


BOTANISCHES INSTITUT
der Universität Wien

Bibliothek

J.-Nr. 1570

Sign. 175a/21



BOTANISCHES MUSEUM
der k. k. Universität.


J.N° 1570

B

32/1*

PLANTÆ ALPINÆ
CARNIOLICÆ.
COLLEGIT ET DESCRIPSIT
H A C Q U E T.

PHILOSOPHIÆ ET MEDICINÆ DOCTOR, ANATOMIÆ,
CHIRURGICÆ ARTIS ATQUE OBSTETRICIÆ PROFES. PUB. ORD.
SOCIETATIS CÆSAREÆ REGIÆ AGRARIÆ ET BONARUM ARTI-
UM IN DUCATU CARNIOLIÆ SECRETARIUS PERPETUUS,
ACADEM. SCIENT. IMPER. NAT. CURIOSORUM. MO-
GUNTINÆ, FRANCOFURTI AD ODERAM, BOTAN-
NICÆ ET GEORGOPHILI FLORENTINÆ, AMI-
CORUM NAT. SCRUT. BEROLINENSIS,
HALLENSIS, OECONOMIÆ
LIPSIENSIS &c.
SODALIS.



VIE N N A E,
Sumptibus Bibliopolæ Joannis Pauli Kraus.

1782.



S O C I E T A T I

B O X A N N I C A E

F L O R E N T I N A E

M U L T O C E L E B E R R I M A E

E T

V I R O I L L U S T R I S S I M O

R U P E R T O C O M I T I P A N T U L P H I N I O

E J U S D E M S O C I E T A T I S

P R A E S I D I D I G N I S S I M O

D. D. D.


A U T O R.

P R A E-



P R A E F A T I O.

Quem tibi, Lector benevole, in praesentiarum si-
sto, primus fasciculus est plantarum, quae in alpi-
bus Carnioliae & Istriae crescunt. Exigui quidem
utrique sunt termini, attamen non facile hortum bo-
tanicum, quo natura opes suas tam copiose conges-
sisse videtur, elegantum magis, & ornatum videris.
Quae enim regio, quis locus tantam botanicarum
rerum copiam, tamque multiplicem simul novita-
tem, utut sit amplissimus, ostentare potest, & tan-
quam re sua propria gloriari, an non id flora car-
nio-



niolica (*) & appendix ad floram austriacam (**)
 Iculenter comprobant? Difficile sane fuit novi quid
 hoc in genere detegere, quandoquidem & provin-
 cia nostra exigua est; & de re Botanica optime me-
 riti Mathioli, & Scopoli, quorum ultimo principem
 facile in sedulitate, & diligentia inquirendi locum
 concesserim, non sine nominis sui gloria, iam pri-
 dem in hac materia elaborarunt. Veritatis nimium
 studiosus, non possum non hic commemorare illu-
 strissimum D. L. B. a Wulfen, cuius indefessus la-
 bor orbi erudito perquam cognitus est. Huius ope-
 ra usus perquam frequenter, & hic, & alter ami-
 corum meorum; nec operae pretium duxerunt, ut,
 quod alieno labore compilarunt, suae forte nimium
 timentes gloriae illi in acceptis referrent, eiusque
 recte ibi obliviscerentur, ubi maxime commemora-
 ri merebatur! quam facile alieno vivitur labore!

quam

(*) A Scopoli Flora carniolica, editio 1. & secunda c. fig. æneis in
8vo Vindobonæ 1772.

(**) II. Jacquin Flora austriaca. Vol. V. Viennæ Austriae 1778. fol.
maj. c. fig. coloratis.

quam facile res, quae ad manus ultro defertur, definitur & describitur ! sed quantis stat sumptibus, quantis, quamque periculis plenis difficultacibus circumficitur is, qui aut novi quid & irreperi adhuc in naturae regno deprehendere, ubique locorum se praesentem fistere vult, idque in ea regione, ubi vix quempiam invenire est, qui Botanices cognitionem habeat. Accedit praeterea, quod labores nostros non mediocriter remorari potest ; asperitas nempe viarum, quae ad haec loca inacessibilia ducunt, ingens montium altitudo, nivibus hinc inde tecta, ubi vix plantam deprehendi posse arbitrabar ; quo tamen Lithologiae studio duntaxat impulsus eluctatus sum.


In hac decade plantarum neque stili elegantiam, lector benevole, neque minutissimarum rerum exactam descriptionem requires ; meus omnis labor eo tendit, ut singulae plantae, quantum fieri potuit, clare & distincte descriptae exhibeantur. Secutus sum Cel. Linnei characteres, genera quod

atti-



attinet, nihil novi mihi occurrit, speciebus novis
nomen specificum ex ipso loco natali impertitus sum.

Utere, Lector benevole, hac opera mea, quam
non omni fructu caritaram iudico, apud eos praefer-
tim, qui non alienum a studio botanico animum ha-
bent; intuebuntur enim occultas naturae divitias se-
que ad similes labores ultro excitari sentient.
Quod ut eveniat ad maius botanicae rei incremen-
tum, ex animo opto, vale.





N. I. TAB. I.

C A R L I N A U T Z K A.

RADIX perennis recta subfusiformis vel conoidea, aut tortuosa ratione loci natalis, rugosa ex flavo in fuscum degenerans, ex qua complures radiculae crassitudine pennae anserinæ, extus flava ferruginea, intus albescens, aliquantum amara.

Caule caret, omnia folia intima tum præcipue illa primi anni, sunt oblonga, ovata, attenuata, undulata; basis in petiolum canaliculatum per totam folii longitudinem. Reliqua folia magna, petiolata, profunde laci-niata, spinosa, minora, quæ versus calicem protenduntur, sessilia integerrima, aut in ellipsoïdem, aut in linea-rem longitudinem procurrentia, spinæ feroce in circum-ferentia: subtus venæ insigniores, & crassæ admodum, perque venulas numerosissimas, quæ reticulatæ, albæ, villosæ, superne fusco virentes, & scabriusculæ.

B

Flos



Flos amplissimus unicus, cuius diameter quinque aut sex pollicum est. Calix radiatus, cartilagineus, subtilissime pilosus, pallide flavescens, duos vel tres pollices longus, minute dentatus; margo basis membranaceus, vel pilosus; superne canaliculato dorso & in gibbum flavum, obscurumque leviter elevato.

Corollæ pallescentes quinquedentatae leviter ventricosæ cum antheris quinque affixis concoloribus, quibus stigma clavatum inhæret. Semen cuneiforme obtusum, minute villosum, pappus setaceus, flavo albus, setulis pollice longioribus, in fasciculos ordinatis; flosculi & in ipsa maturitate remanent. Discus carnosus albescens perpendiculariter bisectus unius pollicis crassitudinem attingit.

Icon omnia in sua nativa magnitudine repræsentat. A. & B. folia ultima versus calicem ovata & linearia, ad basim carnosa sunt; C. & D. squamæ seu foliola calicis; E. partem externam seu convexam; D. concavam seu internam refert; E. stamen unicum figuram lanceolatam habet. F. Semen maturum cum pappo; G. setulas in fasciculos ordinatas; H. corollas tubulofas integras cum stamine, & pistillo I. easdem incisas, & apertas, K. folium, prout in prima ætate nascitur.

Elegans hæc, & utilis planta in summitate montis Utzka, seu montis majoris, qui quasi medius exsurgit, & in contermino monte Planick, & iterum prope Lupocklau, ad pedem montis mihi occurrit. Mirabar vehementer, qua ratione fieri potuerit, ut hæc oculis Clar. Mathioli per Istriam proficiscentis subterfugerit: forte quemadmodum alii Botanici, nimia montis altitudine, viarumque asperitate, vel denique incolarum ferocitate territus huc non pervenit. Sicut & Celeb. Scopoli. Apud nos in Istria, ut in Levante, qui, absque eo quod ipsi sinistri quid a populo accidat, versari vult, necesse habet, ut se popularem esse dicat, quare eorundem linguam callere debet.

Botanices amicis gratam abunde rem vel ex eo fecisse arbitror, quod ea in hac planta exhibuerim, quæ eandem determinant, sed contentine etiam erunt, quorum Deus venter est, cui, dum & de rerum cognitione loquuntur, thura ferunt? Hinc ut & iis satisfaciam, qua ratione hæc planta adparari debeat, ut ad manducandum adponi possit, paucis dicam.

Caro alba, & grati odoris, & minus adhuc amara, quam Cynara Scolymus Linnei; potest quidem manducari cruda; interea tamen & cocta sapit palato. Cum hæc plan-



planta vel in monte naturæ beneficio nata , jam apta est nutriendo corpori , quis illam non dignam æstimet , quæ ad nostros hortos deportetur , colloceturque.

Nulla planta meretur majori jure nominari acaulis , atque hæc ; nam carlinam acaulim Cel. Linnei , Vaillant & aliorum minus probabiliter hoc nomine insigniverim , quandoquidem sæpe unius pedis caulem habet : floret mense Julio , semen mense Septembri maturescit ; odor nullus.

N. 2. TAB. 2. FIG. I.

I L L E C E B R U M K A P E L A.

Exigua planta , duorum pollicum longitudinem excedens . Radix lignosa , & ramosa , perennat , extus fusca , cinerea , intus albescens , caules & rami verrucosi , crassiores , juniores graciles , repuntque . Lignum illis albidum , cortexque ex cinereo in albidum degenerans .

Folia sunt alterna ovata , lanceolata , duas vel tres lineas longa , aliquantum pilosa , sessilia integerrima , stipulae cum foliis alternatim occurrunt , ejusdemque sunt figuræ , albissimæ , pellucidæ , integerrimæ , glabræ . Caules capitulis terminantur .

Flo-

Flores bracteis nitidis occultati, ovatique, calix viridis quinquefidus, exiguus, cartilagineus, ovatus, lanceolatus, & glaber. Corolla nulla, stamina quinque minora calice, filamenta alba. Antheræ flavæ, stylus unicus, brevis, flavescens. Capsula quinquevalvis, monosperma; semen unicum ovatum fuscum.

Ex hac descriptione quis accuratam cum illecebro paronichio, & capitato Linnei similitudinem, aut, si minus, affinitatem non detegit; neque ego locum huc inter allatas duas species unquam negavero.

Crescit in alpibus calcareis sterilibus, has alpes Kapelam dicunt incolæ, circa Grobenek, & versus Recka; dein super monte Kleck. Shneschnihich dicto; & alibi in montibus circumiacentibus floret sub finem Julii, semen maturescit sub finem Augusti, odor nullus.

Icon repræsentat plantam in sua naturali magnitudine, ad latus fistitur A. flos; B. folia cum stipulis & bracteis aucta, C. squama corollæ; D. capsula; & E. semen.



N. 3. TAB. 2. FIG. 2.

R H A M N U S H Y D R I E N S I S.

Arbor inermis, subramosa, tres vel quatuor orgyas alta, paucis ramis prædita. Radix inter faxa calcarea sefe diffundit, truncus illi est diametri unius pedis, cortex durus, cinereus, fuscus, verrucosus, intus flavus, & albidus. Rami nudi, sola in summitate foliosi, veluti in orbem positi, folia sunt glabra, ovalia, uno vel dupli dente crenata, fuscovirentia, subtus albida.

Cyma terminalis, & axillaris, in ramulis junioribus flores non habet, in senioribus autem triginta, aut plures inter folia in formam umbellæ prodeunt. Multi ex his sunt steriles, ex hac potissimum causa, quod non satis nutrimenti habeant.

Calix viridefcens, paulo longior, ex tubo campanulato in limbum expanditur, quadrifidum patentem, planum, tubo ferme acuto longiore; supremo tubo adnascuntur stamina quatuor, erecta, quibus singulis squamu-læ pone accubant, oblongæ & breviores, atrofuscæ. Ger-men est subrotundum, parvum, pistillum bifidum, breve.

His baccae succedunt rotundatae, molles, pellucidae, primo virides, in maturitate nigrescentes, saporis ob dulcedinem ingrati. In qualibet bacca semina bina vel terrena continentur, ovata, nitida, pallescentia, inclusa singula arillo proprio bivalvi. Floret mense Junio & Julio, fructus maturescit m. Septembri, & Octobri. Iconi adstant, rami florentis in A. flos auctus in utraque; in B. germen; in C. squamulae cum stamine; in D. bacca integra; in E. semen.

Habitat in montibus circa Hydriam, Zhernvehe, mali Golack & Voiska ad Terminos Goritienses, & Tolminenses.

N. 4. TAB. 2. FIG. 3.

GENTIANA TERGLOVENSIS.

Primo intuitu judicavi hanc plantam ad gentianam pulmilam, & acaulem referri posse, at deprehendi, eam, & proprios, eosque constantes characteres habere, ita ut non possit non constituere propriam speciem, quemadmodum id more Cel. Linnei, & Cel. Jacquinii me facere oportere arbitror, qui ultimus in flora sua Tom. II. & IV, Tab. 135, & 302. utramque accurate descriptis, & depinxit.

Ego



Ego itaque, qua possum cura, hanc exsequor.

Tota planta glabra, & inodora est.

Radix perennis, erecta, fibrofa, pallens & ætate multiceps, in surculos abit paucos, subdivisos, rosula terminatos, caulis quasi nullus, si persistit, est erectus, gracilis, subrodundatus, semper unifloris. Folia radicalia sunt alterna sessilia, ovalia, duos vel tres lineas longa, integerrima, pinguia; folia duo ad calicem, quæ lanceolata sunt, subacuta, & opposita.

Flos pollicis longitudinem superat. Calix tubulosus, brevis, pentagonus acuminatus, quatuor lineas altus. Laciniæ limbi corollæ cæruleæ quinque, rotundatæ, integrimæ, trium linearum diametrum habent, cum interjectis squamulis semibifidis. Filamenta alba tubo longiori adhærent. Antheræ flavæ, & liberæ. Stylus longus cum stigmate infundibiliformi, ad marginem quasi plumosus, in fructu bipartibilis, ventricosus, ad basim gibbosus. Semina minima fusca, ovalia, floret m. Julio, semina maturescunt m. Octobri; crescit super monte Terglouensi, ad pedem montis glacialis, in monte na-Ziperi, & o protech territorio Bohinensi.

Exhibui in Tabula plantam in nativa sua magnitudine, ad latus fistitur in A. stylus cum stigmate, & fructu

ctu

ctu in maturitate; in E. semen unicum c. limbus corollæ apertæ, odor nullus.

N. 5. TAB. 3.

OENANTHE KARSTHIA.

Radix perennis, subcarnosa, extus fusca, intus albida, tortuosa, radiculis pluribus bifurcatim teres. Caulis solitarius, rotundatus, leviter striatus, glaber sicut tota planta medula albescenti farctus, duos pedes altus. Folia radicalia bipinnata, innixa costa ad basim vaginante, parum striata, semiamplexicauli, circumscriptione oblonga vel elliptica, pinnis lanceolatis, vel subovatis sessilibus, ferrato incisis acutiusculis ad costam principem sedent, folia caulina omnia sunt pinnata, summa ternata; pinnulæ sunt integræ, lineares aut lanceolatæ, acutæ. Petioli fistulosi, & minute striati, ex basi membranacea & vaginante ortum ducunt.

Umbellæ universales convexæ, & involucro paucifolio setaceo instructæ, semper eriguntur, compositæ ex radiis decem, aut duodecim. Umbellulæ particulares subrotundatae, densæ, & parvæ, involucro setaceo due, aut tres flores non superant. Radii exteriores paulo lon-



giores sunt interioribus, flosculi omnes fertiles, & ferme æquales sunt, dum extimorum petala extima pauxillo sunt majora, alba, cordata, dorsoque striata. Filamenta corollæ longitudine: styli rigiduli, paulatim valde elongati. Perianthium pentaphyllum, laciniis lanceolatis, acuminatis, & inæqualibus. Fructus striati, subrotundati, constant ex duobus seminibus, ellipticæ formæ, parum striatis, stylo bifido instructus, quorum alterum tribus foliolis calicis coronatur, & alterum duobus. Odor nullus; sapor pimpinelloideus. Floret mense Julio, semina matu-
rescunt Augusto.

Habitat prope Cryptam cornealem super monte Manas ad Boickam, etiam in montibus circa Reckam, abun-
danter deprehenditur circa Lippizam super Karschto in Carniola interiore.

Iconi ad latus fistitur in A. flos, in B. semina aucta.

Cum hæc planta in multis cum oenanthe pimpinelloide convenit, facile pro eadem haberetur; cui viva ad manus non est, hanc iconem expressam cum illa conferre poterit, quam Cl. Jacquin in citato suo opere Tab. 394· exposuit, ipseque ultro discrimina, quæ inter utramque intercedunt, partim in radice, partim in foliis detegit.

N. 6. TAB. 2. FIG. 4.

CLATHRUS (Fungus) HYDRIENSIS.

In tanta fungorum copia, quos partim Cel. Linneus, & D. Schæfferus determinarunt, quem præfens tabula exhibet, non reperi.

Fungus mediocris, subtriangularis semiputridis arborum radicibus innascitur, subcoriaceus, mollis. Stipes durus, subovatus; curvus, membrana albida obductus. Calamus digitii minimi crassitudinem habet; parum striatus, niger, villosus. Pileum gerit figuræ quasi triangulæ, coloris bruneo-nigri, subtus lamellosus labyrinthiformis; lamellæ versus calatum sunt aliquantum parallelae; superne pileus nodis distinctus, quorum figura fructibus pinus pineæ similis est; cum vero nodi alii majores, minores alii sunt confluentes, efformantque figuram jam pentagonam, jam tetragonam. Ex centris nodorum striae versus latera procurrunt. Partes aliquæ revolutæ, aliquæ planæ, membrana subtilissima, facili negotio separantur. Substantia spongiformis; lamellæ undulatæ, tenues, elasticæ, nec succum lœfæ fundunt. Odor putridus suavèolens.

Ha-



Habitat in collibus prope Hydriam, versus Merslara, Zhernaverch. Ad latus figuræ lamellæ adstant. Crescit mense Julio.

N. 7. TAB. 2. FIG. 5.

LEONTODON TERGLOUENSIS.

Crescit super monte Terglou, ubi glacialis esse incipit, & hoc quoque in locis duntaxat hujridis, reperiitur etiam in alpibus circumjacentibus.

Tota planta inodora est, unum, duos aut tres pollices alta. Radix perennat, crassa, nigra, pollici longitudinem adæquat, fibrillas undique generans, fuscas, albescentes. Caulis firmus, hirsutus, unicus, teres, foliosus. Folia infima duobus pollicibus longiora, amplexicaulia, runcinata, sinuata, acutæ, pilis nigris obducta. Superiora profunde dentata, admodum hirsuta; ultimum folium lineare, integrum, pilosum, nigrum.

Calix ex oblongo globosus, constat squamis imbricatis, lanceolatis, acuminatis, erectis, nigris & hispidis. Corollulæ sulphureum colorem habent, quinquedentatae patentesque, calicem bis superant. Antheræ luteæ. Germina

mina oblonga, glabra, styli longi, stigma luteum, & revolutum.

Receptaculum album, nudum, subcarnosum, semi-na fusca, cuneiformia, pappo coronantur sessili, piloso, ad latus figuræ representatur semen unicum cum pappo.

Figura, quam hic intueris, exhibit naturalem plantæ magnitudinem, ad quam libere ex terra argillacea exurgit. Hæc, si frustulis lapideis tegitur, scapum nanciscitur gracilem, longioremque, ita ut aliam omnino formam induat.

N. 8. TAB. 2. FIG. 6.

MYOSOTIS TERGLOUENSIS.

Clar. Linneo genus myosotum, de quo pauci, & ii quoque non clare satis, & dilucide tractarunt, in acceptis referre debemus, tanta accuratione elaboratum.

Ego primo intuitu hanc plantam non hæsitavi ad genus aretiæ referre, quemadmodum in Collectaneis (*)

Bero-

(*) Beschäftigungen der Berliner Gesellschaft Naturforschender Freunde. Tom. I. 1780. in c. fig.



Berolinensibus, in quibus de itinere meo per alpes carniolicas, & carinthiacas ago, illam nominaveram; at diligentiori subin examine adhibito detectisque singulis notis deprehendi, eam Myosotim esse.

Tota planta colorem tristem, vel viridem fuscum habet, excepto flore. Odor gratissimus, sicut syringa Linnei.

Radix perennis, sublignosa recta, profunda, multum tortuosa ratione situs, tres, vel quatuor pollices longa, fibras paucas habet. Caulis foliosus, imbricatus, hirsutus; rectus vel procumbens; ex una radice plures quoque caules nasci solent.

Folia infima subnigrescentia, alia fusca virentia, oblonga, ovata, aut spatulata, sessilia, plana, integerima, duas, vel tres lineas longa, pillis albis rigidis instruta, quæ caulem circumdant, in medio duo, aut tres flores nascuntur, caulis medius rectus, lateralis utrinque dependent, & quasi corymbum efformant. Hæc planta raro admodum est uniflora; aut acaulis.

Calix semitubulosus quinquefidus, initio villosus, laciniæ quasi lanceolatæ; tubus duplo longior, primo patens, & deinde flores erecti, vel involuti.

Corolla hypocateriformis; tubus ventricosus calyce brevior, annulum cylindricum efformat flavum sulphureum. Sub fauce stamina quinque, quorum filamenta flavescentia subulata minima. Antheræ rodundatae flavæ. Limbus corollæ eleganter cœruleus, planus; in ore glandulæ nectariferæ bifidæ quinque persistunt; segmenta corolla subrotunda, ovata integra. Germen in fundo calicis, sessile, subglobosum, flavum, viride. Stylus stama na attingit; stigma capitatum. Capsula unilocularis polysperma, apice dehiscente, in quinque valvulas divergentes intra calicem persistent. Semina quatuor aut quinque, ovalia fusca. A. Repræsentat in naturali altitudine corollam integrum. B. Corollam apertam cum glandulis, & staminibus. C. Calicem medium apertum. D. Eundem patentem cum capsula, & seminibus in maturitatis statu. E. Capsulam cum stigmate non perfecte maturam. F. Semen unicum parum augmentatum.

Floret m. Augusto, semen maturescit m. Sept. Habitat in monte Terglou ultra montes glaciales, in supremo loco, qui adhuc terra vestitus est, in collectaneis Be-
roli-



rolinenibus superius commemoratis determinavi, in quantum ex crescere soleat altitudinem.

N. 9. TAB. 4. FIG. I.

S C A B I O S A T R E N T A.

Tinter triginta, scabiosarum species, quorum Linneus in suo systemate meminit, nulla est, quæ huic, quam ego hic adfero, similior sit, quam illa, transilvanica, cuius figuram Cl. Jaquin vol. 1. pag. 50. Tab. 11. (*) accuratissime exhibuit, nostra hæc ad 10. primas Linnei nempe corollas quadrifidas referri debet.

Tota planta glabra est. Radix crassiuscula, sæpe longa subnodosa intra scopulorum fissuras ut plurimum crescit versus capita petiolorum antiquorum semitabis, & albescientibus radiculis induita est.

Caulis unicus sex pollices altus, teres, leviter striatus, nunquam ramosus, folia inferiora sunt pinnatifida amplexicaulia, plantam medium altitudine superat; costa

fo-

(*) Hortus Botanicus Vindobonensis. Tom. III. 1770. in fol. maj.
c. fig. col.

foliorum aliquantum sulcata, rigida; lobi inferiores liberi, valde crenati & runcinati, exteiiores semper maiores sunt interioribus. Ex ultimo loborum pari alter lobus perpendiculariter exsurgit, ejusdem formæ cum reliquis, sed solum secundum par foliorum est etiam pinnatifidum minutim crenatum, superiore folia sunt linearia integrerrima. Flos unicus, globosus. Calix communis ovatus, & acutus componitur ex squamulis albis membranaceis, mucronato-aristatis. Corollæ albæ quadrifidæ, ad marginem maiores sunt. Stamina oblonga alba. Antheræ flavæ. Pistillum bteve. Fructus compositus, ovatus & obtusus. Semina ovalia, subpilosa calyculis parvis dentatis coronata. Odor nullus. Floret mense Julio, Augusto, semen maturescit m. Octobri. Primam deprehendi in montibus circa Trenta, & in parte occidentali Terglou in declivibus, infra montem Ziperie, & Traschim-verch & super Mischelem-verch. Ad latus figuræ A. squamulæ calicis; B. semen aristis coronatum.

N. 10. TAB. 5.

ATHAMANTA GOLAKA.

Tota planta glaberrima est. Radix perennis, extus cinerea, intus albida, septem vel octo pollices longa, sub-

D

car-

carnosa, crassa vel fibrosa, ad saxum allisa ramos longos de latere propellens, oreofelenique sapore aliquo prædicta. Coronam fetaceam de præteritis foliis habet. Caulis solitarius, superne ramosus suberectus ascendit, unicus, rotunde fulcatus, duos, tres, vel quatuor pedes altus, ferme glaber. Calami medulla in centro albida, crassitudo unius pollicis est. Folia radicalia ex petiolo membranaceo, & amplexicauli enascuntur, inferiora æque ac superiora tripinnata, in summitate caulis incisa duntaxat, ratione ipsius plantæ magnitudo diversa est, in majore bipedalia sunt. Costæ sunt striatæ anteriores canaliculatæ, pallide virescentes. Caules superiorum foliorum quasi membrana involuti sunt, quæ jam leviter, jam profunde trifida, aut quadrifida, vel etiam pluries incisa est, laciniae ovatæ oblongæ, acutæ, planæ, supra splendide virides, infra palescentes; in summo caule folia singula sunt simplicia, lanceolata minutim incisa: basi ampliata, & membranacea.


Involuci universalis foliola sunt circiter octo novemque, lanceolata multumque incisa, reflexa, undulata, rigida; particulare consurgit ex foliolis integerrimis, glabris, sublinearibus, tribus vel quinque. Umbella universalis ampla constat quindecim aut viginti quinque umbellulis inæqualibus erectis. Umbella partialis quindec. aut viginti flores habet flo-

res,

res, petala alba, glabra, ovata cum apicibus inflexis vix subcordata, æqualia. Stamina petalis longiora. Antheræ binodosæ palescentes. Stigmata bifida, brevia, albovirescentia. Omnes flosculi fertiles sunt.

Fructus immaturus, viridis, subrotundatus; maturus fuscus, ovatus, oblongus teres, nitidus, clavatus. Stigma persistens, Semina bina clavata, marginibus quatuor elevatis, extus membranaceis, ovatis, glabris, in medio striatis, albescientia.

Tota planta, excepta radice, saporem ingratum habet, floret mense Junio, semen m. Augusto maturescit. Ad latus Iconis repræsentatur fructificatio omnis in nativa magnitudine. A. Corolla cum stamine & germine. B. Semen non perfecte maturum. C. Idem maturum. D. Semen nudum extra membranas, cuius una pars interna concava, & externa convexa est, odor nullus. Habitat in alpibus Juliis in summitate montis Velki-, & Mali-Golak & in aliis montibus circumjacentibus.



N. II. TAB. 4. FIG. 2.

POTENTILLA TERGLOVENSIS.

Ex tot Potentillis nec unam vidi, quæ huic nostræ perfecte assimilaretur, illa nitida potentilla Cl. Linnei, sicut illam Celeb. de Wulfen in appendice citato describit, maxime cum hac præsente convenit.

Radix est sublignosa, atra, recta ^crassa, parum fibrosa. Caules plurimi suberecti, pollicis altitudinem attinunt, teretes, una cum foliis, & calicibus tomentori, aut dense villosi albi fericei, & glaucescentes. Folia radicalia, plurima, ternata, subamplexicaulia, in inferiore parte membranacea, versus folia patiolata. Foliola oblonga, ovata, obtusa, subsessilia in apice petioli communis, utrinque æqualiter villosa, plerumque plicata, integerrima. Folia caulina inferiora radicalibus similia, petiolata basi stipulis binis linearibus, acutis integris, & ipsi viliis cinctis. Superiora ternata aut simplicia, primo cum stipulis brevioribus lanceolatis integris. Stipulæ sessiles integræ parum canaliculatæ.

Flos in caule semper unicus, terminalis, magnus, speciosus, odorifer sicut Cl. de Wulfen potentillam suam descrip-

scripsit. Calix persistens subcoriaceus decemfidus, segmentis lanceolatis, alternis brevioribus, angustioribus, supra tandem parum rubescentibus, subitus pallide virescens, villosus. Pili in segmentis lanceolatis strias formant duplices. Petala quinque subcordata, leviter emarginata, pallida, rosea, ampla. Stamina plurima, filamenta albida duas lineas longa, antheræ clavatæ, rubræ, cum polline flavo. Receptaculum villosum. Germen ovatum, sessile, rubrum, sed villo albo sericeo vestitum. Stylus rotundatus, nudus, ruber. Stigma breve, simplex. Florent mense Julio, Augusto, super monte Terglou Sa-Utech, & Zospoliza in regionibus glacialibus. Infra prope A. repræsentatur calix. B. Folium ternatum cum stipulis expansum. C. Stamina. D. Germen pilosum. Omnia in naturali statu.

N. 12. TAB. 4. FIG. 3.

C A R L I N A P O L A.

Tota planta tomentosa, seu arachnoidea est. Radix perennis, lignescens, fere quatuor pollices longa, etiam brevior, non ramosa, tortuosa, fibris vel radiculis funium instar instructa, slavecens, saporem eundem prope quem carlina acaulis habet, hunc saporem temperat levis superveniens dulcedo. Caulis erectus, tres pollices, aut spithamam longus, teres, slavecens, arachnoideus junior
fo-



foliosus, postea nudus, folia alterna sessilia aut subamplexicaulia, in summitate congesta, oblonga, parum ovalia, unius & dimidii pollicis longitudinem habent, rigida, sinuata, spinosa, pungentia; ex angulis sinuositatis pinnulæ oblongæ mucronatæ prostant; in marginibus vero minoribus sunt solitariæ, ex eodem loco in apicibus folia semper solitaria per costas decurrent.

Floris caput suprotundum, cujus summitas in receptaculum elongatur, cui flos infidet involucro foliaceo mucronata rigido; & hæc quoque folia sunt ensiformia, leviter canaliculata, integerrima rigida, & capitulo duplo longiora, coloris cinnabarini, semper persistentia. Corollæ albescentes, quinquedentatæ, tubulosæ, quibus Antheræ quinque slavecentes affixæ. Stigma clavatum. Semen cordiforme, glabrum; pappus setaceus, albescens, sessilis, duas vel tres lineas longus. Discus parum carnosus, albidus, saporem dulcem habet; floret mense Julio, & Augusto; primo hanc plantam inveni copiosam in montibus apenninis super monte Falcon, postea in Campagna di Roma, & in Colliseo prope Polam in Itria. Ad latus A. folium. B. Squamas calicis. C. Semen papposum repræsentat.

Tres numero duntaxat hujus generis plantas in ultimo loco reperi, in quibus Myrmeleon an Libelluloides Linnei insidebat, quem huic plantæ addidi, vel propter singulares nigrescentes maculas.









P. 2.



F. 2.



F. 4.



F. 6.



P. 3.




P. 4.



F. 1


a
b




F. 2.




a
b
c



F. 3.





UB WIEN



+AM374283204

