

BOTANISCHES INSTITUT
der Universität Wien


Bibliothek

J.-Nr.

2253

Sign.

154/31





BOTANISCHES MUSEUM
der k. k. Universität.

J.Nº 2253

B

60 / 26





Supplementum

Horti Botanici Hafniensis


in usum

Tyronum et Botanophilorum,

conscriptis

J. W. Hornemann;

Prof. Botan. ord.



Hafniæ MDCCCXIX.

Typis Schultzii.

Die Botanische Hymenaea

aus der

Academie de l'Institut National

conservatoire

J. W. Hornemann

Bei Cotta's Verlag

1822. MDCCLXXII.

Die Botanische

CLASSEIS ET
CLASSIS I.
MONANDRIA.
~~ANISOGYNO~~
MONOGYNIA:

I. CANNA.

3. C. CHINENSIS $\beta.$ lutea.
Hab. in China 4. C. intr. 1815.

I. b. MARANTA.

Anthera simplex filamento adnata. Styl. petaliformis. Stigm. subtrigonum. Fruct. baccar. sicca. Sem. unicum.

2. M. ARUNDINACEA: culmo ramoso herbaceo, foliis ovato-lanceolatis subtus pilosiusculis, pedunculis bifloris. Willd. Sp. Hab. in Amer. calid. 4. C. intr. 1817.

DIGYNIA.

15. CORISPERMUM.

I. C. HYSSOPIFOLIUM $\beta.$ densum: spicis densioribus.
Hab. — — ♂ D. intr. 1815. — Corisp. spicatum.
W. Sp.

2. C. SQVARROSUM $\beta.$ elongatum: spicis elongatis.
Hab. — — ♂ D. intr. 1815. ex horto Berol. sub nomine Corisp. intermedit.

CLASSIS II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

JASMINUM.

1. I. SAMBAC. γ.

Hab. in Ind. or. ḥ. C. intr. 1812.

VERONICA.

59. (52-3). V. CRASSIFOLIA: foliis oppositis ovato-lanceolatis in petiolum decurrentibus, conjugationibus remotis, inferioribus crenatis, superioribus integerrimis, spicis terminalibus solitariis ternisque, corollis orchideis. *Römer et Schult. syst. veget.*

Hab. in Hungar? 4. D. intr. 1810.

5. V. SPICATA β. fol. integerrimis.

Hab. in Europa 4. D. intr. 1805.

10. V. GLABRA β. latifolia γ. fol. ternatis.

Hab. in Europ. austr. 4. D. intr. 1811.

13. V. LONGIFOLIA: β. fol. oppositis γ. flor. albis fol. ternatis δ. fol. basi incisis.

Hab. in Europ. 4. D. intr. 1811 &c.

14. V. MARITIMA β. humilis.

Hab. in Europ. 4. D. intr. 1813.56. (14-15). V. COMPLICATA: foliis verticillatis oppositisque linear-lanceolatis complicatis dentatis, dentibus incrassatis. *V. E.*

— — β. fl. albo.

Hab. in Europ. australi 4. D. intr. 1813.

57. (16-17). *VILLOSA*: foliis oblongo-ovatis inciso-serratis, cauleque subvillosis. *Schrad. Com.*

Hab. — — 4. D. intr. 1814.

58. (35-36). *V. CAUCASICA*: racemis lateralibus, foliis bipinnatifidis: laciiniis lanceolatis linearibusque, pedicellis capillaribus, calycinis segmentis subaequalibus lanceolatis, caule erectiusculo. *Bieb. cauc.*

Hab. in Iberia. 4. D. intr. 1815. — Racemi foliosi elongati.

38. *V. LATIEOLIA* *β. incisa*.

Hab. in Europ. 4. D.

55. (38-39). *V. DENTATA*: foliis ovatis vel oblongo-lanceolatis acutiusculis remote serratis, calycibus quinqvepartitis, caule adscendente. *Schrad. germ.*

Hab. in Austria 4. D. intr. 1814.

54. (40-41). *V. MOLLISSIMA* *Zea*: caulibus prostratis undique pubescenti-lanuginosis, foliis ovatis cordatis pubescentibus grosse serratis sessilibus amplexicaulis, calycibus nervosis.

Hab. in Hispania? 4. D. intr. 1815.

53 (44-45). *V. CRISTA GALLI*: hispida, foliis cordatis serratis longitudine pedunculi, calyce diphyllo compresso cristato persistente.

Hab. — — ④. D. intr. 1815. ex horto *Windobonensi* sub hoc nomine.

30. JUSTICIA.

14. (2-16). *I. SEXANGULARIS*: umbellis axillaribus trifloris, bracteis cuneiformibus, foliis ovatis. *V. Symb.*

Hab. in Vera Cruce, Jamaica ④. C. intr. 1816.

16. (14-3). *I. ASSURGENS*: spicis axillaribus terminalibusque, floribus alternis, bracteis linearibus. *Vahl Symb.*

Hab. in Ins. carib. ④. C. intr. 1816.

13. (5-6). *I. PANICULATA*: calyce antherisque simplicibus, filamentis hirsutis, paniculis terminalibus axillaribusque subdichotomis, floribus secundis, capsulis com-

DIANDRIA MONOGYNIA:

presis, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis. *W. E.*

Hab. in Ind. orient. *Θ. C. intr.* 1815.

35. (11-12). *I. INFUNDIBULIFORMIS*: spicis axillaribus terminalibusque, bracteis imbricatis lanceolatis villosis, foliis lanceolato-ovatis quaternis. *V. E.*

Hab. in Ind. orient. *Θ. C. intr.* 1815.

35. LYCOPUS.

2. *L. EXALTATUS* *β. minor.*

Hab. in Europa austr. *Θ. D. intr.* 1815.

4. *L. RUBELLUS*: foliis ovatis argute dentatis basi apice que integerimis subtus coloratis.

Hab. — — *Θ. D. intr.* 1804. ex horto *Kiloniensi* sub hoc nomine.

39. MONARDA.

9. (5-6) *M. ALTISSIMA*: foliis ovatis acuminatis basi rotundatis æquivalibus hirtis grosse serratis, floribus capitatis, bracteis pallidis. *W. E.*

Hab. in Amer. bor. *Θ. D. intr.* 1813.

41. SALVIA.

63. (23-24). *S. SPIELMANNI*: foliis radicalibus oblongis subcordatis obtuse dentatis, caulinis dentato-crenatis, verticillis sexfloris, floribus horizontalibus, pedunculo unifloro terminali. *W. E.*

Hab. — — *Θ. D. intr.* 1815.

41. *S. DISERMAS* *β.* floribus rubris.

62. (50-51) *S. HIRSUTA*: foliis lanceolatis ovatis remote serratis hirtis petiolatis, spica terminali, verticillis superioribus confertis, bracteis calyce majoribus ovatis acuminatis nervosis ciliato-pilosis, *W. E.*

Hab. — — *Θ. D. intr.* 1815.

52. *S. SCLAREA* *β.* bracteis coloratis.

Hab. in Italia *♂. D. intr.* 1816.

CLASSIS III.**TRIANDRIA.****MONOGYNIA.****50. FEEDIA.**

22. (5-6). *F. ERIOCARPA*: foliis integerrimis obtusis, superioribus basi dentato-laciñiatis, fructu 5-6 dentato hispido. — *Valerianella eriocarpa* Desvaux.

Hab. — — ♂. D. intr. 1814.

57. IXIA.

5. *I. MACULATA* γ. carnea, macula fusca.

— — δ. alba.

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1816.

16. (5-17). *I. FLAVA* mihi foliis linearí-ensiformibus non marginatis, scapo subquadriifloro, tubo spatha longiore.

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1805. sub nomine *Ix. macul. flav.*

11. *I. CROCATA* β. flore rubro.

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1816.

17. (16-20). *I. STRIATA*: foliis linearí-ensiformibus marginatis, spathis membranaceis, valvula exteriore tridentata longitudine tubi. *V. E.*

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1805.

20. (17-19). *I. DUBIA*: foliis ensiformibus, scapo monostachyo, floribus maculatis, spatharum valva exteriore uniaristata interiore biaristata. *Venten. Choix.*

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1817.

19. (20-6). *I. VIRIDIFLORA*: foliis linearí-ensiformibus marginatis, scapo polystachyo multifloro, corollis basi maculatis, tubo spathis enerviis longiore. *Willd. En.*

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1817.

18. (8-9). *I. GRANDIFLORA*: foliis subtiliter striatis, spathis aristato-laceris, tubo brevi, laciniis stellato-patentibus oblongo-cuneatis apice rotundatis, staminibus lateralibus. *Gawl. in Curt. Mag.*

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1817.

15. (9-10). *I. SORDIDA* mihi foliis linearibus scapo unifloro brevioribus, corolla erecto-patula, spathis membranaceis lacero-aristatis.

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1815. — affinis *I. monanthæ* Delaroche qvæ vero secund. Vahlium varietas est. *Ix. bulbiferae*.

14 *I. HYALINA*: $\beta.$ carnea.

— $\gamma.$ flore roseo variegato.

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1810.

58. GLADIOLUS.

26. (4-5). *G. VENOSUS*: corollis subringentibus, spathis tubum æqvantibus, laciniis corollæ obtusis trinerviis venosis, foliis lineariformibus. *W. E.*
Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1809.

5. *G. CUSPIDATUS* $\beta.$ ocellis majoribus.

— $\gamma.$ petalorum acuminibus longioribus.
Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1810.

24. (6-7). *G. HIRSUTUS*: foliis ensiformibus, corollis fere regularibus. *Ait. kew. Ed. 2.*

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1817.

25. (9-10). *G. LACCATUS*: corollis infundibuliformibus cernuis fauce teretibus: laciniis oblongis obtusis, tubo spathis lanceolatis attenuatis æqvali. *Vahl. Enum.*

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1817.

27. (13-14). *G. UNDULATUS*: foliis ensiformibus, petalis subæqvalibus lanceolatis undulatis. *Lin.*

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1800.

21. *G. PLICATUS* $\beta.$ *augustifolius* — exstant in horto varietates plures flore purpureo, cyaneo. &c.

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1815.

61. IRIS.

8. I. NEGLECTA β . petalis obscure coeruleis.

Hab. — — 4. D. intr. 1813.

35. (15-16) I. BOHEMICA: scapo pruinoso multifloro superante folia ensiformi falcata recurva, spathis inflatis virentibus. *Schum. fl. boh.*

Hab. in Bohem. 4. D. intr. 1814.

34. (19-20) I. STENOGYNA: foliis linearibus, caule subbifloro longioribus, germinibus hexagonis, stigmatibus linearibus obtusis, parte tubi incrassata angustam longitudine æquante. *Redout. Lil.*

Hab. — — — 4. D. intr. 1817.

33. (30-31) I. EDULIS corollis imberibus, folio radi cali scapum vaginante linearis canaliculato longissimo, stigmatis labio exteriori integro. *Lin. Suppl.*

Hab. in Cap. b. sp. 4. T. intr. 1816.

62. MORAEA.

6. (23) M. IXIOIDES (*miki*): caule erecto superne ramoso tereti, foliis linearis-canaliculatis erectis scapo longioribus.

Hab. ad Cap. b. sp. 4. T. intr. 1817. — Folium unicum scapo dimidio longius. Scapus superne divisus. Spathæ bi-trifloræ. Corolla patentissima, basi angulata, carnea vel flavo: laciniis dorso viridi carinatis.

64. FICUS.

12. (2-3) F. RUBIGINOSA: foliis ellipticis integerrimis utrinque rotundato-obtusis glabris, junioribus subtus rubiginoso-pubescentibus. *Desfont. Hist. des arbr.*

Hab. in nova Holland. 5. T. intr. 1810.

13. (9-10) F. ELASTICA Roxb. foliis oblongis glabris apice obtuse mucronatis margine cartilagineis, spatha foliorum coccinea.

Hab. in Ind. orient. 5. C. intr. 1815. — Elegans et speciosa planta. Florentem non vidi.

69. CYPERUS.

20. (2-3) *C. PYGMAEUS*: capitulis globosis glomeratis, spiculis ovatis planis, involucro polyphylio foliisque culmo longioribus. *V. E.*
Hab. in Ind. orient. 24. *○. C. intr.* 1817.
19. (3-4) *C. COMPRESSUS*: spiculis digitatis subqvaternis lanceolatis, valvulis mucronatis latioribus membranaceis. *V. E.*
Hab. in Carib. et Amer. merid. 24. *○. C. intr.* 1817.
18. (8-21) *C. DIFFORMIS*: spiculis confertissimis globoso-capitatis, valvulis obovatis, umbellulis subbibradiatis, involucro diphylo umbella longiore. *V. E.*
Hab. in India orientali et Guinea. 24. *C. intr.* 1815.
21. (18-9) *C. SPHACELATUS*: spiculis linearis-lanceolatis complanatis acutis, valvulis margine sphacelatis, involucro subtetraphylo. *V. E.*
Hab. in Amer. merid., Guinea. 24. *C. intr.* 1816.

DIGYNIA.

78. DIGITARIA.

6. (2-3) *D. CHINENSIS* (*mihi*): spicis digitatis qvaternis flaccidis, culmis diffusis radicantibus, foliis lanceolatis glabris, vaginis apice basique villosis.
Hab. in China *○. C. intr.* 1817.

80. ALOPECURUS.

4. *A. GENICULATUS* *β.* radice bulbosa.
Hab. in Europ. 24. *D. intr.* 1803.

84. MILIUM.

7. (3-4) *M. MICROSPERMUM* (*mihi*): panicula subpatente elongata multiflora, floribus aristatis, glumis calycinis subtrinerviis.
Hab. in Canariis? 24. *F. intr.* 1809. ex hort. Monspel. sub nomine Aristidæ canariensis. — In Herbar. *Vahlii* adest *Mili* species huic simillima ab oris

tunetanis. Maxime affine est *M. paradoxo* sed præter notas indicatas differt: foliis angustioribus, floribus minoribus minus ventricosis et seminibus minoribus flavis.

86. TRICHODIUM.

4. (1-2) *T. FILIFORME*: panicula contracta pauciflora, gluma corollina apice biaristata, arista dorsali e basi proveniente geniculata, foliis filiformibus.
Hab. in alpibus Europ. austr. 4. D. intr. 1810. — Arista geniculata tortilis.

87. AGRÖSTIS.

7. *A. VULGARIS* β. *dulcis*.
Hab. in Europa ①. D. intr. 1816.
13. (8-12) *A. DIFFUSA*: panicula florente fructiferaque patente, spiculis submuticis, culmis decumbentibus, ramis stolonibusque repentibus. *Host. Gr.*
Hab. in Austria 4. D. intr. 1813.
22. (15-9) *A. VARIA*: panicula fructifera contracta, spiculis muticis aristatisve, culmo erecto, radice repente. *Host. gram.*
Hab. in Austria. 4. D. intr. 1815.

88. ARUNDO.

25. (3-13) *A. EFFUSA* (*W. Suppl.*) panicula patente, calycibus acutis, arista terminali pilisque calycem æquantibus, foliis glaucis.
Hab. — — 4. D. intr. 1816.
23. (15-14) *A. STRICTA*: panicula stricta patente, calycibus acutis, arista dorsali recta corollam subæquante, pilis corolla brevioribus. *Schräd. germ.*
Hab. in Europ. bor. 4. D. intr. 1812.
24. (13-4) *A. VARIA*: panicula patente, calycibus acutis, pilis corollam æquantibus, arista dorsali geniculata calycem vix excedente. *Schräd. l. c.*
Hab. in Europ. 4. D. intr. 1815.

93. STIPĀ.

5. (1-2) *S. JUNCEA*: aristis nudis rectis, calycibus semi-ne longioribus, foliis intus lœvibus. *Lin.*
Hab. in Europ. austr. et americ. bor. 4. D. *intr.*
 1816.

94. ANDROPOGON.

3. *A. ALLIONII*: spica solitaria erecta terminali, flosculis geminis hinc masculis glabris muticis, inde foemineis pubescentibus longe aristatis, aristis villosis contortis. *Decand. Syn.*
Hab. circa Segusium Pedemontis. 4. F. *intr.* 1815.

95. PASPALUS.

1. *P. PUBESCENS*: β. spicis brevioribus.
Hab. in Amer. boreali 4. F. *intr.* 1812.

99. CHLORIS.

9. (5-6) *C. COMPRESSA*: spicis erectis plurimis umbellatis, perigonii hermaphroditi valvula exteriore dorso gibba et glabra, apice ciliata et longe aristata, flosculis sterilibus 2, altero aristato altero mutico, vaginis compressis ad faucem pilosis. *Decand. Cat.*
Hab. in Gallia merid. ◎. F. *intr.* 1815.

102. PENICILLARIA.

2. *P. CYLINDRICA*: panicula subspicata cylindracea, involucellis setaceis ciliatis, culmi geniculis glabris. *Römer et Schult. Syst. veg.*
Hab. in Ind. orient. Brasilia et Cap. b. sp. ◎. T. *intr.*
 1816.

104. HOLCUS.

3. *H. AVENACEUS* β. *præcox*.
Hab. in Pensylvania. 4. D. *intr.* 1798.

105. AIRA.

2. *AIRA GLAUCA* β. *valesiaca*.
Hab. in Italia 4. D. *intr.* 1800.

17. *A. JUNCEA*: foliis subulatis, panicula patente obtusissima, flosculis apice dentatis, petalo exteriore basi villoso et aristato interiore glabro bifido.
Loisf. flor. gall.

Hab. in montibus Delphinatus. 4. D. intr. 1816.

107. SESLERIA.

6. (1-7) *S. CYLINDRICA*: spica densa cylindrica, foliis acutissimis. *Decand. Syn.*

Hab. in Galloprov. et Helvetiæ alpib. 4. D. intr. 1816.

7. (6-2) *S. TENUIFOLIA*: racemo spicato linearis nudo, spiculis subtrifloris, gluma corollina exteriori tristata, foliis setaceis. *Schrad. german.*

Hab. in Istria. 4. D. intr. 1816.

108. POA.

15. *P. ALPINA* $\beta.$ *multiflora* $\gamma.$ *brevifolia*.

Hab. in alpibus Europæ. 4. D. intr. 1815.

22. *P. PRATENSIS* $\beta.$ *glaucescens*.

Hab. in Europ. 4. D. intr. 1810.

47. (post 41) *P. CAROLINIANA*: panicula patentissima, ramis subverticillatis, spiculis lanceolatis acutis quinquefloris glabriusculis, foliis glabris. *Biel. pl. nov.*

Hab. in Carolina boreal. ①. T. intr. 1813.

43. *P. CONVOLUTA* $\beta.$ *tenuior*.

Hab. — — — 4. D. intr. 1812.

48. (38-39) *P. CHINENSIS*: paniculæ ramis simplicissimis, floribus sessilibus, seminibus imbricatis, culmo erecto. *Lin.*

Hab. in China. ①. T. intr. 1817.

111. DACTYLIS.

5. (2-3) *D. MARITIMA*: spica interrupta, foliis rigidis involutis, stolonibus diffusis repentibus. *Schrad. germ.*

Hab. in Istria. 4. D. intr. 1816.

115. FESTUCA.

41. (12-13) F. DELICATULA: panicula secunda spicata lanceolata: spiculis patentibus quinquefloris aristatis, calycis gluma altera brevissima, foliis linearis setaceis canaliculatis. — *Lagasca* Spec. nov.

Hab. in Hispania 4. O. F. intr. 1816.

24. F. ELATIOR β. *villosa*.

40. (34-35) F. DICHOTOMA: spiculis bi-trifloris dichotomo-divaricatisimis, glumis corollinis biaristatis, panicula basi vagina involucrata. — *Triticum dichotomum* Vahl. *Dactylis memphitica* Sprengel.

Hab. in AEgypto? O. D. intr. 1803.

42. (20-21). F. VAGINATA: panicula patula secunda, spiculis subsexfloris, flosculis obtusiusculis muticis, foliis que linearibus convolutis glaucis, culmo tereti erecto. W. E.

Hab. in Hungaria 4. D. intr. 1812.

43. (post 38). F. MEXICANA: panicula spicæformi: spiculis teretibus undecimfloris aristatis, vaginis scabris. Röm. et Schult. Syst. — *F. scabra* *Lagasca* gen.

Hab. in Mexico 4. T. intr. 1816.

114. BROMUS.

25. (7-8) B. WOLGENSIS W. S. panicula nutante secunda, spiculis lanceolato-linearibus 12-floris, aristis glumis longioribus, foliis pubescentibus.

Hab. ad Wolgam 4. D. intr. 1814.

26. (15-16). B. VILLOSUS (*hort. Landshutt.*) panicula sub-nutante, spiculis scabris linear-lanceolatis compressis superne latioribus, aristis rectis gluma triplo longioribus, foliis culmo ramis que paniculae mollissime pubescentibus.

Hab. — — O. D. intr. 1815.

29. (9-32). B. GLAUCUS: panicula nutante laxa, spiculis oblongis pubescentibus quadrifloris brevissime aristatis foliis subinvolutis glaucis flaccidis culmo que nudis. Spreng. Index hort. halens. 1807.

Hab. — — 4. D. intr. 1801.

27. (12-28). *B. LONGIFLORUS* *W. S.* panicula erecta diffusa, spiculis nutantibus linearibus pubescentibus, foliis subpubescentibus.

Hab. — — 2. D. intr. 1815.

31. (13-14). *B. MOLLISSIMUS* (*mihi*): panicula apice nutante, spiculis lanceolato-linearibus subcompressis nudis, aristis flexuosis longitudine glumæ, foliis culmoque mollissime pubescentibus.

Hab. — — ○. D. intr. ex horto *Vindob.* sub nomine *Br. verticillati*. — Folia superiora subglabra, culmi adscendentibus debiles, aristæ purpureæ.

30. (18-19). *B. CONFERTUS* *Bieb.*: panicula erecta ovata glomerata, spiculis lanceolatis compressis pilosis, aristis rectis gluma sublongioribus, foliis pilosis, culmo ramoso.

Hab. in Iberia ○. D. intr. 1815.

32. (29-30). *B. RUPESTRIS*: spica disticha simplici nutante erectave, spiculis multifloris glabris aristatis, arista valvula sua breviore, foliis glabris, ligula truncata, radice repente *Host. Gram.*

Hab. in Europa merid. 4. D. intr. 1816.

28. (27-13). *B. ANGUSTIFOLIUS* (*mihi*): panicula nutante, spiculis 14 floris linearibus, aristis gluma dimidio brevioribus, foliis anguste linearibus glabris.

Hab. in Caucaso? 4. D. intr. 1815. — communica sub nomine *Brom. angustifolii caucasici* sed non quadrat cum diagnosi *Biebersteinii* et certe a *Bromo erecto Smithii* diversissima, præter notas indicatas, magnitudine 4-pedali et foliis non ciliatis.

117. TRITICUM.

42. (post 22). *T. VARIEGATUM*: radice repente, spiculis glabriusculis suboctofloris muticis, valvulis exterioribus quinquevenerviis, ligula truncata, foliis glaucescentibus. *Spreng. Pug.* 2.

Hab. in Russia? 4. D. intr. 1815.

41. (post. 42). *T. HIRSUTUM* (*mihi*): spica linearis compressa, spiculis quadrifloris, glumis corollinis hirsutis subaristatis, culmo erecto.

Hab. in Russia? 4. D. intr. 1815. ex horto *Goren-*
kano sub nomine *Tr. imbricati*, sed nec cum *Tr.*
imbricato Lamarckii nec cum *Biebersteinii* qua-
 drat.

40. (23-24). T. FARCTUM: glumis calycinis subnove-
 nerviis obtusis quadriifloris, flosculis muticis, ra-
 chis laevi, foliis apice convolutis, vaginis pube-
 scentibus.

Hab. — — 4. D. intr. 1814. *Missum* ab. ill. Bern-
 hardio sub hoc nomine. — *Affine Tr. juncea*, sed
 diversum in primis foliis planiusculis apice tantum
 convolutis et vaginis pubescentibus.

39. (27-43). T. MARITIMUM: calycibus multifloris, flo-
 sculis mucronatis, spica ramosa. *Lin.*

Hab. in maritimis Galliae, Angliae ①. D. intr. 1815.

43. (39-31). T. TENELLUM *Lin.* spiculis multifloris muti-
 cис, valvulis glumisque obtusiusculis, foliis subse-
 taceis, radice annua. *Römer* et *Schult.* l. c. sub.
Brachypodium Halleri.

Hab. in Europ. austr. ①. D. intr. 1815.

31. (43-28). T. NARDUS: calycibus quadriifloris, spicu-
 lis secundis: flosculis aristatis. *Loissel Flor. gall.*

Hab. in Gallia meridion. ①. F. intr. 1815.

38. (post. 28). T. BIUNCIALE *Vittm.*: spiculis quadri-
 qvinqvefloris breve aristatis unilateralibus, foliis
 linearibus.

Hab. in Italia? ①. D. intr. 1801.

118. LOLIUM.

4. (1-2). L. MULTIFLORUM: spiculis 20-floris compressis,
 superioribus aristatis, culmo sublaevi. *Decand.*

Syn. *etragrostis sativa* : *MUTAGRISAT.* T. (ss 1801) s.

Hab. in Europ. ♂. D. intr. 1816.

119. ELYMUS.

16. (6-7). E. PHILADELPHICUS: spica pendula patula, spi-
 culis sexfloris aristatis ternatis, foliis planis. *W.E.*

Hab. ad Philadelphiam 4. D. intr. 1815.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

131. PROTEA.

7. (ante 1). *P. MELLIFERA*, foliis lanceolato-lingulatis basi attenuatis, involucro turbinato, bracteis glabriusculis imberbibns viscidis, aristis corollæ lata-tis longitudine laminarum, stylo glabro apice sim-plici. *Ait. Kew. ed 2.*

Hab. ad Cap. b. sp. h. T. intr. 1816.

8. (3-4). *P. SPECIOSA*: foliis obovato-oblongis basi an-gustatis ramisqve glabris, involuci bracteis seri-ceis interioribus apice subdilatatis mediisque bar-batis, stylo pubescente, aristis corollæ apice la-nata. *Ait. l. c.*

Hab. ad Cap. b. sp. h. T. intr. 1816.

136. SCABIOSA.

12. *S. CILIATA* var. *incarnata*.

Hab. — — 4. D. intr. 1815.

46. (18-19). *S. MONTANA*: foliis hirtis: caulinis ovato-oblongis acuminatis serratis, radicalibus indivisis pinnatifidisqve, caule hispido. *W. E.*

Hab. in pratis Caucasi ♂. D. intr. 1814.

48. (20-21). *S. GRAMUNTIA*: corollulis qvinquefidis, ca-lycibus brevisimis, foliis caulinis bipinnatis fili-formibus. *Lin.*

Hab. in Gal. austr. 2. D. intr. 1814.

24. *S. AGRESTIS*: var. flore albo.

Hab. — — ♂. D. intr. 1815.

16 TETRANDRIA MONOGYNIA.

50. (24-25). *S. LAXIFLORA W. E.*: corollis quinquefidis radiantibus, foliis radicalibus pinnatifidis lyratis, superioribus pinnatifidis: laciniis lanceolatis, caule glabro.

Hab. — — 4. D. intr. 1815.

47. (21-49). *S. AMOENA*: corollulis quinquefidis radiantibus calyce longioribus, laciniis integris crenulatis, foliis caulinis pinnatifidis radicalibus lyratis. Jacq. Ecl. I.

Hab. in Russia 4. D. intr. 1815.

49. (ante 22). *S. MOLLIS*: calyce suboctophyllo, foliis radicalibus lyratis dentatis mollissime pubescentibus, caulinis pinnatis linearibus integerrimis. *W. E.*

Hab. — — 4. D. intr. 1814.

41. *S. OCHROLEUCA*. *Bergiacaea*.

Hab. in Europ. 4. D. intr. 1814.

51. (29-30). *S. SCOPOLII*: corollis quinquefidis subradiatis foliis oblongis obtusis crenatis mollissime pubescentibus, caulinis inferioribus lyratis, superioribus pinnatis glabris: foliolis linearibus.

Hab. — — 4. D. intr. ex horto *Vindebon.* sub hoc nomine.

140. SPERMACOCE.

6. *S. SUMATRENSIS*: foliis lanceolatis hispidis, corymbis terminalibus subdichotomis. *Retz. Obs.* 110. 2. 22.

Hab. in Sumatra 4. C. intr. 1816.

143. ASPERULA.

8. (3-4). *A. ARISTATA*: foliis linearibus subcarnosis, inferioribus quaternis, floribus subternis aristatis. *Lin. Suppl.*

Hab. in in Europ. austr. 4. D. intr. 1816.

9. (4-5). *A. MONTANA*: foliis linearibus, inferioribus senis, intermediis quaternis summis oppositis, caule fuscido, corollis quadrididis externe scabris. *W. E.*

Hab. in Hungaria. 4. D. intr. 1816.

144. GALIUM.

34. (1-2). *G. DIFFUSUM Schrad.*: foliis quaternis lanceolatis trinerviis subitus glabris.
Hab. — — 4. D. intr. 1812.
30. (5-6). *G. TENUISSIMUM*: foliis senis linearibus acutis scabris, caule ramosissimo dichotomo, pedicellis longissimis capillaribus. *Bieb. cauc.*
Hab. in Tauriae et Caucasi rupestribus ①. F. intr. 1815.
31. (30-6). *G. DIVARICATUM W. Suppl.*: foliis quaternis senis linearibus mucronatis reflexis caulibusque procumbentibus hispidis, pedicellis divaricatis.
Hab. — — ①. D. intr. 1815.
33. (10-11). *G. SPLENDENS*: foliis senis linear-lanceolatis, caulibus procumbentibus laevibus, pedunculis bifloris.
Hab. — — 4. D. intr. 1804. — Affine *Galio linifolio*.
32. (22-23) *G. ELLIPTICUM W. Suppl.*: foliis quaternis ovalibus utrinque hispidis trinerviis, panicula divaricata.
Hab. — — 4. F. intr. 1813. A. *G. rotundifolio*, cui nimium affine, differt foliis ovalibus utrinque hispidis.
38. (10-31) *G. ERECTUM*: foliis suboctonis lanceolatis antrorsum aculeato-serrulatis mucronatis, paniculis trichotomis, caule laeviusculo flaccido. *Smith. brit.*
Hab. in Anglia et Gallia meridion. 4. D. intr. 1815.

145. VALANTIA.

10. (3-4) *V. FILIFORMIS Smidt*: foliis ternis quaternis que linear-lanceolatis, fructibus linearibus barbatis altero hispido.
Hab. in Canariis ①. F. intr. 1816. — Communicata ab amicissimo Profesore C. Smidt, nuper in regno Congo præmaturo morte erepto, qui hanc cum multis aliis plantis novis in Canariis detexit.

154. BUDDLEIA.

2. *B. SALIGNA*: foliis linear-lanceolatis integerrimis marginē revolutis subtus tomentosis, corymbis terminalibus coarctatis, floribus fasciculatis. *W. E.*
Hab. ad Gap. b. sp. h. T. intr. 1811. Quæ in Horto bot. hafn. exstat sub nomine *Buddl. salicifol.* est.
Buddl. saligna.

156. PLANTAGO.

37. (8-9). *P. SPARSIFLORA* Mich.: foliis lanceolatis remote denticulatis, dentibus inctaslati coloratis, spica elongata, floribus distantibus.
Hab. in Carolina et Georgia 4. D. intr. 1814.
36. (10-11). *P. SERICEA*: foliis lanceolatis denticulatis quinqvenerviis subtus albo-hirtis, scapo tereti piloso, spica oblonga. *W. Suppl.*
Hab. — — 4. D. intr. 1814.
40. (15-16). *P. CRASSINERVIS* mihi: foliis lanceolatis septennerviis remote glanduloso-dentatis: dentibus fasciculato-pilosis, scapo tereti foliis longiore.
Hab. — — 4. D. intr. 1817. sub nomine *Plant.* sp.
38. (16-39). *P. MONTANA*: foliis linearibus pilosis, scapo tereti hirsuto; spica ovata villosa. *Lam. illustr.*
Hab. in alpinis Gall. austr. 4. D. intr. 1815.
39. (38-17). *P. SALSA*: foliis linearibus subtus convexiusculis subdentatis glabris, scapo tereti hirsuto, spica cylindrica glabra; bracteis longitudine calycis. *Bieb. Cauc.*
Hab. in litt. Taurice 4. D. intr. 1816.

160. CISSUS.

5. (ante 1). *C. AMPELOPSIS*: foliis truncato-cordatis acuminatis dentatis angulatisqve, nervis subtus pubescentibus, racemis duplicate-bifidis. *Pursh. flor. amer.*
Hab. in Amer bor. 4. F. intr. 1816.

CLASSIS V.**PENTANDRIA.****MONOGYNIA.****186. HELIOTROPIUM.**

8. (4-5). *H. OBLONGIFOLIUM mihi*: foliis oblongis integrerrimis obtusis scabris, spicis conjugatis abbreviatis.

Hab. in Ins. Palma ♂. D. intr. 1816. Affine *H. europaeo* sed differt foliorum forma et spicis brevioribus.

187. MYOSOTIS.**I. M. SCORPIOIDES β. sylvatica:**

Hab. in sylvatic. Europ. 4. D. intr. 1810.

188. LITHOSPERMUM.

7. (2-3). *L. HYPOCRATERIFORME mihi*: foliis obovato-lanceolatis scabris basi ciliatis, caule hispido, limbo corollæ replicato.

Hab. — — 4. ♂. D. intr. 1817. ex horto berolinensi sub. nomine *Lith. latifolit.*

189. ANCHUSA.

11. (5-6). *A. HISPIDA*: pedunculis axillaribus diphyllis, foliis lanceolatis repando dentatis hispidis. *Vahl.*
Symb.

Hab. in AEgypto ♂. E. intr. 1816.

20 PENTANDRIA MONOGYNIA.

191. PULMONARIA.

6. *P. DAVURICA* Fisch.: subglabra, foliis radicalibus ovato-cordatis longe petiolatis, caulinis linear-lanceolatis sessilibus. *P. amoena* Stevens.
Hab. in Davuria 4. F. intr. 1815. — Species elegantissima.

194. ONOSMA.

1. *O. ECHIOIDES*. *B. tardiflora*. *C. arenarium* Kit.
Hab. in Hungaria 24. D. intr. 1814. Huc pertinet *O. echioides* γ. Lehmann monographia Onosmatum.

197. LYCOPSIS.

5. *L. VARIEGATA*: foliis repandis dentatis callosis, caule decumbente, corollis cernuis. Lin.
Hab. in Creta ①. F. intr. 1813
6. (1-2). *L. ROSEA*: floribus æqvalibus, calycibus quinquefidis: fructiferis inflatis pendulis, dentibus acuminatis, foliis oblongis hispidis. Bieb. Cauc. sub *Anchusa*.
Hab. ad Fluv. Terek. ①. D. intr. 1816.

198. ECHIUM.

1. *E. CANDICANS* *B. fl. albo*.
Hab. in Madera 5. T. intr. 1815.
13. (2-15). *E. BIFRONS*: caule fruticoso ramoso: ramis apice pubescentibus, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis, paniculæ ovatæ spiculis sæpe simplicibus. Decand. Cat.
Hab. in Canariis 5. T. intr. 1814.
17. (15-14). *E. LINEATUM*: caule fruticoso stricto, foliis ovato-lanceolatis hirsutis, spicis axillaribus conjugatis, staminibus corolla longioribus. Jacqv. Ecl. I.
Hab. in Canariis 5. T. intr. 1815.
15. (13-17). *E. AMBIGUUM*: caule fruticoso ramoso, ramis hispido-setosis, foliis oblongo-lanceolatis

utrinque attenuatis hispidis, paniculae oblongo-ovatae spiculis bifidis, lobis calycinis corollaæ æquilibus. *Dec. l. c.*

Hab. in Canariis ḥ. T. intr. 1814.

14. (17-3). E. VIRESSENS: caule fruticoso ramoso, ramis molliter hirsutis, foliis lanceolatis molibus virescentibus hirsutis, paniculae filiformis spiculis pedicellatis, inferioribus bifidis, superioribus simplicibus. *Dec. l. c.*

Hab. in rupibus Teneriffæ ḥ. T. intr. 1814.

16. (1-2). E. ACULEATUM: caule fruticoso ramoso albidente, foliis linearibus sericeis ad margines et costam pilis aculeiformibus scabris, panicula brevi subglomerata, spiculis simplicibus. *Decand. Cat.*

Hab. in Canariis ḥ. T. intr. 1814.

203. PRIMULA.

8. P. PALINURI: foliis obovato-spathulatis obtusis dentato-crenatis glabris, scapo laterali foliis longiore, umbella nutante, involucri foliolis inæqualibus maximis. *Lehm. mongr. Prim.*

Hab. in rupib. Promontorii Palinuri 24. F. intr. 1816.

10. P. MARGINATA: foliis obovato-oblongis crenato-dentatis glabris albo marginatis, umbella multiflora, involucri foliolis ovatis obtusis pedunculis brevioribus. *Lehm. l. c.*

Hab. in alpib. Europ. austr. 24. D. intr. 1816.

9. P. INTEGRIFOLIA: foliis ellipticis subintegerrimis crassiusculis margine cartilagineis vel subciliatis, umbella 2-5 flora erecta, calycibus tubulosis obtusissimis tubo vix dimidio brevioribus. *Lehm. Prim.*

Hab. in alpib. Europ. austr. 24. D. intr. 1815.

208. MENYANTHES.

2. NYMPHOIDES: foliis cordatis integrerrimis, corollis ciliatis. Lin.

Hab. in aquis stagnant. Europ. 24. D. intr. 1815.

22 PENTANDRIA MONOGYNA.

213. ANAGALLIS.

1. A. ARVENSIS β. flore pallido.

Hab. in Europ. Ο. D. intr. 1813.

220. CONVOLVULUS.

21. (3-4). C. SCAMMONIA: foliis sagittatis postice truncatis pedunculis teretibus subtrifloris. Lin.

Hab. in Syria, Cappadocia 24. T. intr. 1814.

20. (16-17). C. LINEARIS: caulinibus fruticosis, foliis linearibus acutis piloso-sericeis, floribus terminalibus umbellato-paniculatis, calycibus pilosis. W. Sp.

Hab. — — ḥ. F. intr. 1814.

221. IPOMOEA.

7. I. PURPUREA β. variegata.

Hab. in America Ο. D. intr. 1815.

16. (11-12). I. HIRSUTULA: foliis pubescentibus cordatis trilobis acuminatis, pedunculis subbifloris.

Hab. — — Ο. F. intr. 1815. ex horto vindobon. sub hoc nomine. — Flores albi.

17. (14-18). I. TAMNIFOLIA: foliis cordatis acuminatis pilosis, floribus aggregatis. W. Sp.

Hab. in Carolina Ο. F. intr. 1816.

18. (17-15). I. PENDULA Brown.: foliis ternatis: foliolis tripartitis.

Hab. in Nov. Hollandia Ο. T. intr. 1817. — Florem non vidi.

221. B. VESTIA.

Cal. campanulatus 5-dentatus. Cor. tubuloso-campanulata. Stigma capitatum. Caps. 4-valvis. Sem. nuda.

I. V. LYCIOIDES W. E.

Hab. in Chili ḥ. T. intr. 1813.

222. POLEMONIUM.

3. (1-2). P. MEXICANUM: caule ramosissimo hispido, foliis pinnatis: foliolis ovatis, superioribus ciliatis.

Hab. in Mexico ♂. ♂. T. *intr.* 1817. ex hort. *Dorp.* sub hoc nomine. Differt a *P. coeruleo* præter notas indicatas statura humiliori et foliolis obtusioribus.

223. CAMPANULA.

52. (*ante 1*). *C. BALDENSIIS Balbis*: ramosa, foliis oblongis crenatis, pedunculis longissimis, floribus nautantibus, calycibus longitudine corollæ.

Hab. in Monte Baldo ♂. D. *intr.* 1815.

51. (7-8). *C. GRACILIS*: foliis linear-lanceolatis obsolete serratis, caule dichotomo, pedunculis elongatis unifloris. *Pers. Syn.*

Hab. in nova Zeelandia ♂. F. *intr.* 1815.

55. (15-16). *C. SVAEOLENS Schrad.*: foliis radicalibus rhomboideo-ovalibus, superioribus ovalibus, omnibus grosse obtuse serratis, floribus in racemo composite diffuso nautantibus.

Hab. — — — 4. D. *intr.* 1813. — Affinis *C. liliifolia*, sed præter notas indicatas diversa corollis pallidioribus et stylo breviores.

53. (17-18). *C. TRACHELOIDES*: caule sulcato foliisque utrinque attenuatis hirtis, inferioribus ovato-lanceolatis petiolatis, superioribus sessilibus, ramis floriferis paniculatis, calycibus reflexis barbatis. *Bieb. Canc.*

Hab. in sylvis Caucasi. 4. D. *intr.* 1812.

54. (19-20). *C. MACRANTHA hort. gorenk.*: pedunculis solitariis axillaribus cernuis, foliis subtus scabris, supra pubescentibus duplicato-serratis, inferioribus cordatis petiolatis, superioribus ovalibus sessilibus, caule simplici.

Hab. in Russia 4. D. *intr.* 1815.

56. (49-54). *C. AGGREGATA*: caule angulato glabro, foliis caulinis sessilibus dentatis undulatis lanceolatis, floralibus cordatis, floribus axillaribus terminalibusque sessilibus. *W. Suppl.*

Hab. — — — 4. D. *intr.* 1814.

24 PENTANDRIA MONOGYNIA.

21. C. TRACHELIUM: $\beta.$ flore albo.
— — — $\gamma.$ flore pleno.
Hab. in Europa. 24. D. intr. 1812.
50. (31-32). C. LONGIFOLIA λ *Peyr.*: hispida, caule simplici folioso, pedunculis axillaribus unifloris, foliis linearibus subcrenatis longissimis, stigmatibus tribus, capsulis 3-locularibus. *Decand.* *Synop.* sub nomine *Camp. speciosæ*.
Hab. in Pyrenæis et montibus Galliæ narbonens. ♂.
D. intr. 1814.

224 B. PORTLANDIA.

Cor. clavato - infundibuliformis. *Antheræ* longitudinales. *Caps.* pentagona, retusa, bilocularis, polysperma, coronata calyce 5-phyllo.

1. P. GRANDIFLORA: floribus pentandris, foliis lanceo-lato-ellipticis. *Swarz.* fl. ind. occ.
Hab. in Ind. occid. ♂. C. iutr. 1817.

234. LONICERA.

1. L. CAPRIFOLIUM: $\beta.$ fl. pallido.
Hab. in Europa australi ♂. D. intr. 1812.

242. VERBASCUM.

25. (1-2). V. CUSPIDATUM: foliis decurrentibus crenatis tomentosis, superioribus cuspidatis, racemi fasciculis remotiusculis, antheris duabus oblongis. *Schrad.* *Verb.*
Hab. in Austria ♂. D. intr. 1816.
22. (5-6). V. CONDENSATUM: foliis tomentosis: radicalibus elliptico - oblongis basi attenuatis inæqualiter duplicato-crenatis, caulinis oblongis acutis simpliciter crenatis, superioribus subrotundo - ovatis cuspidatis leviter decurrentibus, racemis densis, antheris duabus oblongis. *Schrad.* *Verb.*
Hab. in sterilibus Austriæ ♂. D. intr. 1815.
24. (7 8). V. NEMOROSUM: foliis acutis crenatis tomentosis: radicalibus oblongis utrinque attenuatis,

caulinis inferioribus lanceolatis, intermediis oblongo-lanceolatis leviter decurrentibus, racemi fasciculis remotiusculis, antheris duabus oblongis.

Schrad. l. c.

Hab. in Austria. ♂. D. intr. 1816.

8. V. LYCHNITIS: β. flore albo.

Hab. in Europ. ♀. D. intr. 1815.

21. (8-9). V. SPECIOSUM *Schrad.* foliis radicalibus oblongo obovatis tomentosis, margine subcrenatis, caulinis sessilibus cordatis acuminatis, ramis virgatis, floribus glomeratis, filamentis omnibus albo-lanatis.

Hab. — — — ♀. D. intr. 1804.

19. (10-23). V. VIRGATUM: foliis oblongo-lanceolatis dentatis sessilibus, radicalibus sublyratis pubescens tibus, caule ramoso, floribus aggregatis subsessilibus. *Smith britt.*

Hab. in Anglia, Delphinatu. ♀. D. intr. 1813.

23. (19 20). V. AUSTRIACUM: foliis ovatis glabris crenatis, inferioribus longe petiolatis, superioribus sessilibus, caule superne ramoso.

Hab. in Austria. ♀. D. intr. 1815 ex horto vindobonensi sub hoc nomine, Stamina non vidi.

20. (23-11). V. MONTANUM: foliis tomentosis: radicalibus oblongo-ellipticis crenatis petiolatis, caulinis oblongis acutiusculis obsolete crenulatis, superioribus acutis leviter decurrentibus, racemo subspicato, florum fasciculis subconfertis, antheris subæqualibus. *Schrad. Verb.*

Hab. in Germania, Helvetia, Pyrenæis. ♂. D. intr. 1815.

244. HYOSCYAMUS.

9. (6-7). H. ORIENTALIS: foliis deltoideo-ovatis repandis, calycibus fructus tumidis, genitalibus exsertis. *Bieberst. fl. cauc.*

Hab. in Iberia ♀. D. intr. 1812.

245. NICOTIANA.

ii. (4-5). *N. QUADRIVALVIS*: glutinosa, foliis oblongis sessilibus integerrimis utrinque nudiusculis, corollis acutis calyce longioribus, capsulis quadrivalvibus subglobosis. *Spreng. Pug. II.*

Hab. ad fluv. Missouri. *O. D. intr.* 1815.

249. PHYSALIS.

26. (10-11). *P. IXOCARPA Brotero* (secund. Decand.): ramosa ramis angulatis, foliis ovatis acuminatis, repando dentatis basi inaequilibus, calycibus fructiferis ovatis laevibus.

Hab. — — *O. T. intr.* 1815. — Est *Phys. angulata* B. horti hafn. sed sine dubio spec. distincta.

250. SOLANUM.

55. (2-3). *S. INAEQVALE mihi*: Caule inermi, foliis ovato lanceolatis subtus pubescenti-tomentosis integerrimis sinuatissime, superioribus basi inaequilibus, floribus corymbosis terminalibus.

Hab. — — 24. *C. intr.* 1803. — In herbario Vahlii extat sub nomine *Sol. lanceolati* a Cavanillesio misum, sed a *Sol. lanceolato* differt foliis latioribus angulatis et caule inermi.

57. (13-14). *S. RUBRUM*: caule inermi subperennante, foliis geminis ovatis integerrimis, pedunculis subumbellatis. *Linn.*

Hab. in India orient. *O. D. intr.* 1817.

14. *S. NIGRUM* B. fructu luteo.

Hab. in Europ. *O. D. intr.* 1798.

54. (30-31). *S. REVOLUTUM mihi*: caule herbaceo aculeato, foliis cordatis angulato-lobatis petiolatisque aculeatis, superioribus integris, pedunculis calycibusque viscoso-tomentosis, corollæ lacinias linearibus revolutis.

Hab. in collibus Brasiliæ *O. intr.* 1808. — A *S. ciliato* differt caule annuo, foliis non oblongis, calycibus inermibus et denique corollis. — A *S.*

stramonifolio foliis minus profunde lobatis, aculeis rectis et forma laciniarum corolla.

58. (32-33). S. PENTAPETALOIDES Roxb.: caule herbaceo aculeato, foliis aculeatis, inferioribus cordatis angulatis superioribus sinuatis, corollis quinquepartitis, pedunculis bifloris.

Hab. in Ind. orient. 4. C. intr. 1816.

56. (21-22). S. ZUCCAGNIANUM Dunal. foliis ovatis subrepandis, umbellis terminalibus.

Hab. in Italia? O. F. intr. 1815.

251. CAPSICUM.

12. (1-2). C. LONGUM: pedunculis solitariis, fructibus oblongo-acuminatis subincurvis pendulis, petiolis glabris, caule herbaceo. Dec. Catal.

Hab. — — O. C. intr. 1815. — Vix nisi varietas Caps. annui.

10. (2-3). C. SPHAERICUM: pedunculis solitariis, fructibus globosis pendulis, petiolis glabris, caule fruticoso. W. Suppl.

Hab. — — h. C. intr. 1815.

13. (4-5). C. TORULOSUM hort. madrit.: pedunculis solitariis, fructibus ovato-oblongis torulosis pendulis, caule fruticoso.

Hab. — — h. C. intr. 1813. — An diversum a C. pendulo?

11. (5-6). C. CONICUM: fructibus ovatis pendulis, petiolis glabris, caule frutescente.

Hab. — — h. C. intr. 1815. — Misum a celeb. Sohradero sub hoc nomine.

261 B. TECTONA.

Cor. 5. fida. Stigm. dentatum. Drupa siccata, spongiosa, intra calycem inflatum.

1. T. GRANDIS. Lin. Suppl.

Hab. in Ind. orient. h. C. intr. 1816.

275. VIOLA.

23. (1-2). *V. SAGITTATA*: acaulis, foliis oblongis acutis cordato-sagittatis serratis basi incisis, floribus inversis. *Ait. Kew.*
Hab. in Pensylvan. 4. D. intr. 1817.

21. (ante 8). *V. ARFNARIA*: caulibus simplicibus subpubescentibus diffusis, foliis cordato subrotundis subglabris crenulatis, stipulis lanceolatis dentatis, calycibus acutis. *Dec. Syn.*

Hab. in arenosis Valesiae et Montis Cenisii 4. D. intr. 1815.

22. (8-9). *V. RUPESTRIS Schrad.*: caulibus ramosis decumbentibus, foliis cordatis obtusis, stipulis lanceolatis subserratis, pedunculis filiformibus longitudine foliorum.

Hab. in Europ. rupestrib. 4. D. intr. 1816.

10. *V. LACTEA* *y. lancifolia*.

Hab. in Gallia austr. 4. D. intr. 1815.

20. (13-14). *V. BANNATICA Kit.*: caule angulato diffuso elongato foliisque ovato-subcordatis crenatis glabris, stipulis dentato-pinnatifidis.

Hab. in Bannatu 4. D. intr. 1812.

278 B. MANGIFERA.

- '*Coroll.* quinquepetala: petalis lanceolatis. *Drupa* reniformis. *Nux lanuginosa*.

1. *M. INDICA*: foliis oblongo-lanceolatis, floribus submonandris, drupa maxima. *Lamk. Enc.*

Hab. in Indiis 5. C. intr. 1817.

287. MOLLIA.

3. *M. ARISTATA* *Smidt.*: caule ramoso diffuso, foliis senis lanceolatis apice seta terminatis.

Hab. in Canariis ab illustr. C. Smidtio detecta 4. T. intr. 1816.

289. CELOSIA.

9. (1-2). *C. STRICTA* *mihi*: foliis linear-lanceolatis strictis, summis linearibus, stipulis falcatis.

Hab. ad. Rio janeiro ♂. C. intr. 1817.

8. (4-5). C. CERNUA: foliis inferioribus ovatis subcordatis margine undulatis, superioribus linear-lanceolatis acuminatis, stipulis linear-lanceolatis falcatis, spicis acuminatis subcristatisve.

Hab. — — ♂. C. intr. 1805. ex horto *Calcuttense* sub hoc nomine.

290. ILLECEBRUM.

11. (4-5). I. CANARIENSE: fruticosum, foliis ellipticis acutis, stipulis bracteisque ovatis brevioribus, paniculis terminalibus dichotomis. *Lin. Suppl.*

Hab. in Canariis ♂. T. intr. 1815.

292 B. RAUWOLFIA.

Bacca disperma. *Semina* cordata.

1. R. CANESCENS: foliis quaternis oblongo-obovatis acuminatis pubescentibus, floribus terminalibus axillaribusque. *W. Sp.*

Hab. in Jamaica ♂. C. intr. 1816.

DIGYNIA.

304. APOCYNUM.

4. A. VENETUM: caule erectiusculo herbaceo, foliis elliptico-lanceolatis, margine denticulato-scabris. *W. Sp.*

Hab. in Ins. maris Adriat. 4. F. intr. 1816.

305. ASCLEPIAS.

16. (9-10). A. FUSCATA: foliis ovatis acuminatis margine nudis, pedunculis multifloris, folliculis glabris.

Hab. — — 4. D. intr. 1813. ex horto *berolinense* sub hoc nomine. — *Ascl. nigra* differt summitatibus volubilibus, pedunculis brevioribus paucifloris et folliculis subscabris.

306. STAPELIA.

33. (1-2). *S. PROTENSA* (*mihi*): Corollæ laciniis ovatis acuminatis reflexis margine clavato fimbriatis, coronæ exterioris laciniis obtusis subtrilobis, cornibus clavatis suberectis, appendicibus indivisis, fundo protenso.

Hab. ad Gap. b. sp. 1812. — A *Stap. glauca*, præter notas indicatas statura humiliore ramosiore differt, a *St. revoluta* forma laciniarum corollæ, quæ denique reflexæ non revolutæ sunt.

29. *S. RUGOSA* *B. difformis*.

Hab. ad Cap. b. sp. 24. C. intr. 1811.

34. (25-26). *S. RADIATA*: corollis quinquefida: laciniis replicatis cum fundo hemisphærico subelevato hirsutis, coronæ exterioris laciniis bifidis, interioris foliolis depressis.

Hab. ad Cap. b. sp. 24. C. intr. 1816. ex horto Kilon. sub hoc nomine. Affinis *St. cæpitosæ* sed diversa hirsutie et fundo corollæ parum elevato.

308. CHENOPODIUM.

32. (21-22). *C. ACUTIFOLIUM* *Kitaib.*: foliis deltoideis dentato-subsinuatis, superioribus lanceolatis integerrimis, racemis lateralibus foliosis, caule procumbente.

Hab. in Hungaria? *O. D. intr.* 1815.

309. ATRIPLEX.

14. (4-5). *A. TATARICA*: caule erecto, foliis oblongis sinuatis basi cuneatis subtus canis, calycibus fructus dentatis. *W. Sp.*

Hab. in Tataria *O. D. intr.* 1815.

15. (5-6). *A. BENGALENSIS* *Lam.*: caule erecto, foliis oblongo-deltoides sinuatis obtusis, calycibus fructus subrotundis lævibus.

Hab. in Bengalia *O. D. intr.* 1815.

310. BETA.

1. *B. vulgaris* β *alba*.
 6. (3-4). *B. procumbens* *Smidt*: floribus geminis fructibus globosis, calycibus fructus laevibus, foliis cordato triangularibus.

Hab. in Canariis. *O. D. F.* missa 1815. ab infausto *Smidtio* qui hanc speciem ab omnibus hujus generis forma fructus diversam detexit. *B. maritima* valde affinis, ad quam retuli florentem.

311. SALSOLA.

13. (4-5). *S. spicata*: herbacea, foliis oblongis obtusis semiteretibus, floribus ternis axillaribus subspicatis. *W. Sp.*

Hab. in Hispan. *O. D. intr.* 1814.

326. ASTRANTIA.

4. (2-3). *A. heterophylla*: foliis tripartitis: lobis ovato-lanceolatis acutis, ciliato-serratis, caulino medio indiviso, involucris apice spinuloso-serratis. *Biéb. Cauc.*

Hab. in Caucaso *F. intr.* 1812.

327. BUPLEURUM.

5. *B. angulosum* β . *W. Sp.*

Hab. in alpib. Valesiae *F. intr.* 1811.

7. *B. falcatum* β . *seorzoniferolium*.

Hab. in alpibus German. austr. *F. intr.* 1814.

330. CAUCALIS.

13. (3-12). *C. mauritanica*: involucro universali monophyllo, partialibus triphyllis. *Willd. Sp.*

Hab. in Mauritania *O. D. intr.* 1816.

12. (13-4). *C. pumila*: umbella universali subquinqvefida, partialibus subtrispermis, foliis supradecompositis cauleque decumbente villosis. *W. Sp.*

Hab. in maritimis Barbariae *O. F. intr.* 1805.

332. DAUCUS.

10. (6-7). *D. CRINITUS*: foliis verticillatis multifariam pinnatifidis rigidulis acutis, involucris apice multipartitis, seminibus crinitis. *Desf. atl.*
Hab. in Barbar. 4. D. intr. 1816.

333. AMMI.

5. (1-2). *A. BOEBERI Hofm. Umbell.*: foliis duplicato-ternatis: pinnulis lanceolatis argute serratis, terminali obovato.

Hab. in Russia O. D. intr. 1817.

335. SELINUM.

14. (10-11). *S. ELEGANS*: caule subtereti striato, pedunculo aphylo longissimo. *Balb. Icon.*

Hab. in Ital. alpib.? 4. D. intr. 1815.

337. ATHAMANTA.

9. (1-2). *A. ALATA*: foliis supradecompositis: pinnulis oblongis inciso-serratis, involucellis setaceis umbellulas æquantibus, caule membranaceo-alato. *Bieb. Cauc.*

Hab. in subalp. Caucasi 4. D. intr. 1815.

10. (5-6). *A. DENUDATA Hort. Gorenk.*: foliis triternatis: ramificationibus divaricatis, pinnulis lanceolatis integerrimis, involucro universalis nullo.

Hab. in Russia? 4. D. intr. 1815.

344. HERACLEUM.

3. *H. ANGUSTIFOLIUM* $\beta.$ *longifolium.*

Hab. in Anglia? 4. D. intr. 1815.

12. (1-2). *GIGANTEUM Hort. Gorenk.*: foliis ternatis: foliolis oblongis lobatis, radiis umbellæ et umbellulæ hirsutis.

Hab. in Russia? 4. O. intr. 1815.

- II. (5-6). *H. LIGUSTICIFOLIUM*: foliis decompositis: foliolis quinatis ternatisque subrotundis inciso-serratis, umbellis radiantibus. *Bieb. Cauc.*
Hab. in Tauria ♂. D. intr. 1815.

345. LIGUSTICUM.

8. (1-2). *L. ATHAMANTHOIDES*: foliis bipinnatis: foliolis bipinnatifidis: lobis subfalcatis, involucri foliolis pinnatifidis.
Hab. — — 4. D. intr. 1813. ex horto berolinensi sub hoc nomine.
9. (2-3). *L. ACTAEIFOLIUM*: petiolo duplicato-tripartito, foliolis ovalibus æqualiter dentatis, involucellis setaceis, fructibus oblongo-ovalibus subulato-ro-costatis. *Mich. Amer.*
Hab. ad Fluvium St. Laurens et in Virginia. 2. D. intr. 1817. — florentem non vidi.

346. ANGELICA.

6. (1-2). *A. FLAVESCENS* *Besser.*: foliis duplicato-pinnatis: foliolis omnibus decurrentibus, terminali subsimplici.
Hab. in Gallicia? 2. D. intr. 1816.

348. SISON.

8. (3-7). *S. CANADENSE* *Lin.* foliis ternatis: terminali trifido, lateralibus bifidis.
Hab. in Canada. 2. D. intr. 1815.
7. (8-4). *S. TRIFOLIATUM* *Mich.*: foliis ternatis: terminali ovato-lanceolatum, lateralibus bi-trilobis.
Hab. in Carolina superior. 2. F. intr. 1816.

349. b. CUMINUM.

- Flores flosculosci, fertiles. Pet. cordata. Umbel. quadrifida. Involuc. setacea, longissima.*
- I. *C. CYMINUM*. *Lin.*
Hab. in AEgypto, AEthiopia. Q. D. intr. 1817.

350. OENANTHE.

7. (3-4). *O. GLOBULOSA*: fructibus globosis. *Lin.*
Hab. in Europ. austr. 2. D. intr. 1815.

352. CICUTA.

3. (1-2). *C. DAVURICA* *Fisch.*: foliis simpliciter pinnatis :
 pinnis linearibus setaceo-serratis.
Hab. in Davuria. 2. D. intr. 1815.

353. AETHUSA.

5. (1-2). *AE. ELATA* *Friedland.*: foliis pinnatifidis, pe-
 diculis superne canaliculatis, involucro submo-
 nophyllo.
Hab. in Podolia. ♂. D. intr. 1815.

355. SCANDIX.

9. (5-6). *S. NEMOROSA*: caule geniculis tumidiusculis,
 foliolis ovato-lanceolatis inciso-serratis nitidis, ner-
 vis subtus pilosiusculis, fructibus tuberculato-hi-
 spidis. *Bieb. Cauc. sub Chærophylle.*

Hab. ad Fluvium Terek. ○. D. intr. 1817.

356. CHAEROPHYLLUM.

7. (1-2). *ANGULATUM* *Kit.* caule sulcato, foliolis oblon-
 gis inciso-serratis nitidis, superioribus confluen-
 tibus.

Hab. in Hungaria 2. D. intr. 1814.

8. (2-3). *C. MACULATUM* *W. Suppl.*: caule maculato
 glabro, geniculis tumidis, foliis pubescentibus: fo-
 liolis lanceolatis incisis.

Hab. — — 2. D. intr. 1814. — Affin. *Ch. temulo*
 sed foliola in hoc ovata et caulis scaber. — variat
 foliis pubescentibus et glabris.

6. *C. AUREUM* β. involucris coloratis.

— — γ. *caucasicum* lobis folior. majoribus.
Hab. in Europa australi et Caucaso 2. D. intr. 1794.

9. **C. TENUIFOLIUM** Stev. caule lævi, foliis supradecompositis: pinnis filiformibus canaliculatis, involucellis umbellula longioribus basi villosis.

Hab. in Russia. 4. D. intr. 1815. — *Habitus AEthusaæ.*

358. SESELI.

2. **S. GLAUCUM** $\beta.$ *caucasicum.*

Hab. in Caucaso. 4. D. intr. 1815.

6. **TORTUOSUM** $\beta.$ *flaccidum.*

Hab. — — 4. D. intr. 1815.

11. (ante 9). **S. AMMOIDES:** foliis radicalibus: foliolis imbricatis. *Jacq. hort.*

Hab. in Lusitania, Italia. ①. D. intr. 1815.

360. PASTINACA.

4. **P. PIMPINELLIFOLIA** $\beta.$ *alpina.* *Bieb. Cauc.*

Hab. in Caucaso orientali ♂. D. intr. 1814.

361. SMYRNIUM.

5. (1-2). **S. NUDICAULE:** foliis supradecompositis radicalibus: pinnis subtrilobis incisis acutis, caule nudo superne ramoso. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Tauria et Caucaso. 4. D. intr. 1817.

362. ANETHUM.

3. **A. PIPERITUM** *mīhi*: umbellis paucifloris inæqualibus, radice perenni.

A. FOENICULUM $\beta.$ *piperitum Decand. Catal.*

Hab. in Ital. 4. F. intr. 1810. *Affine A. Foeniculum* sed diversum radice perenni et foliolis, præsertim radicalibus, brevioribus quasi verticillatis. *A. Foenicum* sic melius distingendum: umbellis multifidis planis, seminibus ovatis, radice bienni.

4. **A. DULCE:** fructibus ovatis subcompressis, foliis radicalibus distichis tripinnatis: lobis capillaceis, superemorum lobis rarissimis. *Decand. Cat.*

Hab. — — ♂. F. intr. 1814. — *Colitur in Italia hortis.*

364. PIMPINELLA.

3. *P. MAGNA* *B. macrophylla.*

Hab. — — 4. D. intr. 1815.

10. (4-5). *P. LACINIATA Schrad.* foliis omnibus pinnatis: pinnis pinnatifidis, laciniis linearibus falcatis, petiolis triquetri, caule sulcato.

Hab. — — 4. D. intr. 1813.

13. (5-II). *P. PEREGRINA:* foliolis imis cordato-ovatis serratis, superioribus oblongis, umbellæ radiis fructibusque hispidis. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Italia, Tauria et Causaso. 4. F. intr. 1816.

II. (13-6). *P. TRAGIUM:* pubescenti-cana, foliolis imis subrotundo-inciso-serratis, caulinis oblongis obsoletis, caule striato, fructibus tomentosis. *Bieb. Cauc.*

Hab. in rupestribus Tauriæ, Galliæ merid. et Italiae 4. D. intr. 1815.

12. (8-9). *P. ROTUNDIFOLIA:* foliis simplicibus reniformibus lobatis crenatis. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Caucaso. 4. D. intr. 1816.

TRIGYNIA.

369. VIBURNUM.

II. (1-2). *V. RUGOSUM:* foliis lato-ovatis rugosis subtus hirtis, involucro universali heptaphylle. *Pers. Syn.*

Hab. in Canariis 4. F. intr. 1816.

PENTAGYNIA.

384. ARMERIA.

3. *A. ALLIACEA* *B. flore albo.*

Hab. in Europ. austr. 4. intr. 1815.

4. *A. DENTICULATA* $\beta.$ foliis subintegerrimis.
Hab. in Italia. 24. F. intr. 1815.

385. STATICE.

20. (3-4). *S. VIMINEA Schrad.*: scapo paniculato tereti, foliis lanceolatis punctatis basi attenuatis apice obtusis mucronulatis, ramis floribusque distantibus.
Hab. — — 24. F. intr. 1813.
21. (11-12). *S. ECHIOIDES*: scapo paniculato tereti, foliis scabris. *Lin.*
Hab. in Europ. australi ♂. F. intr. 1815.
22. (14-15). *S. PECTINATA*: caule ramisque paniculatis triquetris, foliis obovatis petiolatis, spicis secundis. *Ait. Kew.*
Hab. in Canariis. ♂. F. intr. 1815.

386. LINUM.

18. (5-6). *L. HIRSUTUM*: calycibus hirsutis acuminatis sessilibus alternis, foliis alternis: rameis oppositis. *W. Sp.*
Hab. in Austria, Tartaria. 24. F. intr. 1815.

388. CRASSULA.

1. *C. COCCINEA* $\beta.$ foliis minoribus.
Hab. ad Cap. b. sp. ♂. T. intr. 1817.
-

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

396. PITCAIRNIA.

2. *P. ANGUSTIFOLIA* $\beta.$ *furfuracea.**P. FURFURACEA* W. E.*Hab.* in Amer. merid. 24. C. intr. 1805.

397. TRADESCANTIA.

1. *T. VIRGINICA* $\beta.$ *florib. rubris.**Hab.* in Virginia 24. D. intr. 1816.

402. NARCISSUS.

19. (1-2). *N. ANGUSTIFOLIUS*: spatha uniflora, nectario rotato brevissimo membranaceo crenato, foliis scapo non latioribus. *Ait. Kew. E. 2.**Hab.* in Europ. austr. 24. D. intr. 1815.2. *N. INCOMPARABILIS*: $\beta.$ flore pleno sulphureo.*Hab.* in Hispania, Lusitania. 24. D. intr. 1812.20. (4-5). *N. MAJOR* *Curtis*: spatha uniflora, nectario campanulato criso aequante petala lanceolata, foliis longitudine fere scapi.*Narcissus totus Inteus montanus major.* *Hort. Ey- stæd. vernal. ordo tertius sol. I. fig. I.**Hab.* in Europ. austr.? 24. D. intr. 1816. A *Curtis-* *sio ad N. bicolorum Gouani* refertur. sed differt, proter petala, colore profundiore floris.6. *N. MINOR* $\beta.$ flore pleno.*Hab.* — 24. D. intr. 1816.

12. *N. onorus* β. petalis pallidis.

Hab. in Eur. austr. 2. D. intr. 1812.

403 b. MASSONIA.

Cor. infera, limbo 6-partito. *Filam.* collo tubi imposita. *Caps.* 3-alata, 3-locularis, polysperma.

1. *M. NERVOSA* mihi: foliis ovato-lanceolatis striatoneurotenuibus, corollæ laciniis erectis membranaceis.

Hab. ad Cap. b. sp. — 2. T. intr. 1817. — Folia Mass. angustifoliæ latiora, 15-nervosa, lævia, apice in mucronem coarctata. Corollæ tubus violaceo-pallidus, 2 lin. longus: laciniæ longitudine tubi, stramineo-pallidæ, membranacea. Nectarium coeruleo-violaceum. Stamina corolla duplo longiora, aurantiaca.

2. *M. LATIFOLIA*: foliis subrotundis glabris. *W. Sp.*

— — — β. maculata.

Hab. ad Cap. b. sp. 2. T. intr. 1817.

410. ALLIUM.

49. (2-3). *A. SVAEOLENS*: caule teretiusculo, soliis linearibus carinatis, umbella subrotunda, staminibus subulatis. *Jacq. icon.*

Hab. in Austria, Aquitania, Pyrenæis. 2. D. intr. 1815.

46. (3-4) *A. DEFLEXUM*: caule planifolio umbellifero declinato, staminibus tricuspidatis longitudine corollæ, foliis angusto-linearibus. *W. Sp.*

Hab. in Sibiria? 2. D. intr. 1815.

45. (46-4) *A. ROTUNDUM*: staminibus alternis tricuspidatis corolla longioribus, umbella globosa, bulbis ovatis grumosis. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Europ. austr., Tauria. 2. D. intr. 1804.

51. (8-9). *A. CONTROVERSUM*: caule planifolio bulbifero, floribus omnibus masculis, staminibus tricuspidatis, spatha longissime cuspidata. *W. E.*

Hab. — — 2. D. intr. 1815.

50. (9-10). *A. VIOLENCEUM*: caule planifolio bulbifero, staminibus subulatis corolla duplo longioribus, spatha umbella longiore. *W. Suppl.*
Hab. — — 4. D. intr. 1815.
52. (16-47). *A. VINEALE*: caule teretifolio bulbifero, staminibus tricuspidatis. *Lin.*
Hab. in Europ. austr. 4. D. intr. 1815.
47. (52-17). *A. ACUTUM*: foliis fistulosis, spatha lanceolata umbella breviore, petalis ovatis acutis, staminibus subulatis corolla brevioribus. *Spreng. Pugill. I.*
Hab. — — 4. D. intr. 1813.
53. *A. LUSITANICUM Redout. Lil.*: scapo nudo basi unanguloso, foliis semiteretibus, umbella nutante, staminibus subulatis.
Hab. in Lusitania. 4. D. intr. 1816.
53. (21-22). *A. ACUTANGULUM*: scapo ancipiti angulato, umbella fastigiata, staminibus simplicibus corollam æquantibus, foliis linearibus oblique flexis. *W. Suppl.*
Hab. — — 4. D. intr. 1815.
22. *A. SENESCENTS* *B. major.*
Hab. in Europ. austr. 4. D. intr. 1799.
44. (27-28). *A. SPIRALE*: scapo subancipiti, umbella capitata, staminibus corolla longioribus, foliis linearibus spiraliter tortis. *Willd. Suppl.*
Hab. — — 4. D. intr. 1815.
48. (28-29). *A. DANUBIALE* *Biel. pl. nov.*: scapo anguloso, foliis linearibus canaliculatis subtus bicarinatis, umbella plana.
Hab. in Austria. 4. D. intr. 1806.
54. (31-32). *A. CLUSIANUM*: scapo nudo tereti, foliis linearibus planis ciliatis, umbella pauciflora. *W. Suppl.*
Hab. in Enrop. aust. 4. D. intr. 1815.
36. *A. FISTULOSUM* *G. minus.*
Hab. — — 4. D. intr. 1812.

37. A. SCHOENOPRASUM *G. serotinum.*

Hab. in alpin. Europ. Sibir. 4. D. intr. 1813.

411. LILIUM.

14. (3-II). L. PENNSYLVANICUM: foliis sparsis linearilanceolatis, supremis verticillatis, caule subunifloro subalato-pentagono, pedunculo lanato, corolla erecta extus floccoso-lanata. *Ker. in bot. mag.*

Hab. in Pensylv. 4. D. intr. 1817.

11. (3-4). L. TIGRINUM: foliis sparsis sessilibus quinque-nerviis (bulbiferis), superioribus cordato-ovatis, corollis revolutis intus papillosum. *Ait. Kew. Ed. 2.*

Hab. in China. 4. D. intr. 1817.

12. (7-8). L. SUPERBUM: foliis imis verticillatis, coeteris sparsis, floribus racemoso-pyramidalis reflexis, corollis revolutis. *Lam. Encycl.*

Hab. in Amer. sept. 4. D. intr. 1817.

13. (post 9). L. CAMSCHATCENSE: foliis verticillatis, flore erecto, corolla campanulata: petalis sessilibus. *Lin.*

Hab. in Camschatka. 4. D. intr. 1817.

412. FRITILLARIA.

7. F. TULIPIFOLIA: foliis lanceolatis alternis remotis, caule superne nudo unifloro, capsula obtusangula. *Bieb. cauc.*

Hab. in graminos. Caucasi 4. D. intr. 1817.

420. ORNITHOGALUM.

17. O. THYRSOIDES γ. petalis subserratis.

Hab. ad Cap. b. sp. 4. T. intr. 1814.

20. (7-8). O. PIOSUM: foliis linearis-ensiformibus ciliatis, floribus racemosis, pedunculis incurvis.

Hab. ad Cap. b. spec. 4. T. intr. 1817.

420 b. PUSCHKINIA.

Cor. monopetala, sexpartita, infera. Nectar. brevissimum, sexdentatum, coronans faucem. Stamina intra nectarium.

1. *P. SCILLOIDES*: foliis radicalibus nullis. *Bieb. Cauc.*
Hab. in Iberia. 4. F. intr. 1816.

426. ASPARAGUS.

1. *A. OFFICINALIS* *B. maritimus.*
Hab. in maritim. Europæ boreal. 4. D. intr. 1812.

427. DRACAENA.

3. (ante 1). *L. DRACO*: arborea, foliis subcarnosis apice spinosis. *Lin.*
Hab. in Canariis, India orient. 5. C. intr. 1816.

431. HYACINTHUS.

7. (3-4). *H. PALLENS*: corollis campanulato-cylindricis: limbo erectiusculo tubo breviore, bracteis minimis, foliis linear-lanceolatis erectis. *Bieb. Cauc.*
Hab. in Caucaso. 4. D. intr. 1817.

434. LACHENALIA.

6. *L. PENDULA* *B. tricolor.*
Hab. ad Cap. b. sp. 4. T. intr. 1816.

443. HEMEROCALLIS.

2. *H. GRAMINEA* *B. europæa.*
Hab. in Europa 4. D. intr. 1815.
6. (4-5). *H. GOERULEA*: foliis ovatis subcordatis, corollæ limbo campanulato, bracteis marcescentibus.
W. E.
Hab. in China, Japonia. 4. F. D. intr. 1813.

450 b. ACHRAS.

Cor. 12-fida. Cal. o. Germ. superum. Bacca.

- I. A. SAPOTA: floribus solitariis, foliis lanceolato-ovatis. *Lin.*

Hab. in Amer. merid. h. C. intr. 1817.

452 b. CANARINA.

Cor. 6-fida. Cal. 6-phylloides, superus. Caps. 6-lo-
cularis.

- I. C. CAMPANULA *Lin.*

Hab. in Canariis. 24. T. intr. 1817.

TRIGYNIA.

460. RUMEX.

36. (13-14). R. UCRANICUS: foliis lanceolatis undulatis basi subauriculatis, valvis setaceo-dentatis omnibus graniferis.

Hab. in Ucrania. ②. D. intr. 1814. ex horto Vindobonensi sub hoc nomine. Medius quasi inter R. persicarioid. et dentatum e quibus differt statura humiliori et caulis purpureis; differt denique a R. persicarioide dentibus setaceis et a R. dentato foliis undulatis basi non rotundatis.

37. (17-18). R. AQVATICUS: valvulis ovatis integris obsolete graniferis, foliis cordato-lanceolatis acutis. *Smith brit.*

Hab. in Europ. 24. D. intr. 1815.

32. R. ACETOSA $\beta.$ maxima.

Hab. — 24. D. intr. 1816.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

480. OENOTHERA.

16. (11-12). *O. TETRAGONA*: foliis ovalibus obtusis integris, floribus subfastigiatis, capsulis pedicellatis truncatis quadrvivalvibus. *Roth. Cat. 2.*

Hab. in Amer. bor 2^f. D. intr. 1804.

482. EPILOBIUM.

12. (10-11). *E. DAVURICUM Fischer*: foliis linear-lanceolatis subdenticulatis, caule erecto.

Hab. in subalp. Davuriæ. 2^f. D. intr. 1815.

486. b. BURSERA.

Cal. 3-4-fidus. *Petal.* 4, ovata. *Caps.* subcarnosa, 3-loclaris, 3-valvis. *Semin.* solitaria.

1. B. GUMMIFERA: foliis pinnatis ovatis acuminatis, floribus racemosis polygamis. *Pers. Syn.*

Hab. in Amer. occid. 3^f. C. intr. 1813.

496. ERICA.

43. (13-14). *E. DECLINATA*: stylo exerto, corollis ovatis, pedunculis solitariis terminalibus, foliis margine tenuissime ciliatis, ramis deflexis.

Hab. ad Cap. b. sp. 3^f. F. intr. 1817. ex horto Herrenhus. sub hoc nomine.

TRIGYNIA.

505. POLYGONUM

26. (2-3). *P. VIRGINICUM*: foliis ovalibus, spicis longissimis, floribus inæqvalibus digynis. *Mich. flor. amer.*

Hab. in Amer. bor. 24. D. *intr.* 1796.

27. (16-17). *P. RAMOSUM*: floribus octandris trigynis axillaribus sessilibus, foliis linearibus margine ciliatis subrecurvis, caule flexuoso dichotome ramoso.

Hab. in Sibiria? 24. D. *intr.* 1817. ex horto *Gorenzano* sub hoc nomine.

CLASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA:

517. PODALYRIA.

5. (3-4). *P. ALBA*: foliis ternatis petiolatis: foliolis oblongis obtusis, stipulis filiformibus petiolo brevioribus. *W. Sp.*

Hab. in Carolina. 24. F. *intr.* 1816.

6. (post 4). *P. CALYPTRATA*: foliis simplicibus ellipticis supra scabriusculis subtus villosis reticulato-venosis, pedunculis unifloris, calycibus villosis basi calytra decidua instructis. *W. Sp.*

Hab. ad Cap. b. sp. 5. T. *intr.* 1816.

7. (post. 6). *P. MYRTILLIFOLIA*: foliis simplicibus elliptico-obovatis obtusis cuspidatis utrinque sericeis, pedunculis unifloris. *W. Sp.*

Hab. ad Cap. b. sp. 5. T. *intr.* 1816.

520. BAUHINIA.

3. B. ACUMINATA: foliis ovatis: lobis acuminatis semiovatis. *Lin.*

Hab. in Ind. orient. ♂. *C. intr.* 1817.

524. CASSIA.

16. (ante 1). C. TORA: foliis trijugis obovatis: exterioribus majoribus, glandula subulata inter inferiora. *Lin.*

Hab. in India. ♂? *C. intr.* 1817.

17. (1-2). OBTUSIFOLIA: foliis trijugis obovatis obtusis subtus villosiusculis: exterioribus majoribus, glandula inter infima, stipulis subulatis, leguminibus recurvis. *Ait. Kew. Ed. 2.*

Hab. in Ind. occid. ♂? *C. intr.* 1817.

18. (17-2). C. CORYMBOSA: foliis trijugis lanceolatis subfalcatis glabris, glandula inter infima, corymbis pedunculatis axillaribus, leguminibus cylindricis. *Lam. Enc.*

Hab. in Bonaria. ♂. *C. intr.* 1817.

19. (10-11). C. SOPHERA: foliis decemjugis lanceolatis, glandula baseos oblonga. *Lin.*

Hab. in India. ♂. *C. intr.* 1817.

14. (19-11). C. VENOSA *Nocca?*: erecta, foliolis ellipticis ciliatis obtusis mucronatis, glandula petiolari sessili.

Hab. — — ♂. *C. intr.* 1814.

15. (11-12). C. MIMOSOIDES: foliis linearibus, glandula baseos petiolorum obsoleta, stipulis setaceis. *Lin.*

Hab. in Zeylona. ♂. *C. intr.* 1815.

537. JUSSIEUA.

4. (2-3). J. EXALTATA *Roxburg*: erecta glabra, foliis lanceolato-linearibus supra glabris subtus subhirsutis, floribus tetrapetalis octandris subsessilibus.

Hab. in India orient. ♂. *C. intr.* 1815.

DIGYNIA.

552. SAXIFRAGA.

26. (9-10). *S. OPPOSITIFOLIA*: foliis caulinis ovatis oppositis imbricatis, summis ciliatis. *Lin.*

Hab. in Europ. alpib. 2. D. *intr.* 1817.

25. (22-24). *S. STERNBERGII*: foliis cuneiformibus palmato-qvinqvefidis ciliatis petiolo linearib. longioribus, caulis sterilibus brevissimis cespitosis, floriferis adscendentibus simplicibus. *W. E.*

Hab. in German. 2. D. *intr.* 1815. — nimium affinis *S. adscendentii* et *palmatae*.

24. *S. ADSCENDENS* $\beta.$ *sponhemica*.

— — — $\gamma.$ *condensata*.

Hab. in German. 2. D. *intr.* 1815.

22. *S. PALMATA* $\beta.$ *tomentosa*.

— — — $\gamma.$ *elongata*.

Hab. in German. 2. D. *intr.* 1815.

556. GYPSOPHILA.

13. (3-4). *G. ELEGANS*: foliis lanceolatis subcarnosis, paniculæ ramis dichotomis patentissimis glabris, corolla emarginata calyce genitalibusqve duplo longiore. *Bieb. Cauc.*

Hab. in glareosis ad fluvium Terek. ①. D. *intr.* 1815.

558. DIANTHUS.

3. *D. COLLINUS* $\gamma.$ floribus majoribus.

Hab. in Hungaria 2. D. *intr.* 1812.

36. (13-14). *D. DIUTINUS* *Kit.*: ramis dichotomis, squamis calycinis brevibus mucronatis, petalis dentatis apice emarginatis imberibus.

Hab. in arenosis Hungariæ. 2. D. *intr.* 1814.

57. (34-22). *D. FURCATUS*: pedunculis bifidis terminalibus, squamis calycinis lanceolato-cuspidatis erectis tubo brevioribus, petalis incisis, foliis linearis-

bus nervosis margine serrulato-scabris. *Spreng.*
Pugill. 2.

Hab. in Italia et ad Tergestum 4. D. *intr.* 1816.

35. (ante 29). D. ARENARIUS: caulis subunifloris squamis calycinis ovatis obtusis, corollis multifidis, foliis linearibus. *Lin.*

Hab. in Europ. 4. D. *intr.* 1815.

34. (33-29). D. HUNGARICUS: ^{Lept.} caulis subunifloris, squamis calycinis brevissimis subrotundis acuminatis, corollis multifidis, foliis subulatis glaucis ciliatis, *Towns. Travels.*

Hab. in Hungaria 4. D. *intr.* 1815.

24. D. PLUMARIUS $\beta.$ *saxatilis Pers.*

Hab. in rupestrib. Galliae. 4. D. *intr.* 1814.

32. D. CAESIUS $\beta.$: caule atropurpureo, squamis calycinis ovato-mucronatis, foliis viridibus.

Hab. — — 4. D. *intr.* 1814. ex horto berolinensi sub nomine *Dianth. arenarii.*

TRIGYNIA.

559. VISCAGO.

15. (1-2). V. MARITIMA: calycibus fructiferis erectis inflatis reticulato-striatis, petalis bifidis, caule repente. *W. Sp. sub Silene.*

Hab. in maritim. Europ. boreal. 4. D. *intr.* 1815.

12. V. PILOSA $\beta.$ *mollissima.*

Hab. in Hung. 4. D. *intr.* 1815.

16. (14-15). V. WOLGENSIS *W. Suppl.:* petalis linearibus indivisis margine integerrimis, pistillis petalis longioribus.

Hab. ad Wolgam. 4. D. F. *intr.* 1815.

561. SILENE.

75. (17-18). S. PILOSA *Schousboe:* hirsuta, foliis lanceolatis basi attenuatis, radicalibus subspathulatis,

calycibus cylindricis erectis, petalis bifidis: laciniis linearibus inæqualibus.

Hab. inter fructices montis Gibil kibir locis aridis.

○. D. intr. 1803.

72. (19-20). *S. SAXATILIS*: petalis linearibus bifidis, floribus lateralibus secundis cernuis, foliis glabris: radicalibus linear-lanceolatis, superioribus linearibus.

Hab. — — 24. D. intr. 1814. ex horto *Berolinensi* sub hoc nomine.

73. (21-22) *S. LATIFOLIA mihi*: floribus paniculatis secundis nutantibus, ramis bi-trichotomis, petalis bipartitis: laciniis linearibus, foliis pubescentibus: radicalibus spathulatis petiolatis, caulinis late obovatis basi undulatis.

Hab. — — 24. D. intr. 1814. ex horto *Pestensi* sub nomine *S. mutabilis*.

DESCR.: *Caulis* bi-tripedalis, pubescens, geniculis maximis rubicundis. *Folia* radicalia obtusa, canina mucronata, in petiolum decurrentia. *Panicula* trichotoma maxime viscida. *Calyses* decemstriati pilosi. *Petala* albida; subtus fuscantes. *Corona* maxima. *Genitalia* exserta. *Capsula* ovata erectiuscula.

76. (post 29). *S. VISCAGINOIDES mihi*: petalis semibifidis, calycibus inflatis, foliis linearibus glabris acutis, panicula contracta elongata.

Hab. in Davuria. 24. D. intr. 1811.

74. (34-35). *S. PINGVIS Vahl.*: sericeo-pilosiuscula, calycibus erectis clavatis, petalis bifidis, foliis carnosis: radicalibus spathulatis, superioribus obovato-lanceolatis.

Hab. ad Cap. Spartel. ○. D. intr. 1803.

70. (37-38). *S. CONGESTA*: calycibus clavatis pilosis congestis, canle dichotomo, ramis floriferis elongatis.

Hab. — — ○. D. intr. 1815. ex horto *Berolinensi* sub hoc nomine.

71. (51-52). *S. BIPARTITA*: foliis inferioribus spathulatis, floribus racemosis secundis nutantibus, petalis bipartitiis. *Desf. Atl.*

Hab. in Africa boreal. ♂. D. *intr.* 1812.

563. ARENARIA.

26. (8-9). *A. CALYCINA*: glaberrima, foliis gramineis brevibus, pedunculis longissimis subunifloris, petalis lanceolatis hyalinis calyce multo brevioribus. *Pers.*
Syn.

Hab. in Barbaria. ♂? D. *intr.* 1815.

PENTAGYNYIA.

569. COTYLEDON.

8. (4-5). *C. COCCINEA*: foliis obovatis acutis carnosis, spica foliosa terminali. *W. Sp.*

Hab. — — ♂. T. *intr.* 1816.

570. SEDUM.

1. *S. TELEPHIUM* β. *purpureum*.

Hab. in Europ. ♀. D. *intr.* 1813.

23. (2-3). *S. ARZOON*: foliis lanceolatis serratis planis, caule erecto, cyma sessili terminali. *Lin.*

Hab. in Sibiria ♀. D. *intr.* 1816.

22. (post 19). *S. VILLOSUM*: foliis oblongis supra planiusculis pedunculisque axillaribus subunifloris pubescentibus, petalis ovatis obtusiusculis. *V. Sp.*

Hab. in alpib. Europ. ♂? D. *intr.* 1815.

572. OXALIS.

28. (4-5). *O. SPECIOSA*: scapo foliorum longitudine, foliis ternatis subrotundis ciliatis, stylis staminibus longioribus. *W. Sp.*

Hab. ad Cap. b. sp. ♀. T. *intr.* 1817. — Adest solummodo var. γ. *rigidula*.

574. LYCHNIS.

11. L. BRACHYPETALA: caule folioso multifloro pubescente, foliis lanceolatis nervosis glabris, floribus nutantibus, calycibus inflatis angulatis fere longitudine petalorum.

Hab. — — 4. D. intr. 1814. ex horto Berolinensi sub hoc nomine.

575. CERASTIUM.

20. (1-2). C. CONNATUM *Willd.* herb.: glabrum, foliis oblongis connatis, junioribus pilosis, pedunculis reflexis, petalis calycis longitudine.

Hab. — — ♂. D. intr. 1814.

CLASSIS XI.

ICOSANDRIA.

MONOGYNYIA.

579. CACTUS.

22. (1-2). C. STELLATUS: simplex ovato-subglobosus, tuberculis oblongis apice piloso-spinosis, pilis longitudinali spinularum. *Willd. Suppl.*

Hab. in Amer. calid. ♂. C. intr. 1816.

23. (11-12). C. SPECIOSUS: erectus leviter quadrangularis, angulis dentatis. *W. Suppl.*

Hab. — — — ♂. C. intr. 1816.

24. (18-19). C. ALATUS: articulatus prolier, ramis foliaceis compressis obovatis dentatis lanugine brevissima. *W. l. c.*

Hab. — — — ♂. C. intr. 1816.

591. ACACIA.

20. (3-4). *A. LONGIFOLIA*: inermis, foliis linear-lanceo-latis utrinque angustatis trinerviis striatis, spicis axillaribus geminatis cylindraceis. *W. Sp.*

Hab. in Nova Hollandia *h. F. intr.* 1817.

21. (13-14). *A. GRANDIFLORA*: inermis, foliis bipinnatis, partialibus septemdecimjugis, propriis quadraginta jugis, spicis subcapitatis pedunculatis racemosis terminalibus. *W. l. c.*

Hab. in Ind. orient. *h. C. intr.* 1817.

PENTAGYNYIA.

602. MESPILUS.

6. *M. CRUS GALLI* *δ. splendens.*

Hab. in America boreali *h. D. intr.* 1803.

22. (16-17). *M. OVALIFOLIA* *mihi*: spinosa, foliis ovalibus serratis, utrinque subpilosis, supra lucidis, stipulis semicordatis inciso-serratis glandulosis.

Hab. in Amer. boreal.? *h. D. intr.* 1803. — Affinis *Mesp. Cr. Galli* a qua tamen differt præsertim foliis latioribus membranaceis.

21. (16-17). *M. ODORATISSIMA*: spinis terminalibus, foliis utrinque pubescentibus, basi cuneatis, pinnatifidis: lobis divaricatis remote acute serratis, fructibus viridi-flavis.

Hab. in Amer. bor.? *h. D. intr.* 1806. ex Anglia sub hoc nomine. — Affinis *M. tanacetifol.* sed differt colore fructus et foliorum laciniis obtusioribus serulatis.

20. *M. PARVIFOLIA* *β. pallida.*

Hab. in Virginia *h. D. intr.* 1806.

603. PYRUS.

28. (13-17). *P. ORIENTALIS* *Tournefort*: spinosa, foliis lanceolatis subtus canis integerrimis, in apicibus ramulorum fasciculatis.

Pyrus sylvestris orientalis folio oblongo incano.

Tounef. Cor. p. 43.

Hab. in Oriente ḥ. D. intr. 1795.

17. (18-14). *P. EDULIS*: foliis oblongis basi cuneatis inaequaliter duplicito-serratis subtus tomentosis, floribus corymbosis. *W. E.*

Hab. in Gallia. ḥ. D. intr. 1807.

666. MESEMBRYANTHEMUM.

76. (ante 1). *M. LINGVIFORME*: foliis inaequaliter lingvaeformibus adscendentibus perviridibus subinde carinatis. *Haworth. misc. nat.*

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1816.

67. (5-6). *M. DIMINUTUM*: subacaule, foliis linearibus subulatis obtusissime triquetris, petalis rubicundis. *Haw. l. c.*

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1817.

68. (6-7). *M. CANINUM*: subacaule, foliis impunctatis glaucis apicem versus grosse bifariam dentatis, pedunculis folio duplo longioribus. *Haw. l. c.*

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1816.

63. (18-19). *M. TORTUOSUM*, foliis oblongo-ovatis connatis subpapilliosis confertis, calycibus triphyllis bicornibus, caule divaricato laxo procumbente. *W. Sp.*

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1815.

77. (29-66). *M. REFLEXUM*: foliis flexuoso-reflexis obtusis semiteretibus glaucis, calycinis laciniis valde inaequalibus, caule senecto erecto basi incrassato. *Haw. l. c.*

Hab. ad Cap. b. sp. ḥ. T. intr. 1817.

66. (77-30). *M. FOLIOSUM* *Haw.*: foliis semicylindricis subulatis superne canaliculatis papilliosis confertis, caule ramosissimo.

Hab. ad Cap. b. sp. ḥ. T. intr. 1816. — Cum descriptione *Haworthii* non plane convenit.

65. (30-31). *M. VIRIDIFLORUM*: foliis semiteretibus puloso-pilosis, calycibus hirsutis, petalis viridibus, caudice incrassato, ramis diffusis. *Haw. l. c.*

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1801.

64. (33-34). *HIRTELLUM*: foliis confertis cylindricis obtusissimis crystallino-papulosis, calyce turbinato papuloso-piloso, staminibus longitudine petalorum. *Ait. Kew. Ed. 2.*
Hab. ad Cap. b. sp. h. T. intr. 1816.
71. (46-73). *M. PULVERULENTUM*: foliis cylindrico-triqvetris obtusis, punctis pulverulentis scabris, calyce sexido, petalis rubicundis. *Haw. l. c.*
Hab. ad Cap. b. sp. h. T. intr. 1817.
73. (71-47). *M. LACERUM*: foliis confertis glaucis compresso triqveteris acinaciformibus, angulo carinali cartilagineo lacero, petalis calyce longioribus. *Haw. l. c.*
Hab. ad Cap. b. sp. h. T. intr. 1816.
70. (51-52). *M. PERFOLIATUM*: foliis valde connatis glaucis acuminatis punctatis apice subtus triacanthis. *Haw. l. c.*
Hab. ad Cap. b. sp. h. T. intr. 1817.
72. (57-58). *M. LAEVIGATUM*: foliis acinaciformibus laevigatis: marginibus cartilagineis integris. *Haw. l. c.*
Hab. ad Cap. b. sp. h. T. intr. 1813.
78. (59-60). *M. CLAVELLATUM*: foliis expansis obsolete triqveteris clavatis viridibus obtusissimis cum mucronulo. *Ait. Kew. Ed. 2.*
Hab. ad Cap. b. sp. h. T. intr. 1816.
75. (60-74). *M. AEQVILATERALE*: foliis æqvilaterale-triqvetris: marginibus laevibus sine cartilagine, caulis debilibus prostratis. *Haw. l. c.*
Hab. in Nova Hollandia. h. T. intr. 1817.
74. (75 61). *M. SERRULATUM*: foliis compresso-triqvetris: marginibus minime serrulatis vix cartilagineis, internodiis saepe longioribus, ramulis purpurascensibus subasperis. *Haw. l. c.*
Hab. ad Cap. b. sp. h. T. intr. 1816.
69. (61-62). *M. MURICATUM*: foliis confertissimis deltoidibus, bracteis foliolisqve majoribus calycinis triqveteris glaucis et trifarie denticulatis. *Haw. l. c.*
Hab. ad Cap. b. sp. h. T. intr. 1816.

POLYGYNIA.

609. ROSA.

7. *Rosa PIMPINELLIFOLIA* $\delta.$ *pumila.**Rosa myriacantha Loissel.* Flor. gall.*Hab.* in Gallia $\mathfrak{h}.$ D. *intr.* 1810.

611. FRAGARIA.

7. *F. INDICA*: calycis laciniis exterioribus majoribus
obovatis tridentatis. *Hort. Kew. Ed. 2.**Hab.* in India. 4. D. *intr.* 1817.

612. POTENTILLA.

2. *P. MULTIFIDA* $\beta.$ *angustifolia.**Hab.* in Europa. 4. D. *intr.* 1814.35. (12-13). *P. PYRENAICA*: foliis radicalibus qvinatis,
caulinis ternatis: foliolis hirtis oblongo-cuneiformibus,
calycinis laciniis subæqualibus corolla bre-
vioribus, caule erectiusculo. *De Cand. Fl. Gall.*
Hab. in pratis Pyrenæorum. 4. D. *intr.* 1815.32. (13-14). *P. LACINIOSA*: foliis qvinatis pilosis, su-
perioribus ternatis: foliolis linear-lanceolatis pinna-
tifidis: laciniis subdentatis, caule erecto, petalis
calycis longitudine.*Hab.* in Hungaria? 4. D. *Missa* 1814. ab illustriss.
Kitaibelo sub hoc nomine.33. (ante 14). *P. BITHYNICA*: foliis radicalibus qvinatis:
foliolis subrotundis obovatis, caulinis ternatis: fo-
liolis oblongis, caule ramosissimo, calyce longi-
tudine corollæ.*Hab.* in Bithynia 4. D. *intr.* 1812 ex horto bot. *Vin-*
dobonensi sub hoc nomine.20. *P. AUREA* $\beta.$ *minor.* — *P. sabauda De Cand. Fl. Gall.*
Hab. in Sabaud. 4. D. *intr.* 1815.34. (20-21). *P. ASTRACHANICA*: foliis radicalibus qvinatis
oblongis dentatis: summis tripartitis, corollis ca-
lyce majoribus, caule adscendente. *W. Sp.*
Hab. ad Astrachan et in Caucaso. 4. D. *intr.* 1812.

- 21.** (32-33). *P. DECLINATA*: foliis inferioribus quinatis: foliolis lanceolatis profunde incisis, caulinis ternatis, caule prostrato, calycibus petalis longioribus.
Hab. — — 24. D. intr. 1814 ex horto *Vindobonensi* sub hoc nomine.

614. GEUM.

- 22.** (8-9). *G. ATLANTICUM*: villosum, foliis inferioribus pinnatis: pinna terminali cordata maxima, caule subunifloro, fructibus hirsutis, aristis contortis.
W. Sp.

Hab. in Monte Atlas. 24. D. intr. 1815.

CLAS S I S XI.

P O L Y A N D R I A.

MONOGYNIA.

620. PAPAVER.

- 20.** (6-7). *P. CAUCASICUM*: capsulis oblongis glabris, caule ramosissimo virgato pedunculisque setis sparsis erectis evanidis, foliis pinnatifidis incisis. *Bieb.*
Cauc.

Hab. ad Fluv. Terek. ②. 24. D. intr. 1816.

629. TRIUMFETTA.

- 2.** *T. SEMITRILoba*: foliis semitrilobis, floribus comple-
tis. *Lin.*

Hab. in Amer calid. Ȣ. C. intr. 1816.

642 CISTUS.

- 15.** (3-4). *C. LEDON*: fruticosus exstipulatus, foliis sub-
sesibus connatis lanceolato-linearibus supra glabris

subtus tomentosis, pedunculis bracteatis unifloris,
capsulis decemlocularibus. *Lam. Enc.*

Hab. in Hisp., Lusit., Canariis. $\ddot{\text{h}}$. T. *intr.* 1816.

643. HELIANTHEMUM.

28. (3-4). *H. CALYCINUM*: suffruticosum erectum exstipulatum, foliis linearibus, pedunculis unifloris, calycibus triphyllis. *Lin. sub Cisto.*

Hab. in Europ. austr., Barbar. $\ddot{\text{h}}$ F. *intr.* 1816.

26. (15-16). *H. LINEARE*: suffruticosum, stipulatum, ascendens subtomentosum, foliis linearibus obtusis petiolatis margine revolutis, calycibus lævibus. *W. Sp.*

Hab. in Hispan. 4. D. *intr.* 1814.

27. (18-19). *H. STOECHADIFOLIUM*: caule erecto, foliis oblongis sublinearibus margine revolutis subtus incanis subpetiolatis, racemis ante florescentiam revolutis. *Brot. Lusit.*

Hab. in Lusitania 4. F. *intr.* 1815.

29. (23-24). *H. PULVERULENTUM*: fruticosum stipulatum ramosissimum incano pubescens, foliis linearibus margine subrevolutis subtus tomentosis. *Thuil. fl. Par.*

Hab. in Gallia. $\ddot{\text{h}}$. F. *intr.* 1816.

644. CORCHORUS.

5. *C. HIRTUS*: capsulis oblongis cauleque pilosis, foliis oblongis æqualiter serratis. *Pers. Syn.*

Hab. in Amer. merid. O. C. *intr.* 1814.

6. *C. JAPONICUS*: capsulis rotundis glabris, foliis duplicito-serratis. *Thunb. jap.*

Hab. in China et Japonia $\ddot{\text{h}}$. T. *intr.* 1815.

DIGYNIA.

647. PAEONIA.

1. *P. OFFICINALIS* β . b. flore pleno carneo.

Hab. in Helvetia. 4. D.

4. *P. HUMILIS* ♂. flore albo.
— — ε. foliis subtus pubescentibus.
Hab. in Hisp. 4. D. intr. 1804. et 1805.

TRIGYNIA.

649. RESEDA.

14. (5-6). *R. SCOPARIA* *Smidt.*: foliis linear-setaceis rigidis integerrimis, floribus trigynis, caule fruticoso.
Hab. in Canariis ḥ. F. intr. 1816 a celeb. C. Smidt.

650. EUPHORBIA.

78. (6-7). *E. ANACANTHA*: inermis imbricata, tuberculis foliolo subrotundo instructis, floribus terminalibus solitariis sessilibus, petalis palmatis. *Ait. Kew.*
Hab. ad Cap. b. sp. ḥ. T. intr. 1816.

77. (19-20). *E. MURICATA*: foliis subcordatis oblongisve margine scabris, floribus axillaribus solitariis, caulis prostratis tetragonis.
Hab. — — ⊖ F. D. intr. 1818 ex horto *Monacensi* sub hoc nomine.

71. (31-32). *E. TERRACINA*: umbella quadrifida dichotoma, foliis alternis lanceolatis retusis mucronatis.
Lin.

Hab. in Hispan. ⊖ D. intr. 1815. — Petala in exemplariis nostris non cordata.

73. (33-34). *E. SPINOSA*: umbella subquadrifida simplici, inolucris ovatis: primariis triphyllis, foliis oblongis integerrimis glabris, caule fruticoso.
Lin.

Hab. in Europ. austr., Creta, ḥ. F. intr. 1815.

74. (34-35). *E. CRISPATA* *W. Suppl.*: ramosissima, foliis oblongis ramisque superne villosis, umbella quinquefida dichotoma, involucris universalibus ovato-cordatis, partialibus subreniformibus, capsulis papillosois.

Hab. — — 4. D. intr. 1815.

76. (38-69). E. DULCIS: umbella qvinquefida: bifida, involucellis subovatis denticulatis, foliis lanceolatis obtusis apice denticulatis, capsulis verrucosis pilosis. *Willd. En.*

Hab. in Germania, Helv., Ital., Galliæ umbrosis. — 4. D. intr. 1816.

75. (41-42). E. PINIFOLIA *W. Suppl.*: foliis inferioribus setaceo-capillaribus confertissimis, superioribus linearie subulatis, involucris lanceolato-linearibus, involucellis ovato-lanceolatis, umbella 5-6-fida.

Hab. — — 4. F. intr. 1815.

70. (44-45). E. SETICORNIS: involucris lanceolatis umbellæ longitudine, involucellis ovato-cordatis acutis, foliis linearibus, superioribus lanceolatis.

Hab. in Barbaria ♂. ♂. D. intr. 1815 ex horto Monspel. sub hoc nomine.

72. (48-49). E. PUBESCENS: umbella trichotoma, involucellis semicordatis, foliis cuneiformibus pilosis serrulatis, capsulis muricatis. *V. Symb.*

Hab. Tuneti. ♂. D. intr. 1815.

79. (61-62). E. GLAUCESCENS: umbella multifida dichotoma, involucellis ovatis foliisqve lanceolatis glaucis glaberrimis integerrimis mucronatis, inferioribus reflexis. *Spreng. Pug. 2.*

Hab. — — 4. D. intr. 1816.

651. DELPHINIUM.

2. D. AJACIS γ. *humilis*.

— — δ. *fl. pleno*.

Hab. in Europ. ♂. D. intr. 1816.

14. (9-10). D. SPURIUM: labellis oblongis bifidis: laciniis oblongis subæqualibus, foliis glabris tripartitis: laciniis trifidis incisis, capsulis apice divaricatis.

Hab. — — 4. D. intr. 1813 ex horto Berolin. sub hoc nomine.

10. D. URCEOLATUM β. *villosum*.

Hab. — — 4. D. intr. 1816.

652. ACONITUM.

8. *A. NEOMONTANUM* $\beta.$ *præcox*, sterile.

Hab. in alpibus German. 4. D. intr. 1814.

14. (8-9). *A. MEDIUM Schrad.*: cuculli calcare adunco obtuso, galea convexa breviori, foliis opacis quinquepartitis: laciniis lanceolatis trifidis: lacinulis linearibus subedentulis.

Hab. — — 4. D. intr. 1801 — Differt ab *A. neomontano*, cui affinis, præter notas indicatas, galea obtusiore.

15. (10-11). *A. TORTUOSUM*: cuculli calcare adunco obtuso, labio obcordato adscendente, foliis nitidis quinquepartitis: laciniis lato-cuneiformibus trifidis dentatis, petiolis nudis, caule volubili. *W. E.*

Hab — — 4. D. intr. 1816.

PENTAGYNIA.

656. AQVILEGIA.

2. *A. VULGARIS* $\beta.$ flore pleno.

— — $\gamma.$ *grandiflora*.

— — $\delta.$ *nectariis destituta*.

Hab. in Europ. australi. 4. D. intr. 1815.

3. *A. BICOLOR* $\beta.$ *præcox*.

— — $\gamma.$ *fl. plen.*

Hab. in Sibiria. 4. D. intr. 1815.

POLYGYNIA.

659. SEMPERVIVUM.

16. (1-2). *S. URBICUM* δ midt.: caule fruticoso, foliis obovatis ciliatis in petiolum tetragonum attenuatis.

Hab in Canariis $\ddot{\text{h}}$. F. intr. 1816. — Affine *S. ardua boreo*.

14. (3-13). *S. SPATHULATUM* *michi*: caule frutescente, foliis petiolatis spathulatis margine cartilagineo-dentatis, ramis tortuosis.

Hab. in Canariis ḥ. T. *intr.* 1816. — in Canariis detexit celeb. C. Smidt. — florentem non vidi.

13. (14-4). S. BARBATUM Smidt.: propaginibus patulis, foliis lanceolato-linearibus ciliatis, caulinis linearibus reflexis, staminibus 14.

Hab. in Canariis. 24. T. *intr.* 1816.

11. (8-9). S. HIRTUM: foliis caule petalorumque apicibus hirtis. *Lin.*

Hab. in alpib. Europ. australior. 24. D. F. *intr.* 1815.

15. (9-10). S. AUREUM Smidt.: foliis obovato-spathulatis patentibus apice mucronatis margine integerimis cartilagineis, inferioribus depresso-depressis, propaginibus patulis.

Hab. in Canariis 24. T. *intr.* 1816. — florentem non vidi.

12. (post. 10). S. MONANTHOS: foliis teretibus clavatis confertis, pedunculis nudis subunifloris, nectariis obcordatis. *Ait. Kew.*

Hab. in Canariis. 24. F. *intr.* 1815.

665. PULSATILLA.

7. (ante 1). P. PATENS: pedunculo involucrato, foliis digitatis. *W. Sp.*

Hab. in Europ. austr., Sibiria. 24. D. *intr.* 1815.

666. ANEMONE.

8. A. NARCISSIFLORA: floribus umbellatis involucratis, foliis radicalibus palmatis inciso-cordatis. *W. Sp.*

Hab. in alpibus Helv., Ital. 24. D. *intr.* 1814.

668. CLEMATIS.

8. C. FLAMMULA β. *parvifolia*.

Hab. — — ḥ. D. *intr.* 1803.

669. THALICTRUM.

2. T. FOETIDUM β. *saxatile*.

Hab. in Delphinatu 24. D. *intr.* 1815.

5. T. ELATUM $\beta.$ *purpureum*. *T.* in *Cannabis* 24. D. *intr.* 1814. *Hab.* in *Hungaria* 24. D. *intr.* 1814.
24. (78). T. DISCOLOR: foliolis cordato-subrotundis obtuse lobatis, subtus glaucis venosis, panicula contracta aphylla, staminibus erectis. *Spreng. Pug.* 1. *Hab.* — — 24. D. *intr.* 1816.
23. (8-9). T. ACUMINATUM: panicula diffusa foliosa, floribus nutantibus, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis integris indivisisque. *Spreng. Pug.* 2. *Hab.* — — 24. D. *intr.* 1815.
8. T. MINUS $\beta.$ *glaucescens*. *Hab.* — — 24. D. *intr.* 1815. — T. *glaucescens*. *Willd. Suppl.*
20. (11-22). T. LASERPITHIFOLIUM *W.* *Suppl.*: foliolis inferioribus cuneatis trifidis, caulinis linearibus: terminali tripartita, floribus erectis. *W. Sp.* 10. *Hab.* — — 24. D. *intr.* 1813.
22. (20-12). T. PURPURASCENS: foliis tripartitis, caule foliis duplo altiore, floribus cernuis. *Linn.* *Hab.* in *Canada*. 24. D. *intr.* 1814.
21. (17-18). T. SIMPLEX: caule folioso simplicissimo anguloso, floribus nutantibus. *W. Sp.* 11. *Hab.* in *Europ. alpib.* 24. D. *intr.* 1815.
672. RANUNCULUS.
32. R. BULBOSUS $\beta.$ fl. pl. *pleno*. *Hab.* in *Europ. hortis*. 24. D. *intr.* 1814.
40. R. CHAEROPHYLLUS fl. pl.
48. (38-39). R. AUREUS: calycibus patulis, pedunculis sulcatis, caulis glabris, foliis profunde tripartitis subhirsutis lobatis argute dentatis. *Hab.* — — 24. D. *intr.* 1814. *Missus sub hoc nomine ab illustrissimo Bernhardio.* — Maxime affinis *R. lanuginoso*, sed differt notis indicatis, a *R. obtusifolio* differt habitu, foliis subhirsutis et lobis foliorum acutis.

CLASSIS XIII.**D I D Y N A M I A.****GYMNOSPERMIA.**677. **b. ANISOMELES.**

Cal. 5-fidus. Cor. labium superius abbreviatum, integrum, inferius trifidum: lacinia media biloba. Stam. exserta, approximata. Antheræ breviorum biloculares: lobis paralellis, longiorum dimidiatae v. dissimiles.

1. *A. ovata*: foliis ovatis subcordatis crenatis, verticillatis multifloris, bracteis linearibus, calycibus pilosis: glandulis inconspicuis. *Ait. Kew. Ed. 2.*
Hab. in Ind. orient. ♂. C. intr. 1816. — Ajuga disticha Roxb.

678. **TEUCRIUM.**

19. *T. LUCIDUM* β. *album.*

Hab. in Europ. austr. 4. F. intr. 1798.

26. (21-22). *T. CAPITATUM*: capitulis pedunculatis, foliis lanceolatis crenatis tomentosis, caule erecto. *W. Sp.*

Hab. in Hispania, Gallia, Sibiria. 4. D. intr. 1814.

682. **NEPETA.**

21. (2-3). *N. AMETHYSTINA*: caulis decumbente-ascendentibus, cymis pedunculatis, foliis petiolatis cordato-ovatis grosse serratis deflexis incanis rugosis.

Hab. — — 4. D. intr. 1815. — Corollæ incarnatæ post florescentiam amethystinæ. — Missa ex horto Vindobonensi sub hoc nomine.

64 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

22. (18-19). N. MALABARICA: spica verticillata, bracteis filiformibus, foliis lanceolatis inferne integerrimis.
Lin.
Hab. in Malabaria. Ȣ. C. intr. 1816. — *Ajuga fruticosa* Roxburg.

683. LAVANDULA.

5. L. PINNATA *B. carnosa*.
Hab. in Eur. austr. Ȣ. F. intr. 1810.

684. SIDERITIS.

9. S. PERFOLIATA *B. subtomentosa*.
Hab. in Oriente Ȣ. D. intr. 1816.
15. (11-12). S. HIRSUTA: foliis lanceolatis obtusis dentatis pilosis, bracteis dentato-spinosis, caulinis hirsutis decumbentibus. *Lin.*
Hab. in Gallia austr., Hispania, Italia, Ȣ. F. intr. 1813.

685. BYSTEROPOGON.

2. B. PLUMOSUM: paniculis dichotomis, calycibus plu-mosis, foliis ovatis subserratis subtus tomentosis.
L'Her. Sert. Angl.
Hab. in Canariis. Ȣ. T. intr. 1816.

686. MENTHA.

11. M. ROTUNDIFOLIA *y. parviflora*.
Hab. in German. Ȣ. D. intr. 1812.

694. BETONICA.

8. (3-4). B. ROSEA: spica interrupta basi foliosa, corollæ galea bifida reflexa: lacinia intermedia labii inferioris crenulata crispa, foliis bullatis.
Hab. — — Ȣ. D. intr. 1812. a Dom. Prien. sub hoc nomine.

7. (post 6). B. GRANDIFLORA: spica foliosa interrupta, corollæ galea integra: labio subemarginato, tubo incurvo calyce triplo longiore. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Caucaso. Ȣ. D. intr. 1813.

695. STACHYS.

21. (2-3). *S. VELUTINA*: verticillis sexfloris, bracteis ovatis nervosis apice dentatis, foliis subrotundo-cordatis dentatis mollissime pubescentibus.

Hab. in Hispania 2. F. intr. 1815.

20. (16-23). *S. ARENARIA*: verticillis subspicatis hirsutis sexfloris, calycibus spinosis, foliis oblongis serratis obtusis, galea bifida. *V. Symb.*

Hab. in arenosis Tunetii et Capadociæ 2. F. intr. 1810.

22. (16-17). *S. FOENICULUM*: erecta pubescens, foliis ovato-cordatis dentatis supra glabris subtus albicantibus tomentosis, verticillis subsexfloris. *Pursh. amer.*

Hab. ad Missouri ♂. D. intr. 1816.

23. (20-17). *S. IBERICA*: verticillis subspicatis, foliis oblongis basi attenuatis serratis hirtis, inferioribus obtusis, bracteis muticis, calycibus mucronato-spinosis. *Bieb. Cauc.*

Hab. in apricis Iberiae 2. F. intr. 1816.

24. (17-18). *S. ANGUSTIFOLIA*: verticillis bifloris, foliis linearibus nudis, inferioribus pinnatifido-dentatis. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Tauria 2. F. intr. 1816.

696. BALLOTA.

3. *B. VULGARIS Hofmannsegg*: foliis cordatis indivisis serratis acuminatis, calycibus aristatis, cymis pendulatis.

Hab. in Europa ♂? D. intr. 1816.

697. MARRUBIUM.

16. (1-2). *M. ASTRACHANICUM*: foliis ellipticis obtusis crenatis tomentosis rugosis, calycibus bracteisque lanceolatis. *W. Sp.*

Hab. ad Astracan et in Oriente. 2. D. F. intr. 1815.

698. LEONURUS.

2. L. CARDIACA γ. *hirsutus*.

Hab. in Europ. 24. D. *intr.* 1815.

6. (post 4). L. SIBIRICUS: foliis tripartitis multifidis lineariibus obtusiusculis. *Lin.*

Hab. in Sibiria, China. ♂. D. *intr.* 1815.

699. PHLOMIS.

14. (4-5). P. LACINIATA: foliis alternatim pinnatis: foliis laciniatis, calycibus lanatis. *Lin.*

Hab. in Oriente. 24. F. *intr.* 1816.

706. THYMUS.

16. (11-12). T. GRAVEOLENS: floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caule ramoso patulo, foliis subrotundis acutis apice subserratis hirsutis. *Bieb.*
Cauc.

Hab. in campestr. Tauriae et Iberiae. ♂. D. *intr.* 1815.

707. MELISSA.

4. (1-2). M. CORDIFOlia β . villosa, foliis cordatis crenato-dentatis, ramulis ex axillis elongatis floriferis.
Pers. Syn.

Hab. in Italia et Austr. austr. 24. D. *intr.* 1815.

710. DRACOCEPHALUM.

14. (5-6). D. RUYSCIANA: floribus spicatis, foliis bracteisque lanceolatis indivisis muticis. *Lin.*

Hab. in subalpinis Europ. 24. D. *intr.* 1794.

711. OCIMUM.

2. O. MONACHORUM β . *rubellum*.

Hab. in India orient. ♂. C. *intr.* 1815.

714. PRUNELLA.

7. (1-6). *P. ALBA*: foliis caulinis petiolatis lanceolatis basi pinnatifido-dentatis, calycis labio superiore truncato triaristato. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Eur. austr. Caucaso. 4. D. intr. 1812.

6. (7-2) *P. PINNATIFIDA Roth.*: foliis radicalibus pinnatifidis: lobo terminali longiore, caulinis linearibus basi hastato-auriculatis, superioribus linearibus integerrimis.

Hab. in German. 4. D. intr. 1814.

715. SCUTELLARIA.

10. (ante 1). *S. ORIENTALIS*: foliis incisis subtus tomentosis, spicis rotundato-integerrimis. *Lin.*

Hab. in Armenia, Mauritania. 4. F. intr. 1815.

720. SELAGO.

2. *S. FASCICULATA*: foliis obovatis glabris, spicis fasciculatis. *Thunb. prodr.*

Hab. ad Cap. b. sp. 4. T. intr. 1815.

3. *S. SPURIA*: spicis corymbosis, foliis linearibus denticulatis. *Lin.*

Hab. ad Cap. b. sp. 4. T. intr. 1817.

ANGIOSPERMIA.

732. LINARIA.

34. (11-12). *L. BIPUNCTATA*: foliis linearibus glabris, inferioribus quaternis, caule erecto paniculato, floribus spicato-capitatis. *Lin. sub Antirrhino.*

Hab. in Hispaniae arvis. ① D. intr. 1815.

35. (19-32). *L. MULTICAULIS*: foliis quinque linearibus carnosis, floribus capitatis. *Lin. sub Antirrhino.*

Hab. in Sicilia, Oriente. ① D. intr. 1815.

32. (35-20). *L. RETICULATA*: foliis linearibus canaliculatis sparsis, fasciculorum radicalium subquinque, ca-

68 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

lycibus hirsutis, pedunculis bracteis brevioribus.
W. E.

Hab. in maritim. Africæ boreal. 2. T. *intr.* 1814.

33. (post. 31). *L. REFLEXA*: foliis oblongis glabris, infimis ternis, superioribus alternis, pedunculis axillariis, caule adscendente. *Vahl. Symb. sub Antirrh.*

Hab. in Barbaria ②. D. *intr.* 1815.

733. ANTIRRHINUM.

1. *A. MAJUS* ♂ elegans.

Hab. — — ♂. D. *intr.* 1815.

735. MARTYNIA.

2. *M. DIANDRA*: caule ramoso, foliis oppositis cordatis dentatis, floribus diandris. *W. Sp.*

Hab. in Mexico. ②. C. *intr.* 1817.

737. SCROPHULARIA.

25. (5-6). *S. SMITHII mihi*: foliis ovato-cordatis duplicito crenatis subtus tomentosis, panicula pyramidalis racemosa, racemis dichotomis, floribus secundis.

Hab. in Canariis. 3. T. *intr.* 1816. Communicata a celeb. *C. Smithio*.

27. (9-10). *S. HIRSUTA Kit.*: tota lanato-hirsuta, foliis duplicito-grosse-arguteque dentatis, pedunculis trichotomis.

Hab. — — 4. D. *intr.* 1817.

26. (11-12). *S. RUGOSA W. Suppl.*: foliis ovato-cordatis apice attenuatis rugosis grosse dentatis, pedunculis trichotomis.

Hab. — — 4. D. *intr.* 1817.

28. *S. VERNALIS* β. *cordata*: foliis subrotundo-cordatis.
Hab. in Hungaria 24. D. *intr.* 1815. — *S. cordata* Pers.

29. (15-16). *S. VERBENAELFOLIA* Vahl.: foliis oblongis pinnatifidis dentatis basi cuneatis, ramis paniculæ flexuosis.

Hab. — — 24. F. D. intr. 1800.

24. (20-21). *S. VARIEGATA*: foliis ovatis lobato-dentatis, inferioribus basi pinnatifidis subpubescentibus, caulis fruticosis ramosis patulis, pedunculis ramosis subtrifidis glanduloso-hispidis. *Bieb. Cauc.*
Hab. in Caucasō. 3. F. D. intr. 1816.

739. HEMIMERIS.

2. *H. COCCINEA*: didynama, foliis ternis linearibus remote denticulatis, caule frutescente. *W. Sp.*
Hab. in Amer. merid. 3. C. intr. 1816.

740. DIGITALIS

10. (1-9). *D. MINOR*: corollis obtusis, labio superiore subbilobo, foliis laevibus. *Lin.*
Hab. in Hispania. 24. F. intr. 1815.
 9. (10-2). *D. THAPSI*: foliis pubescentibus mollibus, amplexicauli-subdecurrentibus. *W. E.*
Hab. in Hispan. 24. F. intr. 1814.

11. (post. 8). *D. CANARIENSIS*: calycinis foliolis lanceolatis, corollis bilabiatis acutis, caule fruticoso. *Lin.*
Hab. in Canariis 3. T. intr. 1816.

741. BIGNONIA.

7. (4-5). *B. CHELONOIDES*: foliis pinnatis cum impari: foliolis ovatis integerrimis pubescentibus, corollis barbatis semipentandris. *Lin.*
Hab. in Ind. orient. 3. C. intr. 1816.

743. b. LIPPIA.

- Caps.* disperma, bilocularis. *Cor.* hypocrateriformis. *Cal.* compressus.

2. *L. PURPUREA*: capitulis hemisphaericis pedunculatis solitariis, foliis ovatis acuminatis serratis scabris basi integerrimis.
Hab. — — 24. C. intr. 1816 ex horto Berolin. sub hoc nomine.

70 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

744. LANTANA.

9. (5-8). *L. INVOLUCRATA*: foliis oppositis ternisque rhomboeo-obovatis obtusis rugosis tomentosis, caule inermi, capitulis squarrosis, bracteis ovatis.
Ait. Kew.

Hab. in Amer. merid. et Antill. *h. C. intr.* 1818.

758. RUELLIA.

9. (7-8). *R. PANICULATA*: foliis integerrimis, pedunculis dichotomis lateralibus, calycibus sessilibus; lacinia suprema majore. *Lin.*

Hab. in Jamaica. *4. C. intr.* 1815.

CLASSIS XIV.

TETRADYNAZIA.

SILICULOSA.

776. CRAMBE.

6. *C. STRIGOSA*: frutescens, foliis ovatis cordatis dentatis hispidis basi inaequivalibus auriculatis, panicula filiformi diffusa. *W. Sp.*

Hab. in Canariis *h. T. intr.* 1816.

7. *C. CORDATA W. Suppl.*: caule exaltato, foliis cordatis inaequivaliter dentato crenatis.

Hab. in Sibiria? *4. D. intr.* 1810.

789. ALYSSUM.

20. (1-2). *A. MICROPETALUM Fischer.*: suffruticosum procumbens, foliis linear-lanceolatis obtusis stellatopilosus, petalis vix calyce longioribus.

- Hab.* in Sibiria? ♂. ♂. F. intr. 1817.
19. (4-5). A. GEMONENSE: caule herbaceo, ramis divaricatis, foliis obovatis subtomentosis. Lin.
- Hab.* in Germania australi. ♀. ♂. D. intr. 1813.

792. LEPIDIUM.

12. (1-2). L. PROCUMBENS: caule basi ramoso; ramis ascendentibus, foliis inferioribus pinnatifidis, superioribus lanceolatis indivisis, petalis longitudine calycis. W. Sp.
- Hab.* in Hispania, Sibiria, Caucaso. ⊖. D. intr. 1815.

794. THLASPI.

14. (3-4). T. BÜXBAUMII Fischeri: totum glabrum, siliulis subrotundo-obcordatis, foliis cordatis acutis sessilibus.

Hab. in Iberia. ⊖. F. intr. 1816.

795. IBERIS.

11. (1-2). I. PUBESCENTS: suffruticosa, foliis linearis-patulatis subcarnosis margine pubescenti-ciliatis, inferioribus apice obsolete subtridentatis. W. Suppl.
- Hab.* — — ♂. D. F. intr. 1813.

12. (8-9). I. ODORATA: herbacea, foliis linearibus superne dilatatis serratis. Lin.

Hab. in alpib. Alobrogicis. ⊖. F. D. intr. 1815.

SILIQVOSA.

797. CARDAMINE.

10. (2-3). C. OCCULTA mihi: foliis radicalibus simplis subrotundis, caulinis pinnatis ternatisque: foliolis sublobatis, floribus apetalis.

Hab. in China. ⊖. C. intr. 1817. — An differt a C. bonariense Persoon?

9. (3-4). *C. CHELIDONIA*: foliis pinnatis, foliolis obtusis
quadratis inciso-dentatis. *W. Sp.*
Hab. in Italia. 24. F. intr. 1814.
7. *C. PRATENSIS* β fl. pleno.
Hab. in Eur. cult. in hortis. 24. D. intr. 1817.

798. SISYMBRIUM.

35. (17-18). *S. MILLEFOLIUM*: foliis supradecompositis
tomentosis, petalis calyce majoribus. *Ait. Kew.*
Hab. in Canariis. 5. T. intr. 1816.
31. (18-19). *S. ERYSIMOIDES*: foliis runcinato-lyratis den-
tatis glabris, siliqvis rectangule patentibus subpe-
dunculatis. *W. Sp.*
Hab. in regno tunetano. 5. F. intr. 1815.
37. (21-33). *S. SUBBIPINNATIFIDUM mihi*: foliis bipinna-
tifidis: lobis sinuatis, radicalibus sublyratis, sili-
qvis arcuatis torulosis. — *Sinapis subbipinnatifida*
Lagasca genera nov.
Hab. in Hispan. 5. D. intr. 1817.
33. (37-22). *S. AFFINE*: foliis runcinatis dentatis glabris,
sinuatis lanceolatis inæqualiter dentatis, caule te-
reti, siliqvis erecto-patulis. *Willd. Suppl.*
Hab. — — 5. D. intr. 1813.
34. (22-23). *S. GLABRUM W. Suppl.*: foliis pinnatifido-
runcinatis cauleque glabris: lobo extimo triangu-
lari, siliqvis subsecundis nutantibus.
Hab. — — 5. D. intr. 1815.
38. (26-27). *S. PERSICUM*: siliqvis linearibus lævibus pa-
tulis, foliis pinnatis: pinnis pinnatifidis linearibus.
Hab. in Persia. 5. F. intr. 1818; ex horto Goettin-
gensi sub hoc nomine.
36. (27-28). *S. ATROVIRENS mihi*: glabrum, foliis in-
ferioribus lyrato-pinnatifidis, superioribus ovato-
lanceolatis repando-dentatis, siliqvis arcuatis.
Hab. in China. 5. C. intr. 1817. — *Habitus Sisymbri-*
amphibii; color foliorum et caulis atro-virescens.
32. (28-29). *S. NITIDUM*: glabrum, foliis sinuato-hasta-
tis basi in petiolum decurrentibus, siliqvis filifor-
mibus patentibus.

*Hab. — — ♂. D. intr. 1815 ex horto Berolinensi
sub hoc nomine.*

799. ERYSIMUM.

13. (3-4). *E. PATULUM*: foliis lyrato-pinnatifidis subsca-
bris, superioribus sinuatis, siliqvis patulis.

*Hab. — — ♂. D. intr. 1817. ex hort. Dorpathensi
sub hoc nomine.*

800. CHEIRANTHUS.

26. (4-5). *C. DUBIUS*: foliis lanceolato-linearibus basi
angustatis dentatis margine undulatis siliqvis pa-
tentibus.

*Hab. — — ♂. D. intr. 1814. ex horto Berolinensi
sub hoc nomine.*

27. (6-7). *C. PALLENS*: foliis linearibus integerrimis
cauleque elongato cinereo-incanis subtomentosis.
Pers. Syn. sub. Erysimo.

*Hab. in Helvetia. ♂. D. intr. 1815. — nimium affinis
Ch. alpino.*

29. (7-8). *C. IBERICUS*: foliis inferioribus runcinatis den-
tatis, superioribus lanceolatis indivisis, ramis flo-
riferis siliqvisque compresso-tetragonis erecto-pa-
tulis. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Caucaso. ♂. D. intr. 1816.

10. *C. SCOPARIUS* γ. *Chamæleo Decand.*

Hab. in Teneriffa. 4. F. intr. 1814.

28. (post. 25). *C. QVADRANGULUS*: foliis linearibus inte-
gerrimis, siliqvis sessilibus oblongis quadrangulis.
W. Sp.

Hab. in Sibiria. 4. D. intr. 1812.

802. HESPERIS.

4. *H. MATRONALIS* γ. *sibirica.*

— — — γ. *flore pleno.*

Hab. in Sibiria. ♂. D. intr. 1815.

74 TETRADYNA MIA SILIQUOSA.

11. (4-5). *H. ELATA*: caule simplici erecto, foliis lan-

ceolatis acuminatis remote denticulatis.

Hab. — — ♂. D. intr. 1816 ex Anglia sub hoc no-

mine. — Petala obtusa integerrima et apice emar-

ginata.

803. ARABIS.

17. (3-4). *A. SERPYLLIFOLIA*: foliis ellipticis integerrimis

sessilibus, caule flexuoso decumbente. W. Sp.

Hab. in Delphinatu. ♂. F. intr. 1814.

18. (4-5). *A. PRAECOX*: foliis oblongis acutis sessilibus

integerrimis glabris, caulinis strigosis, stolonibus

repentibus, siliqvis patulis. W. E.

Hab. in Hung. 24. D. intr. 1815.

19. (7-8). *A. LUCIDA*: foliis rigidis nitidis, radicalibus

obovato-spathulatis subdentatis, caulinis oblongis

subintegerrimis subcordatis sessilibus. Willd.

Suppl.

Hab. — — 24. D. intr. 1815.

804. TURRITIS.

8. (4-5). *T. ALPINA*: foliis radicalibus dentatis hispidis,

caulinis amplexicaulibus. Lin.

Hab. in Austria, Gotlandia ♂. D. intr. 1817.

805. BRASSICA.

16. (11-12). *B. ERUCASTRUM*: foliis runcinatis, caule

hispido, siliqvis lœvibus. Lin.

Hab. in Europ. austr. ♂. D. intr. 1815.

15. (12-13). *B. SUBULARIA*: foliis radicalibus pinnatifidis

runcinatisqve: laciniis ovatis acutis, caule inferne

hispido, siliqvis subtorulosis stylo ensiformi ter-

minatis. Broter. Eu. it.

Hab. in Lusitania ♂. D. intr. 1815. — Lobus infi-

mus foliorum in exemplaribus horti non auriculi-

formis ut indicat celeb. Brotero.

806. SINAPIS.

18. (8-9). *S. HETEROPHYLLA*: foliis lyratis hispidis: lobo terminali crenato-dentato, summis lanceolatis dentatis, siliqvis filiformibus pubescentibus adpressis. *Lagasca nov. gen.*

Hab. circa Madritum ♂. *O. D. intr.* 1817. — Affinis *Sin. pubescens*, sed differt præsertim foliis superioribus integris.

17. (9-10). *S. DISSECTA*: siliqvis ovatis torosis, patulis cornu compresso-ensiformi brevioribus, foliis profunde pinnatifidis: lacinias dentato-sinuatis pinnatifidisque. *Lagasco. gen. nov.*

Hab. in Hispan. *O. D. intr.* 1817.

16. (post. 14). *S. LAEVIGATA*: siliqvis laevibus patulis, foliis lyratis glabris, summis lanceolatis, caule laevi. *Lin.*

Hab. in Lusitan., Hispania. ♂. *D. intr.* 1816.

807. RAPHANUS.

1. *R. SATIVUS* ♂. *oblongus.*

Hab. — — ♂. *D. intr.* 1816.

CLASSIS XV.

MONADELPHIA.

PENTANDRIA.

817. PASSIFLORA.

12. (1-2). *P. LAURIFOLIA*: foliis oblongis integerrimis venosis, petiolis biglandulosis, involucro triphylo apice dentato. *W. Sp.*

Hab. in Surinamo et Antillis. ♂. *C. intr.* 1816.

818. ERODUM.

14. (5-6). E. BOTRYS *Fisch.*: pedunculis trifloris, foliis oblongis pinnatifidis: lacinis incisis, caule prostrato hispido.

Hab. in Russia? ♂. D. *intr.* 1818.

13. (9-10). E. GLAUCOPHYLLUM: pedunculis multifloris, foliis oblongis sublobatis crenatis subcarnosis glabris, aristis apice plumosis. W. Sp.

Hab. in AEgypto. ♂. C. *intr.* 1815.

HEPTANDRIA.

819. PELARGONIUM.

70. (ante. 1). P. LOBATUM: acaule, umbella composita, foliis subtus tomentosis simplicibus cordatis ternatis quinatisque: foliolis lobatis sinuatis dentatis. W. Sp.

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. *intr.* 1817.

2. P. FLAVUM β. *majus*.

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. *intr.* 1817.

69. (29-30). P. BLANDUM *mihi*: umbellis quadrifloris foliis cordato-reniformibus trifidis argute dentatis glabris carnosis cucullatis.

Hab. ad Cap. b. sp. 3. T. *intr.* 1817 ex hort. Kiloens. sub nomine *P. amplissimi*. — *Habitus omnino P. tricuspidati*.

32. P. CORDATUM β. *grandiflorum*.

Hab. ad Cap. b. sp. 3. T. *intr.* 1814.

66. (35 68). P. FORMOSUM *Desf.*: foliis cordatis subcucullatis rigidis argute dentatis, umbellis 3-4-floris.

Hab. ad Cap. b. sp. 3. T. *intr.* 1808.

71. (68-76). P. ANGULOSUM: umbellis multifloris, foliis rotundatis cucullatis angulosis dentatis. Ait. Kew.

Hab. ad Cap. b. sp. 3. T. *intr.* 1816.

68. (66-76). P. PANICULATUM *mihi*: foliis reniformibus pubescentibus 9-lobis: lobis rotundatis mucrona-

to-dentatis, umbellis multifloris coarctato-paniculatis.

Hab. ad Cap. b. sp.? ḥ. T. intr. 1813 ex horto *Parsino* sub nomine *P. formosi*.

41. *P. AUSTRALE* β. *major*.

Hab. in nova Hollandia ḥ. T. intr. 1813.

46. *P. QVERCIFOLIUM* β. *glutinosum*.

Hab. ad Cap. b. sp. ḥ. T. intr. 1817.

65. (45-46). *P. MOLLE*: umbellis paucifloris, foliis cordatis trilobis pubescentibus crispis.

Hab. ad Cap. b. sp. ḥ. T. intr. 1814 ex horto *Kin-dobonensi* sub hoc nomine.

55. *P. CRISPUM* β. *latifolium*.

Hab. ad Cap. b. sp. ḥ. T. intr. 1806.

67. (post. 63). *P. FRUTICOSUM*: pedunculis bifloris, foliis pinnato-decompositis glabris: foliolis linearibus. *W. Sp.*

Hab. ad Cap. b. sp. ḥ. T. intr. 1814.

POLYANDRIA.

821 b. KLEINHOFIA.

Cal. 5-phyllo. *Petal.* 5. *Nect.* campanulatum, dentatum, staminiferum. *Caps.* 5-angularis, 5-locularis: loculis monospermis.

1. *K. HOSPITA* Willd. Sp.

Hab. in Amboina. ḥ. C. intr. 1817.

828. SIDA.

42. (21-22). *S. GRAVEOLENS* Roxb.: foliis subrotundocordatis subacuminatis, pedunculis petiolo brevioribus, capsulis truncatis calyce longioribus.

Hab. in Ind. orient. ○. C. intr. 1818.

43. (26-27). *S. PANICULATA*: foliis ovato-cordatis dentatis, racemis paniculatis, capsulis birostratis. *W. Sp.*

78 MONADELPHIA POLYANDRIA.

Hab. in Indiis. 24. C. intr. 1817.

41. (28-29). S. PENTACARPOS Roxb. foliis cordatis subtri-cuspidatis, pedunculis longitudine petioli, cap-sulis muticis hispidissimis.

Hab. in India? O. C. intr. 1817. — Capsulæ non truncatæ.

829. MALACHRA.

3. M. HEPTAPHYLLA Fischer: capitulis subpedunculatis subpentaphyllis multifloris, foliis cordatis quinque-lobis crispis, lobo medio elongato.

Hab. in Brasilia. O. C. intr. 1817. — Valde affin. M. alcæifolia.

831. MALVA.

39. (25-26). M. HENNINGII Goldb.: foliis cordato-orbi-culatis septemlobis, floribus geminis, pedunculis petiolo triplo brevioribus, caule calycibusque hirsutis.

Hab. in ruderatis ad Mosqvam. O. D. intr. 1817.

832. LAVATERA.

12. (10-11). L. PUNCTATA: caule punctato scabro, foliis subtomentosis, inferioribus orbiculato-cordatis, summis trilobis, pedunculis solitariis folio longioribus. W. Sp.

Hab. in Italia O. F. intr. 1815.

856. GOSSYPIUM.

5. G. LATIFOLIUM: foliis acutis, insimis indivisis, reliquis trilobis subtus uniglandulosis. Murr. Comment.

Hab. — — O. C. intr. 1815.

839. HIBISCUS.

23. (12-13). H. PRURIENS W. Suppl.: foliis serratis, inferioribus ovato-cordatis acuminatis, superioribus tripartitis: lobo intermedio elongato, caule hispido.

Hab — — O. C. intr. 1815.

22. H. TRIONUM $\beta.$ ternatus. — — — — —
Hab. in Africa. Ⓣ. D. intr. 1805.
24. H. HISPIDULUS: foliis cordatis trilobis crenatis, cauleque hispidis, pedunculis unifloris petiolo brevioribus, calycis exterioris heptaphylli foliolis subulatis, corolla connivente. Spreng. Pugill. 2.
Hab. — — — C. intr. 1814. — Folia inferiora thloba superiora quinquepartita, Corolla alba, fundo flavo.

CLASSIS XVI.

DIADELPHIA.

- DECANDRIA.
5. G. TINCTORIA $\beta.$ major.
Hab. in Europa. Ⓣ. D. intr. 1815.

853. CROTALARIA.
9. (2-3). C. PARVIFLORA: foliis simplicibus lanceolatis, stipulis superioribus decurrentibus brevissime bidentatis, racemis oppositifoliis. W. Sp.
Hab. in Virginia, Carolina. Ⓣ. C. intr. 1815.

10. (6-7). C. LABURNIFOLIA: foliis ternatis ovatis acuminatis glabris, stipulis nullis, racemo terminali, leguminibus pedicellatis pendulis. W. Sp.
Hab. in Ind, orient. Ⓣ. C. intr. 1817.

854. ONONIS.
21. (10-11). O. ARTROPODIA Broter.: pedunculis unifloris, foliis ternatis, supremis sessilibus, foliolis

ovalibus obtusis serratis basi rotundatis, caule erecto: ramis declinatis.

Hab. in Lusitania? *O. F. intr.* 1817.

859. DOLICHOS.

11. (3-9). *D. HETEROPHYLLUS* *mihu*: caule volubili, leguminibus racemosis acinaciformibus dorso integris, foliolis inferioribus late cordatis, superioribus lanceolatis elongatis.

Hab. — — in Canariis. cult. *O. C. intr.* 1817.

9. (11-4). *D. VEXILLATUS*: pedunculis petiolo crassioribus capitatis, alis subfalcatis difformibus, leguminibus linearibus strictis. *Lin. sub Phaseolo.*

Hab. in Havanna. *O. C. intr.* 1815.

12. (4-10). *D. GIGANTEUS*: volubilis, leguminibus racemosis hirtis æqvalibus, seminibus hilo cinctis, foliis utrinque glabris, calycibus hirsutis campanulatis. *W. Sp.*

Hab. in Ind. orient. *H. C. intr.* 1817.

10. (12-5). *D. MINIMUS*: leguminibus racemosis compressis tetraspermis, foliis rhombais. *Lin.*

Hab. in Jamaica. *O. C. intr.* 1815.

864. OROBUS.

12. (10-11). *O. SYLVATICUS*: foliis pinnatis hirsutis multijugis ovato-lanceolatis, stipulis semisagittatis, caule ramoso decumbente hirsuto. *W. Sp.*

Hab. in Europ. nemoros. *4. D. intr.* 1815.

866. VICIA.

31. (6-7). *V. POLYPHYLLA*: pedunculis folio longioribus, floribus imbricatis, foliolis linear-lanceolatis acutis, stipulis semisagittatis lanceolatis integerrimis. *W. Sp.*

Hab. in Hungaria, Oriente, Algeria ♂? *D. intr.* 1814.

35. (7-8). *V. DENTATA* *Fisch.*: pedunculis multifloris foliorum longitudine; foliolis ovatis obtusis, inferi-

oribus subrotundis apice subdentatis, stipulis semiagittatis serratis.

Hab. in Sibir. ♂. D. intr. 1816.

34. (10-11). V. BENGHALENSIS: foliolis integerrimis, stipulis integris, leguminibus erectiusculis. *Lip.*

Hab. in Ind. orient. ♂. D. intr. 1816.

33. (12-13). V. BICOLOR *W. Suppl.*: pedunculis nudis folio brevioribus, foliolis oblongis obtusis, stipulis subalatis basi unidentatis.

Hab. — — ♂. D. intr. 1813.

35. V. PANONICA ♂. *violacea*.

Hab. — — ♂. D. intr. 1816.

32. (20-21). V. HIRTA: leguminibus solitariis reflexis pilosis, vexillis glabris, foliolis linearibus mucronatis cauleque hirtis. *Balb. Miscell.*

Hab. in agro Nicæens. ♂. D. intr. 1815.

867. ERVUM.

3. E. DISPERMUM: pedunculis bifloris aristatis, leguminibus glabris dispermis, foliolis linear-lanceolatis pubescentibus. *W. E.*

Hab. in Ind. orient. ♂. T. D. intr. 1817.

878. ORNITHOPUS.

15. (9-10). O. HETEROPHYLLUS: foliis insimis simplicibus, caulinis pinnatis, summis ternatis, stipulis obcordatis oppositifoliis, lomentis repandis. *W. E.*

Hab. in Lusitania ♂. D. intr. 1816.

883. LESPEDEZIA.

6. L. GLOMERATA: caule volubili, foliolis ovalibus obtusis subpubescentibus, spicis axillaribus terminalibusque sessilibus glomeratis.

Hab. in Ind. orient.? ♂. C. Missa. 1818. sub hoc nomine ex horto Dorpatensi.

884. HEDYSARUM.

33. (6-7). *H. PULCELLUM*: foliis ternatis, bracteis geminis conjugatis orbiculatis lineatis. *Zin.*

Hab. in Ind. orient. 5. C. intr. 1817. V. (11-0) 18

32. (24-25). *H. ARENARIUM* Kit.: foliolis lanceolato-linearibus acuminatis mucronatis, alis calyce longioribus, lomentis monospermis aculeatis. (31-31) 33

Hab. in Hungaria? 4. D. intr. 1814. vid. oitof

34. (27-31). *H. PETRAEUM*: caule erectiusculo, foliis pinnatis oblongo-lanceolatis glabris, alis calyce duplo longioribus, lomentis pubescentibus monospermis dentatis. *W. Sp.*

Hab. in Oriento. 4. F. intr. 1816. V. (12-08) 32

31. (34-29). *H. CORSICUM*: caulinibus adscendentibus glabris, foliolis linearibus acutis margine ciliatis, spicis globosis, lomentis 2-4-spermis pubescentibus echinatis.

Hab. in Corsica. 5. F. intr. 1815. — missum ab il-
lustr. *Balbisio* sub hoc nomine.

884. b. FLEMMINGIA.

Cal. 5-fidus. *Vexillum* striatum. *Legum.* sessile, ovale, turgidum, bivalve, dispermum. *Semina* sphærica.

1. *F. CONGESTA*: fruticosa erectiuscula, foliolis lato-lanceolatis, racemis axillaribus congestis. *Roxb. Cor.*

Hab. in Ind. orient. 5. C. intr. 1818.

886. INDIGOFERA.

8. (ante 1). *I. SARMENTOSA*: foliis ternatis, foliolis ovatis mucronatis sessilibus, pedunculis axillaribus sub-bifloris, ramis filiformibus patulis. *Thunb. prodr.*

Hab. ad Cap. b. sp. 4. T. intr. 1817.

6. (ante 8). *I. LINIFOLIA*: foliis simplicibus linearibus canis, leguminibus globulosis. V. S.

Hab. in Ind. orient. 5. C. intr. 1818.

7. (2-3). *I. viscosa*: foliis pinnatis sexjugis obovatis stri-
goso-pubescentibus, racemis folio brevioribus, le-
guinibus pendulis, caule erecto piloso viscoso
W. Sp.

Hab. in Ind. orient. ♂. C. intr. 1818.

887. PHACA.

4. *P. TRIANGULARIS*: caule erecto trigono, foliis subde-
cemjugis: foliolis ovalibus, inferioribus apice trun-
cato-emarginatis, racemis folio longioribus.

Hab. — — 4. F. intr. 1817. ex horto Gorinkano
sub hoc nomine. — Habitus Indigoferæ et forte
hujus Generis. Fructum non vidi.

888. ASTRAGALUS.

42. (13-14). *A. BUCERAS*: foliolis ellipticis cuneatis emar-
ginatis, stipulis ovatis dilatatis, racemis paucifloris,
pedunculis folio brevioribus, leguminibus ha-
matis subulatis. *W. Suppl.*

Hab. — — ♂. D. intr. 1815.

43. (14-41). *A. AEGICERAS*: foliolis ellipticis emargina-
tis, stipulis ovatis, racemis paucifloris peduncula-
tis folio brevioribus, leguminibus hamatis apice
compressis canaliculatis. *W. Suppl.*

Hab. — — ♂. D. intr. 1815.

41. (43-45). *A. ANNULARIS*: caulescens diffusus, legumi-
nibus subulatis incurvis glabris, foliolis obovatis.
V. S.

Hab. in AEgypto. ♂. D. intr. 1814.

892. MELIOTHUS.

8. *M. OFFICINALIS* β. *angustifolia*.

Hab. in Europ. ♂. D. intr. 1816.

15. (8-16). *M. ALTISSIMA*: caule erecto, foliolis ovato-
oblongis, racemis longissimis, alis carinæ æquival-
ibus, leguminibus nudis ovatis utrinque acutis mo-
nospermis. *Loisseleur flor. gall. sub Trifolio.*

Hab. circa Lutetiam. ♂. D. intr. 1814.

16. (15-9). M. BOUMETTI: gracilis, leguminibus racemosis nudis rugosis monospermis, foliolis oblongo-ovatis truncatis apice argute serratis, caule erecto.

Hab. — — ♂. D. intr. 1817. ex horto Berolinensi sub hoc nomine.

893. TRIFOLIUM.

9. T. REPENS ♂. *majus*: — — γ. *umbellatum*.

Hab. in Europ. ♀. D. intr. 1815.

62. (39-40). T. SCABRUM: capitulis ovatis axillaribus sessilibus, calycibus dentibus inaequalibus lanceolatis mucronatis rigidis recurvis, foliolis obovatis serrulatis. W. Sp. 1815.

Hab. in Europa. ♂. D. intr. 1816.

60. (50-51). T. FORMOSUM Savi: capitulis umbellatis, corollis resupinatis, calycibus fructiferis inflatis glabris, caulis prostratis, foliolis obovato-lanceolatis.

Hab. in Persia. ♂. F. intr. 1815.

61. (52-53). T. VESICULOSUM: glabrum, capitulis ovatis, calycibus hirsutis: dentibus rigidis subaequalibus, foliolis ovato-lanceolatis, caule adscendente. Savi flor. Pisan.

Hab. in Italiæ et Corsic. marit. ♂. D. intr. 1816.

894. LOTUS.

22. (7-8). L. ANTHYLLOIDES: caule fruticoso, capitulis paucifloris, foliolis bracteisque triphyllis subspathulatis. Venten. Malmais.

Hab. ad Cap. b. sp. ♂. T. intr. 1815.

38. L. CORNICULATUS ♂. *gracilis*, ♂. *pilosus*,

Hab. in Europa. ♀. D. intr. 1814.

21. (18-25). L. DEPRESSUS W. Suppl.: caulis procumbentibus, leguminibus strictis linearibus cylindricis, foliolis linearibus.

Hab. in Europ. australi? 24. D. *intr.* 1815.

23. (21-19). L. GEBELIA W. *Suppl.*: capitulis trifloris, caulis procumbentibus, foliolis obovatis glabris.
Hab. in Europ. austri? 24. D. *intr.* 1815.

896. TRIGONELLA.

- II. T. MONSPELIACA $\beta.$ *pumila.*

Hab. in Europ. austri. ○. D. *intr.* 1815.

15. (8-9). T. TENUIS *Fisch.*: leguminibus pedunculatis congestis patentibus falcatis compressis, pedunculis inermibus.

Hab. in Imperio ruthenico. ○. D. *intr.* 1818.

14. (9-10). T. ORNITHORYNCOS *Fisch.*: pedunculis spinosis, leguminibus brevissime pedunculatis umbellatis reflexis recurvisque acuminato-rostratis, foliolis subrotundis subserratis carnosis.

Hab. in Imperio ruthenico. ○. D. *intr.* 1818.

897. MEDICAGO.

45. (12-13). M. APPLANATA W. *Suppl.*: pedunculis subtrifloris, leguminibus inermibus orbiculatis utrinque planissimis margine ciliatis, anfractibus distantibus, stipulis multifido-setaceis, foliis obovatis dentatis.

Hab. — — ○. F. *intr.* 1815.

44. (38-39). M. MIRRORALIS *Rhode Mscpt.*: leguminibus subbifloris cochleatis orbiculatis, aculeis rectis, apice uncinatis, stipulis multipartitis, foliis subrotundis apice argute dentatis.

Hab. in Gallia australi? ○. D. *intr.* 1815.

Hab. in Eupod. subtiliis 4. D. intr. 1812.
 25. (21-26). I. GEMMA: capillis stipulis
 eaeusgippe-truncatippe, foliis opacis spicis
 Hap. in Eupod. subt. 4. D. intr. 1812.

CLASSIS XVII.

POLYADELPHIA.

Hab. in Eupod. subt. 4. D. intr. 1812.

POLYANDRIA.

Hab. in Eupod. subt. 4. D. intr. 1812.

903. HYPERICUM.

27. (8-9). H. FLORIBUNDUM: floribus trigynis, calycibus
 ovatis subciliatis, staminibus corolla brevioribus,
 foliis lanceolato-ellipticis, caule fruticoso. Ait.
Kew.

Hab. in Madera. 5. T. intr. 1816.

28. (14-15). H. CANADENSE: floribus trigynis alaribus pe-
 dunculatis solitariis, foliis sessilibus linearibus basi
 attenuatis, caule herbaceo tetragono superne di-
 chotomo. *W. Sp.* 24. D. intr. 1817.
Hab. in Canada.

26. (23-24). H. ELEGANS: calycibus ovatis acutis, foliis
 ovato-lanceolatis acuminatis subcordatis amplexi-
 caulis, caule teretiusculo paniculato erecto,
W. Sp. 24. F. intr. 1815.

CLASSIS XVIII.

SYNGENESIA.

ÆQVALIS.

907. SCORZONERA.

18. (3-19). *S. GLASTIFOLIA*: caule subunifloro folioso, foliis linear-lanceolatis acuminatis glabris nervosis planis. *W. Sp.*

Hab. in German. austr. 24. D. intr. 1812.

19. (18-4). *S. TAURICA*: caule folioso multifloro calyce-que pubescentibus, foliis inferioribus lanceolatis acuminatis integris pubescentibus: superioribus linear-subulatis. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Tauria, 24. D. intr. 1816.

908. SONCHUS.

26. (3-4). *S. RADICATUS*: pedunculis nudis calycibusque glabris, caule subnudo, foliis radicalibus lyratis utrinque levibus: lobis trianguli-ovatis. *Ait. Kew.*

Hab. in Madera et Canariis. *h. T. intr.* 1816.

27. (5-28). *S. LYRATUS*: pedunculis nudis, calycibus turbinatis dævibus: squamis inferioribus apice reflexis, foliis lyrato-pinnatifidis: laciinis ovato-triangularibus, terminali acuminata, caule fruticoso. *W. Suppl.*

Hab. — — *h. F. intr.* 1816.

28. (27-6). *S. LAEVIGATUS*: pedunculis nudis, calycibus turbinatis levibus: squamis inferioribus apice reflexis, foliis pinnatifidis: laciinis oblongo-lanceo-

latis, terminali acuminata, caule fruticoso. W.
Suppl.

Hab. — — h. F. intr. 1816.

10. S. OLERACEUS $\beta.$ *lævis.*

Hab. in Europ. ♂. D. intr. 1798.

25. (post. 24). S. CAUCASICUS *Biel. pl. nov.:* pedunculis apicē incrassatis, calycibus ovatis, floribus corymbosis, foliis radicalibus lyratis: caulinis cordatis sessilibus amplexicaulibus grosse serratis, caule hirsutissimo.

Hab. in Caucaso ♀. D. intr. 1811.

909. LACTUCA.

8. L. SCARIOLA $\beta.$ *lævis.*

Hab. in Europa. ♂. D. intr. 1815.

16. (13-14). L. SEGUSIANA: foliis inferioribus runcinato-dentatis, caulinis hastato-linearibus integerrimis mucronatis, caule ramosissimo. *Balbis Miscell.*

Hab. in Italia. ♂. D. intr. 1815.

910. CHONDRILLA.

5. (1-2). C. GRAMINEA: foliis radicalibus runcinatis, caulinis indivisis, superioribus linearifiliformibus, caule calycibusque levibus. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Deserto caucasico-caspica et ad Astrachan ♀. D. intr. 1814.

912. LEONTODON.

5. (1-2). L. CORNICULATUS *Kit.:* foliis runcinatis tenellis, squamis calycinis exterioribus reflexis sub apice corniculatis.

Hab. in Hungaria ♀. D. intr. 1814.

6. (post. 4). L. BESARABICUS: scapis declinatis, foliis runcinatis: lobis acutis crispis margine scabris, calycibus exterioribus lanceolatis erectis adpressis.

Hab. in Besarabia. ♂. ♂. D. intr. 1815. ex horto Vindobonensi sub hoc nomine.

913. APARGIA. *W. Sp.* (1-11). *A. ALPINA*: scapo unifloro squamoso, super-
-ixelne incrassato subhirsuto, calycibus hispidis, foliis
lanceolato-oblongis glabriusculis. *W. Sp.*
Hab. in alpin. Europ. temperat. 24. D. intr. 1815.
914. (12-2). *A. CAUCASICA*: scapo nudo unifloro glabro,
calyce hirsuta, foliis runcinato-dentatis scabris sub-
pilosis, pilis simplicibus prostratis. *Bieb. Cauc.*
Hab. in Caucaso. 24. F. intr. 1814.
915. PICRIS. *W. Sp.* (1-2). *P. RHAGADIOCUS*: foliis integris amplexicauli-
bus oblongis, calycibus interioribus torulosis-arti-
culatis hispidis: foliolis cymbiformibus. *Per. Syn.*
Hab. prope Malagam Hispaniae. 24. D. intr. 1815.
917. HIERACIUM.
65. (6-68). *H. STOLONIFERUM*: foliis ovatis subtus lepi-
dotis, stolonibus repentibus.
Hab. — — 24. D. intr. 1815 ex horto Vindobonensi
sub hoc nomine.
68. (65-7). *H. COLLINUM* *W. Suppl.*: pilosum, scapis
nudis ramosis: ramis elongatis subunifloris, foliis
lanceolatis, stolonibus repentibus.
Hab. in Hungaria? 24. D. intr. 1815.
69. (7-8). *H. BIFURCUM*: scapo bifurco subbifloro basi
subfolioso, foliis lanceolatis acutis integerimis,
stolonibus nullis. *Bieb. Cauc.*
Hab. in Tauria. 24. D. intr. 1816.
71. (8-9). *H. ANGUSTIFOLIUM*: scapo subtrifloro unifolio
hirsuto, foliis linear-lanceolatis acutis pilosis. *W. Sp.*
Hab. in Montib. Salisb. et Italiæ. 24. D. intr. 1816.
64. (16-17). *H. HALLERI*: caule erecto subbifloro, foliis
pilosis dentatis, radicalibus oblongis, caulinis lan-
ceolatis sessilibus, calyce villosa. *W. Sp.*
Hab. in alpib. Delphin., Helvetiæ et Silesiæ. 24. D.
intr. 1814.

63. (20-21). H. STERNBERGHII *Hoppe*: caule folioso erecto ramoso, foliis radicalibus petiolatis lanceolatis oblongis integerrimis, caulinis oblongis amplexicaulis basi dentatis, calycibus hispidis.
Hab. in German. austr. 24. D. intr. 1814. d.H.
67. (31-32). H. SYLVATICUM: caule erecto simplici, foliis oblongis villosis subdentatis, floribus subpedunculatis. *W. Sp.*
Hab. in Europæ sylvaticis. 24. D. intr. 1814. d.H.
72. (40-41). H. HUMIFUSUM: caulinibus virgatis procumbentibus glabris, foliis lanceolatis acuminatis dentatis glaucis glabris, calycibus subpilososis. *Spreng.*
Hab. — — 24. D. intr. 1816. d.H.
66. (48-49). H. PROSTRATUM *Desf. Tabl.*: caule prostrato apice florifero, foliis lanceolatis remote dentatis lanatis.
Hab. — — 24. D. intr. 1813. (80-8) d.H.
70. (51-52). H. INCANUM: caule erecto tomentoso, cymbo composito, foliis ovato-lanceolatis amplexicaulis integris subundulatis incanis ciliatis.
Bieb. *Cauc.*
Hab. in Caucaso. 24. D. intr. 1815. (80-8) d.H.
26. (3-4). C. TARAXACIFOLIA: foliis runcinato-pinnatifidis dentatis hispidis, scapis adscendentibus basi foliosis multifloris, calycibus tomentosis, squamis exterioribus patulis. *W. Sp.*
Hab. in arvis Barbariæ. ♂. D. intr. 1814. (80-8) d.H.
24. (23-6). C. CROATICA: foliis glabris, radicalibus oblongo-ovatis remote dentatis, superioribus linearilanceolatis sagittatis integerrimis, caule calycibus que hispidis.
Hab. in Croatia. ♂. D. intr. 1817 ex horto Pestiano sub hoc nomine.
25. (7-8). C. GRANDIFLORA: foliis radicalibus oblongis denticulatis, caulinis inferioribus sessilibus oblon-

-*latis dentatis, superioribus lanceolatis integerrimis
et sagittatis, calyce adpresso cauleque hirsutis.* W.

Suppl.

Hab. — — 24. D. intr. 1814.

925. HEDYPNOIS.

6. (4-5). *H. CASPICA*: caulis ramosis diffusis hispidis,
foliis oblongis amplexicaulis remote denticula-
tis, squamis calycis fructiferæ undique hispidis.
*Hab. ad Mare caspic. ⊖ D. intr. 1815. ex horto Vin-
dobon. sub hoc nomine.*

928. ACHYROPHORUS.

6. *A. BALBISII*: foliis runcinato-dentatis hispidis obtus-
sis, caule subramoso nudo calyceque glabro.
Hypocharis Balbisii Willd. Suppl.

Hab. in Italia? ⊖ D. intr. 1815.

929. LAPSANA.

4. (1-2). *L. PUBESCENS* mihi: caulescens ramosa pube-
scens, foliis radicalibus pinnatis lyratis angulatis,
superioribus ovatis basi pinnatifidis sinuato-denta-
tis, supremis lanceolatis sessilibus integerrimis, ca-
lycibus glabris.

*Hab. — — ⊖ D. intr. 1815 ex horto Monspess. sub
nomine Laps. grandifloræ.*

937. SERRATULA.

1. *S. TINCTORIA* γ. *integrifolia*.

Hab. in Europa. 24. D. intr. 1816.

938. CARDUUS.

24. (12-13). *C. TENUIFLORUS*: foliis decurrentibus sinua-
tis spinosis subtus tomentosis, calycibus subcylin-
dricis aggregatis sessilibus, squamis lanceolatis
erectiusculis. *Smith. brit.*

Hab. in Anglia. ⊖ D. intr. 1817.

25. **C. ATRIPLICIFOLIUS** *Fisch.*: foliis petiolatis subtriangularibus, radicalibus deltaideo-hastatis sinuato-dentatis, calycibus lanatis cernuis.

Hab. in Imperio ruthenico. 4. D. intr. 1815. — *An* Onop. deltoides *Hort. Kew.*?

940. CNICUS.

39. (2-3). **C. PYRENAICUS**: foliis semidecurrentibus lanceolatis canescens in pubescens sinuato-dentatis ciliato-spinosis, pedunculis nudis tomentosis, floribus subaggregatis, calycinis squamis ovatis mucronatis apice patulis. *W. Sp.*

Hab. in Pyrenæis. 4. D. intr. 1816.

34. (6-42). **C. FEROX**: foliis subdecurrentibus pinnatifidis: laciniis bilobis divaricatis margine et in superiore superficie spinosis subtus villosis, calycibus hemisphaericis involucratis: squamis subulatis spinosis patulis. *W. Sp.*

Hab. in montos. Galliæ austr. et Italia. ♂. D. intr. 1813.

42. (34-7). **C. COLLINUS**: foliis decurrentibus pinnatifidis: lobis divaricatis spinosis, calycis squamis lanatis reflexis.

Hab. in Hungaria? ♂. D. intr. 1798. ex horto Vindobon. sub nomine *Cardui collini*.

7. **C. CILIATUS** β. lanatus.

Hab. in Sibiria. ♂. D. intr. 1814.

40. (7-36). **C. ARACHNOIDEUS**: foliis amplexicaulibus hispidis pinnatifidis: laciniis bilobis divaricatis subtus nudis subvillosis, calycibus ovatis arachnoideo-villosis: squamis lanceolatis spinosis erecto-patulis levibus. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Caucaso. 4. D. intr. 1816.

36. (40-41). **C. SERRULATUS**: foliis amplexicaulibus hispidis pinnatifidis: laciniis bilobis divaricatis spinosis subtus tomentosis, calycibus ovatis glabris: squamis spinosis serrulatis erecto-patulis. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Tauria ♂. D. intr. 1816.

41. (36-8). *G. ORGYALIS W. Suppl.:* foliis sessilibus, radicalibus pinnatifidis: lacinias sinuatissimae spinosis, caulinis sinuatissimae longissime spinosis, squamis calycinis serrato-spinosis basi bracteis pinnatifidis obvallatis.

Hab. — — — ♀. D. intr. 1817.

33. (9-10). *C. ALTISSIMUS:* foliis sessilibus oblongo-lanceolatis scabris subtus tomentosis dentatis ciliatis, radicalibus pinnatifidis, calycibus bracteatis ovatis: squamis ovato-lanceolatis spinosis adpressis.

W. sp.

Hab. in Carolina. ♀. D. intr. 1811.

43. (10-11). *C. MITIS Fisch.:* foliis oblongis basi attenuatis grosse serratis: serraturis ciliatis apice setiferis, superioribus amplexicaulibus.

Hab. in Russia. ♂. D. intr. 1817.

37. (22-23). *C. SEMIPECTINATUS:* foliis amplexicanibus pinnatifidis, pedunculis erectis, calycis squamis adpressis.

Hab. — — ♂. D. intr. 1813 ex horto Goettingensi sub hoc nomine.

35. (28-29). *C. REPLICATUS:* foliis sessilibus ovato-lanceolatis replicatis margine spinosis subtus niveis, inferioribus dentatis, superioribus subpinnatifidis, pedunculis unifloris, spinis calycinis patentibus.

Hab. in Hungaria? ♀. D. Missus 1810 ab illustrissimo Kitaibel sub nomine Cardui replicati.

38. (31-32). *C. SIMPLEX:* foliis radicalibus oblongis serratis petiolatis integris, basi pinnatifidis, summis dentato-serratis, caule unifloro, calycibus scarosis: squamis acutis pubescentibus. — Gmel. sib. 2. p. 84. T. 37?

*Hab. in Sibiria? ♀. D. intr. 1815. ex horto Windobonensi sub hoc nomine. Abunde differt a *Cn. centauroide* foliorum forma et squamis calycinis subrotundis, quae in *C. centauroide* elongatae sunt.*

943. CARLINA.

7. (3-4). **C. LANATA:** caule subbifido, flore intermedio sessili, foliis incanis lanceolatis dentato-spinosis. *W. Sp.*
Hab. in Europ. austr., Barbaria. **○. D. intr.** 1817.

8. (5-6). **C. BIEBERSTEINII:** caule superne corymboso, foliis linear-lanceolatis ciliato-spinosis subtus lanatis. — *Carlina lanata Bieberst.*

- Hab.** in Tauria? 4. **D. Missa** 1817 a celeberr. Bernhardio sub hoc nomine.

946. ONOBRÖMA.

5. **O. CARDINELLUS:** foliis caulinis linearibus pinnatis longitudine plantæ. *Lin.*

- Hab.** in Eur. austr. 4. **F. D. intr.** 1817.

948. BIDENS.

2. **B. CERNUA** *β. radiata.*

- — γ. foliis superioribus subpinnatis.

- Hab.** in Eur. **○. D. intr.** 1815.

950. CACALIA.

13. (ante 1). **C. PAPILLARIS:** caule fruticoso, papillis cylindraceis truncatis petiolaribus obsito, foliis lanceolatis planis. *W. Sp.*

- Hab.** ad Cap. b. sp. **h. T. intr.** 1817.

9. **C. HASTATA** *β.:* foliis subtus tomentosis.

- Hab.** in Sibiria. 4. **D. intr.** 1816.

956. EUPATORIUM.

3. **E. CANNABINUM** *β. album.*

- Hab.** — — 4. **D. intr.** 1817.

5. **E. PURPUREUM** *β. altissimum.*

- Hab.** ad Baltimoram Amer. septentr. 4. **D. intr.**

1807.

959. STEVIA.

10. (3-11). *S. HYSSOPIFOLIA*: pappo paleaceo aristato-
que, caule diffuso pubescente, foliis linear-lan-
ceolatis superne dentato-serratis supra lucidis ses-
silibus. *Lagasc. nov. gen.*
Hab. in Mexico, 24. T. intr. 1817.
11. (10-4). *S. LANCEOLATA*: foliis lanceolatis acutis pla-
niusculis in petiolum attenuatis serratis subtus sca-
bris, summis linear-lanceolatis integerrimis, pap-
po paleaceo triaristato. *Lag. l. c.*
Hab. circa Pachuca, 24. T. intr. 1817.
9. (6-7). *S. PANICULATA*: caule paniculato, foliis inseri-
tibus ovatis superioribus ovato-oblongis serratis
basi cuneatis integerrimis, summis linear-lanceo-
latis, pappo mutico subbiaristatoque. *Lag. l. c.*
Hab. in Nova Hispan. 24. T. intr. 1817.

1966. SANTOLINA.

10. (1-2). *S. ERICOIDES*: foliis quadrifariam imbricatis
subglabris, ramis unifloris tomentosis albicanti-
bus, squamis calycinis acutis glabris. *Pers. Syn.*
Hab. in Europ. merid. h. F. intr. 1813.
9. (post 7). *S. ANTHEMOIDES*: pedunculis unifloris, foliis
bipinnatis, caule ramosissimo villosa. *Lam.*
Hab. in Hispan., Italia, 24. F. intr. 1813.

SUPERFLUA.

970. TANACETUM.
4. (ante 1). *T. SUFFRUTICOSUM*: foliis pinnatis: pinnis
linearibus dentatis pubescensibus, corymbo fasti-
giato basi folioso, caule suffruticoso. *IV. Sp.*
Hab. ad Cap. b. sp. h. T. intr. 1816.

971. ARTEMÍSIA.

34. (16-17). *A. SAXATILIS*: foliis caulinis canescensibus
pinnatis linearilobiformibus, floralibus indivisis li-

96 SYNGENESIA SUPERFLUA.

nearibus, caule adscendentē ramossissimo paniculato, pedunculis subcorymbosis, calycibus subgloboso-angulatis nutantibus. *W. Sp.*

Hab. in rupibus calcareis Hungariae. 24. D. intr. 1814.

37. (27-28). A. LACINIATA: foliis pilosis triplicato-pinnatis, caule simplici, panicula aphylla, floribus globosis nutantibus. *W. Sp.*

Hab. in Sibir. 24. D. intr. 1817.

35. (30-31). A. DESERTORUM *Spreng.*: foliis radicalibus lineariformibus apice trifido laciniatis: lacinias divaricatis, floribus erectis, pedicellis setaceis.

Hab. — — 24. D. intr. 1811.

36. (35-31). A. INTEGRIFOLIA: foliis lanceolatis acuminatis subitus tomentosis subdentatis, floribus ova-tis subsessilibus erectis. *W. Sp.*

Hab. in Sibiria. 24. D. intr. 1816.

972. GNAPHALIUM.

27. (7-8). G. CANDIDISSIMUM: foliis candidis niveo-tomen-tosis subcarnosis, inferioribus spathulatis, summis acutiusculis, corymbo composito, calycibus tomen-tosis. *Bieb. Cano.*

Hab. in Caucaso. 24. D. F. intr. 1818.

25. (14-15). G. PENNSYLVANICUM: caule herbaceo erecto subramoso, foliis obovato-spatulatis subitus pubescentibus, floribus axillaribus et terminalibus glo-meratis spicatis. *W. E.*

Hab. in Pensylv., Virgin. 24. F. intr. 1808.

26. (16-17). G. SPHAERICUM: caule herbaceo ramoso erecto, foliis linearibus trinerviis acutis basi valde attenuatis subitus tomentosis, floribus terminalibus capitatis. *W. E.*

Hab. in Nova Hollandia. 24. T. intr. 1814.

979. ERIGERON.

24. (10-11). E. UNIFLORUM: caule unifloro, calyce pi-losso. *Lin.*

Hab. in alpib. Europ. 24. D. intr. 1817.

980. TUSSILAGO.

6. (3-4). *T. FRAGRANS*: thyrso fastigato, Horibus radia-
tis, foliis subrotundo-cordatis æqualiter denticula-
tis subitus pubescentibus. *W. Sp.*

Hab. in Italia. 24. D. intr. 1816.

981. SENEPIO.

32. (5-6). *S. MICRANTHUS* *Mili*: foliis oblongis, inferio-
ribus pinnatifidis; laciinis dentatis, superioribus
sinuato-dentatis, floribus corymboso-umbellatis.

Hab. — — ♂? T. intr. 1810. — Communicatus ex
Anglia sub nomine *Sen. ilicifolii*.

33. (20-21). *S. ARTEMISIFOLIUS*: corollis radiantibus, fo-
liis bipinnato-multifidis utrinque glabris; laciinis
linearibus subcarnosis, pedunculis unifloris corym-
bosis, radio calycem æquante. *Spreng. Pug. 1.*

Hab. in Gallia. 24. D. intr. 1816.

34. (24-25). *S. NEMORENSIS*: corollis radiantibus, foliis
ovato-lanceolatis serratis margine ciliatis subitus
tenuissime pubescentibus sessilibus basi inæquali-
bus. *W. Sp.*

Hab. in nemor. Germaniae austr. 24. D. intr. 1816.

982. ASTER.

46. (11-12). *A. ERICOIDES*: foliis linearibus integrerrimis
glaberrimis, ramulorum subulatis approximatis,
caulinis elongatis, calycibus subsquarroso: folio-
lis acutis, caule glabro. *W. Sp.*

Hab. in Amer. bor. 24. D. intr. 1809.

48. (13-14). *A. AESTIVUS?* foliis lanceolatis subamplexi-
caulibus integrerrimis apice attenuatis margine sca-
bris, caule e basi ramoso erecto: ramulis pilo-
sis, calycinis squamis laxis linearibus acutis æqua-
libus. *W. Sp.*

Hab. in Amer. bor. 24. D. intr. 1812.

49. (post 16). *A. NOVAE ANGLIAE*: foliis lanceolatis am-
plexicaulibus integrerrimis basi auriculatis, caule

pilosо stricto, floribus terminalibus confertis, calycinis squamis laxis coloratis lanceolatis disco longioribus. *W. Sp.*

Hab. in Nova Anglia. 4. D. intr. 1812.

48. (ante 17). *A. SPURIUS*: foliis lanceolatis amplexicaulibus integerrimis basi auriculatis, caule paniculato piloso, ramis subunifloris, calycinis squamis laxis lanceolatis discum æquantibus. *W. Sp.*

Hab. in Amer. bor. 4. D. intr. 1812.

51. (18-19). *A. PUBESCENS (mihī)*: totus pubescens, foliis radicalibus ovatis serratis longissime in petiolum decurrentibus, superioribus lanceolatis sessilibus amplexicaulibus.

Hab. in Amer. bor. 4. D. intr. 1809 sub nomine *Ast.* *Sp.*

52. (19-20). *A. CORYMBOSUS*: foliis ovatis argute serratis acuminatis, inferioribus cordatis petiolatis nudis, caule superne corymboso fastigiato, ramis pilosis, calycibus oblongis imbricatis: squamis arcte adpressis. *W. Sp.*

Hab. in Amer. bor. 4. D. intr. 1816.

26. *A. SIBIRICUS* β. foliis incisis radio albo.

— — γ. foliis incisis radio coeruleo.

Hab. in Sibiria. 4. D. intr. 1817.

47. (42-43). *A. PATULUS*: foliis ovato-lanceolatis serratis glabris, caule debili, calycibus imbricatis. *Lam.*

Enc.

Hab. in Amer. bor. 4. D. intr. 1810. — Rami et petioli dunculi valde pubescentes.

45. (post 43). *A. PENDULUS*: foliis elliptico-lanceolatis serratis glabris, ramulis remotiusculis, ramis divaricatissimis pendulis, caule pubescente. *W. Sp.*

Hab. in Amer. boreali. 4. D. intr. 1814.

983. SOLIDAGO.

27. (6-7). *S. RECURVATA*: caule erecto pubescente, foliis lanceolatis serratis margine scabris, racemis elongatis secundis recurvatis paniculatis. *W. E.*

Hab. in Amer. boreal. 24. D. intr. 1816.

25. (7-8). *S. ARGENTEA*: caule erecto glabro, foliis glabris: radicalibus obovato-spathulatis inaequaliter serratis, caulinis ovato-lanceolatis, racemis paniculatis coarctatis, pedunculis glabris.

Hab. — — 24. D. intr. 1813 ex horto *Paris*, sub hoc nomine.

24. (9-10). *S. ARENARIA* *Kit.*: caule erecto pubescente, foliis lanceolatis acuminatis undulatis, racemis secundis, pedicellis squamosis.

Hab. in Hungaria? 24. D. intr. 1813.

26. (17-18). *S. HIRTA*: caule paniculato-hirtum, foliis lanceolatis utrinque hirtis, caulinis serratis, ramulis integerrimis, racemis erectis, ligulis elongatis.

W. E.

Hab. in Americ. bor. 24. D. intr. 1816.

985. CINERARIA.

11. (1-12). *C. TUSSILAGINIS*: floribus laxe paniculatis, foliis reniformi-cordatis multangulis subitus tomentosis, petiolis basi auritis. *L'Herit. Sert. angl.*

Hab. in Teneriffa. 24. T. intr. 1816. — *Quoad calyx* potius *Senecia* est.

12. (11-13). *C. SIBINICA*: racemo simpli, foliis cordatis obtusis denticulatis levibus, caule simplicissimo monophyllo. *Lin.*

Hab. in Sibiria, Oriente. 24. D. intr. 1816.

13. (12-2). *C. POPULIFOLIA*: floribus corymbosis, foliis cordatis subangulis subitus tomentosis, petiolis apice multi-jugo-appendiculatis. *L'Herit. Sert. angl.*

Hab. in Canariis h. T. intr. 1816.

987. INULA.

19. *I. VERBASCIFOLIA* *Hort. Paris.* foliis oblongo-lanceolatis subdentatis utrinque tomentosis decurrentibus.

Hab. — — 24. D. intr. 1811.

990. DORONICUM.

4. (1-2). *D. MACROPHYLLUM* *Fisch.*: foliis cordatis dentatis, radicalibus longe petiolatis, caulinis sessilibus amplexicaulibus, caule multifloro.

Hab. in Sibiria? 4. *D. intr.* 1815 ex horto *Gorenkano* sub hoc nomine. — *Affine D. Pardalianche* se differt foliis glabris, radicalibus majoribus, caulinis imis sessilibus.

5. (2-3). *D. PLANTAGINEUM*: foliis quintuplinerviis, radicalibus ovato-oblongis obtusis in petiolum attenuatis subintegerrimis, caulinis oblongis sessilibus acutis integerrimis. *W. Suppl.* 2 (1815).

Hab. in Europ. austr. 4. *D. intr.* 1815.

998. TAGETES.

3. *T. ERECTA* β . sulphurea.

— — γ . fistulosa.

Hab. in China. ①. *D. intr.* 1817.

1001. PECTIS.

2. *P. DISCOIDEA* *mihi*: foliis subulato-filiformibus sublanatis, pedunculis axillaribus unifloris folio longioribus, calycinis squamis lanceolatis, flosculis discoideis. *Spr. Pugill.* 2. sub *Leysera*. — *Longchampia capillifolia* *Willd.* in *Berlin. Mag.*

Hab. in arenos. regni Tunetani. ①. *D. intr.* 1814.

1003. CHRYSANTHEMUM.

11. (3-4). *C. MAXIMUM*: foliis carnoso-fragilibus: inferioribus spathulatis subintegris, mediis sessilibus lanceolato-dentatis, summis linearibus integris, caule simplici unifloro. *Dec. Syn.*

Hab. in Pyrenæis. 4. *D. intr.* 1815.

10. (5-7). *C. FUMILUM*: foliis bipinnatis linearisubulatis glabris, caule erecto subramoso. *W. E.*

Hab. — — ①. *D. intr.* 1813.

12. (8-9). *C. ITALICUM*: foliis pinnatis serratis, florum radiis longitudine disci, caule procumbente. *Lin.*
Hab. in Italia 24. D. *intr.* 1816.

1004. PYRETHRUM.

25. (2-3). *P. ANETHIFOLIUM*: foliis bipinnatifidis linearibus acutis, pedunculis unifloris terminalibus, caule fruticoso. *W. E.*
Hab. in Teneriffa. *h. F. intr.* 1816.

24. (10-11). *T. BROUSSONETII*: foliis pinnatifidis: laciniis sub lanceolatis inciso-serratis, caule paucifloro.
Pers. Syn.

Hab. — — *h. F. intr.* 1816.

1007. COTULA.

6. (2-3). *C. CUNEIFOLIA*: foliis cuneiformibus glabris tridentatis petiolatis, floribus axillaribus subsessilibus. *W. Sp.*

— — *β. colorata.*

Hab. in China. *○. C. intr.* 1815.

28. (11-12). *A. HUNGARICA*: foliis bipinnatis: pinnulis linearibus, caulibus adscendentibus: ramis unifloris.

Hab. in Hungaria. 24. D. *intr.* 1814. Missa ab illustr. Bernhardio sub hoc nomine.

30. (12-13). *A. SUFERUTICOSA mihi*: foliis tripinnatis sub-tus sulcatis: pinnulis subulatis punctatis, caule suffruticoso.

Hab. — — *h. D. intr.* 1814 ex hort. Goeting. sub nomine *Pyrethri alpini*.

29. (17-18). *A. FALLAX*: foliis pinnatis margine revolutis: laciniis linearis subulatis subtrifidis, squamis calycinis superioribus obtusis margine membranaceis. *W. Suppl.*

Hab. in Eur. austr.? *○. D. intr.* 1815.

7. A. ALPINA β W. Sp.
Hab. in alpib. Eur. austr., Sibiriae. 4. D. intr. 1802.
40. (15-16). A. MONGOLICA Fisch.: foliis pectinato-pinnatis lanato-pilosis: pinnis serratis, corymbo composito.
Hab. in Mongolia 4. D. intr. 1817.
39. (18-19). A. LEPTOPHYLLA: foliis villoso-tomentosis bipinnatifidis: pinnis distinctis transversis subtripartitis: lacinulis oblongis integerrimis, corymbo composito, calycibus hemisphaericis, caulis ramosis. Bieb. Cauc.
Hab. in Cauc. 4. D. intr. 1816.
36. (19-20). A. ARBOREA mihi: foliis incanis decursive pinnatis: pinnis linearibus pinnatifidis dentatis, floribus corymbosis discoideis, caule arboreo.
Hab. in Teneriffa. H. T. intr. 1810.
38. (21-22). A. DECUMBENS Lamrk.: caule decumbente, foliis bipinnatis: pinnis pinnatifidis: laciniis subulatis, corymbo composito.
Hab. — — 4. D. intr. 1815.
37. (33-34). A. ODORATA: foliis bipinnatis subtus pilosis: pinnis linearibus integerrimis, corymbo simplici. W. Sp.
Hab. in Galliae et Helvetiae alpibus 4. D. intr. 1816.
1019. RUPHTHALMUM.
9. (1-2). B. SERICEUM: foliis oppositis approximatis spatulato-oblongis sericeis, calycinis squamis setaceis hirsutis, caule arboreo. Lin. sp. affinis
Hab. in Teneriffa. H. T. intr. 1816. — —
10. B. ASPERUM mihi: foliis oppositis scabris ovato-cordatis acutis serratis, pedunculis incrassatis.
Hab. in Carolina. 4. F. intr. 1816 ex America boreali sub nomine *Silphii* spec. nov. — Affine *B. scabro*, sed differt foliis basi non attenuatis et calycis squamis brevioribus.

ivibni siem Frustranea.

1020. HELIANTHUS.

15. (11-12). *H. STRUMOSUS*: foliis ovatis acuminatis serratis triplinerviis subtus scabris; calycinis squamis linear-lanceolatis basi ciliatis. *W. Sp.* (8-8) 8.
Hab. in Canada. 4. D. intr. 1816.
16. *H. ATRORUBENS*: foliis oppositis spathulatis crenatis subtriplinerviis scabris, squamis calycinis erectis longitudine disci. *Lin.*
Hab. in Virginia, Carolina. 4. D. intr. 1816.
17. *H. LINEARIS*: foliis alternis linear-lanceolatis scabris subsessilibus integerrimis venosis, calycibus squarrosis, caule fruticoso. *W. Sp.* 8.
Hab. in Mexico. 5. T. intr. 1816.
8. (3-4). *R. TRILoba*: foliis spathulatis, inferioribus trilobis superioribus indivisis. *Lin.*
Hab. in Virginia. 5. D. intr. 1814.

1029. CENTAUREA.

74. (5-6). *C. CENTAURIUM*: squamis calycinis ovatis obtusis, foliis pinnatis glabris: pinnis argute duplicito-serratis decurrentibus: terminali lanceolata. *W. Sp.*
Hab. in alpibus Italiæ. 4. D. intr. 1815.
78. (7-8). *C. SALICIFOLIA*: calycibus recurvato-plumosis squama brevioribus, foliis lanceolatis acuminatis mucronato-dentatis scabris. *Rieb. Cauc.*
Hab. in Caucaso. 4. D. intr. 1816.
79. (78-8). *C. NERVOSA*: calycibus recurvato-plumosis, foliis ovato-lanceolatis basi dentatis nervosis pubescenti-hirtis, corollis flosculosis. *W. E.*
Hab. in Europ. austr. 4. D. intr. 1817.
80. (8-9). *C. PECTINATA*: calycibus recurvato-plumosis, foliis mucronato-serratis, caulinis inferioribus si-

104 SYNGENESIA FRUSTRANEA.

nuato-pinnatifidis, superioribus et rameis indivisis. *W. Sp.*

Hab. in Eur. austr. 2. D. intr. 1817.

14. C. AXILLARIS. *B. caycas.* 1. susomites H. (21-31) 31
Hab. in Caucaso. 2. D. intr. 1816.

76. (25-26). C. PRATENSIS: foliis pubescentibus remote denticulatis, radicalibus obovato-oblongis petiolatis, caulinis sessilibus ovato-lanceolatis.

Hab. in Hungaria? 2. D. intr. 1813 ex horto Pe-
stiano sub hoc nomine. — Affin. *C. vochinensi.*

77. (post 36). C. ALBA: calycibus integris mucronatis, foliis pinnato-dentatis: caulinis linearibus basi dentatis. *Lin.*

Hab. in Hispan., Helvetia. 2. D. intr. 1811.

75. (ante 37). C. BRACTEATA *Vittmann.*: foliis lanceolatis: radicalibus basi sinuato-dentatis longe petiolatis, floralibus approximatis, ramis angulatis erectis.

Hab. in Italia. 2. D. intr. 1814. Affinis *C. jacea*
a qua differt foliis angustioribus et ramis erec-
tis.

81. (63-64). C. POLYMORPHA: calycibus ciliato-spinosis: spina terminali patulo erecta, squamis glabriuscu-
lis apice nigro-fuscis, foliis pinnatifido-lyratis sub-
tomentosis. *Lagasca. nov. genera.*

Hab. in Arragonia. 2. D. intr. 1817.

NECESSARIA.

1057. ARCTOTIS.

5. (3-4). A. ARBORESCENS: flosculis radiantibus fertili-
bus, caule fruticoso erecto, pedunculis pilosis,
foliis pinnatifidis canescentibus subtus tomentosis:
laciiniis lineari-lanceolatis angulatis mucronato-
dentatis undulatis. *W. Sp.*

Hab. ad Cap. b. sp. h. T. intr. 1818.

1037 b. ARCTOTHECA.

- Recept.* favoso-paleaceum. *Papp.* nullus. *Calyx*
imbricatus.
- I. A. REPENS. *W. Sp.*
Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1818.

1039. OTHONNA.

4. (2-3). O. CORONOPIFOLIA: foliis infimis lanceolatis in-
tegerrimis, superioribus sinuato-dentatis. *Lin.*
Hab. ad Cap. b. sp. 3. T. intr. 1815. — Folia in
planta culta fere omnia integerrima.

SEGREGATA.

1049 b. NAUENBURGIA.

- Calculus* diphyllus, uniflorus. *Cal.* communis fo-
liaceus. *Pappus* nullus. *Receptac.* setosum.
- I. N. TRINERVATA *W. Sp.*
Hab. in Amer. merid. *Q. C.* intr. 1816.

1052. ECHINOPS.

- I. E. SPHAEROCEPHALUS *B.* giganteus.
Hab. in Eur. austr. 24. D. intr. 1811.
4. (1-2). E. DAVURICUS *Fisch.*: foliis pinnatifidis subtus
incano-tomentosis, caule unifloro.
Hab. in Davuria. 24. D. intr. 1815. — Vix differt ab
E. sphæroceph. nisi caule unifloro.
3. E. STRIGOSUS: capitulis fasciculatis, calycibus latera-
libus sterilibus, foliis supra strigosis. *Lin.*
Hab. in Hispan. *Q. F.* intr. 1815.

CLASSIS XX.

M O N O E C I A.

MONOECIA.

TRIANDRIA.

1071. **TRIPSACUM.**

3. (1-2). *T. MONOSTACHYON*: spica solitaria superne maculata inferne feminea. *W. Sp.*

Hab. in Carolina meridionali. 4. *F. intr.* 1807.

1074. **CAREX.**

74. (1-2). *C. CAPITATA*: spica androgyna simplici subglobosa superne mascula, stigmatibus binis, fructibus subrotundo-ovatis acuminatis glaberrimis compressis squama subrotundo-ovata longioribus patulis. *W. Sp.*

Hab. in Lappon., Norveg. 4. *D. intr.* 1817.

73. (17-18). *C. NEMOROSA*: spica androgyna composita, spiculis numerosis ternatim quinatinis aggregatis ovatis confertis superne masculis, stigmatibus 2, fructibus patentibus ovatis acuminatis bidentatis marginatis compressis, squamis mucronatis, bracteis foliaceis spica longioribus. *W. Sp.*

Hab. in Germania, Pannonia. 4. *D. intr.* 1816.

72. (22-23). *C. TENUIS*: spica androgyna composita, spiculis ovatis superne masculis, inferioribus remotiusculis, stigmatibus 2, fructibus compresso-triquetris lanceolatis bicuspidiatis ciliatis, bractea foliacea infima longissima. *Spreng. Pug.* 2.

Hab. — — 4. *D. intr.* 1815.

71. (45 46). *C. PUNCTATA Gaudin.*: spicis foemineis subquaternis, superioribus approximatis sessilibus,

inferiore distante subpedunculata, stigmatibus tribus, fructibus compressis rostratis, bracteis foliaceis.

Hab. in Helvetia. 24. D. intr. 1810.

TETRANDRIA.

1082. BOEHMERIA.

3. B. ELONGATA *Fisch.*: foliis alternis ovatis serratis acuminatis pubescentibus, floribus glomeratis axillaribus, rami elongatis, caule herbaceo.

Hab. in Brasilia. 24. C. intr. 1817.

URTICA.

11. (6-7). U. ANGUSTIFOLIA *Fisch.*: foliis lanceolatis elongatis grosse serratis, floribus dioicis, spicis subpaniculatis.

Hab. in Russia. 24. D. intr. 1817.

PENTANDRIA.

1080. AMARANTHUS.

34. (ante 1). A. TENUIFOLIUS: glomerulis axillaribus triandris, foliis linear-lanceolatis cuneatis retusis, caule ramoso diffuso. W. Sp.

Hab. in Ind. orient. 24. C. intr. 1817.

35. (17-18). A. ADSCENDENS *mihi*: glomerulis triandris spicatis, spicis axillaribus terminalibusque elongatis aphyllis, foliis rhombo-ovatis emarginatis, caule ramoso adscendente.

Hab. in China. 24. C. intr. 1817.

36. (20-21). A. TORTUOSUS *mihi*: racemis compositis pentandris erectis, foliis rhomboidali-ovatis obtusissimis apice emarginatis mucronatis, petiolis tortuosis, caule stricto.

Hab. in Ins. St. Cruc. 24. C. intr. 1816.

POLYANDRIA.

1095. BEGONIA.

5. (1-2). *B. PATULA* *Fischer*: foliis inaequaliter cordatis dentatis, inferioribus reniformibus.

Hab. — — ○. *C. intr.* 1817. ex horto *Gorenkano* sub hoc nomine.

1103. BETULA.

8. (1-2). *B. PUBESCENTS*: foliis deltoidibus acutis subcordatis duplato-serratis subtus ramulisqve pubescentibus, strobilorum squamis lobis lateralibus rotundatis. *W. Sp.*

Hab. in turfos. Germaniae, Daniæ. ♂. *D. intr.* 1816.

10. (2-5). *B. EXCELSA*: foliis ovatis acutis serratis, strobilorum squamis lobis lateralibus rotundatis, petiolis pubescentibus pedunculo brevioribus. *Ait. Kew.*

Hab. in Amer. bor. ♂. *D. intr.* 1815.

9. (post 7). *B. PUMILA*: foliis orbiculato-ovatis serratis subtus ramulisqve pubescentibus, amentis foemineis cylindricis. *W. Sp.*

Hab. in Amer. bor. ♂. *D. intr.* 1815.

MONADELPHIA.

1117. ACALYPHA.

8. (2-3). *A. ADSCENDENS* *miki*: floribus foemineis ad basin spicæ masculæ, involucris cordatis inciso-dentatis hirtis, foliis inferioribus subrotundis superioribus oblongis, caule adscendente pubescente.

Hab. in Antillis. ○. *C. intr.* 1818. — *Affin. Acal. reptant. Swartz.*

1118. CROTON.

6. (ante 1). *C. GLABELLUM*: foliis ovatis obtusiusculis integrimis laevibus, fructibus pedunculatis. *Lin.*
Hab. in Antillis ḥ. C. intr. 1818.

1121. PHYLLANTHUS.

3. (ante 1). *P. JUGLANDIFOLIUS*: ramis pinnæformibus, foliis ovato-oblongis acuminatis, pedunculis axillaribus ternis. *W. Suppl.*
Hab. — — ḥ. C. intr. 1816.

1121 b. STILLINGIA.

- MASCULI: *Cal. hemisphaericus*, multiflorus. *Cor.*
tubulosa, erosa.
 FOEMINEI: *Cal. 1-florus*, inferus. *Cor. supera.* *Stylus 3-fidus.* *Caps. 3-cocca*
 3. *S. SEBIFERA*: foliis petiolatis rhomboidibus acuminatis integrimis, caule arboreo. *W. Sp.*
Hab. in China. ḥ. C. intr. 1817.

1123. MOMORDICA.

5. *M. ELATERIUM*: fructibus ellipticis hispidis, foliis cordatis hispidis obtusis dentatis, caule cirrhis nullis. *W. Sp.*
Hab. in Europ. austr. ○. D.

2126. BRYONIA.

6. (2-3). *B. PALMATA*: foliis palmatis laevibus quinque-partitis: lacinias lanceolatis repando-serratis. *Lin.*
Hab. in Zeylona. 2. ○. C. intr. 1815.

1118. CROTON

et (autem) C. creberrimum: foliis ovatis obtusis levibus in
pedunculis levibus, truncatis pedunculis. *Hab. in A*

CLASSIS.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

1176. ASPIDIUM.

14. (10-11). A. FONTANUM: frondibus pinnatis: pinnis cordatis pinnatifidis: laciniis ovatis acutiusculis, infima et terminali subtrilobis, soris demum confluentibus. *W. Sp.*

Hab. in rupestribus Europ. 24. D. intr. 1816.

1179. ASPLENIUM.

7. A. BREYNII: frondibus alternatim decompositis: pin-nulis cuneiformibus apice incisis. *Swartz. Syn.*

Hab. in Europ. boreal. et Helvetia. 24. D. intr. 1816.

1183. ADIANTHUM.

4. A. MICROPHYLLUM *Herb. Vahlii*: frondibus bipinnatis: pinnulis pinnatifidis oblongis, extimus confluentibus.

Hab. in Amer. merid. 24. C. intr. 1806. Ad Pteriden potius pertinet.

ADDENDA.

CLAS S I S I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

1 b. MARANTA.

M. JACQVINI: caule ramoso nodoso, foliis ovatis glabris, floribus spicatis, bracteis coloratis. *Roem.* et *Schult. Syst.*

Hab. ad Caracas. 24. C. intr. 1817.

3. AMOMUM.

A. CARDAMOMUM: foliis breviter petiolatis lanceolatis utrinque attenuatis, spicis laxis horizontalibus, bracteis lanceolatis acutis, labii margine anteriore cristaque trilobis. *Roxb. as. Research.* XI.

Hab. in Ind. orient. 24. C. intr. 1818.

3 b. ZINGIBER.

Corolla limbus interior unilabiatus. *Anthera* duplex, apice rostro simplici recurvato cornuta. *Caps.* trilocularis, trivalvis. *Semina* plura, arillata.

Z. CASSUMUNAR: caulis erectis, foliis sessilibus linear-lanceolatis, spicis compactis strobiliformibus elevatis lanceolatis acutis, bracteis obovatis acuminatis, labio trilobo. *Roxb. l. c.*

Hab. in Ind. orient. 24. C. intr. 1818.

CLASSIS II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

18. JASMINUM.

8. (1-2). *J. LAURIFOLIUM Roxb.*: foliis oppositis ovato-lanceolatis apice attenuato-cuspidatis, pedunculis oppositis unifloris axillaribus.

Hab. in India orientali *Th. C. intr.* 1818. — An idem ac *J. cuspidatum Willd. act. ber.* IV? sed flores non terminales, terni, nec subsessiles.

23. OLEA.

3. *O. FRAGRANS*: foliis elliptico-lanceolatis subserratis, pedunculis unifloris, lateralibus aggregatis. *Thunb. jap.*

Hab. in Cochinchina, China, Japon. *Th. C. intr.* 1818.

30. JUSTICIA.

17. (post 11). *J. RAMOSISSIMA Roxb.*: spicis axillaribus terminalibusque, bracteis lanceolatis coloratis, foliis ovatis, caule ramosissimo.

Hab. in Ind. orient. *Th. C. intr.* 1818. — Nimum affin. *Just. Betonicæ.*

18. (post 17). *J. FORMOSA*: spicis terminalibus, bracteis lanceolatis, foliis ovatis acuminatis. *Willd. En.*

Hab. — — 24. *C. intr.* 1817.

41. SALVIA.

65. (13-14). *S. LEONUROIDES*: foliis cordatis crenatis, floribus axillaribus verticillatis, caule fruticoso. *V.E.*

Hab. in Peru. *h.* *C. intr.* 1818.

64. (57-58). *S. PHLOMOIDES*: foliis lanceolatis subintegerrimis cauleque lanato-viscosis. *Vahl. Symb. bot.*

Hab. in Arragonia. *2.* *F. D. intr.* 1817.

46. ANTHOXANTHUM.

3. *A. OVATUM*: spica ovata densa, vaginis glabris, foliis ciliatis. *Lag. gen. nov.*

Hab. circa Gades. *○. D. intr.* 1817.

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

57. IXIA.

21. (6-7). *I. EXCISA*: foliis oblongis margine interiori inferne excisis, scapo flexuoso, floribus secundis. — *V.E.*

Hab. ad Cap. b. sp. *2.* *T. intr.* 1818.

58. GLADIOLUS.

31. (4-5). *G. LURIDUS mihi*: foliis linearifiliformibus tetrangularibus quadrisulcatis: floribus ringentibus, petalis inaequivalibus, superiore longissime unguiculato.

Hab. ad Cap. b. sp. *2.* *T. intr.* 1818. — An diversus a *G. trichonemifolio* *Gawl.*? *Habitus Gl. tristis* sed multo minor: scapus gracilis 6-uncialis 3-florus, folium inferius longitudine scapi, superiora multo breviora. Corolla valde ringens facie bilabiata. Petalum superius spatulatum longissime

114 TRIANDRIA MONOGYNIA.

unguisculatum apice producto involuto, inferiores duo laterales huic similes sed minores et ungvibus multo brevioribus; reliquæ late ovatae acuminatae. Color floris sordide lutescens venis longitudinalibus fuscis. Odorem spirat *Gl. tristis* sed fortiorem et præsertim die.

28. (12-13). *G. CRISPUS*: corollis infundibuliformibus secundis: laciniis linearis-oblongis, foliis lanceolato-ensiformibus undulato-crispis. *V. E.*

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1818.

29. (ante 14). *G. ALOPECUROIDES*: spica imbricata disticha, foliis linearis-ensiformibus. *V. E.*

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1818.

30. (14-15). *G. ANCEPS*: corollæ tubo filiformi, scapo ancipiti flexuoso, foliis ensiformibus spathæque carina extrorsum denticulatis. *V. E.*

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1818.

59. ANTHOLYZA.

2. *A. AETHIOPICA*: foliis ensiformibus attenuatis, spica disticha. *Thunb. prodr.*

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1818.

60. ARISTEA.

2. *A. COERULEA*: scapo tereti subalato stricto, foliis rigidiusculis multistriatulis, floribus fasciculato- et composito-capitatis, capitulis multifloris spicatum alterne dispositis, spathis integris acutis. *Roem. et Schult. Syst.*

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1818.

61. IRIS.

36. (9-10). *I. PLICATA*: caule multifloro tereti foliis altiore, laciniis corollæ undulato-plicatis, erectis latioribus. *Lam. Enc.*

Hab. — — 24. D. intr. 1818.

37. (18-19). *I. VIRGINICA*: caule ancipiti multifloro foliis altiore. *V. E.*

Hab. in Virgin., Carolina. 24. T. intr. 1818.

38. (26-27). I. LUSITANICA: foliis canaliculatis, scapo bifloro, corollæ laciniis interioribus semarginatis, germine subincluso. *Ait. Kew. Ed. 2.*

Hab. in Lusitan. 24. D. intr. 1818.

63. COMMELINA.

11. (9-10). C. NUDIFLORA: foliis linearibus, pedunculis lateralibus terminalibusque submultifloris nudis. *V. E.*

Hab. in Ind. orient. ①. C. intr. 1818.

64. FICUS.

16. (1-2). F. ULMIFOLIA: foliis ovatis rariter dentatis acuminatis basi apiceque inæquivalibus utrinque scarbris. *Lam. Enc.*

Hab. in Java et Philippinis. Ȣ. C. intr. 1818.

14. (6-7). F. TEREBRATA: foliis obovatis acutiusculis integrermis venosis, receptaculis globosis geminatis sessilibus. *Willd. Sp.*

Hab. in Ins. Mauritii et in Ind. orient. Ȣ. C. intr. 1818.

15. (7-8). F. POPULNEA: foliis ovato-oblongis breve acuminatis integerrimis glabris. *Willd. Sp.*

Hab. in Amer. merid. Ȣ. C. intr. 1818.

68. FIMBRISTYLIS.

2. F. TOMENTOSUM: spicis ovatis acutis, involucro subpentaphyllo umbella composita longiore basi foliisque pilosissimis. *V. E.*

Hab. in Ind. orient. 24. C. intr. 1818.

87. AGROSTIS.

8. A. ALBA γ. Röm. et Schult. Syst.

Hab. in sylvat. Austriæ. 24. D. intr. 1816.

94. ANDROPOGÓN.

9. (ante 1). A. SERRATUS: panicula laxa, flosculo altero pedicellaio altero sessili, pedicellis hirsutis. *Thunb.*
fl. japon. *Hab.* in Japon., Ind. orient. ♂. C. intr. 1818.

98. ELEUSINE.

8. (1-2). E. MUCRONATA: spicis digitatis quaternis, rachi spicæ glabra mucronata, calycis valvula exteriore aristata, foliis a medio ad basin ciliatis, culmo repente. *W. E.* sub *Dactylotenio*.

Hab. in Carolina., Antillis. ♂. C. intr. 1817.

7. E. FILIFORMIS ♂. spiculis bifloris.

Hab. in Amer. merid. ♂. C. intr. 1817.

103. PANICUM.

29. (26-27). P. CURVIFLORUM *mihi*: panicula patente, glumis acuminatis curvatis, culmo ramoso, foliis subhirtis.

Hab. in Ind. orient. ♂. C. *Missum a celeb. Wallichio* sub nomine *P. tenelli Roxb.* sed cum alia extat spec. Panici hujus nominis, *curviflorum* ob flores curvatos nominavi. — *P. tenellum Lamarckii* in omnibus partibus triplo major est et foliis hirtis gaudet.

105. AIRA.

18. (4-5). A. TRUNCATA *W. Suppl.*: panicula effusa glumis obtusis, foliis brevissimis conduplicatis, fasciculorum basi planis, caule repente.

Hab. — — ♀. D. intr. 1815.

19. (8-9). A. ATROPUSPUREA: foliis planis, panicula divaricata paupera, flosculis calyce multum brevioribus apice pilosis. *Wahl. Lapp.*

Hab. in Lapponia, Grönland. ♀. D. intr. 1817.

106. MELICA.

7. M. COEBULEA ♂. *sylvatica*.

Hab. in sylvaticis Europ. boreal. ♀. D. intr. 1810.

8. M. LATIFOLIA Roxb.: panicula diffusa, ramis elongatis filiformibus, spiculis coarctatis, corollis pilosis, foliis lanceolatis nervosis.

Hab. in Ind. orient. 4. C. intr. 1818.

108. POA.

28. P. NEMORALIS B. cæsia Röm. et Schult. Syst.

Hab. in montib. Europ. austr. 4. D. intr. 1817.

50. (28-46). P. STERILIS: panicula attenuata: ramis brevissimis, spiculis subtrifloris acutis glabris, foliis brevibus, culmeis distichie patentibus. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Tauria. 4. D. intr. 1817.

51. (29-50). P. PULCHELLA: panicula coarctata racemosa secunda, spiculis linearibus teretibus suboctofloris: glumis obtusiusculis enerviis. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Tauria. 4. D. intr. 1817.

49. (37-38). P. PUNCTATA: panicula diffusa, spiculis duodecimfloris, floribus diaphanis laevibus; puncto intus fusco. *Lin.*

Hab. in Ind. orient. 4. C. intr. 1817.

113. FESTUCA.

44. (15-16). F. HETEROPHYLLA: panicula laxa patula nubante, foliis radicalibus tenuissimis longissimis, radice repente. *Röm. et Schult. Syst.*

Hab. in sylvaticis Eur. 4. D. intr. 1817.

114. BROMUS.

33. (3-4). B. VELUTINUS: panicula fructifera apice nubante, spiculis oblongo-lanceolatis tumidiunculis compressis pubescentibus, flosculis subimbricatis, aristis gluma longioribus primo erectis dein patentibus, foliis subpilosis. *Schrad. Fl. germ.*

Hab. in Eur. media et austr. 4. D. intr. 1817.

117. TRITICUM.

44. (6-7). T. CEVALLOS: spica pyramidato-teretiuscula longissima glaberrima, glumis utrinque compressis

118 TRIANDRIA MONOGYNYA.

- late carinatis bidentatis, semine longissimo. *Lag.*
nov. gen.
- Hab.* — cultum in regno Granatensi. ♂. ♂. D. intr.
1817.
45. (8-9). *T. FASTUOSUM*: glumis utrinque compressis late
carinatis mucronatis pubescentibus, spica longa
subpyramidata, semine tumido. *Lag. l. c.*
Hab. — cult. in Hispania merid. ♂. ♂. D. intr. 1817.
46. (11-12). *T. COCHLEARE*: spica opposite compressa
confertissima abbreviata pubescente, glumis utrin-
que compressis late carinatis. *Lag. l. c.*
Hab. — cultum in regno Granatensi. ♂. ♂. D. intr.
1817.
47. (12-13). *T. GAERTNERIANUM*: glumis utrinque com-
pressis late carinatis glaberrimis mucronatis, spica
longa subpyramidata, semine tumido. *Lag. l. c.*
Hab. — cultum in Hispania: ♂. ♂. D. intr. 1817.
48. (13-14). *T. PLATISTACHIUM*: spica opposite compres-
sa confertissima abbreviata glabra: glumis utrin-
que compressis late carinatis. *Lag. l. c.*
Hab. — cult. in regno Granat. ♂. ♂. D. intr. 1817.
49. (16-17). *T. BAUHINI*: glumis truncatis dense imbri-
catis, semine tumido. *Lag. l. c.*
Hab. — cult. in Bourgalensi provincia. ♂. ♂. D.
intr. 1817.
50. (17-18). *T. CIENFUEGOS*: gluma disperma, valvulis
subbidentatis, dentibus ungivculatis, semine tu-
mido. *Lag. l. c.*
Hab. — cult. in Asturum principatu. ♂. ♂. D. intr.
1817.
118. LOLIUM.
5. (2-3). *L. RIGIDUM*: spica mutica: spiculis calyce mul-
to longioribus, corollis elongatis, culmo superne
scaberrimo. *Gaudin. Agrostogr.*
Hab. in Helvetia. ♂. D. intr. 1817.

123. ROTTBÖLLIA.

7. (1-2). *R. SUBULATA* Savi: spica tereti subulata erecta
calyce univalvi ensiformi acuminato adpresso. *Röm.*
et Schult. Syst. sub Monerma.

Hab. in marit. Italiae et Gall. austr. ♂. D. intr. 1817.

126. HOLOSTEUM.

2. (ante 1). *H. CORDATUM*: foliis subcordatis. *Lin.*

Hab. in Jamaica, Surinamo, Java. ♂. C. intr. 1818.

128. MOLLUGO.

2. (ante 1). *M. PENTAPHYLLA*: foliis subquadratis obovatis
glabris, floribus paniculatis, caule decumbente.
Willd. nov. act. berol.

Hab. in Ind. orient., Zeylona. ♂. C. intr. 1818.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

131. PROTEA.

9. (ante 7). *P. TRITERNATA*: foliis bipinnatis filiformibus
glabris, pedunculis capitulo longioribus, squamis
calycinis lanceolatis hirtis. *Thunb. prodr.*

Hab. ad Cap. b. sp. ♂. T. intr. 1817.

10. (9-11). *P. PINIFOLIA*: foliis filiformibus, floribus ra-
cemosis ecalyculatis glabris. *Thunb. l. c.*

Hab. ad Cap. b. sp. ♂. T. intr. 1817.

11. (10-7). *P. NANA*: foliis linearis-subulatis, capitulo
terminali, calyce colorato. *Thunb. l. c.*

120 TETRANDRIA MONOGYNIA.

Hab. ad Cap. b. sp. ḥ. T. intr. 1817.

12. (7-1). P. PLUMOSA: foliis lanceolato-cuneiformibus incanis, capitulo terminali oblongo, petalis inferne glabris, superne pilosis; pilis longissimis. *Ait.* Kew.

Hab. ad Cap. b. sp. ḥ. T. intr. 1817.

13. (4-14). P. ARGENTEA: foliis lanceolatis argenteo-to-mentosis ciliatis, caule arboreo, capitulis globosiss. *Thunb.* l. c.

13. *Hab.* ad Cap. b. sp. ḥ. T. intr. 1817.

14. (13-15). P. ACAULIS: foliis oblongis capituloque globo glabris, caule decumbente brevissimo. *Thunb.* l. c.

14. *Hab.* ad Cap. b. sp. ḥ. T. intr. 1817.

15. (14-5). P. GLABRA: foliis oblongis aeniis capituloque hemisphaerico glabris, caule fruticoso. *Thunb.* l. c.

Hab. ad Cap. b. sp. ḥ. T. intr. 1817.

16. (post 6). P. CYNAROIDES: foliis subrotundis petiolatis glabris. *Thunb.* l. c.

Hab. ad Cap. b. sp. ḥ. T. intr. 1817.

132. CONCHIUM.

3. C. RUSCIFOLIUM: foliis ovato-ellipticis utrinque acutis mucronatis, capsulis obovatis obtusis. *W. E.*

Hab. in Nova Hollandia ḥ. T. intr. 1817.

144. GALIUM.

36. (5-30). G. CAUCASICUM: caule scabro, foliis verticillato-senis nonisve linearibus margine revolutis scabris mucronatis, pedunculis umbellatis dichotomis. *Lag. nōv. gen.*

Hab. in Caucas. 2. D. intr. 1817.

37. (19-20). G. TRICORNE: foliis subobconis lanceolatis margine cauleque retrorsum aculeatis, pedunculis axillaribus trifloris, fructu granulato nutante. *Smith.* fl. brit.

Hab. in arvis. Europ. 2. D. intr. 1817.

152. CALLICARPA.

3. C. LANCEOLARIA Roxb.: foliis lanceolatis acuminatis utrinque glabris superne serratis ramis lepidotomentosis.

Hab. ad Silhet. Ind. orient. $\ddot{\text{h}}.$ C. intr. 1818. Varietas forte *Callic. longifoliae Lamarck*, differt solummodo foliis pallidioribus acutioribus et ramis lepidotis.

156. PLANTAGO.

42. (10-11). P. SIBIRICA: foliis ovato-lanceolatis, laxe crenato-dentatis, obtusis trinervibus, spica elongata, scapo compresso subangulato. *Poir. Enc. meth. Suppl.*

Hab. in Sibir. 4. D. intr. 1817.

41. (11-36). P. LAGOPUS: foliis lanceolatis subdenticulatis, spica ovata hirsuta, scapo tereti. *Lin.*

Hab. in Europ. austr. $\Theta.$ D. intr. 1817.

174. RIVINA.

2. R. LAEVIS $\beta.$ var. foliis ovato-lanceolatis.
Rivina lanceolata W. Suppl.

Hab. — — $\ddot{\text{h}}.$ C. intr. 1817.

175. PARIETARIA.

5. P. ARBOREA: foliis ovatis basi rotundatis apice acuminatis, caule arboreo.

Hab. — — $\ddot{\text{h}}.$ T. missa 1818. ab illustr. *Wendlandio* sub hoc nomine.

TETRAGYNIA.

180. ILEX.

5. (3-4). I. SALICIFOLIA: foliis alternis distantibus semipervirentibus lanceolatis utrinque acuminatis medio denticulatis, cymis axillaribus petiolo longioribus. *W. E.*

Hab. in Insula Mauritii $\ddot{\text{h}}.$ C. intr. 1818.

182. SAGINA.

3. *S. STRICTA*: glaberrima, caule pedunculisque strictis, foliis subcylindricis muticis, calyce obtuso. *Fries.* novit. fl. svec. Part. III.

Hab. in litt. Daniae et Sveciae ad Gimbrishavn. *O. D.* intr. 1818.

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

189. ANCHUSA.

I. *A. OFFICINALIS* *B. angustifolia*. *Lehm. Asper.*

γ. incarnata ibid.

Hab. in Europ. 4. D. intr. 1817.

198. ECHIUM.

18. (13-15). *E. FRUTICOSUM*: caule tomentoso, foliis lanceolato-spathulatis acutiusculis sericeo-villosis, spiculis confertis corymbosis. *Lehm. Asperif.*

Hab. ad Cap. b. sp. h. T. intr. 1817.

203. PRIMULA.

II. *P. MINIMA*: foliis cuneiformibus nitidis apice multi-dentatis, scapo subunifloro foliis breviore, corolla laciniis semibifidis T. græcum referentibus, fauce villosula. *Lehm. Prim.*

Hab. in alpib. Europ. austr. 4. F. intr. 1818.

220. CONVOLVULUS.

23. (7-8). *C. BATATAS*: foliis cordatis hastatis quinque-nerviis, caule repente hispido tuberifero. *Lin.*

Hab. in Indiis. 24. C. *intr.* 1818.

24. (post 19). C. PES CAPRAE: foliis bilobis, pedunculis unifloris. Lin.

Hab. in India. ⑩. C. *intr.* 1818.

25. (4-5). C. SPLENDENS: foliis ovato-lanceolatis acuminatis subtus nervosis sericeis. — *Letsomia splendens Roxb.*

Hab. in Ind. orient. ad Chitagong. 5. C. *intr.* 1818.

— Florentem non vidi.

26. (8-9). C. SPECIOSUS: foliis cordatis subtus tomentoso-sericeis, pedunculis petiolo longioribus umbeliferis, calycibus acutis. Ait. Kew.

Hab. in Ind. orient. 5. C. *intr.* 1818.

220 b. CANTUA.

Cal. 3-5-fidus. *Cor.* infundibuliformis. *Stigma* 3-fidum. *Caps.* 5-locul. 3-valv. polysperma. *Sem.* alata.

- I. C. FOETIDA: foliis lanceolatis glabris, pedunculis subtrifloris. Fl. Peruv.

Hab. in Peru. 5. C. *intr.* 1818.

221. IPOMOEA.

19. (5-6). I. TUBEROSA: foliis palmatis: lobis septenis lanceolatis acutis integerrimis, pedunculis trifloris. Jacq. obs.

Hab. in Ind. occid. 24. C. *intr.* 1818.

223. CAMPANULA.

- I. C. ROTUNDIFOLIA β. uniflora.

Hab. in alpib. Eur. bor. 24. D. *intr.* 1817.

57. (13-14). C. VERSICOLOR: foliis cordatis serratis lævibus, thyro terminali, laciniis calycinis subulatis, corolla rotato-patula. Smith. fl. græca.

Hab. in Græcia. 24. F. *intr.* 1818.

58. (17-18). C. UCRANICA: foliis oblongis inæqualiter dentatis subtus scabris, caule paniculato, bracteis calycibusque ciliatis. Spreng. nov. Prov.

Hab. in Ucrania. 24. D. *intr.* 1818.

124 PENTANDRIA MONOGYNIA.

223 b. ROELLA.

Caps. bilocularis coronata. Corolla rotata. Stigma bifidum.

1. *R. CILIATA*: foliis lanceolatis ciliatis, floribus solitariis terminalibus. *Thunb. Pr. 1818. (3-4) 62*
Hab. in Maurit., AEthiopia. H. T. intr. 1818.

228. SAMOLUS.

2. *S. LITTORALIS*: caule tereti ramoso folioso, foliis radicalibus spathulatis, caulinis sublanceolatis, calyculis lacinios acutis. *Brown. Prodr. 1818. (3-4) 62*
Hab. in Nov. Holland. 4. T. intr. 1818.

232 b. CINCHONA.

Coroll. infundibuliformis. Caps. infera, 2-locularis, 2-partibilis, dissepimento parallelo.

1. *C. CARIBAEA*: pedunculis axillaribus unifloris. *Vahl. Act. soc. hist. nat. 1818. (3-4) 62*
Hab. in Caribæis. H. C. intr. 1818.

237 b. ERITHALIS.

Coroll. 5-partita: laciinis recurvis. Cal. urceolatus.

Bacca 10-locularis, infera.

1. *E. FRUTICOSA*: foliis obovatis, cymis compositis pendulatis terminalibus. *W. Sp. 1818. (3-4) 62*
Hab. in Antillis. H. C. intr. 1818.

242. VERBASCUM.

26. (9-10). *V. FORMOSUM*: foliis oblongo-cordatis glabris crenato-dentatis, inferioribus petiolatis, floralibus reniformi-cordatis attenuato-cuspidatis tomentosis, staminibus 3 lanatis.

Hab. in Sibiria? ♂. D. missum 1817. a celeb. Fischero sub hoc nomine. Species formosissima!

250. SOLANUM.

60. (2-3). *S. GRANDIFLORUM*: caule arboreo, foliis ovatis sinuatis integerrimisqve, racemis rameis re-

curvis, floribus secundis magnis. *Ruiz. et Pav.*
Fl. per.

Hab. in Peru. $\ddot{\text{h}}$. *C. intr.* 1818.

59. (39-14). *S. ROSTRATUM* *Dunal.* caule aculeato hirsuto, foliis triplicato-pinnatifidis undulatis recurvatis, corollarum laciniis incurvato-rostratis.

Hab. — — $\ddot{\text{h}}$? *T. intr.* 1818.

25. *S. LYCOPERSICUM* β . fruct. luteo.

Hab. in Amer. calid. \odot . *D. intr.* 1817.

261 c. SIDEROXYLON.

Cor. 5-fida. *Nect.* in plerisque 5-phyllo. *Stigma* simplex. *Bacca* 5-sperma.

1. *S. MELANOPHLEUM*: inerme, foliis perennantibus lanceolatis, pedunculis angulatis. *Lin.*

Hab. ad Cap. b. sp. $\ddot{\text{h}}$. *T. intr.* 1818.

263. PHYLICA.

12. (8-9). *P. CORDATA*: foliis cordato-ovatis patentibus, caule proliquo. *Lin.*

Hab. ad Cap. b. sp. $\ddot{\text{h}}$. *T. intr.* 1818.

268. CELASTRUS.

5. (2-3). *C. CERNUUS*: inermis, foliis ovatis obtusis serratis, pedunculis axillaribus unifloris cernuis. *Thunb. Prod.*

Hab. ad Cap. b. sp. $\ddot{\text{h}}$. *T. intr.* 1818.

281. HEDERA.

2. *H. CAPITATA*: foliis ovato-oblongis apice cuspidatis basi cuneatis trinerviis.

Hab. — — $\ddot{\text{h}}$. *C. missa* 1818 a cell. *Wendlandio* sub hoc nomine. Florentem non vidi.

295. GARDENIA.

2. (ante 1). *G. RADICANS*: inermis, foliis lanceolatis, corollis hypocrateriformibus obtusis, calyce angulato, caule radicante. *W. Sp.*

Hab. in Japon. $\ddot{\text{h}}$. *T. intr.* 1818.

3. (post 1). *G. THUNBERGIA*: inermis, foliis ellipticis, corollis hypocrateriformibus, calycibus latere rumpentibus: laciniis apice dilatatis. *Ait. Kew.*
Hab. ad Cap. b. sp. ḥ. T. intr. 1818.

298. NERIUM.

3. *N. COCCINEUM Roxb.*: foliis oppositis ovatis apice attenuatis, floribus subternis terminalibus.
Hab. in Ind. orient. ad Silhet ḥ. C. intr. 1818.

299. PLUMERIA.

2. *P. ALBA*: foliis lanceolatis revolutis, pedunculis superne tuberosis. *Jacq. amer.*
Hab. in Jamaïca. ḥ. C. intr. 1818.

DIGYNIA.

303. CYNANCHUM.

5. (1-2). *C. MARITIMUM*: caule volubili, foliis cordatis hirsutis subtus tomentosis, pedunculis aggregatis.
Lin.
Hab. in Antill. ḥ. C. intr. 1818.

305. ASCLEPIAS.

17. (11-18). *A. PARASITICA Wallich*: foliis revolutis ova-to-lanceolatis carnosis subtrinerviis glabris nitidis, caule fruticoso foliosissimo radicante, umbellis in ramulis terminalibus.

Hab. in India orient. ḥ. C. intr. 1818. — Affinis *A. carnosæ* sed praeter notas indicatas differt lacte albo qvod in *A. carnosæ* luteum est denique radiculis crebrioribus.

18. (11-12) *A. ARBORESCENS*: foliis revolutis ovatis, caule fruticoso subvilloso. *Lin.*
Hab. ad Cap. b. sp. ḥ. T. intr. 1818.

307. HERNIARIA.

5. (2-3). H. BESSERI *Fisch.*: hirsuto-lanata, ramis elongatis, floribus subpedunculatis glomeratis, foliis lanceolatis.

Hab. — — 24. D. intr. 1817.

322 b. PANAX.

HEMAPHR.: Umbella, *Cal.* 5-dentatus, superus. *Cor.* 5 petala. *Bacca* disperma, infera.

MASCULI: Umbella. *Cal.* integer. *Cor.* 5-petala.

1. P. ACULEATUM: foliis ternatis, summis juxta flores confertis simplicibus, petiolis ramulisque aculeatis. *Ait. Kew.*

Hab. in China. 5. T. intr. 1818.

332. DAUCUS.

II. (10-7). D. MEIFOLIUS: caule hirsuto pilis deflexis, foliis pinnatis: foliolis multifidis subverticillatis divaricatis setaceis, involuci foliolis ciliatis, setis fructuum pectinatis molliusculis. *Spreng. spec. umbell.*

Hab. prope Conimbricam. 24. F. intr. 1817.

336. SELINUM.

15. (6-13). S. POLYMORPHUM: caule angulato ramoso, foliis triternatis: laciniis lanceolato-linearibus margine membranaceis subserrulatis cuspidatis, involuci polyphylli foliolis margine membranaceis serrulatis. *Spreng. Pug. 1.*

Hab. in Imperio ruthenico. 24. D. intr. 1817.

338. PEUCEDANUM.

9. (1-2). P. LONGIFOLIUM: foliis ternato supradecompositis, foliolis subtrigvetro setaceis canaliculatis elongatis, involucro universalis subnullo, floribus luteis. *Spreng. spec. umb.*

Hab. in Hungaria et Austria. 24. D. intr. 1818.

343. LASERPITIUM.

13. (10-11). *L. ARCHANGELICA*: foliis decompositis: foliolis ovatis bi-trifidis dentatis subtus hirsutis. *W. Sp.*

Hab. in Carniola, Croatia. 24. D. intr. 1817.

346. ANGELICA.

8. (2-3). *A. PRATENSIS*: caule sulcato, foliis ternato-decompositis subtus asperis: foliolis subdivaricatis cordato-ovatis inaequaliter dentatis. *Spr. l. c.*

Hab. in Gallia et ad Caucas. 24. D. intr. 1817.

7. (6-2). *A. RAZOLII*: caule sulcato superne pubescente, foliis tripinnatis: foliolis oblongis asperis argute serratis oblique in petiolum decurrentibus, involucris obsoletis. *Spr. l. c.*

Hab. in alpib. Europ. austr. ♂. D. intr. 1817.

358. SESELLI.

12. (7-8). *S. CUNEIFOLIUM*: foliolis latis cuneiformibus furcatis, superioribus oblongis integris, involucellis connato-monophyllis brevissimis, seminibus villosis. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Caucaso et Sicilia. 24. D. intr. 1817.

365. APIUM.

3. (post 2). *A. FRACTOPHYLLUM*: foliolis radicalibus cordatis basi truncatis trifidis.

Hab. — — ♂? D. intr. 1817 ex horto Madritensi sub hoc nomine.

TRIGYNIA.

376. PHARNACEUM.

2. *P. SPATHULATUM*: pedunculis subumbellatis radicalibus, foliis spathulatis. *Swartz. fl. ind. occid.*

Hab. in Antillis ♂. C. intr. 1818.

PENTAGYNYIA.

384. ARMERIA.

9. (1-2). *A. ALPINA*: scapo compressiusculo glabro, calycis communis foliolis elliptico-rotundatis, foliis linearibus planis acutis, margine submembranaceis. *W. E.*

Hab. in Alpib. Carinth., Tyroliae. 2. D. intr. 1817.

386. LINUM.

19. (12-13). *L. FLAVUM*: calycibus acuminatis serrulato-scabris, foliis basi biglandulosis margine glabris, paniculae ramis dichotomis, corollis monopetalis, caule herbaceo. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Austr., German. austr. 2. D. intr. 1817.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNYIA.

402. NARCISSUS.

21. (1-2). *N. TENUIOR*: foliis linearis-subulatis canaliculatis, scapo unifloro, nectario brevi rotato plicato.

Curt. Mag.

Hab — — 2. D. intr. 1817.

403. PANCRATIUM.

7. (1-2). *P. LITTORALE*: spatha multiflora, foliis linearis-lanceolatis, nectarii dentibus 6 staminiferis, spatio intermedio repando. *W. Sp.*

Hab. in Ind. occid. 2. C. intr. 1818.

404. CRINUM.

7. *C. toxicarium Roxb.*: foliis lanceolato-linearibus cuspidatis scapo lateralī longioribus, spatha monophylla, floribus pedunculatis, petalis linearibus tubo brevioribus. — *Rumph. Amb.* 6. T. 69.

Hab. in Ind. orient. et Ins. Molucc. 24. C. intr. 1818.

405. AGAPANTHUS.

2. *A. praecox*: foliis linearibus, spatha multiflora, pedunculis longitudine corollæ. *W. H.* (1818)

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1818. 1.

410. ALLIUM.

55. (10-11). *A. longicaule mihi*: caule longissimo stricto tenui, foliis linearibus angustissimis, spatha univalvis subrotunda cuspidata longitudine capituli bulbiferi.

Hab. in Amer. bor. 24. D. intr. 1817, ex *Amer. bor.* sub nomine *All. gracil.* — Flores tantum imperfectos yidi.

56. (14-43). *A. pallens*: caule subteretifolio umbellifero, floribus pendulis truncatis, staminibus simplicibus corolla æqualibus. *Gouan. ill.*

— — $\beta.$ *caucasicum* spatha longissima.

Hab. in Europ. austr. $\beta.$ in Caucaso. 24. D. intr. 1817. Adest solummodo var. $\beta.$ in horto.

58. (17-18). *A. saxatile*: scapo subnudo tereti, foliis semiteretibus, spatha acuminata umbella longiore, staminibus simplicibus corolla longioribus. *Bieb. Cauc.*

Hab. in lapidosis Tauriæ. 24. D. intr. 1817.

57. (post 41). *A. albidum Fisch.*: scapo nudo tereti, foliis linearisubulatis, umbella multiflora radiis teretibus.

Hab. in Imper. ruthenico. 24. D. intr. 1817.

418. ALBUCA.

43. (2-3). *A. COARCTATA*: petalis interioribus apice fornicatis, foliis glabris, pedunculis longitudine bractearum. *Dryand. in Act. holm.*

Hab. — — 24. C. intr. 1817.

420. ORNITHOGALUM.

21. (11-12). *O. LONGE BRACTEATUM*: racemo longissimo, bracteis pedunculis fere duplo longioribus, foliis lanceolato-ensiformibus. *Murr. Syst.*

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1818.

22. (15-16). *O. JUNCIFOLIUM*: filamentis sublanceolatis, racemo longissimo, foliis subulatis plurimis. *Jacq. h. schönbr.*

Hab. ad Cap. b. sp.? 24. T. intr. 1817.

422. ASPHODELUS.

6. *A. INTERMEDIUS mih*: scapo æqvali, foliis strictis subulatis teretibus striato-sulcatis.

*Hab. in Canar. maj. 24. T. misit 1817. celeb. C. Smith sub nomine *Asph. n. sp.* — A. fistulosus differt foliis semicylindricis.*

7. *A. CLAVATUS Roxb* : scapis ad ramificationes clavatis, foliis setaceis strictis.

Hab. in Ind. orient. ①. C. intr. 1818. — Ab A. intermedio et fistuloso differt statura humiliori et denique duratione.

429. CONVALLARIA.

9. (7-8). *C. STELLATA*: foliis alternis amplexicaulibus ellipticis acutiusculis, racemo terminali simplici. *W. Sp.*

Hab. in Amer. bor. 24. D. intr. 1816.

434. LACHENALIA.

7. (ante 1). *L. HYACINTHOIDES*: corollis campanulatis brevissime pedunculatis, petalis interioribus longi-

oribus patulis emarginatis, foliis linearis-subulatis
canaliculatis laxis scapo duplo longioribus. *W. Sp.*
Hab. ad Cap. b. sp. 2. T. intr. 1818.

456. SANSEVIERA. — — —

3. *S. CARNEA*: foliis distichis lanceolato-ensiformibus ca-
rinatis, floribus solitariis sessilibus. *Hort. Kew. Ed. 2.*

Hab. in China. 2. T. intr. 1818.

446. JUNCUS.

15. (6-7). *J. CAPITATUS*: culmo nudo filiformi, capitulo
terminali sessili subsolitario involucrato. *W. Sp.*

Hab. in ericetis Europ. 2. D. intr. 1818.

446 br. TACCA.

Cal. 6-partitus. Cor. 6-petala, calyci inserta, an-
therifera. Stigma stellatum. Baccæ sicca, 6-an-
gularis, polysperma, infera.

1. *T. PINNATIFIDA*. *Lin.*
Hab. in Ind. orient. et Ins. Societat. 2. C. intr. 1818.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

473. PISONIA.

2. *P. SUBCORDATA*: inermis, foliis cordato-subrotundis,
fructibus subclavatis pentagonis, angulis apice mu-
ricatis. *Swartz. Ind. occ.*

Hab. in Ind. occid. h. C. intr. 1818.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

480. OENOTHERA.

47. (14-15). *O. ROMANZOWII* *Ledebours.* foliis lineari-lanceolatis glaucescentibus glabris, capsulis sessilibus linearis-oblongis.
Hab. — — *O. D. intr. 1818.* — Admodum affinis *O. purpureæ* sed minor et, præter notas indicatas, color florum coeruleo-violaceus.

496. ERICA.

44. (8-9). *E. MARIFOLIA*: floribus terminalibus, foliis ova-tis patentissimis, corollis subglobosis. *Hort. Kew.*
Ed. 2.
Hab. ad Cap. b. sp. *h. T. intr. 1818.*

TRIGYNIA.

503. b. COCCOLOBA.

4. *C. UVIFERA*: foliis cordato-subrotundis nitidis. *Lin-*
Hab. in India occid. *h. C. intr. 1818.*

CLASSIS IX.
E N N E A N D R I A.

MONOGYNIA.

512. LAURUS.

4. (ante 1). L. CASSIA: foliis triplinerviis lanceolatis. *Lin.*
Hab. in Ind. orient. *h. C. intr.* 1818.
5. (2-3). L. PERSEA: foliis ovatis coriaceis transverse
 venosis perennantibus, floribus corymbosis. *Jacq.*
observ.
Hab. in Ind. occid. *h. C. intr.* 1818.

CLASSIS X.
D E C A N D R I A.

MONOGYNIA.

517 b. VIRGILIA.

- Cal.* 5-dentatus. *Cor.* papilionacea. *Stigma* imber-
 be. *Legum.* compressum, oblongum, polyspermum.
1. V. CAPENSIS: staminibus deciduis basi lanatis, ger-
 minibus tomentosis, carina acuminata, foliolis
 lanceolatis. *Ait. Kew. Ed.* 2.
Hab. ad Cap. b. sp. *h. T. intr.* 1818.

520. BAUHINIA.

4. (ante 1). B. PARVIFLORA: racemis axillaribus terminibusqve nutantibus, petalis linearibus, lobis foliorum rotundatis glabris. *V. S.*
Hab. in Ind. orient. *H. C. intr.* 1818.

523. BACTYRILOBIUM.

2. B. GRANDE: foliis 20-jugis oblongis obtusis subholosericeis eglandulosis. *Lin. Suppl. sub Cassia.*
Hab. in Surin., Brassil. et St. Doming. *H. D. intr.* 1818.

524. CASSIA.

21. (9-10). C. SUMATRANA Roxb. foliolis 4-8-jugis coriacis ellipticis apice retusis mucronatis.
Hab. in Sumatra. *H. C. intr.* 1818.
20. (19-14). C. AURICULATA: foliis 12-jugis mucronatis, glandulis subulatis pluribus, stipulis reniformibus barbatis. *Lin.*
Hab. in Ind. orient. *H. C. intr.* 1818.

530 b. HAEMATOXYLON.

Cal. 5-partitus. *Pet.* 5. *Caps.* lanceolata, 1-locularis, 2-valvis: valvis navicularibus.

1. H. CAMPESCHIANUM *Lin.*

Hab. in Amer. merid. *H. C. intr.* 1818.

530 c. GARUGA.

Cal. campanulatus, 5-sidus, staminifer. *Pet.* 5, æqvalia, calyci inserta. *Stigma* 5-lobum. *Drupa* nucibus 2-3, monospermis.

1. G. PINNATA Roxb.

Hab. in Ind. orient. *H. C. intr.* 1818.

536 b. QVASSIA.

Cal. 5-phylloides. *Pet.* 5. *Nectar.* 5-phylloides. *Drupæ* 5, distantes, bivalves, monospermæ, receptaculo carnoso insertæ.

I. Q. AMARA: floribus hermaphroditis, foliis impari-pinnatis: foliolis oppositis sessilibus, petiolo articulato alato, floribus racemosis. *Lin.*

Hab. in Guiana, Surinamo. *h. C. intr.* 1818.

536 c. LIMONIA.

Cal. 5-partitus. *Pet.* 5. *Bacca* trilocularis. *Sem.* solitaria.

I. L. TRIFOLIATA: foliis ternatis, spinis geminis. *Lin.*
Hab. in China. *h. C. intr.* 1818.

546 b. BUCIDA.

Cal. 5-dentatus, superus. *Cor.* nulla. *Bacca* monosperma.

I. B. BUCERAS: spicis elongatis, foliis cuneiformibus glabris. *Vahl. Ecl.*

Hab. in Ind. occid. *h. C. intr.* 1818.

547. TERMINALIA.

I. T. PROCERA Roxb.: foliis oblongo-ovatis basi cuneatis apice rotundatis cum acumine integerrimis.
Hab. ad Andamans Ind. orient. *h. C. intr.* 1818.

DIGYNIA.

552. SAXIFRAGA.

27. (21-22). S. IRRIGUA: piloso-viscosa, foliis trifidis subcucullatis: laciniis bis trifidis, petiolis elongatis sulcatis, petalorum lanceolatorum ungibus patentissimis calyce triplo longioribus. *Spreng. nov. prov.*

Hab. in Sibīria. *24. D. intr.* 1818.

556. GYPSOPHILA.

14. (3-13). G. ACUTIFOLIA: foliis lanceolatis utrinque attenuatis trinerviis marginatis glabris, paniculae ramis pubescentibus subfasciculatis, bracteis calyci-

busque scariosis, petalis emarginatis genitalia superantibus. *Spreng. nov. Prov.*

Hab. in Russia merid. 4. F. intr. 1818.

558. DIANTHUS..

38. (3-4). *D. CAMPESTRIS*: floribus solitariis, squamis calycinis ovatis acutis brevibus, foliis subulatis caule que paniculato subhirsuti. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Tauria. 4. D. intr. 1817.

38. *D. DELTOIDES* *β. wolgensis* *Fisch.* foliis pubescens tibus.

Hab. ad Wolgam. 4. D. intr. 1817.

39. (20-21). *D. CHLOROLEUCUS* *Fisch.*: caulis diffusis, squamis calycinis tubo dimidio brevioribus ovatis acuminatis, foliis linearibus margine cartilagineis, petalis profunde dentatis.

Hab. in Imper. Ruthen. 4. D. intr. 1814.

TRIGYNIA.

561. SILENE.

77. (48-49). *S. CLANDESTINA*: calycibus ovatis decemangulis pubescentibus, petalis bifidis erectis calyce paulo longioribus, foliis oblongo-lanceolatis ciliatis. *W. Sp.*

Hab. ad Cap. b. sp. ①. T. intr. 1817.

PENTAGYNIA.

568. SPONDIAS.

2. *S. MOMBIN*: foliorum petiolo communi compresso, Lin.

Hab. in Ind. occident. 3. C. intr. 1818.

570. SEDUM.

24. (20-24). *S. PALLIDUM*: foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus, cyma ramosa pube-

scente, floribus secundis, petalis aristato-acuminate. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Tauria ♂? D. F. *intr.* 1817.

23. (15-16). *S. HEPTAPETALUM* *Fisch.*: ramosissimum, erectum; foliis oblongis curvatis obtusis sessilibus, cymis trifidis, floribus nutantibus 7-8-petalis.

Hab. in Imper. Ruthenico. ⊖ D. F. *intr.* 1818.

25. (post 19). *S. ATRATUM*: caule erecto, floribus corymbosis fastigiatis. *Jacq. aust.*

Hab. in alpib. Eur. austr. 4. D. *intr.* 1818.

575. CERASTIUM.

22. (3-4). *C. HOLOSTEOIDES*: caule alterno latere pubescente, pedunculis eglanduloso-pilosis, foliis oblongis glabris, petalis calyce margine scarioso brevioribus. *Fries nov. Fl. sv. III.*

Hab. in Blekingia Sveciæ. 4. D. *intr.* 1818.

21. (5-6). *C. TENUIFOLIUM* *Sprengel.*: foliis linearibus longissimis cauleque pubescentibus, pedunculis terminalibus umbellatis.

Hab. — — ♂. 4. D. *intr.* 1818.

CLASSIS XI.

ICOSANDRIA.

MONOGYNYIA.

583. METROSIDEROS.

6. *M. LOPHANTHA*: foliis sparsis lanceolatis utrinque attenuatis mucronatis, floribus terminalibus dense spicatis pubescentibus. *Kent. Cels.*

Hab. in Nova Hollandia. 5. T. *intr.* 1817.

7. M. SCARIOSA: foliis sparsis lanceolatis margine scabris, ramulis pubescentibus.

Hab. — — H. T. missa 1818 a celeb. *Wendlandio* sub hoc nomine.

586. EUCALYPTUS.

2. E. OBLIQUA: operculo hemisphaerico mucronulato, umbellis lateralibus solitariis, pedunculis ramulisque teretibus. *Smith. act. Lin.*

Hab. in Ins. Van. Diemen. H. T. intr. 1818.

588. INGA.

2. (ante 1). I. ALBA: inermis, foliis trijugis: foliolis oblongis acuminatis æquivalibus glabris, glandula inter omnia paria, petiolo alato, spicis ovatis. *W. Sp.*

Hab. in Ind. occid. H. C. intr. 1818.

589. MIMOSA.

3. (ante 1). M. SENSITIVA: caule petiolisqve aculeatis, foliis conjugato-pinnatis: foliolis subdimidiato-ovatis acutis subitus pilosis: intimis minimis. *W. Sp.*

Hab. in Brasilia. H. C. intr. 1818.

4. (post 2). M. RUBICAULIS: aculeata, foliis bipinnatis: partialibus quinquejugis: propriis subduodecimjugis, panicula terminali. *W. Sp.*

Hab. in Ind. orient. H. C. intr. 1818.

592 b. CANELLA.

Cal. 3-lobus. *Pet.* 5. *Anther.* 16 adnatæ. *Nectarium* urceolatum. *Bacca* unilocularis 2-4-sperma.

1. C. ALBA. *Swartz.* in *Act. Lin.*

Hab. in Amer. calid. H. C. intr. 1818.

592 c. ARISTOTELIA.

Cal. 5-phyllo. *Petala* 5. *Stylus* trifidus. *Bacca* trilocularis. *Semina* bina.

12. A. MACQVI. *L'Herit. Stirp.*
Hab. in Chili. H. T. intr. 1818.

POLYGYNIA.

609. ROSA.
23. R. RUBIGINOSA $\beta.$ muscosa.
Hab. in Europ. in hortis culta. H. D. intr. 1818.
40. (30-31). R. MULTIFLORA: fructibus ovatis pedunculisqve inermibus villosis, caule petiololisqve aculeatis. *Thunb. jap.*
Hab. in China. H. D. F. intr. 1818.

612. POTENTILLA.

- 2.** P. MULTIFIDA $\gamma.$ davarica.

Hab. in Davuria. 4. D. intr. 1817.

CLASSIS XII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

629. TRIUMFETTA.

- 2.** T. TRilocularis *Roxb.*: floribus completis, foliis subrotundo-ovatis trilobatis serratis, superioribus ovato-lanceolatis, capsulis trilocularibus.
Hab. in Ind. orient. H. C. intr. 1818.

TRIGYNIA.

650. EUPHORBIA.

- 80.** (5-6). E. ORNITHOPUS: inermis tuberculata, tuberculis folio oblongo caduco instructis, pedunculis

solitaria ternisve unifloris terminalibus, petalis tripartitis. *W. E.*

Hab. ad Cap. b. sp. *h.* T. *intr.* 1818.

81. (33-34). *E. CLAREOSA*: umbella qvinquifida bifida, foliis spathulato-lanceolatis mucronatis coriaceis serrulatis, involucris ovatis, involucellis reniformibus, calycinis segmentis subemarginatis, capsulis glabris. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Tauria et Caucaso *4.* F. *intr.* 1818.

82. (51-52). *E. PROCERA*: umbella qvinquifida trifida dichotoma, foliis lanceolatis hirsutis apice serrulatis involucris latioribus involucellisqve ovalibus glabris, capsulis glabris. *Bieb. Cauc.*

Hab. ad Fluv. Terek. *4.* D. *intr.* 1818.

POLYGYNIA.

662. MAGNOLIA.

4. (2-3). *M. PUMILA*: floribus globosis hexapetalis nuntantibus, foliis ellipticis utrinque acuminatis undulatis. *Ait. Kew. Ed. 2.*

Hab. in China. *h. C. intr.* 1818.

662 b. UVARIA.

Cal. 5-phyllo. *Pet.* 6. *Baccæ numerosæ, pendulae, 4 spermæ.*

1. *U. GRANDIFLORA Roxb.*: foliis ellipticis acutis subtus lævibus, pedunculis unifloris bracteatis.

Hab. in Sumatra. *h. C. intr.* 1818.

663. ANNONA.

5. (1-2). *A. SQUAMOSA*: foliis oblongis acutis glabris, fructibus obtuse squamosis, petalis exterioribus lanceolatis, interioribus minutis. *Ait. Kew.*

Hab. in Amer. austr. *h. G. intr.* 1818.

6. (3-4). *A. PALUSTRIS*: foliis oblongis obtusinsculis glabris, fructibus areolatis, petalis exterioribus majoribus subrotundis. *W. Sp.*

Hab. in Amer. *h. C. intr.* 1818.

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

678. TEUCRIUM.

27. (17-18). *T. COMPACTUM*: foliis cuneato-ovatis inciso-serratis hirtis, floralibus petiolatis lanceolatis ciliatis, floribus spicatis. *Lagase. nov. gen.* (8-8)

Hab. in Granat. regno. *h. T. intr.* 1818.

684. SIDERITIS.

14. (post 12). *S. SPINOSA*: hirsuta, foliis lanceolatis bracteisque cordatis dentato-spinosis. *V. S.*

Hab. in Hispania. *h. T. intr.* 1818.

689. HYPTIS.

3. *H. NEPETOIDES Fisch.*: floralibus spicato-racemosis: pedunculis corymbosis; foliis ovato-oblongis inaequilater obtuse serratis.

Hab. — — 4. ♂. *C. intr.* 1818.

695. STACHYS.

25. (21-3). *S. POLYSTACHYA*: viridi-tomentosa, verticillatis multifloris, foliis radicalibus ovalibus basi cordatis, caulinisque cordato-ovatis inaequaliter crena-

tis, floralibus lanceolatis serratis, verticillis subspicatis, caule ramoso. *Tenore Prodr. fl. Neap.*

Hab. prope Neapolin. 24. T. intr. 1818.

26. (3-4). *S. PUBESCENS*: verticillis 6-floris subspicatis, foliis ovato-lanceolatis acutis basi attenuatis dentatis 5-nerviis pubescentibus, caule decumbente, calycibus lanatis inermibus. *Tenore l. c.*

Hab. in Lucania. 24. T. intr. 1818.

697. MARRUBIUM.

17. (post 6). *M. CATARIAEFOLIUM*: foliis ovatis crenatis subtus tomentosis imis reniformi-cordatis, bracteis subulatis calycibus tubum æquantibus, dentibus calycinis patentibus nudis. *Bieb. Cauc. I ni. AdH.*

Hab. ad Tiflin. 24. F. intr. 1818.

706. THYMUS.

17. (4-5). *T. NUMMULARIUS*: floribus verticillato-capitatis, caulis filiformibus repentinibus pilosis, foliis planis subrotundis nervosis pilosiusculis basi ciliatis. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Caucaso. 24. T. intr. 1818.

10. (8-9). *T. BRAUNIANUS*: tota pubescens, foliis subrotundo-cordatis in petiolum decurrentibus serratis, pedunculis axillaribus bifidis multifloris.

*Hab. in Austr. austr.? 24. D. intr. 1818 ex horto Monach. sub nomine *Melissæ Braunianæ*.*

715. SCUTELLARIA.

11. (4-5). *S. MINOR*: foliis cordato-ovatis subintegerrimis, floribus axillaribus. *Lin.*

Hab. in paludib. Europ. mediae. 24. D. intr. 1818.

ANGIOSPERMIA.

740. DIGITALIS.

12. (8-11). *D. OBSCURA*: foliis linear-lanceolatis integrerimis glabris basi adnatis. *Lin.*

Hab. in Hispan. 24. D. intr. 1818.

742 b. CRESCENTIA.

Cal. 2-partitus, æqvalis. *Cor.* gibba. *Bacca* pedicellata, 1-locularis, polysperma. *Sem.* nidulanta.

x. C. CUJETE: foliis cuneato-lanceolatis confertis. *Swartz.*
obs.

Hab. in Antillis. *h. C. intr.* 1818.

744. LANTANA.

g. (5-8). INVOLUCRATA: foliis oppositis ternisqve rhombo-ovatis obtusis rugosis tomentosis, caule inermi, capitulis squarrosis, bracteis ovatis. *Ait. Kew.*
Hab. in Ind. occid. *h. C. intr.* 1818.

746. CAPRARIA.

3. (1-2). *C. UNDULATA:* foliis oppositis ovato-oblongis integerrimis undulatis, supremis subcordatis verticillatis, racemis spiciformibus. *Ait. Kew.*
Hab. ad Cap. b. sp. *h. T. intr.* 1818.

758. RUELLIA.

10. (4-5). *R. OBOVATA Roxb.:* foliis obovatis obtusis in petiolum decurrentibus, floribus axillaribus sessilibus.

Hab. in Chitagong Ind. orient. *4. C. intr.* 1818.

762. CLERODENDRON.

3. C. INERME: foliis ovatis ovalibusve integerrimis calycibusqve (5-dentatis) glabris, corymbis axillaribus, corollæ tubo limbū aliquoties superante. *Ait. Kew. Ed. 2.*

Hab. in Ind. orient. *h. C. intr.* 1818.

763. THUNBERGIA.

2. (ante 1). *T. CAPEESIS:* foliis subsessilibus ovatis, caule decumbente. *Thunb. prodr.*

Hab. ad Cap. b. sp. *4. T. intr.* 1818.

766. ACANTHUS.

3. (1-2). *A. CARDUIFOLIUS*: foliis dentato-sinuatis spinosis, spica radicali. *Lin.*

Hab. ad Cap. b. sp. 4. T. intr. 1818.

CLASSIS XIV.

T E T R A D Y N A M I A.

SILICULOSA.

791. BISCUTELLA.

12. (3-13). *B. MARGINATA*: siliculis undique scabris margine fuscis, caule subnudo, foliis lyratis: lobis obtusis, impari maximo subrotundo, bidentatis pilosis. *Tenor. prodr. fl. neap.*

Hab. in marit. Ins. Capri. ○? D. intr. 1818.

13. (12-4). *B. MARITIMA*: siliculis laevibus margine ciliatis concoloribus, caule subnudo, foliis lyratis: lobis obtusis, impari maximo elliptico, grosse bidentatis pilosis. *Ten. l. c.*

Hab. in Apulia et Lucania. ○? F. D. intr. 1818.

792. LEPIDIUM.

13. (12-2). *L. ALPINUM*: foliis pinnatis integerrimis glabris, caule florifero nudo adscendente, petalis calyce majoribus, siliculis lanceolatis mucronatis. *W. Sp.*

Hab. in alpib. Eur. mediae. ○. D. intr. 1818.

795. IBERIS.

13. (11-2). *I. GIBRALTARICA*: frutescens, foliis cuneiforibus obtusis apice dentatis glabris. *W. Sp.*

Hab. ad Gibraltariam. h. F. intr. 1818.

SILIQVOSA:

797. CARDAMINE.

- II. (ante 1). *C. BELLIDIFOLIA*: foliis simplicibus subrotundis-ovatis integerrimis, petiolis longissimis, canale florifero foliorum longitudine. *W. Sp.*
Hab. in alpib. Eur. 24. D. *intr.* 1818.

798. SISYMBRIUM.

798. SISYMBRIUM. T H I T

39. (11-12). S. TILLIERI: caule subnudo paniculato,
foliis glabris, radicalibus runcinato-sublyratis, cau-
linis basi pinnatifidis. *W. Sp.*
Hab. in alpib. Italiae. ♂. D. *intr.* 1848.

Hab. in alpib. Italiæ. ♂. D. *intr.* 1818.

40. (21-22). S. FUGAX: glabrum laxe, foliis lyratis: lobis lateralibus terminalibusque oblongo-lanceolatis acutis, siliquis filiformibus tandem contortis.
Lagasc. gen. nov.

Hab. in Hispania. 24. F. intr. 1818.

800. CHEIRANTHUS.

30. (9-10). C. STRICTUS: foliis linearibus acutis glabris,
id excaule fruticoso erecto. Lin. ⁱⁿ etrido ad
Hab. ad Cap. b. sp. h. T. intr. 1818.

Hab. ad Cap. b. sp. h. T. intr. 1818

893. ARABIS.

- I. A. ALPINA β . *diffusa*.**

Hab. in Alpibus. 24. D. intr. 1818.

217591

pro multisque foliis brevibus, brevibus

CLASSIS XV.

MONADELPHIA.

TRIANDRIA.

812. SISYRINCHIUM.

7. (2-3). *S. MICRANTHUM*: scapo auncipi ramoso folioso, spatha subtriiflora inaequali, petalis linearibus acuminatis, foliis gramineis canaliculatis. *W. Sp.*

Hab. in Peru. 4. T. intr. 1818.

813. FERRARIA.

3. *E. TRICUSPIS* *B. purpureo-violacea*.

Hab. ad Cap. b. sp. 4. T. intr. 1818.

PENTANDRIA.

817. PASSIFLORA.

13. (3-4). *P. MURUCUJA*: foliis bilobis obtusis emarginatis, petiolis eglantulosis, corona campanulata truncata integerrima. *W. Sp.*

Hab. in Antillis H. C. intr. 1818.

14. (9-10). *P. CILIATA*: foliis trilobis cordatis glabris, ciliato-serratis, involucris multifido-capillaribus. *W. Sp.*

Hab. in Antillis H. C. intr. 1818.

HEPTANDRIA.

819. PELARGONIUM.

72. (ante 70). *P. CONCAVIFOLIUM*: subacante, umbellis simplicibus, foliis ovali-oblongis integerrimis gla-

bris margine ciliatis, floribus pentandris, petalis retusis. *Pers. Syn.*

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1818.

73. (72-70). *P. ASTRAGALIFOLIUM*: acaule, umbella sub-composita, foliis pinnatis: foliolis ovatis utrinque hirsutis, petalis undulatis basi tortis. *Jacq. ic.*

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1818.

74. (1-2). *P. PULCHELLUM*: subacaule pilosum, scapo diviso, foliis oblongis lobato-pinnatis, petiolis alatis. *Curt. Mag.*

Hab. ad Cap. b. sp. 24. T. intr. 1818.

75. (22-23). *P. STENOPETALUM*: pedunculis multifloris, foliis subrotundis obsolete lobatis crenatis zonatis, petalis linearibus, laciniis calycis angustioribus.

W. Sp.

Hab. ad Cap. b. sp. 5. T. intr. 1818.

76. (34-35). *P. BEAUFORTIANUM*: pedunculis multifloris, foliis quinquelobis dentato-mucronatis basi truncatis, floralibus cuneatis. *Pers. Syn.*

Hab. ad Cap. b. sp. 5. T. intr. 1818.

77. (48-78). *P. CYNOSBATIFOLIUM*: pedunculis subbifloris, foliis cordatis trilobis dentatis pilosis: lobo intermedio trilobo, floribus pentandris. *Willd. h. ber.*

Hab. ad Cap. b. sp. 5. T. intr. 1818.

78. (77-49). *P. DELPHINIFOLIUM*: umbellis paucifloris sub-compositis, foliis scabris quinquelobo-palmatis: lobis oblongis serratis, intermedio trilobo. *W.E.*

Hab. ad Cap. b. sp. 5. T. intr. 1818.

79. (62-63). *P. LAEVIGATUM*: pedunculis subbifloris, foliis ternatis glaucis glabris: foliolis trifidis cuneatis: laciniis linear-lanceolatis. *W. Sp.*

Hab. ad Cap. b. sp. 5. T. intr. 1818.

80. (post 67). *P. FERULACEUM*: umbellis multifloris, foliis pinnatis: foliolis inciso-dentatis undulatis, petalis longitudine calycis, caule crasso carnoso. *W. Sp.*

Hab. ad Cap. b. sp. 5. T. intr. 1818.

81. (post 80). *P. TENUIFOLIUM*: umbellis multifloris, foliis decompositis pinnatis multifidis linearibus hirsutis, caule carnoso, ramis floriferis gracilibus.
Ait. Kew.

Hab. ad Cap. b. sp. h. T. intr. 1818.

DECANDRIA.

821. HELICTERIS.

2. (ante 1). *H. JAMAICENSIS*: foliis cordatis inæqualiter serratis pubescentibus subtus tomentosis, fructu contorto. *Lam Enc.*

Hab. in Antillis. h. C. intr. 1818.

POLYANDRIA.

831. MALVA.

40. (23-24). *M. MORENI*: caule erecto, foliis subrotundo-cordatis quinquelobis crenatis subtus incanis, calycibus tomentosis. *Pollini horti et prov. veron. pl. nov.*

Hab. in Monte Baldo. 24. F. intr. 1818.

839. HIBISCUS.

25. (7-8). *H. MACROPHYLLUS Roxb.*: foliis subrotundo-cordatis cuspidatis utrinque tomentosis, floribus paniculatis, calycibus pedunculis petiolisque sericeo-lanatis.

Hab. in Ind. orient. ad Chittagong. 24. C. intr. 1818.

26. (11-12). *H. SABDARIFFA*: foliis dentatis, inferioribus ovatis indivisis, superioribus trilobis basi cuneatis, calyce exteriore subduodecimdentato, caule inerme, floribus subsessilibus. *W. Sp.*

Hab. in Indiis. 24. C. intr. 1818.

27. (17-18). *H. LONGIFOLIUS*: foliis quinque-vel tripartito-palmatis: lobis lanceolatis inciso-dentatis, pe-

150 MONADELPHIA POLYANDRIA.

tiolis flore longioribus, calycibus exterioribus sub-decaphyllis deciduis, interioribus longitudinaliter rumpentibus. *W. Sp.*

Hab. in Ind. orient. *○. C. intr.* 1818.

28. (19-20). *H. TRICUSPIS*: foliis incanis trilobis: lobis lanceolatis subdentatis, pedunculis axillaribus sub-bifloris, terminalibus subracemosis, calyce extiore novemdentato. *W. Sp.*

Hab. in Insulis societ. *ḥ. G. intr.* 1818.

CLASSIS XVI.

DIADELPHIA.

OCTANDRIA.

844. POLYGALA.

2. *P. BRACTEOLATA*: floribus cristatis, racemis terminalibus, alis calycinis cuspidatis multinerviis, caule erecto fruticoso, foliis linear-lanceolatis glabris. *W. Sp.*

Hab. ad Cap. b. sp. 4. *T. intr.* 1818.

3. *P. MYRTIFOLIA*: floribus cristatis, racemis paucifloris terminalibus, carina falcata, caule fruticoso, foliis oblongis obtusiusculis glabris. *W. Sp.*

Hab. ad Cap. b. sp. 4. *T. intr.* 1818.

DECANDRIA.

844 b. DALBERGIA.

- Cal.* obsolete 5-dentatus. *Legumen* foliacum planum non dehiscens. *Sem.* solitaria vel bina.

I. D. SCANDENS: foliis pinnatis 6-jugis: foliolis ellipticis obtusis, floribus racemosis, leguminibus linearibus.

Hab. in Ind. orient. *h. C. missa* a celeb. *Wallichio* praefecto horti Calcuttensis sub hoc nomine.

850. GENISTA.

II. (6-7). G. MANTICA: caule prostrato, ramis angulato-striatis pubescentibus, foliis lanceolatis hirsutis, pedunculis axillaribus folio brevioribus, corollis glabris, leguminibus villoso-sericeis. *Spr. Pug. 2.*

Hab. in sylva mantica Italiae. *h. F. intr.* 1818.

853. CROTALARIA.

II. (1-2). C. TENUIFOLIA Roxb.: foliis linear-lanceolatis obtusis pubescentibus subsessilibus, racemis terminalibus axillaribusque.

Hab. in Coromandelia. *2. C. intr.* 1818.

II. (5-6). C. STYRACIFOLIA: foliis lato-ovatis subsessilibus utrinque pubescentibus incanis, stipulis sublato-setaceis.

Hab. ad Cap. b. sp.? *h. T. missa* 1818. ab illustr. Schradero sub hoc nomine. Florentem non vidi.

854. ONONIS.

II. (15-16). O. HISPANICA: pedunculis aristatis subuni-floris, foliis omnibus ternatis canaliculatis recurvatis totaliter serratis. *Lin.*

Hab. in Hispania. *h. F. intr.* 1818.

859. DOLICHOS.

II. (5-6). D. ROTUNDIFOLIUS: volubilis, leguminibus racemosis compressis pilosiusculis ensiformibus, foliolis ovali-subrotundis glabris. *V. S.*

Hab. in Indiis. *h. C. intr.* 1818.

870. CYTISUS.

16. (14-15). *C. PAUCIFLORUS*: pedunculis subquadriifloris terminalibus, foliolis obovatis subtus pubescentibus, calycibus profunde tripartitis. *W. Sp.*
Hab. in Persia boreal. *H. F. intr.* 1818.

884. HEDYSARUM

35. (2-3) *GRAMINEUM*: foliis simplicibus linear-lanceolatis, stipulis scariosis, racemis nudis: pedicellis bifloris, dentibus calycum barbatis. *Retz. Obs.*
Hab. in Ind. orient. *H. C. intr.* 1818.
36. (3-4). *H. LATIFOLIUM Roxburghi*: foliis lato-ovatis margine undulatis, lomentis articulatis æqualibus, stipulis subulatis.
Hab. in Ind. orient. *H. C. intr.* 1818.
37. (14-15) *H. TUBEROSUM*: foliis ternatis ovatis acutis, racemo terminali longissimo, lomentis repandis villosis. *W. Sp.*
Hab. in Ind. orient. *H. C. intr.* 1818.
38. (15-16). *H. UNCIUM*: foliis ternatis ovatis villosis, caule frutescente scandente, racemis terminalibus. *W. Sp.*
Hab. in Caracas. *H. C. intr.* 1818.
39. (22-23). *H. TAURICUM*: caulescens, foliis pinnatis incanis: foliolis elliptico-lanceolatis, racemis axillaribus folio longioribus, vexillo alis duplo longiore carina breviore, lomenti penduli articulis incanis reticulatis. *Bieb. Cauc.*
Hab. in Tauria *H. F. intr.* 1818.
40. (post 30). *H. CRINITUM*: foliis pinnatis, racemis longis, leguminibus inflexis, caule fruticoso. *Linn.*
Hab. in Ind. orient. *H. C. intr.* 1818.

886. INDIGOFERA.

9. (4-5). *I. ATROPURPUREA Buchanan*: foliis pinnatis undenis: foliolis ovato-ellipticis margine subundula-

tis, spicis axillaribus inferioribus fere longitudine foliorum.

Hab. in Napaul. 3. C. intr. 1818.

888. ASTRAGALUS.

44. (4-5). *A. MELILOTOIDES*: caulescens erectus paniculatus, foliis bi-trijugisve: foliolis linearis cuneatis retusis glabris, racemis filiformibus, leguminibus ovatis rugosis didymis. *W. Sp.*

Hab. in Sibiria 4. D. intr. 1818.

45. (32-33). *A. UTRIGER*: acaulis, foliolis oblongis acutis pilosis, scapis racemosis paucifloris folio duplo brevioribus, leguminibus ellipticis inflatis acuminate pubescentibus. *W. Sp.*

Hab. in montib. Uralens. et in Tauria. 4. D. intr. 1818.

891. PSORALEA.

9. (3-4). *P. APHYLLA*: foliis caulinis rameisque ternatis et simplicibus, ramulorum nullis, stipulis subimbricatis. *Jacq. H. Schönbr.*

Hab. ad Cap. b. sp. 3. T. intr. 1818.

893. TRIFOLIUM.

63. (62-40). *T. RIGIDUM*: spicis ovalibus subsessilibus foliosis, calycinis dentibus rigidis mucronatis, foliolis linearis-cuneatis. *Sav. fl. pis.*

Hab. prope Pisam. 4. D. intr. 1818.

894. LOTUS.

24. (17-18). *L. PROSTRATUS*: caule procumbente ramosissimo, foliis glabris, pedunculis multifloris, leguminibus compressis torulosis patentibus. *Desf. Atl.*

Hab. ad Algeriam. 4. F. intr. 1818.

CLASSIS XVII.

POLYADELPHIA.

ICOSANDRIA.

901. MELALEUCA.

5. M. DENSA: foliis ternis obovatis trinervibus glabris, spicis oblongis ovalibusve. *Ait. Kew. Ed. 2.*
Hab. ad Cap. b. sp. 5. T. intr. 1818.
-

CLASSIS XVIII.

SYNGENESIA.

ÆQVALIS.

908. TRAGOPOGON.

12. (2-3). T. CANUS: calycibus octophyllis radium corollæ subæquantibus, pedunculisqve tomentosis, foliis linearibus strictis. *W. Sp.*

Hab. in Hungaria ♂. D. intr. 1817.

912. LEONTODON.

7. (2-3). L. PALUSTRE: spvamis calycinis exterioribus brevioribus erectis ovatis, foliis sinuatis dentatis glabriusculis. *Smith. brit.*

Hab. in German, Engl. et in Ins. Færœens. 2. D. intr. 1818.

915. PICRIS.

4. (post 2). P. PAUCIFLORA: caule erecto hirto, foliis lanceolatis sessilibus denticulatis, pedunculis elongatis incrassatis, calyce hirto. *Decand. fl. fr.*
Hab. in Gall. austr. 24? D. *intr.* 1818. — An ab *Hier. pappoleuco* diversa?

5. (1-3). P. DAVURICA *Fisch.*: caule erecto hispido, foliis linear-lanceolatis subdenticulatis hispidis, calyce exteriore laxo.
Hab. in Imper. Ruthen. ♂. D. *intr.* 1818.

917. HIERACIUM.

73. (27-28). H. CRASSIFOLIUM *Bernhardi*: caule erecto corymboso-paniculato, foliis linear-lanceolatis denticulatis glabris.
Hab. — — 24. D. *intr.* 1817. Differt ab *H. saxatile* caule foliosiore, dentibus foliorum minoribus et denique ramificatione.

74. (29-30). H. LONGIFOLIUM: caule erecto ramoso, foliis lanceolatis calycibusque lanatis, radicalibus basi elongatis.

Hab. — — 24. D. *intr.* 1817. ex hort. Berolin. sub hoc nomine.

918. CREPIS.

27. (20-21). C. VIRENS: foliis glabris, inferioribus remote dentatis, superioribus subintegerrimis subsagittatis, caule basi ramoso diffuso, calycibus pubescentibus. *W. Sp.*

Hab. in Helvet., Gallia, Italia. ♂. D. *intr.* 1817.

925 b. KRIGIA.

- Recept.* nudum. *Cal.* polyphyllus simplex. *Papp.* membranaceus 5-phyllus cum setis 5-intermixtis alternis.

- i. R. VIRGINICA *W. Sp.*

Hab. in Virginia, Pensylvan. ♂. F. *intr.* 1818.

937. SERRATULA.

- II. (1-2). *S. ARGUTA* *Fisch.*: foliis radicalibus ovatis obtusis argute serratis basi subbipinnatifidis, caulinis inferioribus pinnatifidis superioribus laciniatis.
Hab. in Ucrania 4. D. *intr.* 1818. — *Nimium affinis S. tinctoriae.*

938. CARDUUS.

25. (5-6). *C. MONTOSUS*: foliis decurrentibus oblongis sinuato-dentatis spinosis glabris subtus glaucis, pedunculis elongatis unifloris lanuginosus, squamis calycinis rectis patentibus. *Pollini Pl. nov.*
Hab. in montib. veronens. 4. D. *intr.* 1818.

26. (12-13). *C. ALBIDUS*: foliis decurrentibus runcinatis spinosis villosis subtus tomentosis; pedunculis ramosis subnudis tomentosis, calycibus aggregatis oblongis: squamis erectis omnibus spinoso-acuminatis. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Tauria et ad Caucas. ①. D. *intr.* 1818.

940. CNICUS.

44. (1-2). *C. ULIGINOSUS*: foliis semidecurrentibus oblongis sinuatibus dentatis margine spinosis subtus incanis, floribus corymbosis approximatis, squamis calycinis ovato-lanceolatis mucronatis adpressis. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Tauria. 4. D. *intr.* 1818.

45. (5-6). *C. STRICTUS*: foliis semidecurrentibus lanceolatis sinuatibus: lobis bifidis spinosis subvillosis, floribus terminalibus glomeratis sessilibus, calycinis squamis patulis lanceolatis subulato-spinosis. *Poll. l. c.*

Hab. in montosis Vesuvii. 4. D. *intr.* 1818.

46. (10-44). *C. HELENOIDES*: foliis subcordatis amplexicaulinibus lanceolatis ciliatis subtus tomentosis, inferioribus subincisis, floribus aggregatis, calycinis squamis lanceolatis adpressis mucronatis. *W. Sp.*

Hab. in Sibir. 4. D. *intr.* 1818.

47. (29-30). *C. SPINOSISSIMUS*: foliis amplexicaulibus pin-natifidis dentatis lanatis, calyce cylindrico terminali, squamis adpressis oblongis cartilagineo-mucronatis, mucronibus patulis. *W. Sp.*

Hab. in Hispania. *O. D. intr.* 1818.

956. EUPATORIUM.

12. (3-4). *E. TRIFOLIATUM*: foliis petiolatis ternis quater-nisve ovatis utrinque attenuatis serratis scabriuscum-lis. *W. Sp.*

Hab. in Virginia. *4. D. intr.* 1818.

13. (post 11). *E. ODORATUM*: foliis petiolatis trianguli-ovatis serratis apice integerrimis subtus pubescentibus, corymbis divaricatis terminalibus sessilibus. *W. Sp.*

Hab. in Antillis. *h. C. intr.* 1818.

8181 SUPERFLUA.

972. GNAPHALIUM.

28. (ante 1). *G. ERICOIDES*: fruticosum argyrocomum, foliis sessilibus linearibus, calycinis exterioribus rudibus, interioribus incarnatis. *Lin.*

Hab. ad Cap. b. sp. *h. T. intr.* 1818.

29. (1-2). *G. DASYANTHUM*: fruticosum, foliis lanceolatis acutis basi trinerviis undulatis pilosis, subtus tomentosis, corymbo coarctato bracteato terminati. *W. E.*

Hab. ad Cap. b. sp. *h. T. intr.* 1818.

30. (27-8). *G. CYMOSUM*: herbaceum, foliis lanceolatis trinerviis supra glabris, racemo terminali, caule inferne ramoso. *Lin.*

Hab. ad Cap. b. sp. *4. T. intr.* 1818.

974. ELICHRYSUM.

3. *E. SESAMOIDES*: fruticosum erectum, foliis acerosis linearibus carinatis glabris adpressis, ramis unifloris, floribus sessilibus. *W. Sp.*

Hab. ad Cap. b. sp. *h. T. intr.* 1818.

980. TUSSILAGO.

7. (post 5). *T. SPURIA*: thyrso oblongo, floribus discoideis, foliis oblongo-cordatis inæqualiter denticulatis, subtus dense niveo-tomentosis: lobis divaricatis bilobis. *W. Sp.*

Hab. in German., Bornholmia, Svecia. 4. D. intr. 1818.

981. SENECIO.

35. (ante 1). *S. RECLINATUS*: corollis nudis, calycibus ventricosis subimbricatis, foliis filiformi-linearibus integerrimis glabris. *Ait. Kew.*

Hab. ad Cap. b. sp. 5. T. intr. 1818.

982. ASTER.

55. (ante 1). *A. TOMENTOSUS*: fruticosus, foliis ovatis serratis patentibus subtus tomentosis, floribus terminalibus subternis. *W. Sp.*

Hab. in Nov. Holland. 5. T. intr. 1818.

54. (27-28). *A. PRAECOX*: foliis oblongo-lanceolatis serratis basi angustatis, caule hirsuto, calycibus imbricato-subæqualibus, squamis exterioribus subpatulis. *W. Suppl.*

Hab. — — 4. D. intr. 1818.

985. CINERARIA.

14. (8-9). *C. LANATA*: pedunculis unifloris, foliis cordato-subrotundis septangulis subtus lanuginosis. *L'Her. sert. angl.*

Hab. in Canariis. 5. T. intr. 1818.

15. (14-9). *C. LINIFOLIA*: pedunculis unifloris axillariis, foliis linearis-subulatis glabris, caule fruticoso. *W. Sp.*

Hab. ad Cap. b. sp. 5. T. intr. 1818.

990. DORONICUM.

6. (5-5). *D. ORIENTALE*: glabrum, foliis radicalibus cordatis profunde dentatis, caulinis oblongis ampli-xicaulibus, caule subunifloro. *W. E.*

Hab. in Caucaso. 4. D. intr. 1818.

1006 b. LIDBECKIA.

Recept. nudum. Papp. o. Sem. angulata, articulo styli infimo persistente. Cor. radii plurimæ. Cal. multipartitus.

1. *L. PECTINATA*: foliis pinnatifidis subtus glaucis. *Thunb. prodr.*

Hab. ad Cap. b. sp. ♂. T. intr. 1818.

FRUSTRANEA.

1026. GORTERIA.

2. *G. PAVONIA*: foliis pinnatifidis supra pilosis subtus tomentosis: laciinis ovali-lanceolatis, scapo unifloro, caule decumbente. *Ait. Kew. Ed. 2 sub Gazania.*

Hab. ad Cap. b. sp. ♂. T. intr. 1818.

1029. CENTAUREA.

83. (post 28). *C. STOEPE*: calycibus ciliatis oblongis, foliis pinnatifidis linearibus integerrimis. *Lin.*

Hab. in Austria? 24. D. *intr. 1818.*

84. (37-38). *C. NITENS*: calycibus scariosis integris mucronatis, foliis scaberrimis pinnatis: pinnis linearibus integerrimis margine revolutis mucrone capillari. *Bieb. Cauc.*

Hab. in Caucaso et Iberia. ⊖. D. *intr. 1818.*

82. (72-73). *C. FORARDI*: calycibus ovatis setaceo-spicatos glabris, foliis lanceolato-linearibus sinuato-runcinatis: lobo terminali lanceolato serrato, caulis prostratis.

Hab. in Italia? 24. D. *intr. ex horto Pisano sub hoc nomine.*

NECESSARIA.

1038. OSTEOSPERMUM.

3. (ante 1). *O. SPINOSUM*: foliis obovatis serratis pubescentibus, spinis ramosis. *W. Sp.*

160 SYNGENESIA NECESSARIA.

Hab. ad Cap. b. sp. h. T. intr. 1818.

4. (3-1). O. PISIFERUM: foliis lanceolatis mucronatis sub-petiolatis glabris serratis, ramulis denticulato-angulatis. *Lin.*

Hab. ad Cap. b. sp. h. T. intr. 1818.

1039. OTHONNA.

5. (2-3). O. ATHANASIAE: foliis pinnatis filiformibus, calyce hemisphaerico multidentato. *Jacq. v. h. Schönbr.*
Hab. ad Cap. b. sp. h. T. intr. 1818.

6. (post 3). O. DENTICULATA: foliis oblongis denticulatis glabris basi attenuatis amplexicaulibus, floribus paniculatis. *Ait. Kew.*

Hab. ad Cap. b. sp. h. T. intr. 1818.

CLASSIS XIX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

1039 b. STYLEDIUM.

Cal. bilabiatus. *Cor.* irregularis 5-fida: lacinia quinta dissimili. *Columna* reclinata, dupli flexura. *Antheræ* bilobæ: lobis divaricatissimis. *Caps.* 2-locularis.

1. S. FRUTICOSUM: foliis angusto-linearibus decurrentibus glabris, fauce semicoronata, labello appendiculato. *Ait. Kew. Ed 2.*

Hab. in Nov. Holl. h. T. intr. 1818.

G. (post A) B. STATINATA: quinquecusses erectas foliis ovato
triangulis serratis acuminatis, capsulae alis obtusangulis:
Hab. in China. 2. C. intr. 1818 ex portio Benthonii sup.

CLASSIS XX.**MONOECIA.****MONANDRIA.****CASUARINA.**

1066. **CASUARINA.**
4. (ante 1). **C. MURICATA** Roxb.: ramulellis erectis tere-
tibus 5-sulcatis, strobilorum squamis submuricatis.
Hab. in Chitagong Ind. orient. 5. C. intr. 1818.
5. (1-2). **C. NODIFLORA**: monoica, ramulellis erectis te-
tragonis, strobilorum squamis inermibus glabris,
vaginis masculis quadridifidis glabris. *W. Sp.*
Hab. in Insul. mar. pacif. 5. C. intr. 1818.

TETRANDRIA.**CICCA.**

- MASCULI: *Cal.* 4-phyllo. *Cor.* o.
FEMINEI: *Cal.* 4-phyllo. *Cor.* o. *Styl.* 4. *Caps.*
4-cocca, non dehiscens, subcarnosa.
1. **C. DISTICHA**: foliis pinnatis: foliolis oblongis, race-
mis lateralibus. *W. Sp.*
Hab. in Ind. orient. 5. C. intr. 1818.

POLYANDRIA.**BEGONIA.**

7. (2-3). **B. DISCOLOR**: caulescens, foliis inæqualiter
cordatis serratis acuminatis, capsulae alis obtusangulis:
una majore. *Ait. Kew. Ed. 2.*
Hab. in China. 2. C. intr. 1818.

6. (post 4). B. SPATHULATA: caulescens erecta, foliis ovatis obtusissimis basi tenuissime serrulatis, stipulis oblongis maximis, capsulae ala maxima acutangula, reliquis minoribus æquivalentibus.

Hab. — — 24. C. intr. 1818. ex horto Berolin. sub hoc nomine.

MONADELPHIA.

1118. CROTON.

7. (3-4). C. PUNGENS: foliis cordatis acuminatis serrulatis, supra scabris subtus tomentosis basi quadriglandulosis. W. Sp.

Hab. ad Caracas. h. C. intr. 1818.

1119. JATRÓPHA.

3. (1-2). I. MULTIFIDA: foliis palmatis undecimlobis laevibus: lobis pinnatifidis cuneatis, stipulis setaceis multifidis. W. Sp.

Hab. in Amer. merid. h. C. intr. 1818.

1120. C. HURA.

MASCULI: *Ament.* imbricatum. *Periant.* truncatum, diphyllum. *Cor.* o. *Filam.* cylindrica, apice peltata cincta. *Anther.* plurimis geminatis.

FEMINEI: *Cal.* cylindricus. *Cor.* o. *Styl.* infundibulif. *Stigma* 12-fidum. *Caps.* 12-locularis. *Sem.* 1.

4. H. CREPITANS. Lin.

Hab. in Amer. calid. h. C. intr. 1818.

1121. BEGONIA.

6. (4). B. DIRECTOR: rotundifolia: foliis cordatis sessiliis subcordatis, ebasitatis alia opaciora

Hab. in China. h. C. intr. 1818.

CLASSIS XXI.
DIOECIA.

X E D N I
POLYANDRIA.

1159. CLIFFORTIA.

2. *C. TRIFOLIATA*: foliis ternatis fasciculatis venosis pilosis, lateralibus lanceolatis integerrimis, intermedio obovato tridentato. *W. Sp.*
Hab. ad Cap. b. sp. h. T. intr. 1818.

CLASSIS XXX

D I O L C I A

I N D E X.
POLYANDRIA

A.

	Pag.	Pag.	
Acacia	52	Anchusa	19, 122
Acalypha	108	Andropogen	10, 116
Acanthus	145	Anemone	61
Achillea	102	Anethum	35
Achras	43	Angelica	33, 128
Achyrophorus	91	Anisomele	63
Aconitum	60	Annona	141
Adianthum	110	Anthemis	101
AEthusa	34	Antholytza	114
Agapanthus	130	Anthoxanthum	113
Agrostis	9, 115	Antirrhinum	68
Aira	10, 116	Apargia	89
Albuca	131	Apium	128
Allium	39, 130	Apocynum	29
Alopecurus	8	Aqvilegia	60
Alyssum	70	Arabis	74, 146
Amaranthus	107	Arctotheca	105
Ammi	32	Arctotis	104
Amomum	III	Arenaria	50
Anagallis	22	Aristea	114

	Pag.		Pag.
Aristotelia	139	Aspidium	110
Armeria	36, 129	Asplenium	110
Artemisia	95	Aster	97, 158
Arundo	9	Astragalus	83, 153
Asclepias	29, 126	Astrantia	31
Asparagus	42	Athamanta	32
Asperula	16	Atriplex	30
Asphodelus	131	Cicuta	
B	46	Cinchona	
Bactryllobium	135	Boehmeria	107
Ballota	65	Brassica	74
Bauhinia	46, 135	Bromus	12, 117
Begonia	108, 162	Bryonia	109
Beta	31	Bucida	136
Betonica	64	Buddleja	18
Betula	108	Euphthalmum	102
Bidens	94	Bupleurum	31
Bignonia	69	Bursera	44
Biscutella	145	Bystropogon	64
C			
Cacalia	94	Cardamine	71, 146
Cactus	51	Carduus	91, 156
Callicarpa	121	Carex	106
Campanula	23, 123	Carlina	94
Canarina	43	Cassia	46, 135
Canella	139	Casuarina	161
Canna	1	Caucalis	31
Ganthua	123	Celastrus	125
Capraria	144	Celosia	28
Capsicum	27	Centaurea	103, 159

INDEX.

	Pag.		Pag.
Cerastium	51, 138	Conchium	120
Chærophylleum	34	Convallaria	131
Cheiranthus	73, 176	Convolvulus	22, 122
Chenopodium	30	Corchorus	57
Chloris	10	Corispermum	1
Chondrilla	88	Cotula	101
Chrysanthemum	100	Cotyledon	50
Cicca	161	Crambe	70
Cicuta	34	Crassula	37
Cinchona	124	Crepis	90, 155
Cineraria	99, 158	Crescentia	144
Cissus	18	Crinum	130
Cistus	56	Crotalaria	79, 151
Clematis	61	Croton	109, 162
Clerodendron	144	Cuminum	33
Cliffortia	163	Cynanchum	126
Cnicus	92, 156	Cyperus	8
Coccoloba	133	Cytisus	152
Commelina	115		

D.

Dactylis	11	Digitaria	8
Dalbergia	150	Dolichos	80, 151
Daucus	32, 127	Doronicum	100, 158
Delphinium	59	Dracæna	42
Dianthus	47, 137	Dracocephalum	66
Digitalis	69, 143		

E.

Echinops	105	Elychrysum	157
Echium	20, 122	Elymus	14
Eleusine	116	Epilobium	44

INDEX.

167

	Pag.		Pag.
<i>Erica</i>	44, 133	<i>Erysimum</i>	73
<i>Erigeron</i>	96	<i>Eucalyptus</i>	139
<i>Erithalis</i>	124	<i>Eupatorium</i>	94, 157
<i>Erodium</i>	76	<i>Euphorbia</i>	58, 140
<i>Ervum</i>	81		
<i>F</i>	82		
<i>Feeodia</i>	5	<i>Fimbristylis</i>	115
<i>Ferraria</i>	147	<i>Flemingia</i>	82
<i>Festuca</i>	12, 117	<i>Fragaria</i>	55
<i>Ficus</i>	7, 115	<i>Fritillaria</i>	41

G.

<i>Galium</i>	17, 120	<i>Gladiolus</i>	6, 113
<i>Gardenia</i>	125	<i>Gnaphalium</i>	96, 157
<i>Garuga</i>	135	<i>Gorteria</i>	159
<i>Genista</i>	79, 151	<i>Gossypium</i>	78
<i>Geum</i>	56	<i>Gypsophila</i>	47, 136

H.

<i>Hæmatoxylon</i>	135	<i>Herniaria</i>	127
<i>Hedera</i>	125	<i>Hesperis</i>	73
<i>Hedypnois</i>	91	<i>Hibiscus</i>	78, 149
<i>Hedysarum</i>	82, 152	<i>Hieracium</i>	89, 155
<i>Helianthemum</i>	57	<i>Holcus</i>	10
<i>Helianthus</i>	103	<i>Holosteum</i>	119
<i>Helicteris</i>	149	<i>Hura</i>	162
<i>Heliotropium</i>	19	<i>Hyacinthus</i>	42
<i>Hemimeris</i>	69	<i>Hyoscyamus</i>	25
<i>Hemerocallis</i>	42	<i>Hypericum</i>	86
<i>Heracleum</i>	32	<i>Hyptis</i>	142

INDEX.

	Pag.		Pag.
		I.	
Jasminum	2, 112	Inula	99
Jatropha	162	Ipomoea	22, 123
Iberis	71, 145	Iris	7, 114
Ilex	121	Juncus	132
Illecebrum	29	Jussieua	46
Indigofera	82, 152	Justicia	3, 112
Inga	139	Ixia	5, 113
Kleinhofia	77	Krigia	155
		K.	
		L.	
Lachenalia	42, 131	Ligusticum	33
Lactuca	88	Lilium	41
Lantana	70, 144	Limonia	136
Lapsana	91	Linaria	67
Laserpitium	128	Linum	37, 129
Laurus	134	Lippia	69
Lavandula	64	Lithospermum	19
Lavatera	78	Lolium	14, 118
Leontodon	88, 154	Lonicera	24
Leonurus	66	Lotus	84, 153
Lepidium	71, 145	Lychnis	51
Lespedeza	81	Lycopsis	20
Lidbeckia	159	Lycopus	4
		M.	
Magnolia	141	Malva	78, 149
Malachra	78	Mangifera	28

INDEX.

169

	Pag.		Pag.
Maranta	I, III	Mesembryanthemum	53
Martynia	68	Mespilus	52
Marrubium	65, 143	Metrosideros	138
Massonia	39	Milium	8
Medicago	85	Mimosa	139
Melaleuca	154	Mollia	28
Melica	116	Mollugo	119
Melilotus	83	Momordica	109
Melissa	66	Monarda	4
Mentha	64	Moræa	7
Menyanthes	21	Myosotis	19

N.

Narcissus	38, 129	Nerium	126
Nauenburgia	105	Nicotiana	26
Nepeta	63		

O.

Oenanthe	34	Ornithogalum	41, 131
Oenothera	44, 133	Ornithopus	81
Ocimum	66	Orobus	80
Olea	112	Osteospermum	159
Onobromia	94	Othonna	105, 160
Ononis	79, 151	Oxalis	50
Onosma	20		

P.

Pæonia	57	Papaver	56
Panax	127	Parietaria	121
Pancratium	129	Paspalus	10
Panicum	116	Passiflora	75, 147

	Pag.		Pag.
Pastinaca	35	Poa	II, III
Pectis	100	Podalyria	45
Pelargonium	76, 147	Polemonium	22
Penicillaria	10	Polygala	150
Peucedanum	127	Polygonum	45
Phaca	83	Portlandia	24
Pharnaceum	128	Potentilla	55, 140
Phlomis	66	Primula	21, 122
Phyllanthus	109	Protea	15, 119
Phylica	125	Prunella	67
Physalis	26	Psoralea	153
Picris	89, 155	Pulmonaria	20
Pimpinella	36	Pulsatilla	61
Pisonia	132	Puschkinia	42
Pitcairnia	38	Pyrethrum	101
Plantago	18, 121	Pyrus	52
Plumieria	126		

Q.

Quassia	135
---------	-----

R.

Ranunculus	62	Rosa	55, 140
Raphanus	75	Rottböllia	118
Rauwolfia	29	Rudbeckia	103
Reseda	58	Ruellia	70, 144
Rivina	121	Rumex	43
Roëlla	124		

S.

Sagina	122	Salvia	4, III
Salsola	31	Samolus	124

INDEX.

171

	Pag.		Pag.		
<i>Sansevieria</i>	+ + + + +	132	<i>Sideroxylon</i>	+ + + + +	125
<i>Santolina</i>	+ + + + +	95	<i>Silene</i>	+ + + + +	48, 137
<i>Saxifraga</i>	+ + + + +	47, 136	<i>Sinapis</i>	+ + + + +	75
<i>Scabiosa</i>	+ + + + +	15	<i>Sisymbrium</i>	+ + + + +	72, 146
<i>Scandix</i>	+ + + + +	34	<i>Sisyrinchium</i>	+ + + + +	147
<i>Scorzonera</i>	+ + + + +	87	<i>Smyrnium</i>	+ + + + +	35
<i>Scrophularia</i>	+ + + + +	68	<i>Solanum</i>	+ + + + +	26, 124
<i>Scutellaria</i>	+ + + + +	66	<i>Solidago</i>	+ + + + +	98
<i>Sedum</i>	+ + + + +	50, 137	<i>Sonchus</i>	+ + + + +	87
<i>Selago</i>	+ + + + +	67	<i>Spermacoce</i>	+ + + + +	16
<i>Selinum</i>	+ + + + +	32, 127	<i>Spondias</i>	+ + + + +	137
<i>Sempervivum</i>	+ + + + +	60	<i>Stachys</i>	+ + + + +	65
<i>Senecio</i>	+ + + + +	97, 158	<i>Stapelia</i>	+ + + + +	30
<i>Serratula</i>	+ + + + +	91, 156	<i>Statice</i>	+ + + + +	37
<i>Sesleria</i>	+ + + + +	11	<i>Stevia</i>	+ + + + +	95
<i>Seseli</i>	+ + + + +	35, 128	<i>Stillingia</i>	+ + + + +	109
<i>Sida</i>	+ + + + +	77	<i>Stipa</i>	+ + + + +	10
<i>Sideritis</i>	+ + + + +	64, 142	<i>Stylium</i>	+ + + + +	160

T.

<i>Tacca</i>	+ + + + +	132	<i>Tragopogon</i>	+ + + + +	154
<i>Tagetes</i>	+ + + + +	100	<i>Trichodium</i>	+ + + + +	9
<i>Tanacetum</i>	+ + + + +	95	<i>Trifolium</i>	+ + + + +	84, 153
<i>Terminalia</i>	+ + + + +	136	<i>Trigonella</i>	+ + + + +	85
<i>Teucrium</i>	+ + + + +	63, 142	<i>Tripsacum</i>	+ + + + +	106
<i>Thalictrum</i>	+ + + + +	61	<i>Triticum</i>	+ + + + +	13, 117
<i>Thlaspi</i>	+ + + + +	71	<i>Triumphetta</i>	+ + + + +	56, 140
<i>Thunbergia</i>	+ + + + +	144	<i>Turritis</i>	+ + + + +	74
<i>Thymus</i>	+ + + + +	66, 143	<i>Tussilago</i>	+ + + + +	97, 158
<i>Tradescantia</i>	+ + + + +	38			

	Pag.		Pag.
<i>Urtica</i>	187	<i>Uvaria</i>	141
<i>Verbascum</i>	24, 124	<i>Viola</i>	28
<i>Veronica</i>	2	<i>Virgilia</i>	134
<i>Vestia</i>	22	<i>Viscago</i>	48
<i>Viburnum</i>	36	<i>Zed</i>	2
<i>Zingiber</i>	47	<i>Z.</i>	10

三

181	*	*	*	*	*	monobogobius	T	182	*	*	*	*	*	leptognathus	T
183	*	*	*	*	*	multibarbatus	T	184	*	*	*	*	*	zebrus	T
185	*	*	*	*	*	multifasciatus	T	186	*	*	*	*	*	maculatus	T
187	*	*	*	*	*	oligolepis	T	188	*	*	*	*	*	maculipinnis	T
189	*	*	*	*	*	multicirratus	T	190	*	*	*	*	*	maculatus	T
191	*	*	*	*	*	multifasciatus	T	192	*	*	*	*	*	maculipinnis	T
193	*	*	*	*	*	multifasciatus	T	194	*	*	*	*	*	maculatus	T
195	*	*	*	*	*	multifasciatus	T	196	*	*	*	*	*	maculatus	T
197	*	*	*	*	*	multifasciatus	T	198	*	*	*	*	*	maculatus	T
199	*	*	*	*	*	multifasciatus	T	200	*	*	*	*	*	maculatus	T

UB WIEN



+AM430991706

