

BOTANISCHES INSTITUT
der Universität Wien

Bibliothek

J.-Nr. _____

Sign. C 197/7

ex plantarum

horti c. r. botanici

Pragensis.

Kosteletsky



Verzeichniss

der im k. k. botanischen Garten

zu Prag

cultivirten Pflanzen.

Prag, 1844.

Gedruckt bei K. Geržabek, Brenntegasse Nro. 73.

1862

1862

1862

1862

1862

1862

1862

1862

1862

Vorrede.

Die Herausgabe dieses ersten vollständigen Pflanzen-Verzeichnisses des Prager botanischen Gartens hat einen doppelten Zweck: zunächst und hauptsächlich soll dadurch der schon bestehende lebhafte Verkehr mit andern Gärten noch mehr ausgedehnt und insbesondere der bereits nach mehreren Seiten hin eingeleitete Austausch lebender Pflanzen so viel als möglich vielfältigt werden, dann aber soll die literärische Welt dadurch auch in den Stand gesetzt werden, wenigstens einigermaßen zu beurtheilen, welche Behelfe dem Studium der Botanik hier geboten werden.

Schon eine flüchtige Durchsicht desselben vermag Jeden zu belehren, dass die Zahl der in dem hiesigen botanischen Garten vorhandenen Gewächse Beachtung verdiene; berücksichtigt man nun, dass dieselbe noch im Jahre 1824 unter 5600 war, gegenwärtig aber bereits über 13,000 gestiegen ist, so ergibt sich wohl klar, dass der Prager Garten hinsichtlich einer solchen Zunahme binnen zwei Jahrzehnden keinem andern Universitäts-Garten nachstehe, wobei noch zu bemerken ist, dass demselben zur Erreichung eines solchen glücklichen Erfolges verhältnissmässig nur sehr beschränkte Mittel zu Gebote stehen. Zu bedauern bleibt nur, dass die grösstentheils ganz alten und schlecht gebauten, auch für die Menge der aufzunehmenden Pflanzen nicht hinreichend geräumigen Gewächshäuser keine ganz entsprechende Cultur derselben, vorzüglich aber jener aus den tropischen Erdstrichen gestatten, letztere daher grössten-

theils nur in kleinern Exemplaren vorrätbig gehalten werden müssen und demnach häufig nur unvollkommen oder gar nicht zur Blüthe gelangen; doch wird diesem Übelstande durch die bereits so vielfach erprobte gnädige Fürsorge der hohen Staats-Regierung wohl schon in der nächsten Zukunft abgeholfen und der botanische Garten in den Stand gesetzt werden, seinen Zweck noch vollkommener, als es bisher möglich war, erreichen und den Anforderungen, welche die Gegenwart an ein solches wissenschaftliches Institut stellt, auch in der angedeuteten Hinsicht entsprechen zu können.

Über die Einrichtung dieses Cataloges habe ich nur wenige Worte zu sagen. Dass die Pflanzen in alphabetischer Reihe aufgeführt sind, ergab sich als nothwendige Folge des oben angedeuteten hauptsächlichen Beweggrundes zur Herausgabe desselben, indem eine systematische Anordnung unvermeidlich einen grossen Zeitverlust beim Gebrauche herbeigeführt hätte. Aber auch des Belehrenden bietet eine solche systematische Einrichtung nicht viel; der Mann vom Fache geht ohnehin dabei leer aus und der Studirende, auf den es doch allein abgesehen seyn kann, lernt eben auch bloss Namen kennen und vermag die Pflanzen im Garten mit dem Cataloge in der Hand doch nicht besser kennen zu lernen, als ohne diesen und zwar um so weniger, als ja letztere in keinem Garten sämmtlich in der Ordnung stehen können, in welcher sie sich auf dem Papiere befinden. — Allerdings hätte der Catalog an Brauchbarkeit gewonnen, wenn ausser den Namen, unter welchen jede Pflanze hier wirklich cultivirt wird, auch noch die übrigen, die sie bei den Schriftstellern führt, angegeben worden wären, allein eine etwas vollständigere Synonymik würde die Bogenzahl mehr als verdoppelt haben. Was indessen die Rücksicht auf die nothwendige Beschränkung der letztern zu thun gestattete, das ist geschehen und am Schlusse einer jeden Gattung sind stets alle andern Gattungen genannt, welche die übrigen, bei jener etwa vermissten Arten enthalten.

Was nun die Gattungen selbst anbelangt, so lässt es sich nicht läugnen, dass, während in einer Familie ein oder ein paar oft ziemlich geringfügige Charaktere für vollkommen ausreichend gehalten werden, um eine Gattung von einer andern zu trennen, in andern Familien oftmals Gattungen vorkommen, deren einzelne Arten häufig ähnliche oder zum Theil noch viel bedeutendere Unterschiede darbieten, ohne dass man an eine Trennung derselben dachte, oder wenn letztere etwa doch von Einem oder dem Andern (wie z. B. früher von Medicus, Mönch, Necker u. s. w.) vorgenommen wurde, diese ganz unbeachtet liess. Ist es auch schliesslich von keiner Bedeutung, ob der Eine mehr, der

Andere weniger Gattungen zulässt, insofern der Letztere wieder mehr Untergattungen aufstellen muss, so wäre doch wenigstens hierin ungleich mehr Folgerichtigkeit, als man gegenwärtig findet, und ein in dieser Hinsicht möglichst gleichförmiges, durchgreifendes Verfahren für das ganze Gebiet der Pflanzenwelt zu wünschen. Diesem Grundsatz möglichst treu zu bleiben, war mein Bestreben und aus diesem Gesichtspunkte bitte ich die hier befolgte Nomenclatur der Gattungen und Arten zu beurtheilen.

Bezüglich der letztern haben wohl alle Sachverständigen gewiss schon lange die Beobachtung gemacht, dass sich gegenwärtig in den botanischen Gärten eine nicht unbedeutende Zahl von Pflanzen vorfindet, die man ausserhalb derselben in der freien Natur wohl vergebens suchen würde. Erklärt man diese für blosse Abarten, so ist damit nicht viel geholfen, weil es so häufig nicht Abänderungen einer oder der andern Species, sondern wahre Mittelformen sind, die also mit gleichem Rechte zu einer wie zur andern Art gezogen werden können und bei der Aussaat aus Samen meistens sehr constant wiederkehren, wenn die Mutterpflanze von den übrigen Arten mehr oder weniger geschieden stand. Durch solche Mittelformen werden Arten, die an und für sich leicht zu unterscheiden sind, zu einer innigen Kette verbunden und ein sehr allmählicher Übergang zwischen den am weitesten von einander entfernt stehenden Gliedern hergestellt, so dass man nur die Wahl hat, entweder alle zusammen für nur eine einzige naturhistorische Species zu halten, oder noch mehr Arten, als bisher in den Systemen vorkommen, anzuerkennen. Bequemer ist es freilich jene offenbar, wenn auch ohne absichtliches menschliches Einwirken, in den Gärten allmählich entstandenen Blendlinge ganz und gar unberücksichtigt zu lassen und als ächte Arten nur solche wesentlich verschiedene Pflanzenformen anzusehen, deren Vaterland man nachweisen kann. Allein, ganz abgesehen davon, dass jene doch einmal wirklich existiren und zum Theil schon sehr verbreitet vorkommen, also jedenfalls beachtet werden müssen, zeigen sie ausserdem auch klar, welcher Vorgang im natürlichen Verbreitungsbezirke der Pflanzen, wenn auch häufig wegen minder günstiger Umstände viel langsamer, stattfindet, und auf welche Weise viele sogenannte ächte Arten allmählich sich gebildet haben mögen. Mit Gewissheit kann aber auch behauptet werden, dass die immer mehr Platz greifende Ansicht: Der Begriff der Art sei kein einfacher, fester, durch die Natur selbst unterscheidbar gegebener Grundbegriff, sondern habe eben auch, wie die weitem Begriffe von Gattung, Familie, Ordnung u. s. w. nur dem Bedürfnisse des Systematikers seine Entstehung zu verdanken, bilde demnach, gleich diesen, nach der jeweiligen

individuellen Ansicht eines solchen ein bald verengtes, bald erweitertes Fach in dem grossen Fachwerke der Classification, jener Wichtigkeit, die man so häufig in das Geschäft des Aufstellens neuer Arten und Gattungen legte, bedeutenden Abbruch thun müsse, um so mehr, als man gegenwärtig bereits mehr und mehr dem eigentlichen Ziele der Pflanzenforschung in einer ganz andern Richtung nachstrebt.

Prag den 25. Juli 1844.

Der Vorstand des k. k. botanischen Gartens:

Prof. et Med. Dr. **V. F. Kosteletzky.**

Erklärung

der angewendeten Abkürzungen und Zeichen.

Die Abkürzungen der Autoren - Namen bedürfen für den Mann vom Fache freilich keiner Erläuterung, da jedoch dieses Verzeichniss auch in die Hände Solcher gelangt, die damit keinesweges vertraut sind, so folgen dieselben hier in alphabetischer Reihe mit Beifügung der ganz ausgeschriebenen Namen.

Adans.	Adanson.	Baumg.	Baumgarten.
Ag. }	Agardh.	Baxt.	Baxter.
Agd. }		Bechst.	Beckstein.
A. Juss.	Adrien Jussieu.	Beck.	Becker.
Ait.	Aiton.	Bedf.	Bedford.
All.	Allioni.	Bell.	Bellardi.
Amm.	Amman.	Benth.	Bentham.
And.	Anderson.	Bercht.	Berchtold.
Andr.	Andresw.	Berg.	Bergius.
Andrz.	Andrzeiowsky.	Berl.	Berlandier.
Ard.	Arduino.	Bert.	Bertoloni.
Aubl.	Aublet.	Bertr.	Bertero.
Audib.	Audibert.	Bess.	Besser.
Aut.	Autorum.	B. et S.	Banks et Solander.
Balb.	Balbis.	B. et W.	Bartling et Wendland.
Bart.	Barton.	Bge.	Bunge.
Bartl.	Bartling.	Bhd.	Bernhardi.
Bass.	Bassi.	Big.	Bigelow.
Bast.	Bastard.	Bisch.	Bischoff.
Batem.	Batemann.	Biv.	Bivona-Bernardi.

Bl.	Blume.
Blum. }	
Boennggh.	Boenninghausen.
Boerh.	Boerhave.
Boiss.	Boissier.
Bonpl.	Bonpland.
Boo.	Booth.
Borkh.	Borkhausen.
Bory.	Bory de St. Vincent.
Bouch.	Bouche.
Brand.	Brande.
Brign.	Brignoli.
Broch.	Brochi.
Brogu.	Brogart.
Brof.	Brotero.
Brouss.	Broussonet.
Burch.	Burchell.
Burm.	Burmann.
Buxb.	Buxbaum.
Camb.	Cambessedes.
Camer.	Camerarius.
C. A. Mey.	Car. Ant. Meyer.
Campd.	Campdera.
Cass.	Cassini.
Cav.	Cavanilles.
Cerv.	Cervantes.
Ces.	Cesati.
Cham.	Chamisso.
Ch. et S.	Chamisso et Schlechtendahl.
Chois.	Choisy.
Clairv.	Clairville.
Clar.	Clarion.
Colebr.	Colebrooke.
Coll.	Colla.
Comm.	Commerson.
Commel.	Commelyn.
Coss. et G.	Cosson et Germain.
Court.	Courtois.
Crtz.	Crantz.
Cunnggh.	Cunningham.
Curt.	Curtis.
Cuss.	Cusson.
Cyr.	Cyrillo.
DeC.	De Candolle.
DeC. f.	De Candolle filius.
Decais.	Decaisne.
Del.	Delile.
Delarb.	Delarbre.
Delm.	Delmbard.
Desf.	Desfontaines.
Desp.	Desportes.
Desr.	Desroussaux.
Desv.	Desvaux.
Deth.	Detharding.
Dietr.	Dietrich.
Dillen.	Dillenius.
Dougl.	Douglas.
Drumm.	Drummond.
Dry.	
Dryand. }	Dryander.

Dub.	Duby.
Duch.	Duchesne.
Dufr.	Dufresne.
Duham.	Duhamel du Monceau.
Dum-C.	Dumont de Courset.
Dumort.	Dumortier.
Dun.	Dunal.
D'Urv.	D'Urville.
Eckl.	Ecklon.
E. et Z.	Ecklon et Zeyher.
Ehrenb.	Ehrenberg.
Ehrh.	Ehrhart.
Ell.	Elliot.
E. Mey.	Ernst Meyer.
Endl.	Endlicher.
Esch.	Eschscholtz.
Etl.	Etlinger.
F. et L.	Fischer et Lallemand.
F. et M.	Fischer et Meyer.
F. et Tr.	Fischer et Trautvetter.
Feuill.	Feuillé.
Fieb.	Fieber.
Fisch.	Fischer.
Forb.	Forbes.
Forsk.	Forskäl.
Forst.	Forster.
Fr.	Fries.
Fres.	Fresenius.
Friedl.	Friedlaender.
Friv.	Frivaldszky.
Fröl.	Froelich.
Fzl.	Fenzl.
Gaertn.	Gaertner.
Gasp.	Gasparini.
Gaud.	Gaudin.
Gaudich.	Gaudichaud.
G. et H.	Gillies et Hooker.
G. et P.	Guillemin et Perrottet.
Gmel.	Gmelin.
G. M. S.	Gaertner, Meyer et Scherbius.
Godr.	Godron.
Gold.	Goldie.
Goldb.	Goldbach.
Good.	Goodenough.
Gou.	Gouan.
Grah.	Graham.
Griseb.	Grisebach.
Gron.	Gronov.
Guerns.	Guernsent.
Guss.	Gussone.
Hab.	Haberle.
Hall.	Haller.
H. Angl.	Hortorum Anglorum.
Ham.	Hamilton.
Hartm.	Hartmann.
Hask.	Haskarl.
Haw.	Haworth.
Hayn.	Hayne.
H. Bas.	Horti Basiliensis.
H. Belg.	Hortorum Belgicorum.

H. Ber.
 H. Bonon.
 H. Dresd.
 Heist.
 Hell.
 Henk.
 Herb.
 H. Erf.
 Herm.
 H. et A.
 H. et B.
 H. et L.
 H. et R.
 Heuff.
 Heyn.
 Heynh.
 H. Gall.
 Hke.
 H. Kew.
 Hladn.
 H. Leod.
 H. Mon.
 Hochst.
 Hoeck.
 Höffg.
 Hoffm.
 Hook.
 Hopp.
 Horn.
 Horng.
 Houst.
 H. Par.
 H. Petr.
 H. Vind.
 Huds.
 Hüg.
 Jacq.
 Jacq. f.
 Juss.
 K.
 Kaempf.
 Karw.
 Kaulf.
 Kenn.
 K. et K.
 K. et W.
 Kit.
 Klzsch.
 Knowl.
 Köhl.
 Kön.
 Kth.
 Kze.
 L.
 Lab.
 Lag.
 Lall.
 Lam.
 Lamb.
 Lap.

Horti Berolinensis.
 Horti Bononiensis.
 Horti Dresdensis.
 Heister.
 Heller.
 Henkel von Donnersmark.
 Herbert.
 Horti Erfurtensis.
 Hermann.
 Hooker et Arnott.
 Humboldt et Bonpland.
 Hoffman et Link.
 Heer et Regel.
 Heuffel.
 Heyne.
 Heynhold.
 Hortorum Gallorum.
 Haenke.
 Horti Kewensis.
 Hladnik.
 Horti Leodinensis.
 Horti Monacensis.
 Hochstetter.
 Hoecert.
 Hoffmannsegg.
 Hoffmann.
 Hooker.
 Hoppe.
 Hornemann.
 Hornung.
 Houston.
 Horti Parisiensis.
 Horti Petropolitani.
 Horti Vindobonensis.
 Hudson.
 Hugel.
 Jacquin.
 Jacquin filius.
 Jussieu.
 Kosteletzky.
 Kaempfer.
 Karwinsky.
 Kaulfuss.
 Kennedy.
 Karelín et Kirilow.
 Knowles et Westcote.
 Kitaibel.
 Klotzsch.
 Knowles.
 Köhler.
 König.
 Kunth.
 Kurze.
 Linné.
 Labillardiere.
 Lagasca.
 Lallemant.
 Lamarch.
 Lambert.
 Lapeyrouse.

Lar.
 Lawr.
 Laxm.
 Led.
 Lehm.
 Lej.
 Lem.
 Less.
 L. et Lk.
 L. et O.
 Leyss.
 L'Her.
 Libosch.
 Lightf.
 Lilj.
 Lindl.
 Lk.
 Lod.
 Loeffl.
 Loisl.
 Loud.
 Lour.
 Mak.
 March.
 Marsh.
 Mart.
 Matth.
 M. B.
 Mchx.
 Med.
 Meisn.
 Mel.
 M. et D.
 M. et De N.
 M. et K.
 Mey.
 Mich.
 Mik.
 Mill.
 Mitch.
 Mach.
 Mol.
 Mont.
 Mor.
 Moret.
 Mor. et Dec.
 M. T.
 Müll.
 Mühlb.
 Murr.
 Mut.
 Mx.
 N. E.
 Neck.
 Nestl.
 N. et M.
 Nocc.
 Nois.
 Nutt.
 O. et D.

Laroche.
 Lawrence.
 Laxmann.
 Ledebour.
 Lehmann.
 Lejeune.
 Lemoire.
 Lessing.
 Llave et Lexarza.
 Link et Otto.
 Leysser.
 L'Heritier.
 Liboschitz.
 Lightfoot.
 Liljeblad.
 Lindley.
 Link.
 Loddiges.
 Loeffling.
 Loiseleur Deslonchamps.
 Loudon.
 Loureiro.
 Makoy.
 Marchant.
 Marshal.
 Martius.
 Matthioli.
 Marchal Bieberstein.
 Michaux.
 Medicus.
 Meisner.
 Melazzo.
 Morren et Decaisne.
 Moris et De Notaris.
 Mertens et Koch.
 Meyen.
 Micheli.
 Mikan.
 Miller.
 Mitchel.
 Moench.
 Molina.
 Montin.
 Moris.
 Moreti.
 Morren et Decaisne.
 Moquin-Tandin.
 Müller.
 Mühlenberg.
 Murray.
 Mutis.
 Michaux.
 Nees von Esenbeck.
 Necker.
 Nestler.
 Nees et Martius.
 Nocca.
 Noisette.
 Nuttal.
 Otto et Dietrich.

Ort.	Ortega.	Savig.	Savigny.
Pall.	Pallas.	Schau.	Schauer.
Patr.	Patrin.	Scheidw.	Scheidweiler.
Pauq.	Pauquy.	Schk.	Schkuhr.
Pav.	Pavon.	Schlecht.	Schlechtendahl.
Paxt.	Paxton.	Schlei.	Schleicher.
P. B.	Palisot Beauvois.	Schlt.	Schlechtendahl.
P. Br.	Patrix Brown.	Schm.	Schmidt.
Perrot.	Perrottet.	Schousb.	Schousbae.
Pers.	Persoon.	Schrad.	Schrader.
Petagn.	Petagna.	Schreb.	Schreber.
Pet-Th.	Petit-Thouars.	Schrk.	Schrank.
Plum.	Plumier.	Schübl.	Schübler.
Poepp.	Poeppig.	Schult.	Schultes.
Poir.	Poiret.	Schwei.	Schweinitz.
Poit.	Poiteau.	Schw.	Schweigger.
Poll.	Pollich.	Schwz.	Shweinitz.
Pollin.	Pollini.	Scop.	Scopoli.
Port.	Portenschlag-Ledermayer.	Seen.	Seenus.
Pourr.	Pourret.	Ser.	Seringe.
Preisl.	Preisler.	S. et M.	Sebastiani et Mauri.
Prsl.	Presl.	S. et Sm.	Sibthorp et Smith.
P. Th.	Petit Thouars.	S. et W.	Schrader et Wendland.
Radd.	Raddi.	Sibt.	Sibthorp.
Raf.	Rafinesque-Schmaltz.	Sieb.	Sieber.
Ram.	Ramond.	Siebt.	Sieboldt.
R. Br.	Robert Brown.	Siegesb.	Siegesbeck.
Rchb.	Reichenbach.	Sm.	Smith.
Recq.	Requien.	Sol.	Solander.
Red.	Redoute.	Spenn.	Spenner.
Reiss.	Reisseck.	Spr.	Sprengel.
Ren.	Renealus.	Sprg.	Spring.
R. et C.	Robilliard et Castagne.	St. Am.	St. Amans.
R. et P.	Ruiz et Pavon.	Stbg.	Sternberg.
R. et S.	Roemer et Schultes.	Stechm.	Stechmann.
Retz.	Retzius.	Steinh.	Steinheil.
Reyn.	Reynier.	Steph.	Stephan.
Rhod.	Rhode.	St. et H.	Sternberg et Hoppe.
Rich.	Richard.	Steud.	Steudel.
Richds.	Richardson.	Stev.	Steven.
Riss.	Risso.	St. Hil.	St. Hilaire.
Riv.	Rivinus.	Sw.	Swantz.
Roch.	Rochel.	Swt.	Sweet.
Roehl.	Roehling.	Tell.	Telfaire.
Roll.	Rollinson.	Ten.	Tenore.
Rosc.	Rosece.	T. et G.	Torrey et Gray.
Rottb.	Rottboell.	Thb.	Thunberg.
Rottl.	Rottler.	Thib.	Thibaud.
Royl.	Royle.	Thor.	Thore.
Roxb.	Roxburgh.	Thou.	Thouin.
Roz.	Rozier.	Thuil.	Thuillier.
Rud.	Rudolphi.	Tin.	Tineo.
Rupp.	Ruppis.	Tourn.	Tournefort.
Sab.	Sabine.	Tratt.	Trattinick.
Sadl.	Sadler.	Trautv.	Trautvetter.
Sal.	Salisbury.	Trev.	Treviranus.
Salm-D.	Salm-Dyck.	Trin.	Trinius.
Saut.	Sauter.	Tsch.	Tausch.
Sauv.	Sauvages.	Turcz.	Turczaninow.
Sav.	Savi.	Ucr.	Ucria.

Vaill.	Vaillant.	Wend.	Wenderöth.
Vand.	Vandelli.	Wendl.	Wendland.
Vent.	Ventenat.	W. et A.	Wight et Arnott.
Vib.	Viborg.	W. et B.	Webb et Berthelot.
Vig.	Viguier.	W. et G.	Wimmer et Grabowsky.
Vill.	Villars.	W. et K.	Waldstein et Kitaibel.
Vis.	Visiani.	Wgh.	Wangenheim.
Viv.	Viviani.	Whe.	Weihe.
W.	Willdenow.	Wickst.	Wickström.
Wahlb.	Wahlenberg.	Wierzb.	Wierzbicki.
Wall.	Wallich.	Will.	Willemet.
Wallm.	Wallmann.	With.	Withering.
Wallr.	Wallroth.	W. Mey.	Wilhelm Meyer.
Walp.	Walpers.	Wulf.	Wulfen.
Walt.	Walter.	Zant.	Zantedeschi.
Wats.	Watson.	Zeyh.	Zeyher.
Wed.	Wedemeyer.	Zucc.	Zuccarini.
Wdr.	Wenderöth.	Zuccg.	Zuccagni.
Weinm.	Weinmann.		

Die übrigen Namen sind unabgekürzt.

Die Abkürzungen bei der Angabe des Vaterlandes der Gewächse sind leicht verständlich, nur hinsichtlich des Ausdrucks: *Amer. bor-aust.* wäre höchstens zu bemerken, dass hierdurch der südlichere Theil Nord-Amerika's bezeichnet werde.

Die für die Dauer und Cultur der Gewächse benützten Zeichen sind:

- ① für einjährige,
- ② „ zweijährige,
- 4 „ mehrjährige und krautartige,
- h „ halbstrauchartige,
- h „ strauchartige,
- 5 „ baumartige Pflanzen.

D bedeutet die Cultur ganz im Freien.

F „ im kalten Gewächshause, bei + 1 — 5° R.


T „ im lauwarmen Gewächshause, bei 5 — 9° R.

C „ im warmen Gewächshause, bei 10 — 20° R.

Hieraus ergibt sich auch, was durch die Zusammensetzungen CD., FD., DF. u. s. w. angedeutet wird; erstere gilt nämlich für solche einjährige Pflanzen, die in der ersten Jugend unter Fenster gehalten, später aber theils in Töpfen ins Freie gestellt, theils vollständig ins Land gepflanzt werden. — Die Buchstaben FD. deuten solche Pflanzen an, die im Winter im kalten Gewächshause stehen, im Sommer aber ausgepflanzt werden, DF. dagegen solche, welche zwar den Winter im Freien aushalten, aber geschützt werden müssen oder von denen ein Stück zur Sicherheit im Glashause zu überwintern ist.

Das Zeichen A, bedeutet eine Gebirgs-, so wie jede Baumschutz erfordernde Pflanze, die also im Sommer vor den sengenden Strahlen der Sonne zu bewahren, im Winter dagegen zu decken oder auf andere Weise der strengern Kälte, so wie dem noch verderblicheren Einflusse des bei uns so häufigen Witterungs- Wechsels zu entziehen sind.

Alle Pflanzen, mit ∇ bezeichnet, werden in Wasserbehältern gezogen.



Abelmoschus Med.	(Malvaceae)		Acacia Neck.	(Mimosaceae)	
esculentus Mönch.	Ind. or.	⊙ C.	alata R. Br.	Nov. Holl.	h F.
ficulneus W. et A.	" "	h C.	albida Del.	Afr. med.	5 C.
flavescens K.	" "	h C.	amoena Wendl.	Nov. Holl.	h T.
maculatus Walp.	" "	h C.	angulata Desy.	" "	h F.
Manihot Mönch.	" "	h C.	angustifolia Wendl.	" "	h F.
moschatus Mönch.	" "	h C.	arabica W.	Arab. Aeg.	5 C.
palmatus K.	" "	h C.	arcuata LaB.	Nov. Holl.	h F.
Pseudo-Manihot K.	Mascarenh.	h C.	armata R. Br.	" "	h F.
rugosus Wall.	Ind. or.	h C.	β. truncata.		
splendens Walp.	Nov. Holl.	h C.	brevifolia Lod.	" "	h F.
Abies Tourn.	(Abietineae)		caffra W.	Cap. b. sp.	h T.
balsamifera Mill.	Amer. bor.	5 D.	calamifolia Swt.	" "	h F.
Fraseri Poir.	" "	5 D.	canaliculata Swt.	Nov. Holl.	h F.
pectinata DeC.	Europa "	5 D.	capensis Burch.	Cap. b. sp.	h T.
sibirica Led.	Asia bor.	5 D.	Catechu W.	Ind. or.	5 C.
(vide Picea).			cochlearis Wendl.	Nov. Holl.	h F.
Abroma Jacq.	(Büttneriaceae)		cornigera W.	Ind. occ.	5 C.
augustum L. f.	Ind. or.	h C.	Cunninghami Hook.	Nov. Holl.	h F.
coccineum Hort.	" "	h C.	dealbata Link	" "	h F.
Abrus L.	(Papilionaceae)		decipiens R. Br.	" "	h F.
precatorius L.	Ind. or.	h C.	decurrens W.	" "	h F.
Abutilon Gaertn.	(Malvaceae)		decussata Ten.	" "	h F.
arborescens Swt.	Peruvia	h C.	diffusa Ker.	" "	h F.
asiaticum Swt.	Ind. or.	⊙ C.	discolor W.	" "	h T.
atropurpureum Swt.	Java	h C.	divaricata W.	Ind. or.	h C.
auritum Swt.	Ind. or.	h C.	dodoneaeifolia W.	Nov. Holl.	h F.
Avicennae Gaertn.	Eur. aust.	⊙ D.	eburnea W.	Ind. or.	h C.
bonariense K.	Amer. aust.	h C.	falcata W.	Nov. Holl.	h F.
crispum Med.	Ind. occ.	⊙ CD.	filicina W.	Mexico	h C.
glaucom Swt.	Africa m.	h C.	β. hirsutissima.		
hernandioides Swt.	Ind. occ.	h C.	floribunda W.	Nov. Holl.	h F.
heterospermum K.	Nubia	h C.	genistaefolia Lk.	" "	h T.
inaequale K.	Brasilia	h C.	glaucescens W.	" "	h F.
indicum Swt.	Ind. or.	⊙ C.	graveolens Lod.	" "	h F.
mauritianum Med.	Mascarenh.	h C.	hastulata Sm.	" "	h F.
molle Swt.	Peruvia	h C.	heterophylla W.	Mascarenh.	h T.
mollicomum Swt.	" "	h C.	horrida W.	Arab. Afr.	5 T.
molliissimum Swt.	" "	h C.	juniperina W.	Nov. Holl.	h F.
populifolium Swt.	" "	⊙ C.	latisilica W.	Amer. aust.	5 C.
permolle Swt.	Amer. aust.	h C.	leprosa Sieb.	Nov. Holl.	h F.
reflexum Swt.	Peruvia	h C.	lineata Cungh.	" "	h T.
Sellowianum K.	Brasilia	h C.	linifolia W.	" "	h F.
Sonneratianum Swt.	Cap. b. sp.	⊙ CD.	longifolia W.	" "	h F.
tiliaefolium Swt.	Asia med.	⊙ D.	β. latifolia.		
venosum K.	Brasil. aust.	h T.	maderaspatana Hort.	Ind. or.	h C.
triquetrum Presl.	Amer. aust.	h C.	marginata R. Br.	Nov. Holl.	h F.
vesicarium Swt.	Mexico	⊙ C.	Melanoxylon R. Br.	" "	h F.
virgatum Swt.	Peruvia	h C.	mucronata W.	" "	h F.

Acacia

muricata W.	Ind. occ.	† C.
myrtifolia W.	Nov. Holl.	† F.
nigricans R. Br.	" "	† T.
ornithophora Sweet.	" "	† T.
pendula Cunng.	" "	† F.
penninervis Sieb.	" "	† T.
pentadenia Lindl.	" "	† T.
pubescens Ait.	" "	† F.
pulchella R. Br.	" "	† F.

" β . spinescens.

riparia Kth.	Amer. trop.	† C.
robusta Cunng.	Nov. Holl.	† F.
Sophorae R. Br.	" "	† F.
stricta W.	" "	† F.
suaveolens W.	" "	† F.
subcoerulea Lindl.	" "	† F.
subulata Bonpl.	" "	† F.
tortuosa W.	Ind. occ.	† C.
trinervata Sieb.	Nov. Holl.	† F.
umbellata Ait.	" "	† T.
undulata W.	" "	† F.
venusta W.	Amer. trop.	† C.
vera W.	Africa	5 C.
verticillata W.	Nov. Holl.	† F.
vestita Ker.	" "	† T.
(vide: Albizzia — Calliandra — Leucaena — Vachelia).		

Acaena L.

(Sanguisorbaceae)

adscendens Vahl.	Patagonia	† F.
argentea R. et P.	Chili	† F.
cylindrostachya R. et P.	Peruvia	† F.
ovalifolia R. et P.	"	† F.
sericea Jacq. f.	Mexico	† F.

Acalypha L.

(Euphorbiaceae)

alopecuroides Jacq.	Amer. trop.	⊙ C.
brachystachya Horn.	China	⊙ C.
caroliniana Walt.	Carolina	⊙ D.
cuspidata Jacq.	Amer. trop.	† C.
virgata L.	Ind. occ.	† C.
virginica L.	Amer. bor.	⊙ D.

Acanthophyllum C. A. Mey.

(Sileneae)

mucronatum C. A. Mey.	Caucasus	† FD.
spinosum C. A. Mey.	Sibir. aust.	† FD.

Acanthostachys Lk. K. O.

(Bromeliaceae)

strobilacea Lk. K. O.	Brasilia	‡ C.
-----------------------	----------	------

Acanthospermum Schrk.

(Synanthereae)

humile DeC.	Ind. occ.	⊙ C.
-------------	-----------	------

Acanthus Tourn.

(Acanthineae)

intermedius Host.	Eur. aust.	‡ DF.
mollis L.	" "	‡ DF.

" β . lyratus.

niger Mill.	" "	‡ DF.
-------------	-----	-------

spinosus L.	" "	‡ DF.
-------------	-----	-------

Acer L.

(Acerineae)

campestre L.	Europa	‡ 5 D.
--------------	--------	--------

" β . austriacum Tratt. — γ . ta-

riticum.	Crete	† DF.
----------	-------	-------

creticum L.	"	† DF.
-------------	---	-------

dasy carpum Ehrh.	Amer. bor.	5 D.
-------------------	------------	------

Acer

heterophyllum W.	Oriens	† DF.
hybridum Bosc.	Amer. bor.	5 D.
ibericum M. B.	Caucasus	† DF.
monspessulanum L.	Eur. aust.	† D.
neapolitanum Ten.	Italia	† DF.
nigrum Mchx.	Amer. bor.	5 D.
oblongum Wall.	Nepalia	† F.
obtusatum Kit.	Eur. aust.	† D.
obtusifolium S. et Sm.	Crete	† DF.
Opalus Ait.	Europa aust.	5 D.
opulifolium Vill.	" "	† D.
parvifolium Tausch.	" "	† D.
pensylvanicum L.	Amer. bor.	5 D.
platanoides L.	Europa	5 D.

" β . variegatum — γ . palmati-

fidum Tausch — δ . laciniatum Borkh.

Pseudoplatanus L.	Europa	5 D.
-------------------	--------	------

" β . variegatum.

rubrum Mchx.	Amer. bor.	5 D.
--------------	------------	------

saccharinum Mchx.	" "	5 D.
-------------------	-----	------

spicatum Lam.	" "	5 D.
---------------	-----	------

tataricum L.	Eur. or. Asia.	5 D.
--------------	----------------	------

Aceranthos Mor. et Dec.

(Berberideae)

diphyllum M. et D.	Japonia	‡ F.
--------------------	---------	------

Achillea L.

(Synanthereae)

Ageratum L.	Eur. aust.	‡ DF.
-------------	------------	-------

albicaulis C. A. Mey.	Cauc. Pers.	† DF.
-----------------------	-------------	-------

asplenifolia Vent.	Amer. bor.	‡ D.
--------------------	------------	------

auriculata W.	Asia occ.	‡ D.
---------------	-----------	------

bicolor Wend.	?	‡ D.
---------------	---	------

compacta W.	Eur. or. aust.	‡ D.
-------------	----------------	------

crithmifolia W. et K.	Hungaria	‡ D.
-----------------------	----------	------

crustata Roch.	"	‡ D.
----------------	---	------

decolorans Schrad.	Anglia	‡ D.
--------------------	--------	------

dentifera DeC.	Eur. aust.	‡ D.
----------------	------------	------

distans W. et K.	Hungaria	‡ D.
------------------	----------	------

Eupatorium M. B.	Caucasus	‡ D.
------------------	----------	------

filicifolia M. B.	"	‡ D.
-------------------	---	------

" β . Szowitsiana.

filipendulina Lam.	Asia med.	‡ D.
--------------------	-----------	------

lanata Spr.	Podolia	‡ D.
-------------	---------	------

leptophylla M. B.	Eur. or. aust.	‡ D.
-------------------	----------------	------

ligustica All.	Eur. aust.	‡ DF.
----------------	------------	-------

magna L.	Eur. med. aust.	‡ D.
----------	-----------------	------

Millefolium L.	Europa	‡ D.
----------------	--------	------

" β . banatica — γ . tenuifolia.

nobilis L.	Eur. med.	‡ D.
------------	-----------	------

ochroleuca Ehrh.	Eur. aust.	‡ D.
------------------	------------	------

pectinata W.	" "	‡ D.
--------------	-----	------

Santolina L.	Asia med.	† DF.
--------------	-----------	-------

setacea W. et K.	Eur. med.	‡ D.
------------------	-----------	------

sylvatica Ten.	Italia	‡ DF.
----------------	--------	-------

sudetica Opiz.	Sudeti	‡ D.
----------------	--------	------

tanacetifolia All.	Eur. aust.	‡ D.
--------------------	------------	------

Tournefortii DeC.	Graecia	† F.
-------------------	---------	------

tomentosa L.	Eur. aust.	‡ DF.
--------------	------------	-------

vermiculata Trin.	Asia med.	† DF.
-------------------	-----------	-------

Achimenes P. Br.

(Gesneraceae)

coccinea Pers.	Jamaica	‡ C.
----------------	---------	------

Achimenes

grandiflora DeC.	Mexico	☿ C.
hirsuta DeC.	Brasilia	☿ C.
longiflora DeC.	Mexico	☿ C.
rosea Lindl.	Guatemala	☿ C.
Achnodon P. B.	(Gramineae)	
Bellardi P. B.	Eur. aust.	⊙ D.
tenue P. B.	" "	⊙ D.
Achyranthes L.	(Amarantaceae)	
alba E. et Z.	Cap. b. sp.	☿ T.
argentea Lam.	Sicil. Afr.	☿ F.
aspera L.	Ind. or.	☿ C.
fruticosa Lam.	" "	☿ C.
rivinaefolia Desf.	" ?	☿ C.
sylvatica E. et Z.	Cap. b. sp.	☿ T.
uncinulata Schrad.	" "	☿ T.
virgata Poir.	Ind. occ.	☿ C.
Achyropappus Kth.	(Synanthereae)	
schkuhrioides L. et O. Mexico	☿ D.	
Achyrophorus Scop.	(Synanthereae)	
apargioides DeC.	Chili	☿ F.
hispidus DeC.	" ?	☿ F.
helveticus Scop.	Alp. Sud.	☿ D. A.
maculatus Scop.	Europa	☿ D.
oxyodontus DeC.	" ?	☿ F.
pinnatifidus DeC.	Eur. aust.	☿ F.
Aclisia E. Mey.	(Commelinaceae)	
florida Bhd.	" ?	☿ T.
Acmena DeC.	(Myrtineae)	
elliptica Don.	Nov. Holl.	☿ T.
Acnistum Schott.	(Solanieae)	
arborescens Schlt.	Amer. trop.	☿ C.
Aconitum Tourn.	(Ranunculineae)	
altissimum Mill.	Eur. aust.	☿ D.
angustifolium Bhd.	Styria	☿ D.
Anthona L.	Alpes	☿ D. A.
autumnale Rchb.	Eur. occ.	☿ D.
barbatum Patr.	Asia bor.	☿ D.
Bernhardianum Rchb.	Alpes	☿ D.
" β. flore albo.		
Cammarum Jacq.	Eur. med.	☿ D.
" β. judenburgense.		
cernuum Wulf.	Alpes	☿ D.
chinense Siebd.	China	☿ D. F.
dissectum Tausch	Asia bor.	☿ D.
elatum Wend.	Eur. aust.	☿ D.
eminens Koch	Eur. occ.	☿ D.
exaltatum Bhd.	Europa	☿ D.
excelsum Turcz.	Asia bor.	☿ D.
formosum Rchb.	Alpes	☿ D.
Galocotum Rchb.	Europa	☿ D.
Gmelini Rchb.	Asia bor.	☿ D.
" β. brachycarpum Fisch.		
hebegynum DeC.	Helvetia	☿ D.
hians Rchb.	Alpes	☿ D.
" β. Clusianum Rchb.		
hispidum DeC.	Asia bor.	☿ D.
Hoppeanum Rchb.	Alpes	☿ D.
" β. Mielichhoferi Rchb.		
japonicum Thbg.	Japonia	☿ D. F.

Aconitum

Koelleianum Rchb.	Alpes	☿ D.
laetum Rchb.	Sudeti	☿ D.
leptanthum Rchb.	Asia bor.	☿ D.
Lycocotum L.	Eur. bor.	☿ D.
" β. Lagoctonum Rchb.		
macranthum Rchb.	Alpes	☿ D.
multifidum Koch	Sudeti	☿ D.
" β. callibotryon Rchb.		
Myocotum Rchb.	Eur. med.	☿ D.
Napellus L.	Alpes	☿ D.
" β. Bauhini — γ. Halleri — δ. Schleicheri — ε. tauricum.		
neomontanum Wulf.	Alpes	☿ D.
" β. Braunii Rchb.		
nitidum Fisch.	Asia bor.	☿ D.
orientale Mill.	Asia med.	☿ D.
Pseudo-Anthona Wend.	Alpes	☿ D. A.
pubescens Mönch.		☿ D.
" β. Funkianum Rchb.		
pyramidale Mill.	Alpes	☿ D.
pyrenaicum L.	Pyren.	☿ D.
ranunculifolium Rchb.	Tyrolia	☿ D.
prostratum Bhd.	Alpes	☿ D.
" β. flore albo.		
speciosum Otto.	Sud. Alpes	☿ D.
squarrosus L.	Asia bor.	☿ D.
Stoerkianum Rchb.	Alpes	☿ D.
strictum Bhd.	Alp. Sudeti	☿ D.
tauricum Wulf.	Alpes	☿ D.
" β. compactum.		
Thelyphonum Rchb.	Eur. med.	☿ D.
tortuosum W.	Asia bor.	☿ D.
uncinatum L.	Amer. bor.	☿ D.
variegatum L.	Alpes	☿ D.
" β. rhynchanthum Rchb.		
volubile Pall.	Asia bor.	☿ D. A.
Vulparia Rchb.	Europa	☿ D.
" α. Phtora — β. Cynoctonum — γ. Tragocotum Rchb.		
Willdenowii Rchb.	Alpes	☿ D.
Acorus L.	(Orchideae)	
Calamus L.	Asia med. Europ.	☿ D. V.
gramineus Ait.	China, Japon.	☿ F.
Acratherum Lk.	(Gramineae)	
miliaceum Lk.	Nepalia	☿ F.
Acroglochin Schrad.	(Amarantaceae)	
chenopodioides Schrad.	Nepalia	⊙ D.
Acropera Lindl.	(Orchideae)	
Loddigesii	Mexico	☿ C.
Acropteris Lk.	(Polypodiaceae)	
septentrionalis Lk.	Europa	☿ D. A.
Acrostichum (vide: Platycerium — Ceropteris).		
Acrotiche R. Br.	(Epacrideae)	
ovalifolia R. Br.	Nov. Holl.	☿ T.
Actaea L.	(Paeoniaceae)	
alba Big.	Amer. bor.	☿ D.
brachypetala DeC.	" "	☿ D.

Actaea				Adlumia Raf.	(<i>Fumariaceae</i>)
<i>rubra</i> Big.	Amer. bor.	2. D.		<i>cirrrosa</i> Raf.	Amer. bor. ② D.
<i>sibirica</i> Bess.	Asia bor.	2. D.		Adonis L.	(<i>Ranunculineae</i>)
<i>spicata</i> L.	Europa	2. D.		<i>aestivalis</i> L.	Europa ② D.
(vide: <i>Botrophis</i> —	<i>Cimicifuga</i>).			<i>autumnalis</i> L.	Eur. aust. ② D.
Actinomeris Nutt.	(<i>Synanthereae</i>)			<i>pyrenaica</i> DeC.	Eur. aust. 2. D. 2. A.
<i>helianthoides</i> Nutt.	Am. bor. au.	2. D.		<i>sibirica</i> Patr.	Asia bor. 2. D. 2. A.
<i>oppositifolia</i> Fres.	" "	2. D.		<i>vernalis</i> L.	Europa 2. D.
<i>squarrosa</i> Nutt.	" "	2. D.		Adoxa L.	(<i>Araliaceae</i>)
<i>tetraptera</i> DeC.	Mexico	2. FD.		<i>Moschatelina</i> L.	Europa 2. D.
Actinopora Turcz.	(<i>Paeoniaceae</i>)			Aegilops L.	(<i>Gramineae</i>)
<i>daburica</i> Turcz.	Sibiria	2. D.		<i>caudata</i> L.	Eur. aust. ② D.
Acyros Mönch.	(<i>Labiatae</i>)			<i>ovata</i> L.	Eur. aust. ② D.
<i>alpinus</i> Mönch.	Alpes	2. D. 2. A.		<i>speltoides</i> Tausch	Oriens ② D.
<i>graveolens</i> Lk.	Eur. or. Asia	② D.		<i>squarrosa</i> L.	" ② D.
<i>microphyllus</i> K.	Corsica	2. F.		<i>triaristata</i> W.	Eur. aust. ② D.
<i>patavinus</i> Pers.	Eur. aust.	2. DF.		<i>truncialis</i> L.	Eur. aust. ② D.
<i>thymoides</i> Mönch.	Europa	② D.		<i>triticoides</i> Lk.	Graecia ② D.
Adamia Wall.	(<i>Saxifragaceae</i>)			<i>ventricosa</i> Tausch	Oriens ② D.
<i>cyanea</i> Wall.	Nepalia	2. F.		Aegiphila L.	(<i>Verbenaceae</i>)
Adenandra W.	(<i>Diosmaceae</i>)			<i>martinicensis</i> L.	Ind. occ. 2. C.
<i>amoena</i> Lk.	Cap. b. sp.	2. F.		Aegomarrhron Koch	(<i>Umbelliferae</i>)
<i>umbellata</i> W.	"	2. F.		<i>crispum</i> Koch	Oriens 2. FD.
<i>uniflora</i> W.	"	2. F.		<i>Libanotis</i> Koch	Sicil. Africa 2. F.
Adenanthra L.	(<i>Mimosaceae</i>)			Aegopodium L.	(<i>Umbelliferae</i>)
<i>pavonina</i> L.	Ind. or.	2. C.		<i>alpestre</i> Ledb.	Sibir. aust. 2. D.
Adenocarpus DeC.	(<i>Papilionaceae</i>)			<i>Podagria</i> L.	Europa 2. D.
<i>foliolosus</i> DeC.	Canariae	2. F.		Aeluropus Trin.	(<i>Gramineae</i>)
<i>intermedius</i> DeC.	Lusit. Neap.	2. F.		<i>laevis</i> Trin.	Eur. aust. 2. FD.
<i>telonensis</i> DeC.	Eur. aust.	2. F.		Aeolanthus Mart.	(<i>Labiatae</i>)
Adenophora Fisch.	(<i>Campanulaceae</i>)			<i>suavis</i> Mart.	Brasilia ② C.
<i>coronopifolia</i> Fisch.	Sibir. aust.	2. D.		Aeonium W. et B.	(<i>Crassulaceae</i>)
<i>Gmelini</i> Fisch.	" "	2. D.		<i>arborescens</i> W. et B.	Lusit. Afr. 2. F.
<i>Lamarckii</i> Fisch.	" "	2. D.		<i>β. mutabile</i> — <i>γ. variegatum</i> .	" "
<i>latifolia</i> Fisch.	" "	2. D.		<i>barbatum</i> W. et B.	Canariae 2. T.
<i>liliifolia</i> Ledb.	Eur. or. Asia	2. D.		<i>β. hybridum</i> .	" "
<i>β. suaveolens</i> Rchb.				<i>caespitosum</i> W. et B.	Canariae 2. T.
<i>marsupiflora</i> Fisch.	Sibir. aust.	2. D.		<i>canariense</i> W. et B.	" 2. T.
<i>stylosa</i> Fisch.	" "	2. D.		<i>glandulosum</i> W. et B.	Madera 2. T.
<i>tricuspidata</i> DeC. f.	" "	2. D.		<i>glutinosum</i> W. et B.	2. T.
<i>verbaenaefolia</i> Bhd.	Japonia	2. FD.		<i>Haworthii</i> W. et B.	2. T.
<i>verticillata</i> Fisch.	Sibir. aust.	2. D.		<i>tabulaeforme</i> W. et B.	Madera 2. T.
Adesmia DeC.	(<i>Papilionaceae</i>)			<i>urbicum</i> W. et B.	Canariae 2. T.
<i>muricata</i> DeC.	Patagonia	② D.		Aerua Forsk.	(<i>Amarantaceae</i>)
Adenostyles Cass.	(<i>Synanthereae</i>)			<i>brachiata</i> Mart.	Ind. or. ② C.
<i>albifrons</i> Rchb.	Subalp. Alp.	2. D. 2. A.		<i>lanata</i> Juss.	" " ② C.
<i>glabra</i> DeC.	" "	2. D. 2. A.		<i>sanguinolenta</i> Blum.	Java 2. C.
Adhatoda Herm.	(<i>Acanthaceae</i>)			Aeschynanthus Jack.	(<i>Cyrtandraceae</i>)
<i>Betonica</i> N. E.	Ind. or.	2. C.		<i>grandiflorus</i> Spr.	Ind. or. 2. C.
<i>Vasica</i> N. E.	" "	2. C.		<i>ramosissimus</i> Wall.	" 2. C.
Adiantum L.	(<i>Polypodiaceae</i>)			Aeschynomene L.	(<i>Papilionaceae</i>)
<i>Capillus Veneris</i> L.	Eur. aust.	2. F.		<i>americana</i> L.	Ind. occ. ② C.
<i>concinnum</i> W.	Amer. trop.	2. C.		<i>aspera</i> L.	Ind. or. ② C.
<i>Moritzianum</i> Lk.	" "	2. C.		<i>indica</i> L.	" " ② C.
<i>pedatum</i> L.	Amer. bor.	2. D. 2. A.		<i>subviscosa</i> DeC.	" " ② C.
<i>pubescens</i> Schk.	Ins. Societ.	2. C.		Aesculus L.	(<i>Hippocastanieae</i>)
<i>reniforme</i> L.	Canariae	2. T.		<i>carnea</i> W.	Amer. bor. 5 D.
<i>tenerum</i> Sw.	Ind. occ.	2. C.		<i>Hippocastanum</i> L.	Asia bor. 5 D.
<i>trapeziforme</i> L.	Tasmania	2. T.		<i>β. variegata</i> .	" "
<i>trigonum</i> Lab.	"	2. C.		Lyoni H. Angl.	Amer. bor. 5 D.

Aesculus					
ohioensis Michx.	Amer. bor.	5 D.			
(vide: Pavia).					
Aethionema RBr.			(Cruciferae)		
Buxbaumii DeC.	Oriens	⊙ D.			
cristatum DeC.	"	⊙ D.			
coridifolium DeC.	"	⊖ F.			
gracile DeC.	"	⊖ F.			
heterocarpum Gay	"	⊙ D.			
saxatile DeC.	Eur. aust. or.	⊖ DF.			
Aethusa L.			(Umbelliferae)		
Cynapium L.	Europa	⊙ D.			
elata Frdl.	Eur. or. aust.	⊙ D.			
Aganospma G. Don.			(Apocyniaceae)		
Roxburghii Don.	Ind. or.	⊖ C.			
Agapanthus L. Her.			(Liliaceae)		
praecox W.	Cap. b. sp.	⊖ F.			
umbellatus L'Her.	"	⊖ F.			
β. variegatus.	"	"			
Agasyllis Hoffm.			(Umbelliferae)		
caucasica Spr.	Caucas.	⊖ D. F.			
Agathea Cass.			(Synantheraceae)		
amelloides DeC.	Cap. b. sp.	⊖ F.			
spatulata Kze.	"	⊙ CD.			
Agathophytum M. T.			(Chenopodiaceae)		
Bonus Henricus M. T.	Europa	⊖ D.			
Agathosma W.			(Diosmaceae)		
acuminata W.	Cap. b. sp.	⊖ T.			
ciliata Lk.	"	⊖ T.			
hybrida B. et W.	"	⊖ T.			
laxa B. et W.	"	⊖ T.			
obtusata B. et W.	"	⊖ T.			
mollis B. et W.	"	⊖ T.			
tenuissima Otto	"	⊖ T.			
virgata B. et W.	"	⊖ T.			
Agave L.			(Agavaceae)		
americana L.	Amer. trop.	⊖ F.			
β. variegata.	"	"			
brachystachya Cav.	Mexico	⊖ T.			
geminiflora Brand.	Peruvia	⊖ T.			
lurida Ait.	Mexico	⊖ T.			
potatorum Zucc.	"	⊖ T.			
pulchra Zucc.	"	⊖ T.			
virginica L.	Amer. bor. aust.	⊖ F.			
yuccaefolia Red.	Mexico	⊖ T.			
Ageratum L.			(Synantheraceae)		
conyzoides L.	Inter trop.	⊙ CD.			
β. hirtum.	"	"			
mexicanum Sims.	Mexico	⊙ CD.			
Agraphis Lk.			(Liliaceae)		
campanulata Lk.	Hisp. Lusit.	⊖ DF.			
cernua Rchb.	"	⊖ DF.			
nutans Lk.	Eur. aust.	⊖ DF.			
β. alba.	"	"			
patula Rchb.	Eur. aust.	⊖ DF.			
Agrimonia Tourn.			(Sanguisorbaceae)		
cafra E. Mey.	Cap. b. sp.	⊖ F.			
dahurica W.	Ruthenia	⊖ D.			
Eupatorium L.	Europa	⊖ D.			
Agrimonia					
glabrata Spr.	Ruthenia	⊖ D.			
leucantha Kze.	Amer. bor. ?	⊖ D.			
odorata Camer.	Oriens	⊖ DF.			
parviflora Ait.	Amer. bor.	⊖ D.			
procera Wallr.	Europa	⊖ D.			
suaveolens Pursh.	Amer. bor.	⊖ D.			
Agropyrum P. B.			(Gramineae)		
acutum R. et S.	Eur. med.	⊖ D.			
angustifolium Schult.	Sibiria	⊖ D.			
caesium Presl.	Eur. med.	⊖ D.			
caninum P. B.	Europa	⊖ D.			
cristatum R. et S.	Eur. aust.-or.	⊖ D.			
dasyanthum Ledeb.	"	⊖ D.			
densiflorum R. et S.	Sibiria	⊖ D.			
desertorum Schult.	"	⊖ D.			
farcutum K.	Eur. aust.	⊖ D.			
firmum Prsl.	Eur. med.	⊖ D.			
giganteum R. et S.	Eur. aust.	⊖ D.			
glaucum R. et S.	Eur. med.	⊖ D.			
imbricatum R. et S.	Sibiria	⊖ D.			
junceum P. B.	Eur. aust.	⊖ D.			
litorale Rchb.	"	⊖ D.			
muricatum Schult.	Sibiria	⊖ D.			
obtusiflorum R. et S.	Eur. occ.	⊖ D.			
pectiniforme R. et S.	Tauria	⊖ D.			
pungens Prsl. ^{R. et S.}	Eur. aust.	⊖ D.			
repens P. B.	Europa	⊖ D.			
rigidum R. et S.	Eur. med.	⊖ D.			
rupestre Schult.	?	⊖ D.			
scirpeum Prsl.	Sicilia	⊖ FD.			
sibiricum R. et S.	Asia bor.	⊖ D.			
squarrosus Lk.	Aegyptus	⊙ D.			
variegatum R. et S.	Asia bor.	⊖ D.			
villosus Lk.	Eur. aust. Asia	⊙ D.			
Agrostemma L.			(Sileneae)		
Githago L.	Europa	⊙ D.			
β. nicaeensis	"	"			
Agrostis L.			(Gramineae)		
alba L.	Europa	⊖ D.			
β. coarctata Hoffm.	— γ. gigantea Roth.				
alpina Scop.	Alp. Subalp.	⊖ D. A.			
β. flavescens Host.	"	"			
canina L.	Europa	⊖ D.			
dispar Michx.	Amer. bor.	⊖ D.			
elegans Thore.	Gall. aust.	⊙ D.			
frondosa Ten.	Eur. aust.	⊖ DF.			
lachnantha N. E.	Cap. b. sp.	⊙ CD.			
laxiflora Richds.	Amer. bor.	⊙ D.			
pulchra Richds.	Amer. bor.	⊖ D.			
rubra L.	Europa	⊖ D.			
stolonifera L.	Europa	⊖ D.			
tenuiflora Engl.	Amer. bor. aust.	⊖ DF.			
vulgaris With.	Europa	⊖ D.			
(vide: Anemagrostis—Colpodium—Dactylagrostis—Sporobolus—Triplachne).					
Aichryson W. et B.			(Crassulaceae)		
aureum W. et B.	Canariae	⊖ T.			

Aichryson				Albica			
dichotomum W. et B.	Canariae	② T.		flaccida Jacq.	Cap b.sp.	② T.	
laxum W. et B.	"	② T.		longifolia Fisch.	"	② F.	
stellatum W. et B.	"	② T.		major L.	"	② F.	
tortuosum W. et B.	"	② T.		minor L.	"	② F.	
villosum K.	"	② T.		setosa Jacq.	"	② F.	
Ailanthus Desf. (<i>Xanthoxylineae</i> ?)				Alchemilla L. (<i>Sanguisorbaceae</i>)			
glandulosa Desf.	China	5 D.		alpina L.	Alpes	② D. A.	
Aira. L. (<i>Gramineae</i>)				Aphanes Lees.	Europa	② D.	
caryophyllea L.	Europa	② D.		fissa Schum.	Sud. Alp.	② D. A.	
elegans W.	Eur. aust.	② D.		montana W.	Europa	② D.	
flexuosa L.	Europa	② D.		pentaphylla L.	Alpes	② D. A.	
Lagascæ Kth.	Hispania	② D.		pubescens MB.	Caucasus	② D.	
pulchella W.	Eur. aust.	② D.		vulgaris L.	Europa	② D.	
(vide: Campella—Catabrosa—Koeleria—Poa).				" β . truncata Tausch — γ . glaber- rima — δ . hybrida Hoffm.			
Airochloa Lk. (<i>Gramineae</i>)				Aleuritia Duby. (<i>Primulaceae</i>)			
Barrelieri K.	Eur. aust.	② D.		cortusoides Spach.	Asia bor.	② D. A.	
cristata Lk.	Europa	② D.		farinosa Duby.	Subalpes	② D. A.	
dactyloides K.	Banatus	② D.		Hornemanniana K.	Laponia	② D. A.	
glauca K.	Europa	② D.		" β . labradorica.			
hirsuta Lk.	Helvetia	② D.		longiflora Spach.	Alpes	② D. A.	
setacea K.	Eur. aust.	② D.		scotica K.	Scotia	② D. A.	
valesiaca Lk.	Helvetia	② D.		Alfredia Cass. (<i>Synanthereae</i>)			
villosa Lk.	Eur. aust.	② D.		cernua Cass.	Asia bor.	② D.	
Ajax Salish. (<i>Amaryllideae</i>)				squarrosa K.	"	② D.	
bicolor Salish.	Eur. aust.	② DF.		Algarobia Benth. (<i>Mimosaceae</i>)			
Bulbocodium K.	Hisp. Lus.	② FD.		juliflora Benth.	Ind. occ.	② C.	
major Haw.	Gallia	② DF.		" β orthocarpa.			
moschatus Haw.	Hispania	② DF.		Alisma L. (<i>Alismaceae</i>)			
minor Haw.	"	② DF.		Plantago L.	Europa	② D. V.	
Pseudo-Narcissus Haw.	Eur. aust.	② D.		ranunculoides L.	"	② D. V.	
Telamonius Haw.	Hispania	② DF.		Allamanda L. (<i>Apocynaceae</i>)			
Ajuga L. (<i>Zabiatae</i>)				cathartica L.	Amer. trop.	② C.	
montana Rehb.	Europa	② D.		Alliaria Adans. (<i>Cruciferae</i>)			
" β . latifolia Host.				officinalis Andrz.	Europa	② D.	
orientalis L.	Oriens	② FD.		Allionia L. (<i>Nyctagineae</i>)			
pyramidalis L.	Europa	② D.		albida Walt.	Carol. Mexico	② DF.	
reptans L.	"	② D.		nyctaginea Michx.	Amer. bor.	② D.	
(vide Chamaepitys—Craniotome—Phleboanthe).				Allium L. (<i>Lillineae</i>)			
Aizoon L. (<i>Portulacaceae</i>)				acre Prsl.	Sicilia	② F.	
canariense L.	Afr. bor.	② CD.		acutangulum Schrad.	Europa	② D.	
hispanicum L.	Hispania	② CD.		albidum Fisch.	Ruth. aust.	② D.	
rigidum L. f.	Cap. b. sp.	② T.		Ampeloprasum L.	Europa	② D.	
Albersia Kunth. (<i>Amarantaceae</i>)				angulosum L.	Asia bor.	② D.	
Blitum K.	Europa	② D.		arenarium L.	Europa	② D.	
livida K.	Amer. bor.	aust.		arvense Guss.	Sicilia	② F.	
		② D.		ascalonicum L.	Oriens	② DF.	
oleracea Endl.	Ind. or.	② D.		asperum Don.	Europa	② D.	
polygonoides Endl.	"	② CD.		atropurpureum W. et K.	Hung. aust.	② DF.	
prostrata K.	Eur. aust.	② D.		atroviolaceum Horn.	"	② D.	
Albizia Duraz. (<i>Mimosaceae</i>)				azureum Led.	Altai	② DF.	
Julibrissin Benth.	Oriens	5 F.		carinatum L.	Europa	② D.	
Lebbek Benth.	Aegyptus	5 C.		caspium MB.	Astracan	② D.	
Lophantha Benth.	Nov. Holl.	5 F.		caucasicum MB.	Cauc. Iber.	② D.	
" β . coarctata.				Cepa L.	Asia med. ?	② DF.	
Albica L. (<i>Lillineae</i>)				cepaeforme Don.	Asia bor.	② DF.	
altissima Dry.	Cap b. sp.	② F.		ceratophyllum Bess.	Asia bor.	② D.	
fastigiata Thbg.	"	② F.		Chamaemoly L.	Eur. aust.	② DF.	

Allium

ciliatum Cyr.	Eur. aust.	2. DF.
" β . Clusianum Retz.		
Cyrilli Ten.	Neapol.	2. DF.
danubiale Spr.	Europa	2. D.
descendens L.	Eur. aust.	2. D.
elatum Spr.	?	2. D.
fallax Don.	Europa	2. D.
" β . montanum Schm., — γ . serotinum Schlei.		
fistulosum L.	Asia bor.	2. D.
" β . altaicum Pall. γ . tataricum.		
flavescens Bess.	Ruth. aust.	2. D.
flavidum Led.	Altai	2. DF.
flavum L.	Europ. aust.	2. D.
" β . ruthenicum Lang.		
flexum W. et K.	Europa	2. D.
foliosum Clar.	Gall. Helv.	2. D.
fuscum W. et K.	Hungaria	2. D.
glandulosum Lk. et O.	Mexico	2. D.
glaucum Schrad.	Siberia	2. D.
globosum MB.	Asia bor.	2. D.
graminifolium Loisl.	Corsica	2. DF.
guttatum Stev.	Eur. or.-aust.	2. D.
hymenorhizon Led.	Sibir. aust.	2. D.
illyricum Jacq.	Europ. aust.	2. DF.
inornatum H. Vind.	?	2. DF.
Ledebourianum Schult.	Siberia	2. D.
lineare L.	"	2. D.
longispathum Red.	Hungaria	2. D.
luteolum Moris	?	2. D.
Moly L.	Eur. aust.	2. D.
moschatum L.	"	2. DF.
multibulbosum Jacq.	Austria	2. D.
narcissiflorum Vill.	Eur. aust.	2. DF.
neapolitanum Cyr.	"	2. DF.
neglectum Wendr.	?	2. D.
nigrum L.	Eur. aust.	2. DF.
nutans L.	Asia bor.	2. D.
" β . tataricum.		
obliquum L.	"	2. D.
ochroleucum W. et K.	Eur. aust.	2. D.
odorum L.	Asia bor.	2. D.
" β . acuminatum.		
oleraceum L.	Europa	2. D.
Ophioscorodon Don.	Eur. aust.	2. D.
Pallasii Murr.	Asia bor.	2. D.
pallens L.	Eur. aust.	2. D.
" β . caucasicum.		
paniculatum L.	Eur. aust.	2. D.
paradoxum Don.	Asia bor.	2. D.
pendulinum Ten.	Italia	2. DF.
Porrum L.	Eur. aust.	2. D.
praescissum Rchb.	Asia bor.	2. D.
prostratum Trev.	"	2. D.
pulchellum Don.	Eur. aust.	2. D.
pussillum Cyr.	Sicilia	2. F.
roseum L.	Eur. aust.	2. DF.
" β . bulbiferum		
rotundum L.	Eur. med. aust.	2. D.

Allium

rubellum MB.	Asia bor.	2. D.
rubens Schrad.	"	2. D.
rupestre MB.	Taur. Cauc.	2. D.
sativum L.	Asia med.	2. D.
saxatile MB.	Eur. aust.-or.	2. D.
Schoenoprasum L.	Europa	2. D.
Scorodoprasum L.	"	2. D.
senescens L.	Asia bor.	2. D.
sibiricum L.	Eur. Sibir.	2. D.
sphaerocephalum L.	Europa	2. D.
Stellerianum W.	Asia bor.	2. D.
strictum Schrad.	Eur. med. Asia	2. D.
suaveolens Jacq.	"	2. D.
subhirsutum L.	Eur. aust. or.	2. F.
tataricum L.	Asia bor.	2. D.
tenuiflorum Ten.	Neap. Dalm.	2. FD.
tenuissimum L.	Altai	2. DF.
triquetrum L.	Eur. aust.	2. D.
ursinum L.	Europa	2. D.
vernale Ten.	Sicilia	2. F.
Victorialis L.	Alp. Sud.	2. D.
" β . longifolium.		
vineale L.	Europa	2. D.
(vide: Nothoscordium).		
Alloizonum Kze.	(<i>Synanthereae</i>)	
arctotideum Kze.	Cap. b. sp.	2. T.
Alloplectus Mart.	(<i>Gesneraceae</i>)	
coccineus Mart.	Brasilia	2. C.
Allosorus Bhd.	(<i>Polypodiaceae</i>)	
crispus Bhd.	Alp. Sud.	2. D.
(vide: Cheilanthes — (Pellaea).		
Alnus Tourn.	(<i>Betulaceae</i>)	
americana Lodd.	Amer. bor.	5 D.
autumnalis Lodd.	?	5 D.
cordifolia Ten.	Eur. aust.	5 D.
glutinosa L.	Europa	5 D.
" β . laciniata W. — γ . oxyacanthae folia.		
incana W.	Europa	5 D.
" β . laciniata Lodd.		
intermedia Schrad.	?	5 D.
serrulata W.	Amer. bor.	5 D.
Aloe Tourn.	(<i>Liliaceae</i>)	
acuminata Haw.	Cap. b. sp.	2. T.
africana Mill.	"	2. T.
altissima Schult.	"	2. T.
angustifolia Haw.	"	2. T.
arborescens Mill.	"	2. T.
aspera Haw.	"	2. T.
atrovirens DeC.	"	2. T.
attenuata Haw.	"	2. T.
barbadensis Mill.	Ind. occ. or.	2. T.
brevifolia Haw.	Cap. b. sp.	2. T.
candicans Schult.	"	2. T.
carinata Mill.	"	2. T.
ciliaris Haw.	"	2. T.
conspurcata Salm -D.	"	2. T.
crassifolia Schult.	"	2. T.
cymbaefolia Schrad.	"	2. T.

Aloë			Alopecurus L.		
depressa Haw.	Cap. b. sp.	4 T.	bulbosus L.	Eur. occ. - aust.	4 D.
distans Haw.	"	4 T.	creticus Trin.	Eur. aust. - or.	⊙ D.
echinata W.	"	4 T.	fulvus Sm.	Europa	4 D.
elongata Salm - D.	"	4 T.	geniculatus L.	"	4 D.
fasciata Salm - D.	"	4 T.	nigricans Horn.	Eur. or.	4 D.
glauca Mill.	"	4 T.	pratensis L.	Europa	4 D.
granata Schult.	"	4 T.	utriculatus Pers.	Eur. aust. - oc.	⊙ D.
humilis Lam.	"	4 T.	Aloysia Ori. (Verbenaceae)		
hybrida Salm - D.	"	4 T.	citriodora Ort.	Amer. aust.	4 T.
imbricata Haw.	"	4 T.	Alpinia L. (Zingiberaceae)		
incurva Haw.	"	4 T.	Allughas Rosc.	Ind. or.	4 C.
intermedia Haw.	"	4 T.	calcarata Rosc.	" "	4 C.
laetevirens Lk.	"	4 T.	nutans Rosc.	" "	4 C.
Lingua W.	"	4 T.	striata Lk.	Ind. occ.	4 C.
maculata Thbg.	"	4 T.	Alsine Whlb. (Alsineae)		
margaritifera Ait.	"	4 T.	austriaca Whlb.	Alpes	4 D. 4.
minor Schult.	"	4 T.	costata Fenzl.	Asia bor.	4. D. 4.
mitraeformis W.	"	4 T.	Gerardi Whlb.	Alpes	4 D. 4.
nigricans Haw.	"	4 T.	Helmii Fzl.	Ural	4 D. 4.
paniculata Jacq.	"	4 T.	laricifolia Crtz.	Alpes	4 D. 4.
parva Schult.	"	4 T.	molluginea Lag.	Mexico	⊙ D.
parvipunctata Salm - D.	"	4 T.	procumbens Fzl.	Afr. bor.	4 T.
pentagona Haw.	"	4 T.	saxatilis Whlb.	Alpes	4. D. 4.
plicatilis Mill.	"	4 T.	stricta Whlb.	Europa	4 D. 4.
prolifera Haw.	"	4 T.	tenuifolia Crtz.	Europa	⊙ D.
pulchra Jacq.	"	4 T.	verna Bartl.	"	4 D.
purpurascens Haw.	"	4 T.	Astroemeria L. (Amaryllidaceae)		
Radula Jacq.	"	4 T.	acutifolia Lk. et O.	Mexico	4 T.
recurva Haw.	"	4 T.	aurantiaca Swet.	Chili	4 F.
Reinwardti Salm - D.	"	4 T.	aurea Grah.	"	4 F.
retusa L.	"	4 T.	formosissima R. et P.	Peruvia	4 T.
rigida DeC.	"	4 T.	hirtella Kunth.	Mexico	4 F.
" β. expansa Haw.	"	4 T.	Ligtu L.	Chili	4 F.
rugosa Salm - D.	"	4 T.	oculata Lodd.	"	4 F.
Saponaria Haw.	"	4 T.	Pelegrina L.	Peru, Chili	4 F.
scabra Schult.	"	4 T.	psittacina Lehm.	Bras. aust.	4 F.
Serra DeC.	"	4 T.	Simsii Spr.	Chili	4 T.
soccotrina Lam.	Arab. Afr.	4 T.	Alternanthera Forsk. (Amarantaceae)		
spiralis Haw.	Cap. b. sp.	4 T.	Achyrantha R. Br.	Amer. aust.	⊙ CD.
spirella Haw.	"	4 T.	echinata Bert.	" "	⊙ CD.
subcarinata Salm - D.	"	4 T.	diffusa H. Ber.	" "	⊙ CD.
subnigricans Spr.	"	4 T.	filiformis Schrad.	" ?	⊙ CD.
subverrucosa Salm - D.	"	4 T.	sessilis R. Br.	Asia trop.	⊙ CD.
subvirgida Schult.	"	4 T.	spinosa Schult.	Amer. tr.	⊙ CD.
tenuior Haw.	"	4 T.	Althaea L. (Malvaceae)		
tessulata Schult.	"	4 T.	armeniaca Ten.	Oriens	4 D.
tuberculata Haw.	"	4 T.	cannabina L.	Eur. aust.	4 D.
turgida Schult.	"	4 T.	cretica Weinm.	" "	② F. D.
variegata L.	"	4 T.	ficifolia Cav.	Eur. or. aust.	Asia
verrucosa Ait.	"	4 T.	"	"	② D.
virens Haw.	"	4 T.	" β. pallida	"	"
viscosa L.	"	4 T.	Froloviana Fisch.	Sibir. aust.	② D.
Alonsoa R. et P.	(Scrophulariaceae)	4 T.	hirsuta L.	Eur. aust.	⊙ D.
incisifolia R. et P.	Chili	4 T.	leucantha Ehrbg.	Oriens	② DF.
" β. grandiflora.	"	4 T.	narbonensis Pourr.	Eur. occ. aust.	4 D.
linearis R. et P.	Peruvia	4 T.	officinalis L.	Europa	4 D.
parviflora Steudl.	Amer. aust.	4 T.	pallida W. et K.	Eur. or. aust.	② D.
Alopecurus L.	(Gramineae)	4 T.	rosea Cav.	Oriens	② D.
agrestis L.	Eur. Asia	⊙ D.	" β. sinensis Cav.	"	"

Althaea			Amaryllis		
striata DeC.	Arabia	¶ T.	miniata R. et P.	Peruvia	¶ C.
taurinensis DeC.	Eur. aust.	¶ D.	phoenicea Swt.	Hybr.	¶ C.
Alyssum L.	(Cruciferae)		psittacina Ker.	Brasilia	¶ C.
campestre L.	Eur. aust.	⊙ D.	Principis Salm-D.	"	¶ C.
confertum Lk.	Asia bor.	⊙ D.	Reginae L.	Amer. trop.	¶ C.
hirsutum MB.	Taur. Cauc.	⊙ D.	rutila Ker.	Brasilia	¶ C.
micranthum C. A. Mey.	" "	⊙ D.	speciosa Hort.	Hybr.	¶ C.
micropetalum Fisch.	" "	⊙ D.	stenopetala H. Belg.	Hybr.	¶ C.
minimum W.	Eur. or.	⊙ D.	vittata Ait.	Peruvia	¶ C.
montanum L.	Europa	¶ D.	(vide Ammocharis - Belladonna - Brunswigia - Crinum - Habranthus - Lycoris - Nerine - Sprekelia - Vallota - Zephyranthes)		
rostratum Stev.	Eur. or.-aust.	⊙ D.	Ambrosia Adans.	(Synanthereae)	
umbellatum Swt.	Tauria	⊙ D.	Lippii DeC.	Aegypt. Arab.	⊙ D.
Wierzbickii Heuff.	Hungaria	⊙ D.	moschata DeC.	Oriens	⊙ D.
(vide Aurinia - Koniga - Odontarrhena Psilonema).			muricata DeC.	Hispania	⊙ D.
Alyxia Banks.	(Apocyniae)		odorata DeC.	Oriens	⊙ D.
ruscifolia RBr.	Nov. Holl.	¶ T.	Amblyocarpum F. et M.	(Synanthereae)	
Amalias Hoffg.	(Orchideae)		inuloides F. et M.	Caspia	⊙ D. F.
aurantiaca K.	Mexico	¶ C.	Ambrina Spach.	(Chenopodiaceae)	
Amaracus Mönch.	(Labiales)		ambrosioides Spach.	Amer. Eur.	⊙ D.
Dictamnus Benth.	Creta	¶ F.	anthelmintica Spach.	Amer.	⊙ F. D.
Amarantus L.	(Amarantaceae)		chilensis Spach.	Chili	⊙ F. D.
albus L.	Amer. bor.	⊙ D.	Ambrosia Tourn.	(Synanthereae)	
angustifolius MB.	Oriens	⊙ D.	artemisiaefolia L.	Am. bor.-au.	⊙ D.
bahiensis Schrad.	Brasilia	⊙ D.	maritima L.	Eur. aust.	⊙ D.
bicolor Noce.	Ind. or.	⊙ CD.	trifida L.	Amer. bor.	⊙ D.
caudatus L.	Asia med. au.	⊙ D.	Ambrosinia Bass.	(Asteraceae)	
" β. viridis.			Bassii L.	Sicil. Afr.	¶ T.
chlorostachys W.	Ind. or.	⊙ D.	Amelanchier Med.	(Pomaceae)	
cruentus L.	China	⊙ D.	canadensis Med.	Amer. bor.	¶ D.
curvifolius Hab.	Caucasia	⊙ D.	ovalis DeC.	" "	¶ D.
flavus L.	Ind. or.	⊙ D.	sanguinea DeC.	" "	¶ D.
gangeticus L.	"	⊙ D.	vulgaris Mönch.	Europa	¶ D.
gracilis Poir.	Guinea	⊙ D.	Amellus L.	(Synanthereae)	
gracizans L.	Virginia	⊙ D.	Lychnitis L.	Cap. b. sp.	¶ T.
hybridus L.	"	⊙ D.	Amethystea L.	(Labiales)	
inamoenus W.	Ind. or.	⊙ D.	coerulea L.	Asia bor.	⊙ D.
laetus W.	Italia	⊙ D.	Amicia Kth.	(Papilionaceae)	
paniculatus L.	Am. bor.-au.	⊙ D.	Zygomeris DeC.	Mexico	¶ FD)
retroflexus L.	Eur. med.	⊙ D.	Ammania Houst.	(Lythrineae)	
rigidus Hab.	?	⊙ D.	caspica MB.	Ruth. aust. or.	⊙ D.
sanguineus L.	Ind. occ.	⊙ D.	diffusa W.	Ind. or.	⊙ C.
speciosus Ker.	Nepalia	⊙ D.	hyrcanica Fisch.	Persia	⊙ D.
spinosus L.	Ind. occ.	⊙ D.	multiflora Roxb.	Ind. or.	⊙ C.
strictus W.	?	⊙ D.	purpurea Lam.	Am. bor.-au.	⊙ D.
sylvestris Desf.	Eur. aust.	⊙ D.	ramosior L.	"	⊙ D.
tortuosus Horn.	?	⊙ D.	sanguinolenta Sw.	Ind. occ.	⊙ C.
tricolor L.	Ind. or.	⊙ CD.	senegalensis Lam.	Afr. med.	⊙ C.
tristis L.	" "	⊙ D.	stylosa F. et M.	Louisiana	⊙ D.
viridis L.	Am. med. au.	⊙ D.	Wormskioeldii Lk.	Brasilia	⊙ C.
(vide : Albersia).			Ammi Tourn.	(Umbelliferae)	
Amaryllis L.	(Amaryllideae)		majus L.	Eur. au. As. Af.	⊙ D.
acuminata Ker.	Amer. aust.	¶ C.	" β Boeberi Höcq.	" " " ② FD.	
aulica Ker.	Brasilia	¶ C.	Ammobium RBr.	(Synanthereae)	
coccinea Swt.	Hybr.	¶ C.	alatum RBr.	Nov. Holl.	¶ F.
equestris Act.	Amer. trop.	¶ C.	Ammocharis Herb.	(Amaryllideae)	
eximia Herb.	Hybr.	¶ C.	coranica Herb.	Afr. aust.	¶ C.
Gravinae Melaz.	"	¶ C.			
Johnsoni Swt.	"	¶ C.			

<i>Ammocharis</i>			
<i>falcata</i> Herb.	Afr. aust.	⊕ C.	
<i>Ammophila</i> Host.		(Gramineae)	
<i>arenaria</i> Lk.	Europa	⊕ D.	
<i>Amomum</i> L.		(Zingiberaceae)	
<i>Alzelii</i> Rosc.	Afr. trop.	⊕ C.	
<i>Cardamomum</i> L.	Ind. or.	⊕ C.	
<i>Amorpha</i> L.		(Papilionaceae)	
<i>elata</i> Hayn.	Amer. bor.	⊕ D.	
<i>fruticosa</i> L.	" "	⊕ D.	
<i>glabra</i> Desf.	" "	⊕ D.	
<i>humilis</i> Tausch	" "	⊕ D.	
<i>Lewisii</i> Lodd.	" "	⊕ D.	
<i>pumila</i> Mchx.	" "	⊕ D.	
<i>Amorphophallus</i> Bl.		(Arineae)	
<i>bulbifer</i> Bl.	Ind. or.	⊕ C.	
<i>campanulatus</i> Bl.	" "	⊕ C.	
<i>Ampelodesmos</i> Lk.		(Gramineae)	
<i>tenax</i> Lk.	Afr. bor.	⊕ F.	
<i>Ampelopsis</i> Mchx.		(Ampelidae)	
<i>bipinnata</i> Mchx.	Carol. Virg.	⊕ DF.	
<i>cordata</i> Mchx.	Amer. bor.	⊕ D.	
<i>hederacea</i> Mchx.	" "	⊕ D.	
<i>hirsuta</i> Don.	" "	⊕ D.	
<i>Amphicarpaea</i> Ell.		(Papilionaceae)	
<i>monica</i> Nutt.	Amer. bor.	⊙ D.	
<i>Amphicome</i> Royle.		(Bignoniaceae)	
<i>arguta</i> Royle.	Himalaya	⊕ F.	
<i>Amphilophium</i> Kth.		(Bignoniaceae)	
<i>paniculatum</i> Kth.	Amer. trop.	⊕ F.	
<i>Amsinkia</i> Lehm.		(Boraginaceae)	
<i>angustifolia</i> Lehm.	Chili	⊙ D.	
<i>intermedia</i> F. et F.	Nov. Calif.	⊙ D.	
<i>lycopoides</i> Lehm.	Chili	⊙ D.	
<i>spectabilis</i> F. et M.	Nov. Calif.	⊙ D.	
<i>Amsonia</i> Walt.		(Apocynaceae)	
<i>angustifolia</i> Mchx.	Amer. bor.	⊕ D.	
<i>latifolia</i> Mchx.	Am. bor. - aust.	⊕ D.	
<i>salicifolia</i> Pursh	" "	⊕ D.	
<i>Amygdalus</i> Tourn.		(Amygdalineae)	
<i>campestris</i> Bess.	Podolia	⊕ D.	
<i>communis</i> L.	Oriens, Afr.	⊕ DF.	
<i>β. amara</i>	— <i>γ. flore pleno.</i>		
<i>georgica</i> Desf.	Oriens	⊕ DF.	
<i>nana</i> L.	Ruth. au. Or.	⊕ D.	
<i>pedunculata</i> Pall.	Sibir. aust.	⊕ D.	
<i>pumila</i> L.	?	⊕ DF.	
<i>β. flore pleno.</i>			
<i>sibirica</i> Lodd.	Asia bor.	⊕ D.	
<i>Amyris</i> L.		(Amyrideae)	
<i>maritima</i> L.	Amer. trop.	⊕ C.	
<i>Anacampseros</i> L.		(Portulacaceae)	
<i>arachnoides</i> Sims.	Cap. b. sp.	⊕ T.	
<i>filamentosa</i> Sims.	" "	⊕ T.	
<i>Telephium</i> DeC.	" "	⊕ T.	
<i>Anacyclus</i> L.		(Synanthereae)	
<i>clavatus</i> P.	Sicil. Afr.	⊙ D.	
<i>β. discoideus.</i>			
<i>officinarum</i> Hayn.	Eur. or. - aust.	⊙ D.	
<i>Pyrethrum</i> DeC.	As. m. Afr. b.	⊕ DF.	
<i>radiatus</i> Loisl.	Eur. aust.	⊙ D.	
<i>Anacyclus</i>			
<i>tomentosus</i> DeC.	Eur. aust.	⊙ D.	
<i>valentinus</i> L.	Gall. Hisp.	⊙ D.	
<i>β. purpurascens.</i>			
<i>Anagallis</i> L.		(Primulaceae)	
<i>coerulea</i> Schreb.	Europa	⊙ D.	
<i>collina</i> Schousb.	Afr. bor.	⊕ F.	
<i>β. speciosa.</i>			
<i>indica</i> Wight.	Nepalia	⊙ D.	
<i>latifolia</i> L.	Eur. aust.	⊙ D.	
<i>phoenicea</i> Lam.	Europa	⊙ D.	
<i>β. carnea.</i>			
<i>Anagyris</i> L.		(Papilionaceae)	
<i>foetida</i> L.	Eur. aust.	⊕ FD.	
<i>latifolia</i> Brouss.	Teneriffa	⊕ F.	
<i>neapolitana</i> Ten.	Neapolis	⊕ F.	
<i>Ananassa</i> Tourn.		(Bromeliaceae)	
<i>bracteata</i> Lindl.	Amer. trop.	⊕ C.	
<i>debilis</i> Lindl.	" "	⊕ C.	
<i>lucida</i> Mill.	" "	⊕ C.	
<i>sativa</i> Mill.	" "	⊕ C.	
<i>β. viridis</i> Mill.			
<i>semiserrata</i> Schult.	" "	⊕ C.	
<i>Anandria</i> Siegesb.		(Synanthereae)	
<i>discoidea</i> Less.	Asia bor.	⊕ D.J.	
<i>radiata</i> Less.	" "	⊕ D.J.	
<i>Anarrhinum</i> Desf.		(Scrophulariaceae)	
<i>bellidifolium</i> W.	Eur. occ.	⊕ DF.	
<i>pubescens</i> Fres.	Arabia	⊕ T.	
<i>Anastatica</i> Gaertn.		(Cruciferae)	
<i>hierochuntica</i> L.	Oriens	⊙ CD.	
<i>Anaxeton</i> Gaertn.		(Synanthereae)	
<i>arborescens</i> Gaertn.	Cap. b. sp.	⊕ T.	
<i>Anchusa</i> L.		(Borragineae)	
<i>aethera</i> Tausch	?	⊕ D.	
<i>Agardhii</i> Lehm.	Sibiria	⊕ D.	
<i>altissima</i> Desf.	Gallia ?	⊕ D.	
<i>arvalis</i> Rehb.	Europa	⊕ D.	
<i>Barrelieri</i> Gmel.	Eur. aust.	⊕ DF.	
<i>capensis</i> Thbg.	Cap. b. sp.	⊕ FD.	
<i>hybrida</i> Ten.	Italia	⊕ D.	
<i>leptophylla</i> R. et S.	Eur. aust.	⊕ D.	
<i>lycopoides</i> Bess.	Eur. or.	⊕ D.	
<i>Milleri</i> W.	Oriens	⊕ D.	
<i>officinalis</i> L.	Europa	⊕ D.	
<i>β. alba</i> — <i>γ. coelestis</i> — <i>δ. incarnata.</i>			
<i>procera</i> Bess.	Eur. or.	⊕ D.	
<i>stylosa</i> M. B.	Tauria	⊕ D.	
<i>undulata</i> L.	Eur. aust.	⊕ D.	
(vide: Buglossum — Caryoloph — Lycopsis — Nonea).			
<i>Ancistrum</i> , vide: <i>Acaena</i> .			
<i>Andersonia</i> R. Br.		(Epacrideae)	
<i>sprengelioides</i> R. Br.	Nov. Holl.	⊕ T.	
<i>Andrachne</i> L.		(Euphorbiaceae)	
<i>telephoides</i> L.	Eur. aust. Or.	⊕ FD.	
<i>Andrographis</i> Wall.		(Acanthaceae)	
<i>paniculata</i> N. E.	Ind. or.	⊕ C.	
<i>Andromeda</i> L.		(Ericaceae)	
<i>polifolia</i> L.	Eur. As. Am.	⊕ DF.	

- (vide: Cassandra — Leucothoe — Lyonia — Zenobia).
- Andropogon** L. (*Gramineae*)
 argenteus DeC. Mexico, Peru ④ T.
 distachyos L. Eur. aust. ④ FD.
 hirtus L. " " ④ FD.
 Ischaemum L. Europa ④ D.
 nutans L. Am. bor.-au. ④ FD.
 provincialis Lam. Gall. aust. ④ FD.
 Schoenanthus L. Asia austr. ④ C.
Androsace Tourn. (*Primulaceae*)
 alismoides Horn. Asia bor. ④ D.J.
 elongata L. Europa ④ D.
 filiformis Retz. Asia bor. ② D.J.
 lactiflora Fisch. " " ④ D.J.
 macrocarpa Ledb. " " ② D.J.
 maxima L. Eur.med.au. ④ D.
 obtusifolia All. Alp. Sud. ④ D.J.
 septentrionalis L. Europa ④ D.
Androsaceum Tourn. (*Hypericaceae*)
 hircinum Spach. Eur. aust. ④ DF.
 officinale All. ④ DF.
 parviflorum Spach. Amer. bor. ④ DF.
 pyramidale Spach. " " ④ DF.
Andryala L. (*Synanthereae*)
 candidissima Desf. Canariae ② FD.
 cheiranthifolia L'Her. " ② FD.
 integrifolia L. Eur. aust. ② FD.
 nigricans Poir. Afr. bor. ② FD.
 pinnatifida Ait. Canariae ② FD.
 ragusina L. Eur. aust. ② FD.
Aneimia Sw. (*Aneimiaceae*)
 collina Radd. Brasilia ④ C.
 densa Lk. " ④ C.
 laciniata Lk. " ④ C.
 Phyllitidis Sw. Amer. trop. ④ C.
Anemagrostis Trin. (*Gramineae*)
 spica venti Trin. Europa ④ D.
Anemone Tourn. (*Ranunculaceae*)
 alba Juss. Asia bor. ④ D.
 apennina L. Eur. aust. ④ D.J.
 coronaria L. " " ④ FD.
 " β. chinensis. " " ④ FD.
 multifida Poir. Am. arct. Pat. ④ D.
 narcissiflora L. Alp. Subalp. ④ D.J.
 nemorosa L. Europa ④ D.
 " β. fl. pleno. " " ④ D.
 pensylvanica L. Amer. bor. ④ D.
 ranunculoides L. Europa ④ D.
 stellata Lam. Eur. aust. ④ DF.
 sibirica L. Asia bor. ④ D.J.
 sylvestris L. Europa ④ D.
 " β. grandiflora. " " ④ D.
 trifolia L. Eur. aust. ④ D.J.
 virginica L. Amer. bor. ④ D.
 vitifolia Buchan. Nepalia ④ FD.
 (vide: Hepatica — Pulsatilla).
- Anethum** Tourn. (*Umbelliferae*)
 graveolens L. Eur. aust. Or. ④ D.
 Sowa Roxb. Ind. or. ④ CD.
- Angelica** Tourn. (*Umbelliferae*)
 atropurpurea L. Amer. bor. ② D.
 montana Schlei. Alpes ② D.J.
 sylvestris L. Europa ② D.
 (vide: Archangelica).
- Angelonia** H. et B. (*Scrophulariaceae*)
 floribunda Kze. Am. aust. ④ ⑤ C.
 Gardneri Hook. Brasilia ④ ⑤ C.
 salicariaefolia H. et B. " ④ ⑤ C.
Angraecum Thouars. (*Orchideae*)
 maculatum Lindl. Brasilia ④ C.
Anigosanthus Lab. (*Haemodoriaceae*)
 flavida Red. Nov. Holl. ④ F.
Anisanthus Swt. (*Iridaceae*)
 Cunonia Swt. Cap. b. sp. ④ T.
Anisoderis Cass. (*Synanthereae*)
 Candollei K. Eur.med.au. ④ D.
 foetida Cass. Europa ④ D.
 graveolens K. Eur. aust. ④ D.
 rhoeadifolia F. et M. Eur. or. aust. ④ D.
 rubra Cass. Eur. aust. ④ D.
Anisodus Link. (*Solanaceae*)
 luridus Lk. et O. Nepalia ④ D.
Anisotolus Bhd. (*Papilionaceae*)
 anthylloides Bhd. Chili ④ CD.
 Wrangelianus Bhd. Nov. Calif. ④ D.
Anodia Pav. (*Malvaceae*)
 acerifolia DeC. Mexico ④ CD.
 brachyantha Rchb. " ④ D.
 crenatiflora Ort. " ④ CD.
 Dilleniana Cav. " ④ D.
 hastata Cav. " ④ D.
 triloba Cav. " ④ D.
Anogramma Lk. (*Polypodiaceae*)
 chaerophylla Lk. Amer. trop. ④ C.
 leptophylla Lk. Eur. aust. ④ F.
Anomatheca Ker. (*Iridaceae*)
 cruenta Lindl. Cap. b. sp. ④ FD.
 juncea Ker. " ④ FD.
 venusta Booth " ④ FD.
 xanthospila Ker. " ④ FD.
Anona L. (*Anonaceae*)
 Cherimolia Lam. Peruvia ⑤ C.
 muricata L. Amer. trop. ⑤ C.
Antennaria RBr. (*Synanthereae*)
 dioica RBr. Europa ④ D.
 margaritacea RBr. Amer. bor. ④ D.
 plantaginea RBr. " " ④ D.
 triplinervis Sims Nepalia ④ F.
Anthemis L. (*Synanthereae*)
 altissima L. Eur. aust. ④ D.
 " β. iberica. " " ④ D.
 arvensis L. Europa ④ D.
 aurea DeC. Eur. aust. ④ D.
 austriaca Jacq. Eur. or. ④ D.
 fruticulosa M. B. Caucasus ④ DF.
 maritima L. Eur. aust. ④ DF.
 Melampodia Del. Aeg. Graec. ④ D.
 Micheliana Bert. Eur. aust. ④ D.
 nobilis L. Eur. occ. aust. ④ D.

- Anthemis**
 ▲parthenioides Bhd. ? 2 DF.
 ▲peregrina L. Eur. aust. ② D.
 ▲retusa DeC. Aegyptus ② D.
 ▲rigescens W. Caucasus 2 D.
 ▲ruthenica M. B. Eur. or. ② D.
 ▲secundiramea Biv. Sicil. Aeg. ② D.
 ▲tinctoria L. Europa 2 D.
 ▲" β. pallida.
 ▲Triumfetti DeC. Eur. aust. ② D.
 ▲Wiedemanniana F. et M. Oriens ② D.
 (vide: Anacyclus — Maruta — Ormenis — Pyrethrum).
Anthephora Schreb. (Gramineae)
 ▲elegans Schreb. Ind. occ. ② C.
 ▲villosa Spr. " " ② C.
Anthericum L. (Liliaceae)
 ▲graminifolium W. Cap. b. sp. 2 F.
 ▲Liliago L. Europa 2 D.
 ▲ramosum L. " 2 D.
 ▲" β. latifolium.
 (vide: Bulbine — Hartwegia — Lloydia — Ornithogalum).
Anthocercis Lab. (Scrophulariaceae)
 ▲floribunda H. Belg. Nov. Holl. 2 T.
 ▲litorea R. Br. " " 2 T.
 ▲viscosa R. Br. " " 2 T.
Antholyza L. (Iridaceae)
 ▲aethiopica L. Cap. b. sp. 2 F.
 ▲bicolor Gasp. 2 F.
 (vide: Anisanthus — Gladiolus).
Anthospermum L. (Rubiaceae)
 ▲aethiopicum L. Cap. b. sp. 2 T.
Anthoxanthum L. (Gramineae)
 ▲amarum Brot. Lusit. Hisp. 2 DF.
 ▲gracile Biv. Sicil. Sard. ② D.
 ▲odoratum L. Europa 2 D.
 ▲ovatum Lag. Hispania ② D.
Anthriscus Hoffm. (Umbelliferae)
 ▲Cerefolium L. Eur. med. au. ② D.
 ▲Cicutaria Dub. Eur. occ. 2 D.
 ▲fumarioides Spr. Eur. or. au. ② D.
 ▲Hladnikianus K. Carnia ② D.
 ▲sylvestris Hoffm. Europa 2 D.
 ▲torquata Dub. Eur. occ. 2 D.
 ▲trichosperma Schult. Eur. or. au. ② D.
 ▲tuberculata Schult. ? 2 D.
 ▲vulgaris Pers. Europa ② D.
 (vide: Physocaulis).
Anthurium Schott. (Araceae)
 ▲acule Swt. Ind. or. 2 C.
 ▲crasinervium Schott. Amer. trop. 2 C.
 ▲digitatum Swt. " " 2 C.
 ▲longifolium Swt. " " 2 C.
 ▲macropodium K. " " 2 C.
 ▲reflexum Swt. " " 2 C.
 ▲undatum Schott. " " 2 C.
 ▲violaceum Schott. " " 2 C.
 ▲Willdenowii Kth. " " 2 C.
Anthyllis L. (Papilionaceae)
Anthyllis
 ▲Barba Jovis L. Eur. aust. 2 F.
 ▲bicolor Ten. " " 2 DF.
 ▲Dillenii Schult. Eur. m. au. 2 D.
 ▲Hermania L. Eur. aust. 2 F.
 ▲macrocephala Wend. Europa 2 D.
 ▲montana L. Eur. m. au. 2 DF.
 ▲polyphylla Kit. Eur. or. au. 2 DF.
 ▲Vulneraria L. Europa 2 D.
 ▲" β. alpestris.
 (vide: Cornicina — Tripodion).
Antidesma L. (Antidesmaceae)
 ▲alexiterium L. Ind. or. 2 C.
Antirrhinum Tourn. (Scrophulariaceae)
 ▲angustifolium D'Urv. Neap. Sicil. 2 F.
 ▲calycinum Vent. Lusit. Hisp. ② D.
 ▲latifolium Mill. Eur. or. aust. 2 D.
 ▲majus L. Eur. med. au. 2 D.
 ▲" β. bicolor — γ. caryophylloides —
 δ. fl. pleno et al. variet.
 ▲montevidense Lk. Amer. aust. 2 F.
 ▲" β. fl. pleno.
 ▲Orontium L. Europa ② D.
 ▲siculum Nor. Neap. Sicil. 2 F.
 (vide: Asarina — Linaria).
Anurus E. Mey. (Papilionaceae)
 ▲Nissolia E. Mey. Eur. aust. ② D.
Anychia Mchx. (Paronychiaceae)
 ▲capillacea DeC. Amer. bor. ② D.
 ▲dichotoma Mchx. " " ② D.
Apalochlamys Cass. (Synanthereae)
 ▲Kerii DeC. Nov. Holl. 2 F.
Aphelandra RBr. (Acanthaceae)
 ▲cristata RBr. Ind. occ. 2 C.
Aphyllanthes Tourn. (Aphyllanthaceae)
 ▲monspeliensis L. Eur. aust. 2 F.
Apios Boerh. (Papilionaceae)
 ▲tuberosa Mönch. Amer. bor. 2 D.
Apium Hoffm. (Umbelliferae)
 ▲graveolens L. Europa ② DF.
 ▲" β. scabrum Kze. Chili ② DF.
Apocynum L. (Apocynaceae)
 ▲androsaemifolium L. Amer. bor. 2 D.
 ▲cannabinum L. " " 2 D.
 ▲hypericifolium L. " " 2 D.
 ▲pubescens Mitch. " " 2 D.
Aponogeton Thbg. (Saururineae)
 ▲distachys Ait. Afr. aust. 2 T.
Aposeris Neck. (Synanthereae)
 ▲foetida Less. Alpes 2 D. A.
Apteranthes Mik. (Asclepiadaceae)
 ▲Gussoneana Mik. Lampedusa 2 T.
Aquilegia Tourn. (Ranunculaceae)
 ▲alpina L. Helv. Ped. 2 D. A.
 ▲atrata Koch. Alpes 2 D. A.
 ▲atropurpurea W. Sibiria 2 D.
 ▲" β. davurica Patr.
 ▲canadensis L. Amer. bor. 2 D.
 ▲" β. elatior Hab. — γ. hybrida.
 ▲glandulosa Fisch. Sibir. aust. 2 D. A.

Aquilegia

- glandulosa β . discolor. Altai q D.J.
 - grandiflora Patr. Sibiria q D.J.
 - hybrida Sims. " q D.J.
 - jucunda F. et M. " q D.J.
 - leptoceras F. et M. " q D.J.
 - parviflora Ledb. " q D.J.
 - pyrenaica DeC. Pyr. Apen. q D.J.
 - sibirica Lam. Sibir. aust. q D.J.
 - viridiflora Pall. " " q D.
 - vulgaris L. Europa q D.
 - " β . platysepala Rchb. — γ . nivea Baumg. — δ . corniculata — ϵ . stellata.
- Arabidopsis** Tausch. (*Saxifragaceae*)
- stellaris K. Alpes q D.J.
- Arabis** L. (*Cruciferae*)
- alba Stev. Caucasus q D.
 - Allionii DeC. Pedemont. q D.J.
 - alpina L. Alp. Sud. q D.J.
 - arenosa Scop. Eur. med. q D.
 - auriculata Lam. Eur. med. au. q D.
 - " β . recta Vill. Alpes q D.J.
 - bellidifolia Jacq. Alpes q D.J.
 - borealis Andr. Camtschat. q D.J.
 - brassicaeformis Walr. Eur. med. q D.J.
 - canescens Broch. Italia q D.
 - ciliata R. Br. Alpes q D.J.
 - coerulea Wulf. " q D.J.
 - collina Ten. Neapolis q D.F.
 - conferta W. Europa q D.
 - Crantziana Ehrh. Eur. med. q D.J.
 - " β . runcinata Lam. Alpes q D.J.
 - crispata W. Eur. bor. q D.J.
 - curtisiliqua DeC. Amer. bor. q D.J.
 - declinata Schrad. " q D.J.
 - fruticulosa C. A. Mey. Altai q D.J.
 - Gerardi Bess. Eur. med. q D.
 - Halleri L. " " q D.J.
 - heteromalla Schrad. Am. bor. q D.J.
 - hirsuta Scop. Europa q D.
 - " β . glaberrima Whlb. Sibir. au. q D.J.
 - incarnata Pall. Am. bor. q D.J.
 - lilacina Schrad. Am. bor. q D.J.
 - lucida L. f. Alpes q D.J.
 - Ludoviciana F. et M. Am. bor. q D.
 - lyrata L. " " q D.J.
 - muralis Bert. Eur. aust. q D.F.
 - oblongata Wend. Am. bor. q D.J.
 - ovirensis Wulf. Alpes q D.J.
 - oxyota DeC. Sibiria q D.J.
 - Patriniana DeC. " q D.J.
 - pendula L. Ruth. Asia bor. q D.J.
 - procurrens W. et K. Banatus q D.F.
 - pubescens Poir. Afr. bor. q D.F.
 - pumila Wulf. Alpes q D.J.
 - rosea DeC. Neapolis q D.F.
 - sagittata Bert. Europa q D.
 - saxatilis All. Alp. occ. au. q D.J.
 - serpyllifolia Vill. " " " q D.J.
 - Stelleri DeC. Camtschat. q D.J.

Arabis

- stenopetala W. ? q D.
 - stricta Huds. Eur. occ. q D.J.
 - Turrita L. Eur. aust. q D.F.
 - verna R. Br. " " q D.
- Aralia** Tourn. (*Araliaceae*)
- japonica Thbg. Japonia q D.F.
 - racemosa L. Amer. bor. q D.
 - spinosa L. Am. bor. au. q D.F.
- Araucaria** Juss. (*Abietineae*)
- brasiliensis Lamb. Bras. aust. q D.
- Araucaria** Brot. (*Asclepiadaceae*)
- albens G. Don. Brasilia q C.
- Arbutus** Tourn. (*Ericaceae*)
- Andrachne L. Eur. aust. q F.
 - pilosa Grah. Mexico q F.
 - Unedo L. Eur. aust. q D.F.
 - (vide: Pernettya).
- Archangelica** Hoffm. (*Umbelliferae*)
- decurrens Ledb. Asia bor. q D.
 - officinalis Hoffm. Europa q D.
- Arctotheca** Wendl. (*Synanthereae*)
- grandiflora Schrad. Cap. b. sp. q T.
 - repens Wendl. " q T.
- Arctotis** L. (*Synanthereae*)
- adpressa DeC. Cap. b. sp. q T.
 - angustifolia L. " q T.
 - aspera L. " q T.
 - (vide: Cryptostemma).
- Ardisia** Swt. (*Ardisiaceae*)
- crenulata Vent. Ind. occ. q C.
 - odontophylla Wall. Ind. or. q C.
 - solanacea Roxb. " q C.
- Arduina** L. (*Apocynaceae*)
- bispinosa L. Cap. b. sp. q T.
- Aremonia** Neck. (*Sanguisorbaceae*)
- agrimonoides DeC. Eur. aust. q D.F.
- Arenaria** L. (*Alsineae*)
- balearica L. Balear. Cors. q F.
 - grandiflora L. Alpes q D.J.
 - hispida L. Gall. aust. q F.
 - montana L. Hispania q D.F.
 - multicaulis Wulf. Alpes q D.J.
 - serpyllifolia L. Europa q D.
 - " β . sphaerocarpa. Gallia q D.F.
 - triflora L. " q D.F.
 - (vide: Alsine — Eremogone — Minuartia — Möhringia — Spergularia).
- Argemone** Tourn. (*Papaverineae*)
- albilflora Horn. Mexico q C.D.
 - Barclayana Grah. " q C.D.
 - grandiflora Swt. " q C.D.
 - mexicana L. " q C.D.
 - ochroleuca Swt. " q C.D.
 - " β . stenopetala.
- Argyranthemum** W. et B. (*Synanthereae*)
- anethifolium K. Canariae q F.
 - crithmifolium K. " q F.
 - foeniculaceum K. " q F.
 - frutescens K. " q F.

- Argyranthemum*
grandiflorum K. Canariæ $\frac{1}{2}$ F.
" β . intermedium. $\frac{1}{2}$ F.
speciosum K. $\frac{1}{2}$ F.
Argyrea Lour. (*Convolvulaceae*)
speciosa Swt. Ind. or. $\frac{1}{2}$ C.
splendens Swt. " $\frac{1}{2}$ C.
Argyrolobium E. et Z. " (*Papilionaceae*)
Andrewsianum Steudl. Cap. b. sp. $\frac{1}{2}$ T.
Linneanum Walp. Eur. aust. $\frac{1}{2}$ FD.
lotoides Benth. Caucasus $\frac{1}{2}$ DF.
Arisaema Mart. (*Arineae*)
atrorubens Blum. Amer. bor. $\frac{1}{2}$ DF.
Dracontium Schott. " $\frac{1}{2}$ D.
Arisarum Tourn. (*Arineae*)
vulgare Kth. *Farg* Eur. aust. $\frac{1}{2}$ FD.
Aristea Sol. (*Iridaceae*)
coerulea Vahl. Cap. b. sp. $\frac{1}{2}$ T.
cyanea Ait. " $\frac{1}{2}$ T.
Aristella Trin. (*Gramineae*)
bromoides Bert. Eur. aust. $\frac{1}{2}$ DF.
Aristida L. (*Gramineae*)
coerulescens Desf. Hisp. Afr. bor. $\odot$ D.
Aristolochia Tourn. (*Aristolochiaceae*)
altissima Desf. Creta, Afr. bor. $\frac{1}{2}$ F.
bilobata L. Ind. occ. $\frac{1}{2}$ C.
Clematitis L. Eur. med. au. $\frac{1}{2}$ D.
glauca Desf. Lusit. Afr. bor. $\frac{1}{2}$ F.
grandiflora Swt. Ind. occ. $\frac{1}{2}$ C.
rotunda L. Eur. aust. $\frac{1}{2}$ F.
Serpentaria L. Am. bor. aust. $\frac{1}{2}$ F.
sempervirens L. Creta $\frac{1}{2}$ F.
(vide: *Isotrema* — *Pistolochia*).
Aristotelia L'Her. (*Aristoteliaceae*)
Macqui L'Her. Chili $\frac{1}{2}$ T.
Armeniaca Tourn. (*Amygdalineae*)
brigantiaca Pers. Delphin. $\frac{1}{2}$ D.
dasycarpa Pers. " $\frac{1}{2}$ D.
sibirica Pers. Asia bor. $\frac{1}{2}$ D.
vulgaris Lam. Oriens $\frac{1}{2}$ D.
Armeria W. (*Plumbaginaceae*)
alliacea W. Eur. aust. $\frac{1}{2}$ D.
alpina W. Alpes $\frac{1}{2}$ D. A.
Besseriiana Hort. Eur. or. $\frac{1}{2}$ D.
denticulata Bert. Eur. aust. $\frac{1}{2}$ DF.
dianthoides Horn. " $\frac{1}{2}$ DF.
fasciculata W. Eur. aust. occ. $\frac{1}{2}$ F.
intermedia Lk. Germ. bor. $\frac{1}{2}$ D.
latifolia W. Sicil. Afr. bor. $\frac{1}{2}$ F.
litoralis W. Hisp. Lusit. $\frac{1}{2}$ F.
maritima W. Eur. bor. $\frac{1}{2}$ D.
plantaginea W. Eur. occ. $\frac{1}{2}$ DF.
purpurea Koch. Eur. med. $\frac{1}{2}$ D.
scorzoneraefolia W. Eur. aust. $\frac{1}{2}$ DF.
vulgaris W. Europa $\frac{1}{2}$ D.
Armora cia Rupp. (*Cruciferae*)
macrocarpa Baumg. Hungaria $\frac{1}{2}$ D.
sativa Hell. Europa $\frac{1}{2}$ D.
Arnica L. (*Synanthereae*)
montana L. Europa $\frac{1}{2}$ D. A.
- (vide: *Aronicum* — *Doronicum*).
Arnoseric Gaertn. (*Synanthereae*)
pusilla Gaertn. Europa $\odot$ D.
Aronia Pers. (*Pomaceae*)
arbutifolia Med. Amer. bor. $\frac{1}{2}$ D.
Chamaemespilus Pers. Eur. med. au. $\frac{1}{2}$ D.
melanocarpa Nutt. Amer. bor. $\frac{1}{2}$ D.
(vide: *Amelanchier*).
Aronicum Neck. (*Synanthereae*)
altaicum DeC. Sibir. alt. $\frac{1}{2}$ D. A.
scorpioides Rchb. Alpes $\frac{1}{2}$ D. A.
Arrhenatherum P. B. (*Gramineae*)
avenaceum P. B. Europa $\frac{1}{2}$ D.
bulbosum Schl. " $\frac{1}{2}$ D.
Artanema D. Don. (*Scrophulariaceae*)
fimbriatum Don. Nov. Holl. $\odot$ CT.
Artemisia L. (*Umbelliferae*)
squammata L. Oriens $\odot$ CD.
Artemisia L. (*Synanthereae*)
Abrotanum L. Eur. aust. Or. $\frac{1}{2}$ D.
Absinthium L. Europa $\frac{1}{2}$ D.
afra Jacq. Cap. b. sp. $\frac{1}{2}$ F.
alpina W. Caucasus $\frac{1}{2}$ D. A.
altaica Desf. $\frac{1}{2}$ DF.
annua L. Asia bor. $\odot$ D.
aprica Led. " $\frac{1}{2}$ D.
arborescens L. Eur. aust. $\frac{1}{2}$ F.
argentea L'Her. Sicil. Mader. $\frac{1}{2}$ F.
austriaca Jacq. Eur. or. aust. $\frac{1}{2}$ D.
Biasoletiana Vis. Dalmatia $\frac{1}{2}$ DF.
biennis L. As. et Am. bor. $\odot$ D.
campestris L. Europa $\frac{1}{2}$ D.
" β . *lednicensis* Rochl.
camphorata Vill. Eur. aust. $\frac{1}{2}$ D.
" β . *canescens*.
chamaemelifolia Vill. Delph. Ped. $\frac{1}{2}$ DF.
coerulescens L. Eur. aust. $\frac{1}{2}$ DF.
crithmifolia L. Eur. occ. $\frac{1}{2}$ D.
desertorum Spr. Asia bor. $\frac{1}{2}$ D.
" β . *leucanthemifolia* Desf. —
neglecta Spr. Eur. or. $\frac{1}{2}$ D.
Dracunculus L. Caucas. Arm. $\frac{1}{2}$ DF.
fragrans W. Asia bor. $\frac{1}{2}$ D. A.
frigida W. " $\frac{1}{2}$ D.
glauca Pall. Amer. bor. $\frac{1}{2}$ D.
gnaphalioides Nutt. Ruth. aust. $\frac{1}{2}$ DF.
inodora W. Asia bor. $\frac{1}{2}$ D.
laciniata W. Eur. bor. occ. $\frac{1}{2}$ D.
maritima L. Nepalia $\frac{1}{2}$ FD.
mollissima Don. Hungaria $\frac{1}{2}$ DF.
monogyna W. et K. Dalmatia $\frac{1}{2}$ DF.
naronitana Vis. Oriens $\frac{1}{2}$ DF.
orientalis Fisch. Eur. med. au. $\frac{1}{2}$ D.
pontica L. Eur. au. Asia $\frac{1}{2}$ D.
procerata W. Amer. bor. $\frac{1}{2}$ D.
Purshiana Bess. Sibiria $\frac{1}{2}$ D.
Redowskii Bd. " $\frac{1}{2}$ D.
repens Pall. Eur. bor. Sibir. $\frac{1}{2}$ D.
rupestris L. Europa $\frac{1}{2}$ D.
salina W. " $\frac{1}{2}$ D.

Artemisia

- saxatilis W. et K. Hungaria ♀ D.
 scoparia W. et K. Eur. or. Asia ② D.
 Sieversiana W. Asia bor. ② D.
 tanacetifolia All. Delph. Ped. ♀ D. A.
 Tournefortiana Rehb. Oriens ② D.
 variabilis Ten. Neap. Hisp. ♀ DF.
 vulgaris L. Europa ♀ D.
 " β. coarctata Bess. — γ. cam-
 tschatica Bess.

Arthrocnemum M. T. (Chenopodiaceae)
 fruticosum M. T. Eur. aust. ♀ F.

Arthrolobium Desv. (Papilionaceae)
 ebracteatum DeC. Eur. aust. ② D.
 repandum DeC. " " ② D.
 scorpioides DeC. " " ② D.

Arthropodium R. Br. (Liliaceae)
 cirratum R. Br. Nov. Holl. ♀ T.
 minus R. Br. " " ♀ T.
 pendulum DeC. " " ♀ T.

Arum Tourn. (Araceae)
 italicum Lam. Eur. aust. ♀ DF.
 maculatum L. Eur. med. au. ♀ D.
 orientale M. B. Taur. Cauc. ♀ DF.
 (vide: Amorphophallus — Arisaema —
 Arisarum — Caladium — Colocasia —
 Dracunculus — Sauromatum — Remu-
 satia — Philodendron — Typhonium).

Aruncus Ser. (Spiraeaceae)
 sylvestris K. Europa ♀ D.

Arundinaria Rich. (Gramineae)
 glaucescens P. B. Ind. or. ♀ C.

Arundo L. (Gramineae)
 Donax L. Eur. aust. ♀ DV.

" β. variegata.
 (vide: Ammophila — Ampelodesmos —
 Calamagrostis — Deyeuxia — Phragmi-
 tes).

Asagraea Lindl. (Veratrineae)
 caricifolia Kth. Mexico ♀ T.

Asarina Tourn. (Scrophulariaceae)
 cordifolia Mönch. Eur. aust. occ. ♀ F.

Asarum Tourn. (Aristolochiaceae)
 canadense Mehx. Amer. bor. ♀ D.
 europaeum L. Europa ♀ D.

Asclepias Tourn. (Asclepiadineae)
 amoena L. Amer. bor. ♀ D.

consanguinea ^{E. F. Y.} " " ♀ D.

curassavica L. Amer. trop. ♀ C.

" β. fl. albo.
 exaltata Lk. Amer. bor. ♀ D.

incarnata L. " " ♀ D.

linifolia Lag. Mexico ♀ DF.

mexicana Cav. " " ♀ DF.

nivea L. Louis. Ind. occ. ♀ F.

parviflora Ait. " " ♀ DF.

pulchra Ehrh. Amer. bor. ♀ D.

princeps Bartl. " " ♀ DF.

purpurascens L. " " ♀ D.

syriaca L. " " ♀ D.

Asclepias

- tuberosa L. Am. bor.-au. ♀ DF.
 virgata Balb. Mexico ♀ FD.
 (vide: Cynanchum — Gomphocarpus —
 Hoya — Vincetoxicum).

Aspalathus L. (Papilionaceae)
 argentea L. Cap. b. sp. ♀ T.

Aspalthium Medic. (Papilionaceae)
 acaule K. Cauc. Arm. ♀ FD.

bituminosum K. Eur. aust. ♀ F.

foetidum K. Sicilia ♀ F.

frutescens K. Eur. aust. ♀ F.

palaestinum K. Oriens ♀ F.

plumosum K. Dalmatia ♀ F.

pubescens K. ? ♀ F.

sericeum K. Cap. b. sp. ♀ F.

Asparagus Tourn. (Asparagineae)
 acutifolius L. Eur. aust. ♀ F.

aphyllus L. " " ♀ F.

Broussonetii Spr. Canariae ♀ F.

caspicus Jacq. f. Asia med. ♀ DF.

dahuricus Fisch. Sibir. aust. ♀ D.

declinatus L. Cap. b. sp. ♀ F.

officinalis L. Europa ♀ D.

maritimus Pall. Sibir. aust. ♀ D.

scaber Brign. Eur. aust. ♀ D.

tenuifolius Lam. " " ♀ D.

verticillatus L. Ruth. au. Or. ♀ DF.

Aspera Mönch. (Rubiaceae)
 nutans Mönch. Eur. aust. ② D.

Asperugo Tourn. (Borragineae)
 procumbens L. Europa ② D.

Asperula L. (Pubiaceae)
 Aparine M. B. Eur. or. ♀ D.

" β. rivalis Sibt. et Sm.
 aristata L. fil. Eur. aust. ♀ FD.

arvensis L. Europa ② D.

ciliata Rochl. Hungaria ♀ D.

cynanchica L. Europa ♀ D.

galioides M. B. Eur. med. au. ♀ D.

" β. tyraica Bess.
 hirsuta Desf. Lusit. Afr. b. ♀ F.

laevigata L. Eur. aust. ♀ DF.

longiflora W. et K. " " ♀ D F.

odorata L. Europa ♀ D.

scutellaris Vis. Dalmatia ♀ DF.

taurina L. Eur. aust. ♀ D.

tinctoria L. Europa ♀ D.

Asphodeline Rehb. (Liliaceae)
 capillaris Endl. Eur. aust. ♀ FD.

cretica Vis. Neap. Creta ♀ F.

liburnica Rehb. Eur. or.-aust. ♀ DF.

lutea Rehb. " " ♀ DF.

taurica Endl. Tauria ♀ DF.

Asphodelus Tourn. (Liliaceae)
 albus W. Eur. aust. ♀ DF.

clavatus Roxb. Ind. or. ♀ FD.

intermedius Horn. Canariae ♀ FD.

fistulosus L. Eur. aust. ♀ FD.

ramosus L. " " ♀ DF.

Aspidistra Ker.	(Aspidistraceae)				
lurida Ker.	Ind. or.	4. C.			
Aspidium L.	(Polypodiaceae)				
cristatum Swz.	Europa	4. D.			
dilatatum Swz.	"	4. D.			
Filix mas. Swz.	"	4. D.			
molle Swz.	Ind. occ.	4. C.			
patens Swz.	"	4. C.			
pauciflorum Kaulf.	Mascarenh.	4. C.			
pubescens Swz.	Ind. occ.	4. C.			
Serra Swz.	"	4. C.			
Thelypteris Swz.	Europa	4. D.			
violascens Lk.	Brasilia	4. C.			
(vide: Bathmum — Asplenium — Ne-					
phrodium — Cystopteris — Polypodium					
— Polystichum).					
Asplenium L.	(Polypodiaceae)				
Ebenum Ait.	Am. bor.	4. D.			
decurtatum Lk.	Brasilia	4. C.			
Filix foemina Bhd.	Europa	4. D.			
flabellifolium Cav.	Nov. Holl.	4. T.			
fontanum Hook.	Eur. aust.-occ.	4. F.			
furcatum Swz.	Cap. Mascar.	4. C.			
Halleri R. Br.	Eur. aust.	4. F.			
marinum L.	Lusit. Afr.	4. F.			
Ruta muraria L.	Europa	4. D.			
Serpentini Tausch	Bohemia	4. D.			
striatum L.	Ind. occ.	4. C.			
Trichomanes L.	Europa	4. D.			
(vide: Acropteris).					
Asprella Cav. Humb.	(Gramineae)				
Hystrix Cav. Humb.	Amer. bor.	4. D.			
major Fres.	"	4. D.			
Astartea DeC.	(Myrtaceae)				
Endlicheriana Schau.	Nov. Holl.	4. F.			
Astelia B. et S.	(Asteliaceae)				
Banksii R. Br.	Nov. Zeel.	4. F.			
Aster Tourn.	(Synanthereae)				
abbreviatus N. E.	Amer. bor.	4. D.			
adulterinus W.	"	4. D.			
aestivus Ait.	"	4. D.			
alpinus L.	Alp. Subalp.	4. D.			
amabilis Wend.	Amer. bor.	4. D.			
Amellus L.	Eur. med. au.	4. D.			
amplexicaulis Lam.	Amer. bor.	4. D.			
antirrhinifolius Hort.	"	4. D.			
argutus N. E.	"	4. D.			
asper N. E.	"	4. D.			
azureus Lindl.	"	4. D.			
bellidiflorus W.	"	4. D.			
bessarabicus Bess.	Eur. or.-aust.	4. D.			
bostoniensis Booth	Amer. bor.	4. D.			
blandus Ait.	"	4. D.			
brumalis N. E.	"	4. D.			
caespitosus H. Par.	"	4. D.			
carneus N. E.	"	4. D.			
carolinianus Walt.	Am. bor.-au.	4. D.			
concinus W.	Amer. bor.	4. D.			
confertus N. E.	"	4. D.			
conspicuus Lindl.	"	4. D.			
Aster					
corymbifer K.	Amer. bor.	4. D.			
crassicaulis K.	"	4. D.			
cyaneus Hoffm.	"	4. D.			
deflexus Tausch	"	4. D.			
densus K.	"	4. D.			
diffusus Ait.	"	4. D.			
divergens Ait.	"	4. D.			
dumosus L.	"	4. D.			
eminens W.	"	4. D.			
ericoides L.	"	4. D.			
expansus N. E.	"	4. D.			
fastigiatus K.	"	4. D.			
firmus N. E.	"	4. D.			
flaccidus K.	"	4. D.			
flexicaulis K.	"	4. D.			
floribundus W.	"	4. D.			
foliosus K.	"	4. D.			
formosissimus H. Par.	"	4. D.			
fragilis W.	"	4. D.			
glaber Müll.	"	4. D.			
glaberrimus K.	"	4. D.			
glaucescens K.	"	4. D.			
grandiflorus L.	Am. bor.-au.	4. D.			
heterophyllus W.	Amer. bor.	4. D.			
hirsutus Host.	Bohemia	4. D.			
hirtus K.	Amer. bor.	4. D.			
hyemalis N. E.	"	4. D.			
inamoenus K.	"	4. D.			
laevigatus W.	"	4. D.			
laevis L.	"	4. D.			
Lamarkianus N. E.	"	4. D.			
lanceolatus W.	"	4. D.			
latifolius Desf.	"	4. D.			
laxifolius N. E.	"	4. D.			
laxus W.	"	4. D.			
leucanthemus Desf.	"	4. D.			
longifolius Lam.	"	4. D.			
luxurians N. E.	"	4. D.			
miser L.	"	4. D.			
Mühlenbergii Tausch.	"	4. D.			
multiflorus Ait.	"	4. D.			
mutabilis Ait.	"	4. D.			
neglectus Wend.	"	4. D.			
novae Angliae L.	"	4. D.			
" β . roseus Desf.	"	4. D.			
novi Belgii L.	"	4. D.			
obliquus N. E.	"	4. D.			
onustus N. E.	"	4. D.			
pallens W.	"	4. D.			
paniculatus Ait.	"	4. D.			
parviflorus N. E.	"	4. D.			
patens Ait.	"	4. D.			
patulus Lam.	"	4. D.			
pendulus Ait.	"	4. D.			
politus N. E.	"	4. D.			
praealtus Poir.	"	4. D.			
praecox W.	"	4. D.			
prenanthoides Mühlb.	"	4. D.			
Pseudo-Amellus DeC.	Eur. med.	4. D.			

Aster

△ pulchellus W.	Arm. Cauc.	⊗ DF.
△ puniceus L.	Amer. bor.	⊗ D.
△ pyramidalis K.	" "	⊗ D.
△ pyrenaeus DeC.	Pyrenaei	⊗ DF.
△ rariflorus K.	Amer. bor.	⊗ D.
△ rigens K.	" "	⊗ D.
△ rigidulus N. E.	" "	⊗ D.
△ rubellus K.	" "	⊗ D.
△ rubricaulis Lam.	" "	⊗ D.
△ sagittaeifolius Wed.	" "	⊗ D.
△ salignus W.	" "	⊗ D.
△ sanguineus W.	" "	⊗ D.
△ sericeus Vent.	Am. bor.-aust.	⊗ F.
△ sibiricus L.	Asia bor.	⊗ D.
△ simplex W.	Amer. bor.	⊗ D.
△ speciosus Horn.	" "	⊗ D.
△ spectabilis Ait.	" "	⊗ D.
△ spurius W.	" "	⊗ D.
△ squarrosulus N. E.	" "	⊗ D.
△ squarrosus Walt.	" "	⊗ D.
△ tardiflorus N. E.	" "	⊗ D.
△ tataricus L. fil.	Asia bor.	⊗ D.
△ tenuifolius L.	Amer. bor.	⊗ D.
△ thyrsiflorus Hoffm.	" "	⊗ D.
△ Tradescanti L.	" "	⊗ D.
△ undulatus L.	" "	⊗ D.
△ versicolor W.	" "	⊗ D.
△ vimineus W.	" "	⊗ D.
△ virgatus K.	" "	⊗ D.
△ virgineus N. E.	" "	⊗ D.
(vide: Biotia — Calimeris — Callistephus — Diplopappus — Diplotephium — Eurybia — Felicia — Galatella — Munychia — Olearia — Polyarrhena — Stenactis — Tripolium).		
Asteracantha N. E.	(<i>Acanthinae</i>)	
△ longifolia N. E.	Ind. or.	⊗ C.
Asterias Ren.	(<i>Gentianaceae</i>)	
△ lutea Borkh.	Subalpes	⊗ D. A.
Asteriscus Mönch.	(<i>Synanthereae</i>)	
△ aquaticus Mönch.	Eur. aust.	⊗ CD.
△ maritimus Mönch.	" "	⊗ F.
△ sericeus DeC.	Canariae	⊗ T.
Asterocephalus Vaill.	(<i>Dipsacinae</i>)	
△ argenteus Spr.	Eur. aust.	⊗ D.
△ caucasicus Spr.	Caucasus	⊗ D. A.
△ " β. elegans Spr.		
△ creticus Spr.	Sicil. Creta	⊗ F.
△ graminifolius Spr.	Eur. aust.	⊗ DF.
△ micranthus Spr.	Oriens	⊗ D.
△ prolifer Spr.	Creta, Afr. bor.	⊗ D.
△ siculus Spr.	Graecia	⊗ D.
△ stellatus Spr.	Eur. aust.	⊗ D.
△ ucrainicus Spr.	Eur. or.-aust.	⊗ D.
Asterolinon H. et L.	(<i>Primulaceae</i>)	
△ adoense Kze.	Abyssinia	⊗ FD.
△ stellatum Lk.	Eur. aust.	⊗ D.
Asterothrix Cass.	(<i>Synanthereae</i>)	
△ asperima Cass.	Cauc. Iber.	⊗ DF.

Asterothrix

△ hispanica DeC.	Hispania	⊗ D.
Astraea Schau.	(<i>Myrtineae</i>)	
△ saxicola Schau.	Nov. Holl.	⊗ T.
Astragalus Tourn.	(<i>Papilionaceae</i>)	
△ adsurgens Pall.	Sibir. aust.	⊗ DF.
△ aduncus M. B.	Caucasus	⊗ D.
△ Aegiceras W.	Eur. aust.	⊗ D.
△ alopecuroides L.	Eur. or. Asia	⊗ D.
△ arenarius L.	Europa	⊗ D.
△ asper Jacq.	Eur. aust.	⊗ DF.
△ austriacus L.	Eur. med. au.	⊗ D.
△ baeticus L.	Hisp. Afr. bor.	⊗ D.
△ brachyceras Led.	Asia med.	⊗ D.
△ brachycarpus M. B.	Caucasus	⊗ DF.
△ capitatus L.	Oriens	⊗ D.
△ carolinianus L.	Am. bor.-au.	⊗ DF.
△ Cicer L.	Europa	⊗ D.
△ ciceriformis Bhd.	" "	⊗ D.
△ contortuplicatus L.	Eur. or.-aust.	⊗ D.
△ cruciatus Lk.	Aegyptus	⊗ D.
△ cymbaearpos Brot.	Lusitania	⊗ D.
△ dasyanthus Pall.	Eur. or.-aust.	⊗ DF.
△ dasyglottis Fisch.	Sibir. aust.	⊗ DF.
△ Epiglottis L.	Eur. aust. Asia	⊗ D.
△ falcatus Lam.	Asia bor.	⊗ D.
△ galegiformis L.	Caucasia	⊗ D.
△ Gebleri Fisch.	Songaria	⊗ F.
△ Glaux L.	Eur. occ.-aust.	⊗ D.
△ glycyphyloides DeC.	Taur. Cauc.	⊗ D.
△ glycyphyllus L.	Europa	⊗ D.
△ Grahami Steudl.	Nepalia	⊗ DF.
△ hamosus L.	Eur. aust.	⊗ D.
△ hypoglottis L.	Eur. Asia bor.	⊗ D.
△ illyricus Bhd.	Eur. aust.	⊗ DF.
△ juvenalis Del.	Aegyptus	⊗ D.
△ lactiflorus Leb.	Sibir. aust.	⊗ DF.
△ lasiopetalus Bge.	" "	⊗ DF.
△ Laxmanni Jacq.	" "	⊗ DF.
△ leucophaeus Sm.	" ? "	⊗ FD.
△ macrolobus M. B.	Sibir. alt.	⊗ DF.
△ maximus W.	Armenia	⊗ DF.
△ monspessulanus L.	Eur. aust.	⊗ DF.
△ multicaulis Led.	Sibir. aust.	⊗ DF.
△ narbonensis Gou.	Eur. au.-occ.	⊗ DF.
△ Onobrychis L.	Europa	⊗ D.
△ " β. tauricus.		
△ pentaglottis L.	Hisp. Afr. bor.	⊗ D.
△ podocarpus Mey.	Caucasia	⊗ DF.
△ ponticus Pall.	Ruth. aust.	⊗ DF.
△ refractus C. A. Mey.	Caucasia	⊗ DF.
△ reptans W.	Mexico	⊗ T.
△ reticulatus M. B.	Ruth. aust.	⊗ D.
△ sanguinolentus M. B.	Hispania	⊗ D.
△ scorpioides Pour.	" "	⊗ D.
△ sesameus L.	Eur. aust. Afr.	⊗ D.
△ Stella L.	Gall. au. Afr. b.	⊗ D.
△ striatellus M. B.	Taur. Cauc.	⊗ D.
△ subulatus M. B.	" "	⊗ D.
△ sulcatus L.	Sibiria	⊗ D.

<i>Astragalus</i>			
<i>tauricus</i> Pall.	Ruth. aust.	4 D.	
<i>Tragacantha</i> L.	Gallia, Hisp.	4 F.	
<i>tribuloides</i> Del.	Aegypt. Cauc.	4 D.	
<i>trimestris</i> L.	Graec. Aeg.	4 D.	
<i>uliginosus</i> L.	Sibir. aust.	4 DF.	
<i>vulpinus</i> W.	Ruth. au. Alt.	4 DF.	
(vide: <i>Oxytropis</i> — Phaca).			
<i>Astrantia</i> Tourn.	(<i>Umbelliferae</i>)		
<i>carniolica</i> Jacq.	Alpes	4 D.	
<i>Biebersteinii</i> F. et M.	Caucasus	4 D.	
<i>helleborifolia</i> Sal.	"	4 D.	
<i>intermedia</i> M. B.	"	4 D.	
<i>major</i> L.	Europa	4 D.	
<i>minor</i> L.	Alpes	4 D.	
<i>Astrapaea</i> Lindl.	(<i>Dombeyaceae</i>)		
<i>penduliflora</i> DeC.	Madagasc.	4 C.	
<i>Athamanta</i> L.	(<i>Umbelliferae</i>)		
<i>flavescens</i> Vis.	Dalmatia	4 DF.	
<i>macedonica</i> Spr.	Graec. Afr. b.	4 DF.	
<i>scicula</i> L.	Neap. Sicil.	4 F.	
(vide: <i>Cenolophium</i> — <i>Peucedanum</i>).	— Libanotis —		
<i>Athanasia</i> L.	(<i>Synanthereae</i>)		
<i>crithmifolia</i> L.	Cap. b. sp.	4 F.	
<i>trifurcata</i> L.	"	4 F.	
" <i>β. canescens</i> .	"		
<i>virgata</i> Jacq.	"	4 F.	
(vide: <i>Lonas</i> — <i>Morysia</i>).			
<i>Atheropogon</i> Mühlb.	(<i>Gramineae</i>)		
<i>apludioides</i> Mühlb.	Am. med. bor.	4 F.	
<i>Atractylis</i> L.	(<i>Synanthereae</i>)		
<i>cancellata</i> L.	Eur. aust.	4 D.	
<i>humilis</i> L.	"	2 FD.	
<i>Atragene</i> L.	(<i>Ranunculineae</i>)		
<i>alpina</i> L.	Alpes	4 D.	
<i>americana</i> Sims.	Amer. bor.	4 D.	
<i>sibirica</i> L.	Asia bor.	4 D.	
<i>Wenderothii</i> Schlcht.	Helvetia	4 D.	
<i>Atraphaxis</i> L.	(<i>Polygoniaceae</i>)		
<i>compacta</i> Ledeb.	Sibir. aust.	4 DF.	
<i>spinosa</i> L.	Asia med.	4 DF.	
<i>undulata</i> L.	Cap. b. sp.	4 T.	
<i>Atriplex</i> Tourn.	(<i>Chenopodiaceae</i>)		
<i>angustifolium</i> Sm.	Europa	4 D.	
<i>crassifolium</i> C. A. Mey.	Asia bor.	4 D.	
<i>decumbens</i> Schult.	Nov. Holl.	4 F.	
<i>diffusum</i> Ten.	Eur. aust.	4 D.	
<i>Halimus</i> L.	"	4 F.	
<i>hastatum</i> L.	Eur. bor.	4 D.	
<i>Hermanni</i> Willm.	Europa	4 D.	
<i>hortense</i> L.	Graec. Orients	4 D.	
" <i>β. bengalense</i> Lam.	— γ. —		
<i>guineum</i> .			
<i>incisum</i> M. B.	Tauria	4 D.	
<i>laciniatum</i> L.	Europa	4 D.	
<i>litorale</i> L.	"	4 D.	
<i>microspermum</i> W. et K.	"	4 D.	
<i>patulum</i> L.	"	4 D.	
<i>roseum</i> Lam.	"	4 D.	
<i>Atriplex</i>			
<i>sulcatum</i> Schrad.	Eur. bor. occ.	4 D.	
<i>tataricum</i> L.	Asia bor.	4 D.	
<i>triangulare</i> L.	"	4 D.	
(vide: <i>Halimus</i> — <i>Obione</i>).			
<i>Atropa</i> L.	(<i>Solaniceae</i>)		
<i>Belladonna</i> L.	Europa	4 D.	
(vide: <i>Mandragora</i> — <i>Saracha</i> — <i>Withania</i>).			
<i>Aubrietia</i> Adans.	(<i>Cruciferae</i>)		
<i>Columnae</i> Guss.	Sicil. Neap.	4 F.	
<i>deltoidea</i> DeC.	Eur. aust.	4 DF.	
<i>Aucuba</i> Kaempf.	(<i>Corniceae</i>)		
<i>japonica</i> L.	Japonia	5 FD.	
<i>Auganthus</i> Lk.	(<i>Primulaceae</i>)		
<i>praenitens</i> Lk.	China	4 F.	
" <i>β. fl. albo</i> .			
<i>Aulacospermum</i> Led.	(<i>Umbelliferae</i>)		
<i>anomalum</i> Led.	Altai	4 D.	
<i>cuneatum</i> Led.	"	4 DF.	
<i>Auricula</i> Tourn.	(<i>Primulaceae</i>)		
<i>carniolica</i> K.	Alpes	4 D.	
<i>ciliata</i> K.	"	4 D.	
<i>integrifolia</i> Spach.	"	4 D.	
<i>hortensis</i> Spch.	"	4 D.	
<i>minima</i> Spach.	Alpes, Sud.	4 D.	
<i>Palinuri</i> Spach.	Neapolis	4 F.	
<i>verticillata</i> K.	Arabia	4 T.	
<i>villosa</i> Spach.	Alpes	4 D.	
<i>Aurinia</i> Desv.	(<i>Cruciferae</i>)		
<i>edentula</i> F. et M.	Eur. or. aust.	2 D.	
<i>petraea</i> K.	Eur. aust.	4 F.	
<i>orientalis</i> Desf.	Creta	4 F.	
" <i>β. variegata</i> .			
<i>saxatilis</i> Desv.	Eur. or.	4 DF.	
<i>Avena</i> Tourn.	(<i>Gramineae</i>)		
<i>alpestris</i> Host.	Alpes	4 D.	
<i>atherantha</i> Presl.	Eur. aust.	4 D.	
<i>brevis</i> Roth.	Europa	4 D.	
<i>chinensis</i> Fisch.	Asia occ.	4 D.	
<i>fatua</i> L.	Europa	4 D.	
<i>hirsuta</i> Roth.	Eur. aust.	4 D.	
<i>nuda</i> L.	Asia med.	4 D.	
<i>orientalis</i> L.	"	4 D.	
<i>pilosa</i> M. B.	Iberia	4 D.	
<i>planiculmis</i> Schrad.	Eur. or. Sib.	4 D.	
<i>pratensis</i> L.	Europa	4 D.	
<i>pubescens</i> L.	"	4 D.	
<i>sativa</i> L.	?	4 D.	
<i>sempervirens</i> Vill.	Alpes	4 D.	
<i>sterilis</i> L.	Eur. aust.	4 D.	
<i>strigosa</i> Schreb.	Europa	4 D.	
(vide: <i>Trisetum</i>).			
<i>Axyris</i> L.	(<i>Chenopodiaceae</i>)		
<i>amarantoides</i> L.	Asia bor.	4 D.	
<i>hybrida</i> L.	"	4 D.	
<i>Ayenia</i> L.	(<i>Büttneriaceae</i>)		
<i>pusilla</i> L.	Ind. occ.	4 C.	
<i>Azalea</i> L.	(<i>Ericaceae</i>)		
<i>calendulacea</i> Mchx.	Amer. bor.	4 D.	

Azalea				Baptisia			
glauca Mchx.	Amer. bor.	‡ D.		australis R. Br.	Am. bor-aust.	‡ D.	
nudiflora L.	"	‡ D.		exaltata Swt.	"	"	‡ D.
ponica L.	Podol. Pont.	‡ DF.		minor Lehm.	"	"	‡ D.
viscosa L.	Amer. bor.	‡ D.		tinctoria RBr.	"	"	‡ FD.
pl. var. et hybr. spec.				Barbacenia Vand.		(Velloziaceae)	
(vide: Rhododendron).				purpurea Hook.	Brasilia	‡ C.	
Azara R. et P.	(Bixaceae)			Barbarea R. Br.		(Cruciferae)	
dentata R. et P.	Chili	‡ T.		arcuata Rchb.	Europa	② D.	
Babiana Ker.	(Irideae)			orthoceras Ledb.	Asia bor.	② D.	
augustifolia Eckl.	Cap. b. sp.	‡ T.		plantaginea DeC.	Oriens	② D.	
disticha Ker.	"	‡ T.		praecox R. Br.	Eur. occid.	② D.	
palmifolia Hort.	"	‡ T.		prostrata Gay.	Eur. aust.	② D.	
plicata Ker.	"	‡ T.		stricta Andr.	Eur. med. or.	② D.	
rosea Eckl.	"	‡ T.		vulgaris R. Br.	Europa	② D.	
sulfurea Ker.	"	‡ T.		Barkhausia Mönch.	(Synanthereae)		
tubiflora Ker.	"	‡ T.		alpina DeC.	Taur. Oriens	② D.	
villosa Ker.	"	‡ T.		bellidifolia DeC.	Cors. Sard.	② D.	
Baccharis L.	(Synanthereae)			hyemalis Spr.	Sicil. Sard.	② D.	
glutinosa Pers.	Chili	‡ T.		Marschallii C. A. Mey.	Tauria	② D.	
halimifolia L.	Am. bor-aust.	‡ FD.		praecox Rchb.	Eur. aust.	② D.	
(vide: Conyza — Pluchea).				purpurea Biv.	Neap. Sicil.	‡ F.	
Baeckea L.	(Myrtineae)			raphanifolia Spr.	?	② D.	
frutescens L.	China	‡ T.		scariosa Rchb.	Eur. aust.	② D.	
(vide: Astraea — Harmogia).				setosa DeC.	"	② D.	
Baeothryon N. E. j.	(Cyperineae)			taraxacifolia DeC.	"	② D.	
caespitosum N. E. j.	Alp. Subalp.	‡ D. J.		vesicaria Spr.	"	② D.	
Baeria F. et M.	(Synanthereae)			(vide: Anisoderris).			
chrysostoma F. et M.	Nov. Calif.	② D.		Barleria L.	(Acanthineae)		
Bahia DeC.	(Synanthereae)			cristata L.	Ind. or.	‡ C.	
lanata Nutt.	Amer. bor.	‡ DF.		flava Jacq. f.	Arabia	‡ C.	
Baldingera G. M. S.	(Gramineae)			lupulina Lindl.	Mascarenh.	‡ C.	
arundinacea Dumort.	Europa	‡ D.		(vide: Asteracanthus).			
"	β. picta.			Barosma W.	(Diosmaceae)		
Ballota Tourn.	(Labiatae)			apiculata E. et Z.	Cap. b. sp.	‡ T.	
foetida Lam.	Europa	‡ D.		betulina B. et W.	"	‡ T.	
"	β. alba L. — γ. birta.			dioica B. et W.	"	‡ T.	
nigra L.	Europa	‡ D.		serratifolia W.	"	‡ T.	
(vide: Beringeria — Panzeria).				Bartonia, vide: Chrysostoma.			
Balsamina Tourn.	(Balsaminaceae)			Basella L.	(Basellaceae)		
hortensis Desp.	Ind. or.	② D.		alba L.	Ind. or.	② C.	
Balsamita Desf.	(Synanthereae)			cordifolia Lam.	"	② C.	
cana K.	Asia med.	‡ D.		lucida L.	"	② C.	
pinnatifida K.	"	‡ D.		obovata Kth.	Amer. trop.	② C.	
suaveolens Pers.	Eur. aust.	‡ D.		ramosa Jacq.	Ind. or.	② C.	
Bambusa Schreb.	(Gramineae)			rubra L.	"	② C.	
vulgaris Schrad.	Ind. occ.	‡ C.		Batatas Chois.	(Convolvulineae)		
Banisteria L.	(Malpighiaceae)			betacea Lindl.	Demerara	‡ C.	
laurifolia L.	Ind. occ.	‡ C.		bonariensis Lindl.	La Plata	‡ FD.	
splendens DeC.	Amer. trop.	‡ C.		Willdenowii Don.	Ind. occ.	‡ TD.	
Banksia L. fil.	(Proteaceae)			Bathmum Presl	(Polypodiaceae)		
Cunninghami Sieb.	Nov. Holl.	‡ T.		macrophyllum Lk.	Amer. trop.	‡ C.	
ericaefolia L. fil.	"	‡ T.		trifoliatum Lk.	Ind. occ.	‡ C.	
integrifolia L. fil.	Cap. b. sp.	‡ T.		Bauera Kenn.	(Cunoniaceae)		
latifolia R. Br.	"	‡ T.		humilis Swt.	Nov. Holl.	‡ T.	
paludosa R. Br.	Nov. Holl.	‡ T.		rubioides Kenn.	"	‡ T.	
speciosa R. Br.	"	‡ T.		Bauhinia Plum.	(Caesalpinaceae)		
spinulosa Sm.	"	‡ T.		tomentosa L.	Ceylon	‡ C.	
Baptisia Vent.	(Papilionaceae)			(vide: Casparea).			
alba R. Br.	Am. bor-aust.	‡ D.		Beaufortia R. Br.	(Myrtineae)		

Biscutella					
lyrata L.	Eur. aust.	⊙ D.			
marginata Ten.	Neapolis	⊙ D.			
maritima Ten.		⊙ D.			
raphanifolia Poir.	Sicil. Afr. bor.	⊙ D.			
Biserula L.		(Papilionaceae)			
Pelcinus L.	Eur. aust.	⊙ D.			
Bixa L.		(Bixaceae)			
Orellana L.	Amer. trop.	‡ C.			
Blainvillea Cass.		(Synantheraceae)			
latifolia DeC.	Ind. or.	⊙ C.			
rhomboidea Cass.	Brasilia	⊙ C.			
Blairia L.		(Ericaceae)			
ericoides L.	Cap. b. sp.	‡ T.			
Blechnum L.		(Polypodiaceae)			
brasiliense Desv.	Brasilia	‡ C.			
glandulosum Lk.	"	‡ C.			
gracile Kaulf.	"	‡ C.			
hastatum Kaulf.	Chili	‡ C.			
occidentale L.	Ind. occ.	‡ C.			
triangulare Lk.	Mexico	‡ C.			
(vid: Lomaria).					
Blephilia Raf.		(Labiateae)			
ciliata Raf.	Am. bor.-au.	‡ DF.			
hirsuta Benth.	" " "	‡ DF.			
Bletia R. et P.		(Orchideae)			
expansa Ten.	Ind. occ.	‡ C.			
florida R. Br.	" "	‡ C.			
hyacinthina R. Br.	China, Coch.	‡ C.			
verecunda R. Br.	Ind. occ.	‡ C.			
(vid: Phajus).					
Blitum Tourn.		(Chenopodiaceae)			
capitatum L.	Eur. med.-au.	⊙ D.			
crassifolium Rchb.	Europa	⊙ D.			
glaucum Koch	"	⊙ D.			
petiolare Lk.	Eur. aust.	⊙ D.			
rubrum Rchb.	Europa	⊙ D.			
virgatum L.	Eur. med.-au.	⊙ D.			
" β. chenopodioides Lam.					
Blumenbachia Schrad.		(Loasaceae)			
insignis Schrad.	Brasil. Chili	‡ T.			
Blysmus Panz.		(Cyperineae)			
compressus Panz.	Europa	‡ D.			
Bocconea Plum.		(Papaverineae)			
frutescens L.	Mexico	‡ T.			
(vid: Macleaya).					
Boerhavia L.		(Nyctagineae)			
diffusa L.	Ind. occ.	‡ C.			
hirsuta L.	"	‡ D.			
plumbaginifolia Cav.	Hisp. Aegypt.	‡ T.			
repens Del.	Aegyptus	‡ C.			
scandens L.	Ind. occ.	‡ C.			
viscosa Lag.	Amer. aust.	‡ C.			
Boisduvalia Spach.		(Onagraceae)			
concinna Spach.	Amer. bor.	⊙ D.			
Douglasii Spach.	"	⊙ D.			
Boissiera Hochst.		(Gramineae)			
bromoides Hochst.	Arabia	⊙ CD.			
Boltonia L'Herit.		(Synantheraceae)			
asteroides L'Herit.	Carolina	‡ DF.			
Boltonia					
glastifolia L'Herit.	Amer. bor.	‡ D.			
Bonaveria Scop.		(Papilionaceae)			
Securidaca Scop.	Eur. aust.	⊙ D.			
Bonjeania Rchb.		(Papilionaceae)			
hirsuta Rchb.	Eur. aust.	‡ F.			
recta Rchb.	"	‡ T.			
Bonplandia Cav.		(Polemoniaceae)			
geminiflora Cav.	Mexico	⊙ C.			
Boronia Sm.		(Diosmaceae)			
alata Sm.	Nov. Holl.	‡ T.			
crenulata Sm.	" "	‡ T.			
denticulata Sm.	" "	‡ T.			
Borrigo Tourn.		(Borragineae)			
laxiflora DeC.	Corsica	‡ FD.			
officinalis L.	Oriens	⊙ D.			
(vid: Caccinia — Trichodesma).					
Borreria W. Mey.		(Rubiaceae)			
capitellata Ch. et S.	Amer. trop.	⊙ C.			
Kohautiana Ch. et S.	Afr. trop.	‡ C.			
stricta W. Mey.	Ind. occ.	⊙ C.			
Borrichia Adans.		(Synantheraceae)			
frutescens DeC.	Ind. occ. Am. b.	‡ F.			
Bosea L.		(Celtideae?)			
Yervamora L.	Canariae	‡ F.			
Bossieua Vent.		(Papilionaceae)			
Colvillii H. Angl.	Nov. Holl.	‡ T.			
heterophylla Sm.	" "	‡ T.			
microphylla Sm.	" "	‡ T.			
ovata Sm.	" "	‡ T.			
prostrata Ait.	" "	‡ T.			
rufa R. Br.	" "	‡ T.			
Bothriospermum Bge.		(Borragineae)			
tenellum F. et M.	China bor.	⊙ D.			
Botrophis Raf.		(Paeoniaceae)			
orthostachya K.	Amer. bor.	‡ D.			
gyrostachya K.	"	‡ D.			
Botrychium Sw.		(Ophioglossineae)			
Lunaria	Europa	‡ D. A.			
Botrydium Spach.		(Chenopodiaceae)			
aromaticum Spach.	Eur. aust.	⊙ D.			
Schraderi Spach.	Abyssinia	⊙ D.			
Tournesfortianum K.	Oriens	⊙ D.			
Bougainvillea Comm.		(Nyctagineae)			
rosea Mart.	Amer. trop.	‡ C.			
rubicunda Hort.	"	‡ C.			
Boussingaultia Kth.		(Basellaceae)			
baselloides Kth.	Quito	‡ T.			
Bouvardia Sal.		(Rubiaceae)			
Jacquini Kth.	Mexico	‡ T.			
versicolor Ker.	Amer. aust.	‡ T.			
Bowlesia R. et P.		(Umbelliferae)			
tenera Spr.	Montev. Chili	⊙ D.			
Brachycome Cass.		(Synantheraceae)			
diversifolia F. et M.	Nov. Holl.	⊙ F.			
iberidifolia Benth.	"	⊙ CD.			
Brachypodium P. B.		(Gramineae)			
Barrelieri R. et S.	Italia	⊙ D.			
distachyum R. et S.	Eur. aust.	⊙ D.			
genuense R. et S.	Italia	‡ DF.			

Brachypodium					
Δ pinnatum P. B.	Europa	4 D.			
Δ rigidum Lk.	Hispania	2 D.			
Δ rupestre R. et S.	Eur. med.	4 D.			
Δ sylvaticum R. et S.	Europa	4 D.			
Brachysema R. Br.					
undulatum Ker.	Nov. Holl.	1 T.			
Brandesia Mart.					
porrigens Mart.	Amer. trop.	1 C.			
Brassia R. Br.					
Lanceana Lindl.	Surinamia	4 C.			
maculata R. Br.	Ind. occ.	4 C.			
Brassica Tourn.					
balearica Pers.	Balear. Niza	1 F.			
Δ bracteolata F. et M.	Aegyptus	2 D.			
Δ carinata Braun.	Abyssinia	2 D.			
Δ chinensis L.	China	2 DF.			
Δ cretica Lam.	Graecia	1 F.			
Δ fruticosa Cyr.	Eur. aust.	1 F.			
Δ incana Ten.	Neap. Sicilia	1 F.			
Δ insularis Mor.	Sardinia	1 F.			
Δ integrifolia Andr.	China	2 D.			
Δ juncea Bhd.	"	2 D.			
Δ macrocarpa Guss.	Sicilia	2 F.			
Δ mesopotamica Bhd.	Asia med.	2 D.			
Δ monensis Huds.	Anglia	4 DF.			
Δ montana Raf.	Sicilia	1 F.			
Δ Napus L.	Asia med.	2 D.			
" α . campestris	— β . esculenta	—			
γ . napobrassica.					
Δ oleracea L.	Eur. occ. aust.	2 D.			
" β . acephala	— γ . bullata	— δ .			
capitata	— ϵ . caulorapa	— ζ . botritis.			
Δ praecox W. et K.	Eur. or-aust.	2 D.			
Δ Rapa L.	?	2 D.			
Δ sinapioides Roth.	Eur. aust.	2 D.			
Δ Tournefortii Gou.	Eur. aust-or.	2 D.			
(vide: Conringia — Erucastrum — Eruca — Moricandia).					
Braya St. et H.					
siliquosa Bge.	Altai	4 D.			
supina Koch	Eur. occ. aust.	2 D.			
Brebissonia Spach.					
cylindracea Lindl.	Mexico	1 F.			
microphylla Spach.	"	1 F.			
Brexia P. Th.					
spinosa Lindl.	Madagascaria	5 F.			
Briza L.					
Δ geniculata Thnbg.	Cap. b. sp.	2 CD.			
Δ maxima L.	Eur. aust.	2 D.			
Δ media L.	Europa	4 D.			
Δ minor L.	Eur. aust.	2 D.			
(vide: Chascolytrum).					
Brodiaea Sm.					
congesta Sm.	Ins. Salomon.	4 F.			
Bromelia L.					
bracteata Sm.	Ind. occ.	1 C.			
Karatas L.	Amer. trop.	1 C.			
(vide: Ananassa — Billbergia — Cryptanthus).					
Bromus L.					
adoënsis Hochst.	Abyssinia	2 D.			
angustifolius Horn.	?	4 D.			
Δ arvensis L.	Europa	2 D.			
Δ asper Murr.	"	4 D.			
Δ Biebersteinii R. et S.	Caucasia	4 D.			
Δ brachystachys Horng.	Eur. med.	2 D.			
Δ brizaeformis F. et M.	Cauc. Georg.	2 D.			
Δ canadensis Mchx.	Amer. bor.	4 D.			
Δ ciliatus L.	"	4 D.			
commutatus Schrad.	Eur. med.	2 D.			
Δ confertus M. B.	Eur. or-au.	2 D.			
Δ divaricatus Rhod.	Gallia	2 D.			
" β . lanuginosus Poir.					
Δ erectus Huds.	Europa	4 D.			
" β . glaucus Spr.					
Δ inermis Leyss.	Europa	4 D.			
intermedius Guss.	Italia	2 D.			
Δ jubatus Ten.	"	2 D.			
Δ lanceolatus Roth.	Sicil. Graec.	2 D.			
" β . hirsutissimus.					
Δ laxus Horn.	?	4 D.			
Δ longiflorus W.	?	4 D.			
Δ madritensis L.	Eur. aust.	2 D.			
Δ maximus Desf.	"	2 D.			
Δ mollis L.	Europa	2 D.			
Δ multiflorus Mart.	Amer. bor.	4 D.			
Δ patulus M. et K.	Eur. med.	2 D.			
Δ pendulinus Schrad.	Mexico	2 D.			
Δ pilosus Dietr.	Eur. aust.	2 D.			
Δ platystachyos Desf.	Am. bor-au.	2 DF.			
Δ purgans L.	Amer. bor.	2 D.			
Δ purpurascens Del.	Aegyptus	2 D.			
Δ racemosus L.	Europa	2 D.			
Δ rigidus Roth.	Eur. aust.	2 D.			
Δ rubens L.	"	2 D.			
Δ Schraderi Kth.	Am. bor-aust.	2 D.			
Δ scoparius L.	Eur. aust.	2 D.			
Δ secalinus L.	Europa	2 D.			
Δ squarrosus L.	Eur. aust.	2 D.			
Δ sterilis L.	Europa	2 D.			
Δ tectorum L.	"	2 D.			
Δ velutinus Schrad.	Eur. med-au.	2 D.			
Δ vestitus Schrad.	Cap. b. sp.	2 D.			
Δ Willdenowii Kth.	Am. bor-aust.	2 D.			
(vide: Festuca — Gaudinia — Michelia — Vulpia).					
Brotheroa Spr.					
Δ trinervata Pers.	Amer. aust.	2 D.			
Broussonetia Vent.					
papyrifera Vent.	Japonia	5 DF.			
Browallia L.					
Δ demissa L.	Amer. trop.	2 CD.			
Δ elata L.	"	2 CD.			
Δ elongata Kth.	"	2 CD.			
Brucea L'Her.					
antidysenterica Mill.	Abyssinia	5 C.			
Brugmansia Pers.					
candida Pers.	Amer. aust.	5 T.			
sanguinea G. Don.	"	5 T.			

Brugmansia				Bunchosia Rich.	(<i>Malpighiaceae</i>)
suaveolens W.	Amer. aust.	5 D.		glandulifera Kth.	Amer. trop. ½ C.
(vide: Juan-Ulloa).				Bunias Hall.	(<i>Cruciferae</i>)
Brunfelsia L.	(<i>Scrophulariaceae</i>)			aspera Retz.	Eur. aust. ① D.
americana L.	Amer. trop.	½ C.		Erucago L.	" " ① D.
Brunnichia Banks.	(<i>Polygoniaceae</i>)			macroptera Rchb.	" " ① D.
cirrhosa Gaertn.	Carol. Baham.	½ F.		(vide: Calepina — Laelia — Euclidium — Ochthodium).	
Brunswigia Ker.	(<i>Amaryllideae</i>)			Bunium L.	(<i>Umbelliferae</i>)
Josephinae Ker.	Cap. b. sp.	¾ T.		alpinum W. et K.	Eur. au-or. ¾ D. ½.
Bryonia Tourn.	(<i>Cucurbitaceae</i>)			montanum Koch.	Eur. aust. ¾ D. F.
alba L.	Europa	¾ D.		(vide: Carum — Chamaesciadium — Gasparinia — Ptychotis — Silaus).	
cretica L.	Creta	¾ F.		Buphthalmum L.	(<i>Synanthereae</i>)
dioica L.	Eur. med. au.	¾ D.		salicifolium L.	Eur. med. ¾ D.
laciniosa L.	Ind. or.	¾ C.		" " β . grandiflorum L.	
palmata L.	" "	¾ C.		(vide: Asteriscus — Borrichia — Heliopsis — Pallenis — Telekia).	
(vide: Cephalandra).				Bupleurum Tourn.	(<i>Umbelliferae</i>)
Bryophyllum Sal.	(<i>Crassulaceae</i>)			altaicum Pall.	Sibir. aust. ¾ D.
calycinum Sal.	Masc. Molucc.	½ C.		aristatum Bartl.	Eur. aust. ① D.
Bubon L.	(<i>Umbelliferae</i>)			aureum Fisch.	Sibir. aust. ¾ D. ½.
Galbanum L.	Cap. b. sp.	½ T.		falcatum L.	Europa ¾ D.
(vide: Athamanta — Libanotis — Seseli).				fruticosum L.	Eur. aust. ½ T.
Buchholtzia Mart.	(<i>Amarantaceae</i>)			Gerardi Jacq.	" " ① D.
ficoidea Mart.	Amer. trop.	① C.		glaucum R. et C.	" " ① D.
polygonoides Mart.	" "	① C.		junceum L.	" " ① D.
Buddleia L.	(<i>Scrophulariaceae</i>)			longifolium L.	Eur. med. ¾ D. ½.
brasiliensis Jacq. f.	Brasilia	½ C.		multinerve DeC.	Sibir. alt. ¾ D. F.
connata R. et S.	Peruvia	½ C.		Odontites L.	Eur. aust. ① D.
globosa Lam.	Chili, Peruv.	½ F.		protractum Lk.	" " ① D.
microphylla Kth.	Mexico	½ T.		ranunculoides L.	Alpes ¾ D.
salviaefolia Ait.	Cap. b. sp.	½ T.		rotundifolium L.	Europa ① D.
spicata R. et P.	Peruvia	½ T.		semicompositum L.	Eur. aust. ① D.
(vide: Nuxia).				stellatum L.	Alpes ¾ D. ½.
Büttneria Loeff.	(<i>Büttneriaceae</i>)			tenuissimum L.	Eur. med-au. ① D.
dasyphylla Gay.	Tasmania	½ F.		Burchelia R. Br.	(<i>Rubiaceae</i>)
Buffonia L.	(<i>Alsineae</i>)			capensis R. Br.	Cap. b. sp. ½ T.
annua DeC.	Gall. aust.	① D.		speciosa H. Belg.	" ½ T.
Buglossum Tourn.	(<i>Borragineae</i>)			Burgsdorfia Mönch.	(<i>Labiatae</i>)
officinale Lam.	Eur. occ-aust.	¾ D.		romana H. et L.	Eur. aust. ① D.
vulgare Tausch	Eur. aust.	¾ D.		Burrielia DeC.	(<i>Synanthereae</i>)
Bulbine L.	(<i>Liliaceae</i>)			gracilis DeC.	Nov. Calif. ① D.
aloides W.	Cap. b. sp.	½ T.		Bursaria Cav.	(<i>Pittosporineae</i>)
annua W.	" "	① D.		spinosa Cav.	Nov. Holl. ½ T.
frutescens W.	" "	½ T.		Burtonia R. Br.	(<i>Papilionaceae</i>)
latifolia Spr.	" "	¾ T.		conferta DeC.	Nov. Holl. ½ T.
longiscapa W.	" "	½ T.		Butomus Tourn.	(<i>Butomideae</i>)
rostrata W.	" "	½ T.		umbellatus L.	Europa ¾ D. ½.
semibarbata Haw.	Nov. Holl.	¾ T.		Buxus Tourn.	(<i>Euphorbiaceae</i>)
Bulbocapnos Bhd.	(<i>Fumariaceae</i>)			balearica Lam.	Balearae ½ F.
cavus Bhd.	Europa	¾ D.		sempervirens L.	Eur. aust. ½ D.
" β . albiflorus.				" " α . suffruticosa Lam. — β .	
intermedius K.	Europa	¾ D.		arborescens Lam. — γ . variegata.	
Lobellii K.	Eur. or.	¾ D.		Bystropogon L'Her.	(<i>Labiatae</i>)
solidus K.	Europa	¾ D.		plumosus L'Her.	Canariae ½ T.
(vide: Calocapnos).				punctatus L'Her.	Madera ½ T.
Bulbocodium L.	(<i>Veratrineae</i>)			Cacalia Tourn.	(<i>Synanthereae</i>)
vernum L.	Eur. aust.	¾ D. F.		atriplicifolia L.	Am. bor-au. ¾ D. ½.
Bumelia Swt.	(<i>Sapotaceae</i>)			cordifolia Kth.	Mexico ¾ T.
ambigua Ten	?	½ F.			
lycioides Gaertn. f.	Carolina	½ F. D.			
tenax W.	"	½ F. D.			

- Cacalia**
 ▲ gigantea Jacq. f. Louisiana 2 D.
 ▲ hastata L. Asia bor. 2 D.
 ▲ suaveolens L. Amer. bor. 2 D.
 (vide: Adenostyles — Emilia — Kleinia — Othonna — Porophyllum — Senecio).
- Cachrys**, vide: Aegommarathrum — Krubera — Rumia.
- Cactus**, vide: Cereus — Echinocactus — Echinopsis — Epiphyllum — Hariota — Lepismium — Mammillaria — Melocactus — Opuntia — Pereskia — Phyllocactus.
- Caesalpinia** L. (Caesalpinaceae)
 Sappan L. Ind. or. 5 C.
 (vide: Coulteria).
- Cajanus** DeC. (Papilionaceae)
 bicolor DeC. Ind. or. 1 C.
 flavus DeC. " " 1 C.
- Cajophora** Prsl. (Loasaceae)
 ▲ lateritia Klotzsch La Plata ② CD.
- Cakile** Tourn. (Cruciferae)
 maritima Scop. Europa ② D.
 (vide: Rapistrum).
- Caladium** Vent. (Araceae)
 bicolor Vent. Brasilia 2 C.
 pellucidum DeC. " 2 C.
 pictum DeC. " 2 C.
 (vide: Colocasia — Dieffenbachia — Philodendron — Xanthosoma).
- Calamagrostis** Adans (Gramineae)
 ▲ Epigeos Roth. Europa 2 D.
 ▲ glauca Rehb. " 2 D.
 ▲ Halleriana Roth. " 2 DF.
 ▲ lanceolata Roth. " 2 D.
 laxa Host. Eur. med. aust. 2 D.
 litorea DeC. " " 2 D.
 (vide: Deyeuxia — Lasiagrostis).
- Calamintha** Tourn. (Labiatae)
 ▲ athonica Rehb. Eur. aust. or. 2 D.
 ▲ dilatata Schrad. Am. bor. aust. 2 D.
 ▲ diffusa Hort. Eur. aust. 2 D.
 ▲ grandiflora Mönch. Eur. med. au. 2 DF.
 ▲ menthaefolia Host. Carn. Illyr. 2 DF.
 ▲ Nepeta H. et Lk. Eur. med. au. 2 D.
 ▲ obliqua Host. Eur. aust. 2 D.
 ▲ officinalis Mönch. Eur. med. au. 2 D.
 ▲ villosa Jacq. f. Eur. aust. 2 D.
 ▲ umbrosa Rehb. " " 2 D.
 (vide: Micromeria — Cuspidocarpus).
- Calampelis** D. Don. (Bignoniaceae)
 ▲ scabra Don. Chili 1 DF.
- Calandrinia** Kunth. (Portulacaceae)
 ▲ ciliata DeC. Peruvia ② D.
 ▲ glandulosa Pöpp. Chili ② D.
 ▲ micrantha Schltd. Mexico ② D.
 ▲ procumbens Moris Chili ② D.
 ▲ sericea H. et A. " ② D.
 ▲ speciosa Lindl. California ② D.
 ▲ umbellata DeC. Chili ② D.
 (vide: Cistanthe — Monocosmia).
- Calanthe** R. Br. (Orchideae)
 densiflora Lindl. Ind. or. 2 C.
 furcata Batem. Philippinae 2 C.
 veratrifolia R. Br. Moluccae 2 C.
- Calathea** W. Mey. (Cannaceae)
 bicolor Steudl. Brasilia 2 C.
 Cassupito W. Mey. Caracas 2 C.
 flavesces Lindl. Brasilia 2 C.
 zebrina Lindl. " 2 C.
- Calceolaria** Feuill. (Scrophulariaceae)
 angustifolia R. et P. Peruvia 1 F.
 arachnoidea Grah. Chili 1 F.
 bicolor R. et P. Peruvia 1 F.
 crenatiflora Cav. Chili 2 F.
 connata Hook " 2 F.
 corymbosa R. et P. " 2 F.
 excelsa Grah. " 1 F.
 integrifolia L. " 1 F.
 ▲ pinnata L. Peruvia ② CD.
 plantaginea Sm. Chili, Patag. 2 F.
 purpurea Grah. Chili 2 F.
 robusta Dietr. " 1 F.
 rugosa R. et P. " 1 F.
 salicifolia R. et P. Peruvia 1 F.
 scabiosaefolia R. et P. " 2 F.
 Wheeleri Swt. Chili 1 DF.
 et pl. hybr.
- Caldasia** Lag. (Umbelliferae)
 ▲ eriopoda DeC. Nov. Holl. 2 F.
 (vide: Bonplandia).
- Calea** L. (Synanthereae)
 ▲ jamaicensis L. Ind. occ. 1 C.
- Calendula** L. (Synanthereae)
 ▲ aegyptiaca Desf. Aegyptus ② D.
 ▲ arragonica Fisch. Hispania ② D.
 ▲ arvensis L. Eur. med. au. ② D.
 ▲ denticulata Schousb. Eur. aust. ② D.
 ▲ " β. costata — γ. dasycarpa.
 ▲ gracilis DeC. Persia ② D.
 ▲ incana W. Lus. Afr. bor. ② D.
 ▲ maritima Guss. Sicilia ② D.
 ▲ officinalis L. Eur. aust. ② D.
 ▲ " β. cristata
 ▲ persica C. A. Mey Persia ② D.
 ▲ sicala Cyr. Sicil. Aegypt. ② D.
 ▲ stellata Cav. Afr. bor. ② D.
 (vide: Dimorphothea).
- Calopina** Adans. (Cruciferae)
 ▲ Corvini Desc. Eur. aust. ② D.
- Calimeris** Cass. (Synanthereae)
 ▲ altaica N. E. Sibir. aust. 2 DF.
 ▲ " β. grandiflora.
 ▲ incisa DeC. Sibiria 2 D.
- Calla** L. (Araceae)
 palustris L. Europa 2 DV.
 (vide: Monstera — Richardia).
- Calliandra** Benth. (Mimosaceae)
 portoricensis Benth. Ind. occ. 1 C.
 tetragona Benth. Amer. trop. 1 C.
- Callianthemum** C. A. Mey. (Ranunculinae)

<i>Callianthemum</i>				<i>Calophaca</i> Fisch.	(<i>Papilionaceae</i>)
<i>rutaefolium</i> C. A. Mey.	Alpes	¶ D. J.		<i>Hoveni</i> Fisch.	Sibir. aust. ¶ DF.
<i>Callicarpa</i> L.		(<i>Verbenaceae</i>)		<i>wolgarica</i> Fisch.	Ruth. aust. ¶ DF.
<i>americana</i> L.	Am. bor.-aust.	¶ FD.		<i>Calophanes</i> D. Don.	(<i>Acanthaceae</i>)
<i>cana</i> L.	Ind. or.	¶ C.		<i>oblongifolia</i> Don.	Carolina ¶ FD.
<i>tomentosa</i> W.	" "	¶ C.		<i>Calosmon</i> Presl. (1823)	(<i>Laurineae</i>)
<i>Callichroa</i> F. et M.		(<i>Synanthereae</i>)		<i>aestivalis</i> K.	Amer. bor. ¶ DF.
<i>platyglossa</i> F. et M.	Nov. Calif.	⊙ D.		<i>Calostemma</i> R. Br.	(<i>Amaryllideae</i>)
<i>Callicoma</i> Andr.		(<i>Cunoniaceae</i>)		<i>luteum</i> Ker.	Nov. Holl. ¶ T.
<i>serratifolia</i> Andr.	Nov. Holl.	¶ T.		<i>Calothamnus</i> Lab.	(<i>Myrtineae</i>)
<i>Calliglossa</i> Hook.		(<i>Synanthereae</i>)		<i>clavata</i> Cungh.	Nov. Holl. ¶ T.
<i>Douglassii</i> Hook.	Nov. Calif.	⊙ D.		<i>gracilis</i> R. Br.	" " ¶ T.
<i>Calliopsis</i> Rehb.		(<i>Synanthereae</i>)		<i>quadrifida</i> R. Br.	" " ¶ T.
<i>Atkinsoniana</i> Hook	Am. bor.-occ.	⊙ D.		<i>villosa</i> R. Br.	" " ¶ T.
<i>bicolor</i> Rehb.	Amer. bor.	⊙ D.		(vide: <i>Pentagonaster</i>).	
<i>Drummondii</i> Swt.	Am. bor.-occ.	⊙ D.		<i>Calpurnia</i> E. Mey.	(<i>Papilionaceae</i>)
<i>Callisace</i> Fisch.		(<i>Umbelliferae</i>)		<i>aurea</i> Benth.	Abyssinia. ¶ T.
<i>dahurica</i> Fisch.	Sibir. aust.	⊙ DF.		<i>sylvatica</i> E. Mey.	Cap. b. sp. ¶ T.
<i>Callistachys</i> Vent.		(<i>Papilionaceae</i>)		<i>Caltha</i> L.	(<i>Ranunculineae</i>)
<i>lanceolata</i> Vent.	Nov. Holl.	¶ T.		<i>palustris</i> L.	Europa ¶ D.V.
<i>longifolia</i> Paxt.	" "	¶ T.		<i>β fl. pleno.</i>	
<i>ovata</i> Sims.	" "	¶ T.		<i>radicans</i> Forst	Scotia ¶ D.V.
<i>retusa</i> Lodd.	" "	¶ T.		<i>Calycanthus</i> L.	(<i>Calycanthaceae</i>)
<i>Callistemon</i> R. Br.		(<i>Myrtineae</i>)		<i>floridus</i> L.	Am. bor.-au. ¶ DF.
<i>acerosus</i> Tausch.	Nov. Holl.	¶ T.		<i>glaucus</i> W.	" " ¶ DF.
<i>crassifolius</i> Dum.-C.	" "	¶ T.		<i>laevigatus</i> W.	" " ¶ DF.
<i>glaucus</i> Swt.	" "	¶ T.		(vide: <i>Chimonanthus</i>).	
<i>heteronervis</i> K.	" "	¶ T.		<i>Calycomeia</i> K. *)	(<i>Oleaceae</i>)
<i>hybridus</i> DeC.	" "	¶ T.		<i>acuminata</i> K.	Amer. bor. 5 D.
<i>intermedius</i> H. Berol.	" "	¶ T.		<i>alba</i> K.	" " 5 D.
<i>lanceolatus</i> DeC.	" "	¶ T.		<i>caroliniana</i> K.	" " 5 D.
<i>β. angustifolius</i> — <i>γ citrinus</i> .				<i>elliptica</i> K.	" " 5 D.
<i>lanuginosus</i> Hort.	" "	¶ T.		<i>epiptera</i> K.	" " 5 D.
<i>latifolius</i> Hoffg.	" "	¶ T.		<i>expansa</i> K.	" " 5 D.
<i>linearifolius</i> DeC.	" "	¶ T.		<i>juglandifolia</i> K.	" " 5 D.
<i>linearis</i> DeC.	" "	¶ T.		<i>lancea</i> K.	" " 5 D.
<i>β. brachyphyllus</i> .				<i>nigra</i> K.	" " 5 D.
<i>Lophanthus</i> Swt.	" "	¶ T.		<i>ovata</i> K.	" " 5 D.
<i>marginatus</i> DeC.	" "	¶ T.		<i>pallida</i> K.	" " 5 D.
<i>pallidus</i> DeC.	" "	¶ T.		<i>platycarpa</i> K.	" " 5 D.
<i>praecox</i> Hort.	" "	¶ T.		<i>pubescens</i> K.	" " 5 D.
<i>pinifolius</i> DeC.	" "	¶ T.		<i>Richardi</i> K.	" " 5 D.
<i>rigidus</i> R. Br.	" "	¶ T.		<i>viridis</i> K.	" " 5 D.
<i>rugulosus</i> DeC.	" "	¶ T.		<i>Calycotome</i> Lk	(<i>Papilionaceae</i>)
<i>salignus</i> DeC.	" "	¶ T.		<i>spinosa</i> Lk.	Eur. aust. ¶ FD.
<i>semperflorens</i> Lodd.	" "	¶ T.		<i>villosa</i> Lk.	" " ¶ FD.
<i>Sieberi</i> DeC.	" "	¶ T.		<i>Calycothrix</i> Lab.	(<i>Myrtineae</i>)
<i>speciosus</i> DeC.	" "	¶ T.		<i>glabra</i> R. Br.	Nov. Holl. ¶ T.
<i>viridiflorus</i> DeC.	" "	¶ T.		<i>virgata</i> Hook.	" " ¶ T.
<i>Callistephus</i> Cass.		(<i>Synanthereae</i>)		<i>Calystegia</i> R. Br.	(<i>Convolvulineae</i>)
<i>chinensis</i> N. E.	Chin. Japon.	⊙ D.		<i>dahurica</i> Fisch.	Sibir. aust. ¶ DF.
<i>Callitriche</i> L.		(<i>Callitricheae</i>)		<i>lucana</i> Don.	Neapolis ¶ FD.
<i>vernalis</i> Kütz.	Europa	⊙ D.V.		<i>sepium</i> R. Br.	Europa ¶ FD.
<i>Callitris</i> Vent.		(<i>Cupressineae</i>)		<i>Soldanella</i> R. S.	Eur. au.-occ. ¶ DF.
<i>australis</i> Swt.	Nov. Holl.	¶ T.		<i>Camaridium</i> Lindl.	(<i>Orchideae</i>)
<i>rhomboidea</i> R. Br.	" "	¶ T.		<i>ochroleucum</i> Lindl.	Ind. occ. ¶ C.
<i>Calluna</i> Sal.		(<i>Ericaceae</i>)		<i>Camelina</i> Crantz.	(<i>Cruciferae</i>)
<i>vulgaris</i> Sal.	Europa	¶ D.		<i>dentata</i> Pers.	Eur. med. ⊙ D.
<i>β. fl. pleno.</i>				<i>β. pinnatifida</i> Horn.	
<i>Calocarpus</i> Spach.		(<i>Fumariaceae</i>)		<i>laxa</i> C. A. Mey.	Asia bor. ⊙ D.
<i>nobilis</i> Spach.	Asia bor.	¶ D.		*) <i>Fraxini</i> spec. Aut.	

Camelina

- macrocarpa Wierzb. Banatus ⊙ D.
 — microcarpa Andr. Europa ⊙ D.
 — sativa Crantz. " ⊙ D.
 (vide: Roripa).

Camellia L.

(Cameliaceae)

- euryoides Lindl. China ½ T.
 japonica L. et pl. v. Japonia 5 T.
 Kissi Wall. Nepalia ½ T.
 oleifera Abel. China ½ T.
 reticulata Lindl. " ½ T.
 Sassangua Thnbg. Japonia 5 T.

Campanula Tourn.

(Campanulaceae)

- aggregata W. Eur. aust. ¼ D.
 — alaris H. Berol. Amer. bor. ② DF.
 americana L. " " ② DF.
 azurea Sims. Eur. aust. ¼ DF.
 Bocconi Gmel. Gall. aust. ¼ FD.
 bononiensis L. Eur. or-aust. ¼ D.

— β. obliquaefolia Ten.

- caespitosa Scop. Alpes ¼ D. ½.

- cana Wall. Nepalia ⊙ FD.

- carpatica Jacq. Hung. Trans. ¼ D. ½.

- cephalotes Fisch. Asia bor. ¼ D.

- Cervicaria L. Eur. med. au. ② D.

- collina MB. Taur. Cauc. ¼ D.

- crenata Lk. Eur. or. ¼ D.

- elliptica Kit. Hungaria ¼ D.

- Erinus L. Eur. aust. ⊙ D.

- eximia Wend. ? ¼ D.

- floribunda Viv. Eur. aust. ¼ FD.

- floribunda Ten. Neapolis ¼ DF.

- fragilis Cyr. " ¼ F.

- garganica Ten. Neap. Dalm. ¼ FD.

- glomerata L. Europa ¼ D.

- grandis F. et M. Oriens ¼ DF.

- illinoensis Fres. Amer. bor. ¼ DF.

- laciniata L. fil. Graecia ② DF.

- lactiflora MB. Caucasia ¼ DF.

- lanceolata Lap. Pyrenaei ¼ DF.

- latifolia L. Europa ¼ D.

— β. fl. albo.

- linifolia Lam. Alp. Sudet. ¼ D. ½.

- Loeflingii Brot. Lus., Afr. bor. ⊙ D.

- Lorei L. Eur. aust-or. ⊙ D.

- multiflora W. et K. Hungaria ② D.

- patula L. Europa ② D.

- peregrina L. Asia med. ② FD.

- persicaefolia L. Europa ¼ D.

— β. fl. pleno.

- pusilla Haenke. Alpes ¼ D. ½.

— β. fl. albo.

- pyramidalis L. Eur. aust-or. ¼ D.

— β. fl. albo.

- ramosissima S. et Sm. Graecia ⊙ D.

- rapunculoides L. Europa ¼ D.

- Rapunculus L. Eur. med. au. ② D.

- rhomboidea L. Eur. aust. ¼ DF.

- rotundifolia L. Europa ¼ D.

— β. tenuifolia Hoffm.

Campanula

- ruthenica MB. Ruth. aust. ¼ D.
 Scheuchzeri Vill. Alpes ¼ D. ½.
 silenifolia Fisch. Sibir. aust. ¼ D. ½.
 spicata L. Eur. aust. ② DF.
 Steveni MB. Ruth. au. Sib. ¼ DF.

— β. altaica.

- thyrsoidea L. Alpes ② D. ½.

- trachelioides MB. Caucasia ¼ D.

- Trachelium L. Europa ¼ D.

— β. urticaefolia Schm.

- versicolor S. et Sm. Graecia ¼ FD.

- (vide: Adenophora — Marianthemum —

- Musschia — Platycodon — Roucela —

- Specularia — Symphyandra — Wahlen-

- bergia).

Campelia Rich.

(Commelinaceae)

- Zanonia Rich. Amer. trop. ¼ C.

Camphora N. E.

(Lauriaceae)

- officinatum N. E. China, Japon. ½ T.

Canarina Juss.

(Campanulaceae)

- Campanula L. fil. Canariae ¼ T.

Canavalia Adans.

(Papilionaceae)

- bonariensis Lindl. La Plata ½ T.

Candollea Labil.

(Dilleniaceae)

- cuneiformis Lab. Nov. Holl. ½ T.

- Cunninghami Benth. " ¼ ½ T.

Canna L.

(Cannaceae)

- aurantiaca Rosc. Amer. aust. ½ C.

- brasiliensis Spr. " " ½ C.

- chinensis W. Ind. or. Chin. ¼ C.

- coccinea Ait. Amer. trop. ¼ C.

- compacta Rosc. Ind. or. ¼ C.

- commutata Bouch. Amer. aust. ¼ C.

- densiflora Bouch. " ? " ¼ C.

- discolor Lindl. Ind. occ. ¼ C.

- edulis Ker. Amer. aust. ¼ C.

- exigua Bouch. " " ¼ C.

- excelsa Lodd. " " ¼ C.

- flavescens Lk. Ind. or. ¼ C.

- floribunda Bouch. Amer. aust. ¼ C.

- gigantea Desf. " " ¼ C.

- glauca L. Ind. occ. " ¼ C.

- humilis Bouch. China or. ¼ C.

- indica L. Ind. aust. ¼ C.

- iridiflora R. et P. Amer. med. ¼ C.

- lagunensis Lindl. Amer. aust. ¼ C.

- Lamberti Lindl. " " ¼ C.

- lanuginosa Rosc. " " ¼ C.

- leptochila Bouch. " " ¼ C.

- limbata Rosc. " " ¼ C.

- lutea Ait. " " ¼ C.

- maculata Lk. Ind. occ. ¼ C.

- mexicana Lk. Mexico ¼ C.

- nepalensis Wall. Ind. or. ¼ C.

- occidentalis Rosc. Ind. occ. ¼ C.

- orientalis Rosc. Ind. or. ¼ C.

- pallida Rosc. Amer. aust. ¼ C.

- patens Rosc. Ins. Helena ¼ C.

- platyphylla Lk. Amer. aust. ¼ C.

Canna			Capsicum		
polymorpha Lodd.	Amer. aust.	4.C.	tetragonum Mill.	Amer. trop.	⊙ C.
portoricensis Bouch.	Ind. occ.	4.C.	violaceum Kth.	Peruvia	4.C.
Sellowii Lk.	Amer. aust.	4.C.	Caragana Lam. (<i>Papilionaceae</i>)		
speciosa Rosc.	Ind. or.	4.C.	Altagana Poir.	Sibir.	4.D.
spectabilis Bouch.	?	4.C.	arborescens Lam.	"	4.D.
stolonifera Lk.	Montevideo	4.C.	arenaria Fisch.	"	4.D.
surinamensis Bouch.	Surinamia	4.C.	Chamlagu Lam.	China bor.	4.D.
tenuiflora Bouch.	Ind. occ.	4.C.	frutescens DeC.	Ruth. aust. As.	4.D.
variegata Bouch.	Amer. aust. ?	4.C.	" β . sylvatica H. Vind.	?	4.D.
vittata H. Leod.	Ind. occ.	4.C.	glomerata Booth	Sibir. aust.	4.D.
Cannabis Tourn. (<i>Cannabineae</i>)			jubata Poir.	"	4.D.
sativa L.	Asia	⊙ D.	microphylla DeC.	"	4.D.
β . gigantea.			pygmaea DeC.	"	4.D.
Capnoides Gaertn. (<i>Fumaria</i>)			Redowskii Fisch.	"	4.D.
albida Bhd.	Eur. aust.	② D.	spinosa DeC.	"	4.D.
lutea Gaertn.	Eur. aust.	4.D.	sophoraefolia Tausch	"	4.D.
ochroleuca K.	"	② D.	Caraguata Plum. (<i>Bromeliaceae</i>)		
rigidula Bhd.	Istria.	4.FD.	lingulata Lindl.	Ind. occ.	4.C.
Capnophyllum Gaertn. (<i>Umbelliferae</i>)			Caraluma R. Br. (<i>Asclepiadineae</i>)		
africanum Gaertn.	Cap. b. sp.	⊙ CF.	crenulata Wall.	Ind. or.	4.C.
Capparis Plum. (<i>Capparidaceae</i>)			Cardamine Tourn. (<i>Cruciferae</i>)		
orientalis H. Petr.	Oriens	4.F.	asarifolia L.	Alpes	4.D.J.
sicula Guss.	Sicil. Neap.	4.F.	bellidifolia L.	"	4.D.J.
spinosa L.	Eur. aust.	4.F.	dasyloba Bhd.	Asia bor.	4.D.J.
(vide: Utrerveria).			flaccida Cham.	Chili	4.F.
Capraria L. (<i>Scrophulariaceae</i>)			Gmelini K.	Asia bor.	4.D.J.
biflora L.	Amer. aust.	4.C.	hirsuta L.	Europa	⊙ D.J.
(vide: Freylinia — Teedia).			Impatiens L.	"	⊙ D.J.
Caprifolium Tourn. (<i>Caprifoliaceae</i>)			macrophylla W.	Asia bor.	4.D.J.
balearicum Dum-C.	Eur. aust.	4.FD.	parviflora L.	Eur. med-au.	⊙ D.
dimorphum K.	"	4.D.	pratensis L.	Europa	4.D.V.
gratum Pursh.	Amer. bor.	4.D.	trifolia L.	Eur. med-au.	4.D.J.
Fraseri Pursh.	"	4.D.	Cardaria Desv. (<i>Cruciferae</i>)		
hispidulum Lindl.	"	4.D.	Draba Desv.	Eur. med. aust.	4.D.
hortense Lam.	Eur. aust.	4.D.	propinqua K.	Caucasia	4.DF.
" β . rubrum.			Cardiospermum L. (<i>Sapindaceae</i>)		
italicum K. (non R. et S.)	"	4.D.	corycodes Kze.	Cuba	⊙ CD.
parviflorum Pursh.	Amer. bor.	4.D.	Halicacabum L.	Ind. or.	⊙ CD.
pubescens Gold.	"	4.D.	Carduncellus Adans. (<i>Synantheraceae</i>)		
sylvaticum Lam.	Eur. med. aust.	4.D.	coeruleus DeC.	Eur. aust.	4.FD.
(vide: Periclymenum).			Carduus Tourn. (<i>Synantheraceae</i>)		
Capsella Medic. (<i>Cruciferae</i>)			acanthoides L.	Europa	⊙ D.
bursa pastoris Med.	Europa	⊙ D.	alpestris W. et K.	Carn. Croat.	4.D.J.
procumbens Fries.	Eur. aust-or.	⊙ D.	arabicus Jacq.	Oriens, Sicil.	⊙ FD.
Capsicum Tourn. (<i>Solanaceae</i>)			Argemone Pour.	Pyrenaei	4.D.J.
angulosum Mill.	Amer. trop.	⊙ CD.	argentatus L.	Graec. Aeg.	⊙ D.
annuum L.	"	⊙ CD.	Argyroa Biv.	Sicilia	⊙ D.
baccatum L.	"	4.C.	Candollei Moret.	Gall. Ital.	⊙ DF.
bicolor Jacq.	"	4.C.	carlinaefolius Lam.	Gall. au. Pyr.	4.D.J.
cerasiforme W.	"	⊙ C.	cephalanthus Viv.	Sardinia	⊙ DF.
conoideum Mill.	"	⊙ C.	cinereus M. B.	Taur. Cauc.	⊙ D.
cordiforme Mill.	"	⊙ C.	crispus L.	Europa	⊙ D.
frutescens W.	Ind. or. occ.	4.C.	defloratus L.	Alp. Subalp.	4.D.J.
grossum W.	Ind. or.	⊙ C.	glaucus Led.	?	4.D.J.
longum DeC.	Amer. trop.	⊙ C.	hamulosus Ehrh.	Eur. or-aust.	⊙ D.
pendulum W.	"	⊙ C.	Hystrix C. A. Mey.	Caucasia	⊙ DF.
pyramidale Mill.	Ind. or. Afr.	4.C.	nutans L.	Europa	⊙ D.
sinense Jacq.	China	4.C.	Personata Jacq.	Alp. Subalp.	⊙ D.
sphaericum W.	Amer. trop.	⊙ C.	platylepis Saut.	Tyrolia	⊙ D.

Carduus

<i>pycnocephalus</i> L.	Eur. aust.	⊙ D.
<i>summanus</i> Poll.	Italia	⊙ DF.
(vide: <i>Chamaepeuce</i> — <i>Cirsium</i> — <i>Jurinea</i> — <i>Stemmacantha</i> — <i>Tyrimnus</i>).		
<i>Carex</i> Dillen.	(Cyperineae)	
<i>acuta</i> L.	Europa	⊙ D.V.
<i>alba</i> Scop.	Eur.med.au.	⊙ D.J.
<i>alpestris</i> All.	Eur. aust.	⊙ DF.
<i>arenaria</i> L.	Eur. occ.	⊙ D.
<i>atrata</i> L.	Alp.Subalp.	⊙ D.J.
<i>atrofusca</i> Stev.	Caucasus	⊙ D.J.
<i>bicolor</i> All.	Alpes	⊙ D.J.
<i>Buxbaumii</i> Wahlb.	Eur.b.med.	⊙ D.V.
<i>caespitosa</i> L.	Europa	⊙ D.V.
<i>canescens</i> L.	"	⊙ D.V.
<i>capillaris</i> L.	Alp. Sudet.	⊙ D.J.
<i>caucasica</i> Stev.	Caucasus	⊙ D.J.
<i>corsicana</i> Lk.	Corsica	⊙ DF.
<i>cristata</i> Schwei.	Amer. bor.	⊙ D.
<i>Davalliana</i> Sm.	Europa	⊙ D.
<i>depauperata</i> Good.	Eur.occ.aust.	⊙ D.
<i>digitata</i> L.	Europa	⊙ D.
<i>dioica</i> L.	"	⊙ D.V.
<i>distans</i> L.	"	⊙ D.
<i>divisa</i> Huds.	Eur.med.aust.	⊙ D.
<i>divulsa</i> Good.	Europa	⊙ D.
<i>echinata</i> Murr.	"	⊙ D.V.
<i>Eckloni</i> N. E.	Cap. b. sp.	⊙ F.
<i>elongata</i> L.	Europa	⊙ D.V.
<i>extensa</i> Good.	Eur.occ.au.	⊙ D.V.
<i>ferruginea</i> Schk.	Alpes	⊙ D.J.
<i>festucacea</i> Schk.	Amer. bor.	⊙ D.
<i>flava</i> L.	Europa	⊙ D.V.
<i>foenea</i> W.	Amer. bor.	⊙ D.
<i>formosa</i> Desv.	Am.bor.aust.	⊙ DF.
<i>Fraseri</i> Andr.	" " "	⊙ DF.
<i>frigida</i> All.	Alpes	⊙ D.J.
<i>fuliginosa</i> St. et H.	"	⊙ D.J.
<i>glauca</i> Scop.	Europa	⊙ D.V.
<i>granularis</i> Mühlb.	Am.bor.aust.	⊙ DF.
<i>hirta</i> L.	Europa	⊙ D.
<i>hordeiformis</i> Wahlb.	Eur.occ.aust.	⊙ D.
<i>Hostiana</i> DeC.	Eur. med.	⊙ D.V.
<i>humilis</i> Leyss.	Europa	⊙ D.
<i>hyalina</i> K.	"	⊙ D.
<i>indica</i> L.	Ind. or.	⊙ F.
<i>intermedia</i> Good.	Europa	⊙ D.
<i>irrigua</i> Sm.	Alp. Sudet.	⊙ D.J.
<i>laevigata</i> Sm.	Eur. occ.	⊙ D.
<i>Lagopodioides</i> Schk.	Amer. bor.	⊙ D.
<i>leiorhyncha</i> C. A. Mey.	Sibir. aust.	⊙ DF.
<i>Lepidocarpa</i> Tausch.	Europa	⊙ D.V.
<i>Leporina</i> L.	"	⊙ D.
<i>Mairei</i> Coss. et G.	Gallia	⊙ D.
<i>Micheli</i> Host.	Europa	⊙ D.
<i>Mielichhoferi</i> Schk.	Alpes	⊙ D.J.
<i>montana</i> L.	Europa	⊙ D.
<i>muricata</i> L.	"	⊙ D.
<i>nigra</i> All.	Alpes	⊙ D.J.

Carex

<i>nitida</i> Host.	Eur.med.aust.	⊙ D.
<i>nubigena</i> Don	Nepalia	⊙ F.
<i>nutans</i> Host.	Eur. or. Asia	⊙ D.
<i>Oederi</i> W.	Europa	⊙ D.V.
<i>ornithopoda</i> W.	Alpes	⊙ D.J.
<i>pallescens</i> L.	Europa	⊙ D.V.
<i>paludosa</i> Good.	"	⊙ D.V.
<i>panicea</i> L.	"	⊙ D.V.
<i>paniculata</i> L.	"	⊙ D.V.
<i>paradoxa</i> Schk.	"	⊙ D.V.
<i>pauciflora</i> Lightf.	"	⊙ D.J.
<i>pedata</i> L.	Eur. arct.	⊙ D.J.
<i>pendula</i> Huds.	Europa	⊙ D.V.
<i>pilosa</i> All.	"	⊙ D.
<i>praecox</i> Jacq.	"	⊙ D.
<i>Pseudo-Cyperus</i> L.	"	⊙ D.V.
<i>pulicaris</i> L.	"	⊙ D.V.
<i>punctata</i> Good.	Eur. aust.	⊙ DF.
<i>pyrenaica</i> Wahlb.	Pyrenaei	⊙ D.J.
<i>remota</i> L.	Europa	⊙ D.
<i>repens</i> Bell.	Eur. aust.	⊙ DF.
<i>retroflexa</i> Mühlb.	Amer. bor.	⊙ D.
<i>rigida</i> Good.	Sudet.Herc.	⊙ D.J.
<i>riparia</i> Curt.	Europa	⊙ D.V.
<i>rosea</i> Schk.	Amer. bor.	⊙ D.
<i>rostrata</i> Mühlb.	Am. bor-au.	⊙ DF.
<i>Schraderi</i> Schk.	Eur. or.	⊙ D.
<i>Schreberi</i> W.	Europa	⊙ D.
<i>scoparia</i> Schk.	Amer. bor.	⊙ D.
<i>secalina</i> Whlb.	Eur. or-aust.	⊙ D.
<i>serrulata</i> Biv.	Sicilia	⊙ F.
<i>stenophylla</i> Wahlb.	Europa	⊙ D.
<i>sterilis</i> Schk.	Amer. bor.	⊙ D.
<i>stipata</i> Mühlb.	"	⊙ D.
<i>straminea</i> Schk.	"	⊙ D.
<i>stricta</i> Good.	Europa	⊙ D.V.
<i>sylvatica</i> Huds.	"	⊙ D.
<i>tenuis</i> Host.	Alpes	⊙ D.J.
<i>teretiuscula</i> Good.	Europa	⊙ D.V.
<i>tomentosa</i> L.	"	⊙ D.V.
<i>umbrosa</i> Host.	"	⊙ D.
<i>vaginata</i> Tausch	Sudet.Herc.	⊙ D.J.
<i>vesicaria</i> L.	Europa	⊙ D.V.
<i>virens</i> Lam.	"	⊙ D.
<i>vulpina</i> L.	"	⊙ D.
<i>vulpinoidea</i> Mchx.	Amer. bor.	⊙ D.
(vide: <i>Schelhamera</i>).		
<i>Carica</i> L.	(Papayaceae)	
<i>microcarpa</i> Jacq.	Amer. trop.	⊙ C.
<i>Papaya</i> L.	"	⊙ C.
<i>Carlina</i> Tourn.	(Synanthereae)	
<i>acanthifolia</i> All.	Eur. aust.	⊙ DF.
<i>acaulis</i> L.	Europa	⊙ D.
<i>corymbosa</i> L.	Eur. aust.	⊙ FD.
<i>lanata</i> L.	"	⊙ FD.
<i>longifolia</i> Rehb.	Tyr.Voges.	⊙ D.J.
<i>nebrodensis</i> Guss.	Sicilia	⊙ FD.
<i>sicula</i> Ten.	"	⊙ FD.
<i>vulgaris</i> L.	Europa	⊙ D.

Carlowizia Mönch. salicifolia Mönch.	(<i>Synanthereae</i>) Madera ♀ F.	Cassia stipulacea Ait. Chili ♀ T.	
Carludovica R. et P. palmata R. et P.	(<i>Pandanieae</i>) Columbia ♀ C.	" β. Reichenbachii K. Ind. or. ♀ C.	
Carmichaelia R. Br. australis R. Br.	(<i>Papilionaceae</i>) Nov. Zeel. ♀ F.	sulfurea DeC. Amer. aust. ♀ C.	
Carpesium L. cernuum L.	(<i>Synanthereae</i>) Eur. aust. ② DF.	tomentosa Lam. Mexico ♀ C.	
pubescens Wall.	Nepalia ② FD.	umbellata Bert. Nov. Holl. ♀ T.	
Carpinus Tourn. americana Mchx.	(<i>Cupuliferae</i>) Amer. bor. 5 D.	Cassine L. (Illicineae)	
Betulus L.	Europa 5 D.	capensis L. Cap. b. sp. ♀ F.	
orientalis Lam. (vide: Ostrya).	Eur. aust-or. 5 DF.	Maurocenia L. ♀ F.	
Carrichtera Adans. Vellae DeC.	(<i>Cruciferae</i>) His. Sic. Gr. ① D.	Cassinia R. Br. (Synanthereae)	
Carthamus Tourn. tinctorius L.	(<i>Synanthereae</i>) Asia aust. ① D.	leptophylla R. Br. Tasmania ♀ F.	
(vide: Carlowizia — Carduncellus — Coussinia — Kentrophyllum).		Castanea Tourn. (Cupuliferae)	
Carum L. (Umbelliferae)		vesca Gaertn. Eur. aust. 5 D.	
Bulbocastanum Koch. Europa 4 D.		Casuarina L. (Casuarinaceae)	
buriticum Turcz. Sibir. aust. ② D.		equisetifolia Forst. Oceania 5 T.	
Carvi L. Europa 4 D.		muricata Roxb. Ind. or. 5 C.	
divaricatum Koch. Istria 4 DF.		nana Sieb. Nov. Holl. ♀ T.	
rigidum Koch. Italia 4 DF.		paludosa Sieb. " " ♀ T.	
Carya Nutt. (Juglandineae)		pumila Sieb. " " ♀ T.	
alba Nutt. Amer. bor. 5 D.		quadrivalvis Lab. Tasmania 5 T.	
amara Nutt. " " 5 D.		stricta Ait. Nov. Holl. 5 T.	
porcina Nutt. " " 5 D.		suberosa Sieb. " " 5 T.	
tomentosa Nutt. " " 5 D.		torulosa Ait. " " 5 T.	
Caryolopha F. et Tr. (Borragineae)		Catabrosa P. B. (Gramineae)	
sempervirens F. et Tr. Eur. aust. 4 DF.		aquatica P. B. Europa 4 DV.	
Caryopteris Bge. (Verbenaceae)		Catachaetum Rich. (Orchideae)	
mongolica Bge. China bor. ♀ FD.		tridentatum Hook. Ind. occ. 4 C.	
Casparia Kth. (Caesalpinaceae)		Catalpa Juss. (Bignoniaceae)	
aculeata Kth. Amer. trop. ♀ C.		cordifolia Mönch. Am. bor-aust. 5 DF.	
Cassandra Don. (Ericaceae)		Catananche Tourn. (Synanthereae)	
calyculata Don. Eur. et As. bor. ♀ D.		coerulea L. Eur. aust. 4 FD.	
Casselia N. et M. (Verbenaceae)		β. bicolor. " " ① D.	
integrifolia N. et M. Brasilia ♀ C.		lutea L. " (Gramineae)	
Cassia Tourn. (Caesalpinaceae)		Catapodium Lk. Europa ① D.	
angustifolia Vahl. Arabia ♀ C.		durum Lk. Eur. aust. ① D.	
Barclayana Swt. Nov. Holl. ♀ C.		liolaceum Lk. " ① D.	
bicapsularis L. Ind. occ. ♀ C.		siculum Lk. " (Orchideae)	
Chamaecrista L. Am. med. bor. ① F.		Cattleya Lindl. Brasilia 4 C.	
chinensis Lam. China ♀ T.		crispa Lindl. " 4 C.	
corymbosa Lam. La Plata ♀ T.		Forbesii Lindl. " 4 C.	
Fieldii Colla. Nov. Holl. ♀ T.		intermedia Grah. " (Umbelliferae)	
floribunda Cav. Mexico ♀ C.		Caucalis Tourn. Europa ① D.	
foetida R. et P. Chili 4 T.		dauroides L. Eur. aust. ① D.	
glauca Lam. Ind. or. ♀ C.		leptophylla L. Eur. or-aust. ① D.	
laevigata W. Mexico ♀ C.		muricata Bisch. (vide: Daucus — Orlaya — Torilis — Turgenia).	
ligustrina L. Am. med. bor. ♀ T.		Cayusea Camb. (Resedaceae)	
marylandica L. Am. bor. au. 4 DF.		abyssinica F. et M. Abyssinia ① CD.	
nepalensis Ten. Nepalia ♀ T.		canescens St. Hil. Aegyptus ① CD.	
nictitans L. Am. med. bor. ① F.		Ceanothus L. (Rhamnaceae)	
occidentalis L. Ind. occ. ♀ C.		americanus L. Amer. bor. ♀ D.	
purpurea Roxb. Ind. or. ♀ C.		azureus Desf. Mexico ♀ T.	
ruscifolia Jacq. Madera ♀ T.		ovatus Desf. Am. bor. au. ♀ DF.	
		perennis Pursh. " " 4 DF.	
		(vide: Noltea).	
		Cedronella Mönch. (Labiatae)	
		triphylla Mönch. Canariae ♀ F.	
		Cedrus Tourn. (Abietineae)	

Cedrus

- Deodara Roxb. Ind. or. 5 F.
Libani Loud. Syria 5 DF.

Celastrus L.

- (*Celastrineae*)
buxifolius L. Cap. b. sp. 1 F.
lucidus L. " " 1 F.
scandens L. Amer. bor. 1 D.
(vide: Putterlickia).

Celosia L.

- (*Amarantinae*)
argentea L. Chin., Jap. ① CD.
cristata L. Ind. or. ① CD.
margaritacea L. " " ① CD.
paniculata L. Ind. occ. ① CD.
stricta F. et M. Brasilia 1 C.
trigyna L. Senegambia ② C.
virgata Jacq. Ind. occ. 1 C.

Celsia L.

- (*Scrophulariaceae*)
Arcturus L. Graec. Oriens ② F.
australis Trev. ? ② F.
betonicaefolia Desf. Afr. bor. ② F.
brachysepala F. et M. Oriens ① ② D.
cretica L. Cret. Afr. bor. ② FD.
lanata Jacq. ? ② FD.
orientalis L. Oriens ① D.

Celtis Tourn.

- (*Celtidaceae*)
aspera Desf. Amer. bor. 5 D.
australis L. Eur. aust. 5 D.
crassifolia Lam. " " 5 D.
glabrata H. Petr. ? 5 D.
occidentalis L. Amer. bor. 5 D.
" β . cordata— γ . tenuifolia H. Petr.
Tournefortii Lam. Armenia 5 DF.

Cenchrus L.

- (*Gramineae*)
echinatus L. Amer. trop. ① CD.
lappaceus Tausch " " ① CD.
spinifex Cav. Chili ① CD.

Cenia Comm.

- (*Synanthereae*)
subheterocarpa Less. Cap. b. sp. ① CD.
(vide: Pleiogyne).

Cenocline C. Koch.

- (*Synanthereae*)
aurea C. Koch. Eur. aust. Or. ① D.
globifera C. Koch. Cap. b. sp. ① CD.
matricarioides K. Camt. Am. b. ① D.

Cenolophium Koch.

- (*Umbelliferae*)
Fischeri Koch. Ruth. aust.-or. 1 D.

Centaurea L.

- (*Synanthereae*)
Adami W. Asia med. ① CD.
adonidifolia Rehb. Illyria 1 D.
africana Lam. Afr. bor. 1 F.
alba L. Eur. aust. 1 DF.
alpina L. " " 1 D.
amara L. " " 1 D.
americana Nutt. Am. bor. au. ① CD.
amoena H. Mon. ? 1 D.
aplolepis Mor. Italia 1 DF.
apula Lam. Neap. Sicil. ① D.
arenaria MB. Ruth. aust. 1 D.
argentea L. Graecia Cret. 1 F.
aspera L. Eur. aust. 1 FD.
atropurpurea W. et K. Bannatus 1 D.

Centaurea

- auriculata Spr. ? 1 D.
austriaca W. Eur. or. 1 D.
axillaris W. Eur. aust. 1 D.
" β . carniolica Host.
Balsamita L. Oriens ① D.
bracteata Bert. Eur. aust. 1 D.
Calcitrapa L. Eur. med. au. ① D.
calocephala W. Eur. or. 1 D.
centauroides L. Eur. aust. 1 D.
Centaurium L. " " 1 DF.
ceratophylla Ten. Neap., Sard. 1 DF.
chilensis H. et A. Chili 1 T.
Cineraria Lam. Eur. aust. 1 F.
cinerea Lam. " " 1 F.
collina L. " " 1 DF.
commutata K. ? 1 D.
coriacea W. et K. Eur. or-aust. 1 D.
coronopifolia Lam. Oriens ① D.
cristata Bartl. Illyria ② D.
Crocodylium L. Oriens ① D.
Cyanus L. Europa ① D.
dealbata W. Cauc. Pers. 1 D.
decepiens Thuill. Eur. med. 1 D.
depressa MB. Cauc., Pers. ① D.
deusta Ten. Eur. aust. 1 DF.
diffusa Lam. Eur. or. au. ② DF.
dissecta Ten. Sicil. Neap. ① DF.
erriophora L. Lusitania ① D.
ferox Desf. Afr. bor. 1 F.
fuscata Desf. Afr. bor. Sicil. 1 F.
glastifolia L. Sib. au., Cauc. 1 D.
gymnocarpa M. et De N. Sardinia ② DF D.
Hostiana K. Eur. aust. 1 D.
Jacea L. Europa 1 D.
iberica Trev. Cauc. Arm. ② DF.
incana Ten. Neapolis 1 F D.
intybacea Lam. Hisp., Gall. 1 F.
Isnardi L. Eur. aust. 1 DF.
karschtiana Scop. Illyria 1 DF.
macrocephala M. B. Cauc. Armen. 1 D.
maculosa Lam. Eur. aust. 1 DF.
melanodes K. Europa or. 1 D.
melitensis L. Sicil. Afr. bor. ① D.
montana L. Europa 1 D.
Morisiana K. ? 1 D.
napifolia L. Eur. aust. ① D.
nervosa W. " " 1 DF.
nigra L. Eur. med.-au. 1 D.
nigrescens W. Europa med. 1 D.
nitens MB. Cauc. Georg. ② DF.
orientalis L. Eur. or-aust. 1 D.
ovina Pall. Cauc. Sib. au. 1 DF.
paniculata L. Europa ② D.
parviflora Desf. Afr. bor. ② FD.
pectinata L. Gall. aust. 1 FD.
Phrygia L. Eur. med. 1 D.
" β . banatica Wierzb.
pratensis Thuill. Europa 1 D.
pulchella Led. Sib. au., Pers. ① D.

Centaurea

- pullata L. Eur. aust. 4 FD.
 ragusina L. Dalmat. 1 F.
 Reichenbachii DeC. Ruth. aust. 4 DF.
 rigidifolia Besf. Caucasia 4 D.
 " β . sulfurea Lag.
 romana L. Italia 4 FD.
 rubescens Bess. Tauria 4 D.
 rupestris L. Eur. aust. 4 D.
 ruthenica Lam. Eur. or. Asia 4 D.
 salicifolia MB. Caucasia 4 D.
 salonitana Vis. Dalmatia 4 DF.
 Scabiosa L. Europa 4 D.
 " β . neglecta Schott. — γ . italica Lam.
 semi-Jacea Rchb. Europa 4 D.
 sempervirens L. Eur. aust. 1 F.
 Seridis L. Hispania 4 F.
 serotina K. ? 4 D.
 sicula L. Sicilia 4 D.
 solstitialis L. Eur. aust. 4 D.
 sonchifolia L. " " 4 FD.
 sphaerocephala L. " " 4 FD.
 spinoso-ciliata Seen. Illyria 4 DF.
 spinulosa Rochl. Hungaria 4 D.
 splendens L. Eur. aust. 4 DF.
 squarrosa W. Armen. Pers. 4 FD.
 stereophylla Bess. Ruth. aust. 4 D.
 sulfurea W. Sicilia 4 D.
 tatarica L. fil. Asia bor. 4 D.
 Verutum L. Oriens 4 D.
 virgata Lam. " 4 DF.
 vochinensis Bhd. Eur. aust. 4 T.
 " β . transalpina Schlei. — γ . floscu-
 losa Balb. ? 4 FD.
 xanthina Spr. ? 4 FD.
 (vide: Amberboa — Cnicus — Crupina —
 Galactites — Kentrophyllum — Micro-
 lonchus).

Centrarchena Schott. (Synantheraceae)

- viscida Schott. Hispania 4 D.

Centranthus DeC. (Valerianaceae)

- angustifolius DeC. Eur. aust. 4 DF.
 Calcitrapa Duf. " " 4 D.
 ruber DeC. " " 4 D.

Centratherum Cass. (Synantheraceae)

- intermedium Less. Brasilia 4 C.

Centropogon Prsl. (Lobeliaceae)

- surinamensis Prsl. Amer. Aust. 1 C.

Centrosaema DeC. (Papilionaceae)

- brasilianum Benth. Amer. Aust. 1 C.

- virginianum Benth. Ind. oc. Am. b. 1 F.

Cephalandra Schrad. (Cucurbitaceae)

- quinqueloba Schrad. Cap. b. sp. 4 T.

Cephalanthus L. (Rubiaceae)

- occidentalis L. Amer. bor. 1 DF.

Cephalaria Schrad. (Dipsacaceae)

- alpina Schrad. Alpes aust. 4 D.

- centauroides R. et S. Eur. aust. 4 D.

- corniculata R. et S. Banatus 4 D.

- cretacea R. et S. Eur. or-au. C. 4 D.

Cephalaria

- joppensis Coult. Oriens 4 D.
 leucantha Schrad. Eur. aust. 4 D.
 procera F. et L. Natolia 4 DF.
 rigida Schrad. Cap. b. sp. 4 F.
 Scopolii Vis. Illyr., Dalmat. 4 D.
 syriaca Schrad. Eur. au. Or. 4 D.
 tatarica R. et S. Asia bor. 4 D.
 transylvanica Schrad. Eur. aust. 4 D.
 uralensis R. et S. Ruth. or. Sib. 4 D.

Cephalophora Cav. (Synantheraceae)

- aromatica Schrad. Chili 4 D.

- glauca Cav. " 4 T.

Ceramianthe Rchb. (Scrofulariaceae)

- vernalis Rchb. Eur. med. au. 4 D.

Cerastium L. (Alsineae)

- alpinum L. Alpes 4 D.

- " β . elatum H. Vind. 4 D.

- alsinefolium Tausch Bohemia 4 D.

- arvense L. Europa 4 D.

- brachypetalum Desp. " 4 D.

- campanulatum Viv. Eur. aust. 4 D.

- chloraeifolium F. et M. Natolia 4 D.

- dahuricum Fisch. Sibir. aust. 4 DF.

- dichotomum L. Hisp. Afr. bor. 4 D.

- " β . glandulosum Lk. ? 4 D.

- dubium H. Par. Sibir. aust. 4 D.

- falcatum Bge. Caucasus 4 D.

- frigidum MB. " 4 D.

- grandiflorum W. et K. Styr., Hung. 4 DF.

- " β . banaticum Kit. Neapolis 4 D.

- hirsutum Ten. Graec. Or. 4 DF.

- illyricum Ard. Sibir. aust. 4 D.

- incanum Led. ? 4 D.

- inflatum Lk. Alpes 4 D.

- latifolium L. Sibiria 4 D.

- Ledebourianum Ser. Sibir. aust. or. 4 D.

- maximum L. Causasia 4 D.

- multiflorum C. A. Mey. " 4 D.

- nemorale M. B. " 4 D.

- ovatum Hopp. Alpes 4 D.

- pensylvanicum Horn. Amer. bor. 4 D.

- perfoliatum L. Graec. Oriens 4 D.

- Scarani Ten. Neapolis 4 D.

- strictum L. Alpes 4 D.

- sylvaticum W. et K. Hung. Volh. 4 D.

- tauricum Spr. Ruth. aust. 4 D.

- tenuifolium Pursh. Amer. bor. 4 D.

- tomentosum L. Eur. aust. 4 D.

- triviale Lk. Europa 4 D.

- " β . alpinum. " 4 D.

- vulgatum L. " 4 D.

- (vide: Dichodon — Malachium — Pen-
 taple).

Cerasus Tourn. (Amygdalineae)

- acida Borkh. Oriens 5 D.

- " β . fl. pleno. Europa 5 D.

- avium Mönch. " β . latifolia — γ . fl. pleno. 1 D.

- borealis Mchx. Amer. bor. 1 D.

Cerasus

canadensis Loisl.	Amer. bor.	‡ D.
caroliniana Mchx.	" "	‡ D.
Catesbaei K.	Am. bor.-au.	‡ FD.
Chamaecerasus Loisl.	Eur. med. or.	‡ D.
depressa Ser.	Amer. bor.	‡ D.
Duerinkii Martens.	" "	‡ D.
hyemalis Loisl.	" "	‡ D.
Laurocerasus Loisl.	Oriens.	5 FD.
" β . fol. varieg.		
lusitana Loisl.	Lusitania	5 FD.
Mahaleb Mill.	Eur. aust.	5 D.
Marasca Host.	Dalmatia	‡ D.
nigra Loisl.	Amer. bor.	5 D.
Padus DeC.	Europa	5 D.
persicaefolia Loisl.	Amer. bor.	5 D.
petraea K.	Sudeti	‡ D.
prostrata Loisl.	Eur. or. au. Or.	‡ DF.
pygmaea Loisl.	Amer. bor.	‡ D.
rubra K.	" "	5 D.
semperflorens Borkh.	" ?	5 D.
serotina Loisl.	Amer. bor.	5 D.
virginiana Mchx.	"	5 D.
Ceratocaulos Bhd.	(Solaniceae)	
daturoides Spach.	Amer. trop.	⊙ CD.
Ceratocephalus Pers.	(Ranunculineae)	
falcatus Pers.	Eur. med.-au.	⊙ D.
orthoceras DeC.	Eur. or. Asia	⊙ D.
Ceratochloa, vide: Bromus.		
Ceratonia L.	(Caesalpinieae)	
Siliqua L.	Eur. aust. Afr.	5 F.
Ceratophyllum L.	(Ceratophyllineae)	
demersum L.	Europa	‡ D. V
Ceratopteris Brogn.	(Polypodiineae)	
thalictroides Brogn.	Ind. or. Chin.	‡ C. V
Cerbera L.	(Apocyniceae)	
Lactaria Ham.	Ind. or.	‡ C.
Odallam Gärtn.	"	‡ C.
Cercis L.	(Caesalpinieae)	
canadensis L.	Amer. bor.	‡ D.
Siliquastrum L.	Eur. aust.	‡ DF.
" β . fl. carneo.		
Cercodia Murr.	(Haloragineae)	
erecta Murr.	Nov. Zeel.	‡ F.
Cereus Haw.	(Cactineae)	
alacriportanus Mart.	Brasilia	‡ C.
albispinus Salm-D.	Amer. aust.	‡ C.
armatus Otto	Ind. occ.	‡ C.
articulatus Pfeif.	Chili	‡ T.
azureus Parm.	Brasilia	‡ C.
barbatus Otto	?	‡ C.
Bonplandii Parm.	Brasilia	‡ C.
candicans Gill.	Chili	‡ C.
chalybeus Otto	?	‡ C.
cinerascens DeC.	Mexico	‡ T.
clavatus Salm-D.	Chili	‡ T.
coccineus Salm-D.	Mexico	‡ C.
coerulescens Salm-D.	Brasilia	‡ G.
crenulatus Salm-D.	Amer. trop.	‡ C.
Curtisii Otto	" "	‡ C.

Cereus

divergens Otto	Hayti	‡ C.
eburneus Salm-D.	Amer. aust.	‡ C.
eriophorus Otto	Cuba	‡ C.
extensus Salm-D.	Amer. trop.	‡ C.
flagelliformis Mill.	" "	‡ C.
flagriformis Zucc.	Mexico	‡ T.
flavescens Otto	?	‡ C.
flavissimus Salm-D.	Amer. trop.	‡ C.
Forbesii Otto	" "	‡ C.
gemmatus Zucc.	Mexico	‡ T.
geometrizans Mart.	"	‡ T.
glaucus Salm-D.	Brasilia	‡ C.
grandiflorus Mill.	Ind. occ.	‡ C.
grandis Haw.	Brasilia	‡ C.
Haworthii DeC.	Ind. occ.	‡ C.
horribarbis Otto.	?	‡ C.
horridus O. et D.	Amer. trop.	‡ C.
humilis Dec.	" "	‡ C.
Hystrix Salm-D.	Ind. occ.	‡ C.
inermis Otto	Amer. trop.	‡ C.
Jamacaru Salm-D.	Brasilia	‡ C.
laetus Salm-D.	La Plata	‡ T.
lanuginosus Haw.	Amer. trop.	‡ C.
leptophis DeC.	Mexico	‡ T.
marginatus DeC.	" "	‡ T.
Martianus Zucc.	" "	‡ T.
multangularis Haw.	Amer. trop.	‡ C.
" β . nobilis.		
Napoleonis Grah.	Ind. occ.	‡ C.
nycticalus Lk.	Mexico	‡ C.
Olfersii Salm-D.	Brasilia	‡ C.
pellucidus Otto	Cuba	‡ C.
pentalophus DeC.	Mexico	‡ C.
" β . leptacanthus.		
peruvianus Haw.	Amer. trop.	‡ C.
" β . monstrosus DeC.		
ramosus Karw.	Mexico	‡ C.
repandus Haw.	Ind. occ.	‡ C.
rostratus Lem.	Amer. trop.	‡ C.
Royeni Haw.	Ind. occ.	‡ C.
Schrankii Zucc.	Mexico	‡ T.
serpentinus Lag.	"	‡ T.
speciosissimus DeC.	"	‡ C.
" β . albiflorus — γ . Curtisii — δ .		
Guillardieri — ϵ . Hitchinsii — ζ . Hookeri —		
η . Jenkinsoni — θ . lateritius — ι . Lothii —		
κ . Seidelii — λ . Smithii — μ . Vandesii.		
strictus DeC.	Amer. aust.	‡ C.
strigosus Salm-D.	Chili	‡ T.
sublanatus Salm-D.	?	‡ C.
subrepandus Haw.	Ind. occ.	‡ C.
tetragonus Haw.	Amer. aust.	‡ C.
tortuosus Forb.	La Plata	‡ T.
triangularis Haw.	Ind. occ.	‡ C.
" β . pictus.		
triqueter Haw.	Amer. trop.	‡ C.
validus Haw.	" "	‡ C.
virens DeC.	Mexico	‡ C.
(vide: Echinopsis — Lespismium — Phyllocactus).		

- Cerinth Tourne. (Borragineae)
 alpine Kit. Alpes 4 D.J.
 aspera Roth Eur. aust. ② C.
 maculata L. " " ② DF.
 major L. " " ② D.
 minor L. Europa ② D.
 Ceropogia L. (Asclepiadeae)
 africana R. Br. Afr. aust. 1 T.
 dichotoma Haw. Ind. or. 4 C.
 elegans Wall. " " 1 C.
 Ceropteris Lk. (Polypodiaceae)
 calomelaena Lk. Amer. trop. 4 C.
 chrysophylla Lk. " " 4 C.
 distans Lk. Brasilia 4 C.
 Herminieri Lk. Ind. occ. 4 C.
 Martensii Lk. ? 4 C.
 Massonii Lk. ? 4 C.
 peruviana Lk. Amer. aust. 4 C.
 sulfurea K. Ind. occ. 4 C.
 tartarea Lk. Amer. trop. 4 C.
 Cervaria Riv. (Umbelliferae)
 alsatica Gaud. Eur. med. 4 D.
 Oreoselinum Gaud. " " 4 D.
 Rivini Gaertn. Europa 4 D.
 veneta K. Eur. aust. 4 DF.
 Cestrum L. (Solanaceae)
 auriculatum L'Her. Peruvia 4 C.
 diurnum L. Ind. occ. 4 C.
 foetidissimum Jacq. " " 4 C.
 laurifolium L'Her. Amer. aust. 4 C.
 odontospermum Jacq. " " 4 C.
 Parqui L'Her. Chili 4 F.
 pendulinum Jacq. Amer. trop. 4 C.
 Plukenetii Tausch " " 4 C.
 roseum Kth. Mexico 4 C.
 salicifolium Jacq. Amer. trop. 4 C.
 scandens Vahl. Ind. occ. 4 C.
 undulatum R. et P. Peruvia 4 CT.
 Chaenomeles Lindl. (Pomaceae)
 japonica Lindl. Japonia 4 DF.
 Chaenorhynchum K. (Scrophulariaceae)
 crassifolium K. Hisp. Lusit. 4 F.
 origanifolium K. Eur. aust.-occ. 4 F.
 Chaenostoma, vide Palmstruckia.
 Chaerophyllum Tourne. (Umbelliferae)
 alpestre Hladn. Carnia 4 D.
 aromaticum L. Eur. or-aust. 4 D.
 aureum L. Eur. med. Asia 4 D.
 " β. caucasicum. Europa ② D.
 bulbosum L. Europa ② D.
 coloratum L. Eur. aust.-or. ② D.
 maculatum L. Eur. med. aust. 4 D.
 millefolium DeC. Caucasus 4 DF.
 monogonum Kit. Hungaria 4 D.
 roseum Stef. Caucasus 4 DF.
 temulum L. Europa ② D.
 (vide: Anthriscus — Physocaulis —
 Rhynchostylis — Sphallerocarpis).
 Chaetocalyx DeC. (Papilionaceae)
 pubescens DeC. Ind. occ. 4 C.
 Chaeturus Lk. 240 (Gramineae)
 fasciculatus Lk. Hisp., Lusit. ② D.
 Chaiturus Lk. 244 (Labiatae)
 Marrubiastrum Ehrh. Eur. med. au. ② D.
 Chamaebuxus DeC. (Polygalaceae)
 alpestris Spach Eur. med. 4 D.
 Chamaecyparis Spach (Cupressineae)
 sphaeroidea Spach Amer. bor. 5 D.
 Chamaedorea W. (Palmae)
 Schiedeana Mart. Mexico 5 C.
 Chamaenerion Tourn. (Onagraceae)
 angustifolium Scop. Europa 4 D.
 " β. leucanthum Wendr. Alpes 4 D.J.
 Dodonaei K. Alpes 4 D.J.
 Fleischeri K. " 4 D.J.
 sericeum Bhd. ? 4 D.J.
 Chamaepeuce DeC. (Synantheraceae)
 afra DeC. Graec. Afr. b. ② FD.
 Casabonae DeC. Gall. Ital. ② DF.
 diacantha DeC. Syria ② DF.
 stellata DeC. Eur. aust. ② D.
 stricta DeC. " " ② DF.
 Chamaepitys Tourn. (Labiatae)
 chia K. Eur. aust.-or. ② D.
 vulgaris Lk. Europa ② D.
 Chamaeplium Wallr. (Cruciferae)
 officinale Wallr. Europa ② D.
 Chamaerops L. (Palmae)
 humilis L. Hisp., Ital., Afr. 5 F.
 (vide: Sabal).
 Chamaesciadium C.A. Mey. (Umbelliferae)
 acaule C. A. Mey. Caucasus 4 DF.
 Chaptalia, vide: Anandria.
 Chardinia Desf. (Synantheraceae)
 xeranthemoides Desf. Orients ② D.
 Charieis Cass. (Synantheraceae)
 heterophylla Cass. Cap. b. sp. ② CD.
 " β. Neesii Cass.
 Charwoodia, vide: Cordylina.
 Chascolythrum Desv. (Gramineae)
 erectum Desv. Uruguay 4 T.
 Chasmone Prsl. (Labiatae)
 incisa Prsl. Eur. aust. ② FD.
 Cheilanthes Sw. (Polypodiaceae)
 crenulata Lk. Amer. trop. 4 C.
 cuneata Lk. ? 4 C.
 dicksonioides J. Bev. Amer. trop. 4 C.
 hirsuta Lk. ? 4 C.
 hirta Sw. Cap. b. sp. 4 T.
 Kaulfussii Kze. ? 4 C.
 lentigera Sw. Amer. trop. 4 C.
 marginata Kth. Peruvia 4 C.
 micromera Lk. Mexico 4 C.
 microphylla Sw. Ind. occ. 4 C.
 micropteris Sw. Amer. aust. 4 C.
 multifida Sw. Cap. b. sp. 4 T.
 profusa Kze. " " 4 T.
 pteroides Sw. " " 4 T.
 (vide: Hypolepis).
 Cheiranthus L. (Cruciferae)

Cheiranthus

- Cheiri L. Eur. aust. ♀ DF.
 scapularis L'Her. Madera ♀ F.
 scoparius W. Teneriffa ♀ F.
 (vide: Erysimum — Hesperis — Malcol-
 mia — Matthiola).

Chelidonium Tourn.

(Papaverineae)

- majus L. Europa ♀ D.
 laciniatum Mill. Eur. aust. ♀ D.
 (vide: Glaucium — Roemeria).

Cheiropsis DeC.

(Ranunculineae)

- balearica Spach. Eur. aust. ♀ FD.
 cirrhosa K. " " ♀ FD.
 nepalensis K. " " ♀ FD.

Chelone L.

(Scrophulariaceae)

- glabra L. Amer. bor. ♀ D.
 Lyoni Pursh. Am. bor.-aust. ♀ D.
 obliqua L. " " " ♀ D.
 (vide: Pentstemon).

Chenopodium Tourn.

(Chenopodiaceae)

- acuminatum W. Asia bor. ♂ D.
 acutifolium W. et K. Europa ♂ D.
 album L. " " ♂ D.
 " β. concatenatum Thuil. " " ♂ D.
 atriplicis L. fil. China ♂ CD.
 ficifolium Sm. Europa ♂ D.
 guineense Jacq. Africa ♂ D.
 hircinum Schrad. Brasil.aust. ♂ CD.
 hybridum L. Europa ♂ D.
 leucospermum Schrd. Chili ♂ CD.
 murale L. Europa ♂ D.
 olidum Sm. " " ♂ D.
 opulifolium Schrad. " " ♂ D.
 polyspermum L. " " ♂ D.
 punctulatum Scop. Eur. aust. ♂ D.
 Quinoa L. Chili, Peru. ♂ CD.
 riparium Böngh. Europa ♂ D.
 serotinum L. Asia bor. ♂ D.
 urbicum L. Europa ♂ D.
 viride L. " " ♂ D.

- (vide: Agathophytum — Ambrinia —
 Blitum — Botrydium — Cycloloma —
 Roubiaea — Salsola — Schoberia —
 Suaeda — Teloxis).

Cherleria Hall.

(Alsineae)

- sedoides L. Alpes ♀ D.J.

Chiazospermum Bhd.

(Fumariaceae)

- erectum Bhd. Eur.au.Sibir. ♂ D.

Chilochloa P. B.

(Gramineae)

- aspera P. B. Eur.occ.aust. ♂ D.
 Böhmerti P. B. Europa ♀ D.
 cuspidata P. B. Eur. aust. ♀ D.
 Michellii Rchb. Alpes ♀ D.J.

Chimonanthus Lindl.

(Calycanthineae)

- fragrans Lindl. Japonia ♀ FD.

Chimophila Pursh.

(Pyrolaceae)

- umbellata Nutt. Eur.As.Am. ♀ D.J.

Chiococca P. Br.

(Rubiaceae)

- racemosa Jacq. Amer. trop. ♀ C.

Chionanthus L.

(Oleaceae)

Chionanthus

- virginica L. Am.bor.-aust. ♀ DF.
 Chironia L. (Gentianaceae)
 jasminoides L. Cap. b. sp. ♀ T.
 linoides L. " ♀ T.

" β. longifolia.

- maritima Eckl. " ♀ T.

- peduncularis Lindl. " ♀ T.

(vide: Orphium — Roeslinia).

Chlamydophora Ehrbg.

(Synanthereae)

- tridentata Ehrbg. Aegyptus ♂ CD.

Chloris L.

(Gramineae)

- barbata Sw. Ind. occ. ♂ CD.

- elegans Kth. Mexico ♂ CD.

- fasciculata Schrad. Brasilia ♂ CD.

- meccana H. et St. Arabia ♂ CD.

- pallida W. Ind. occ. ♂ CD.

" β. compressa DeC.

- polydactyla Sw. Amer. trop. ♂ CD.

- radiata Sw. Ind. occ. ♂ CD.

- submutica Kth. Amer. trop. ♂ CD.

- truncata R. Br. Nov. Holl. ♂ CD.

- virgata Sw. Ind. occ. ♂ CD.

(vide: Atheropogon — Eustachys).

Chlorophytum Ker.

(Liliaceae)

- elatum R. Br. Cap. b. sp. ♀ T.

- inornatum Ker. Senegambia ♀ C.

Orchidastrum Ker.

Chondrilla Tourn.

(Synanthereae)

- acanthophylla Borkh. Europa ♀ D.

- brevirostris F. et M. Sibir. aust. ♀ D.

- graminea M. B. Sib.aust.Cauc. ♀ D.

- juncea L. Europa ♀ D.

- pauciflora Led. Sibir. Altai ♀ D.

- piptocoma C. A. Mey. " " ♀ D.

- preanthoides Vill. Eur. aust. ♀ D.J.

- rigens Rchb. Europa ♀ D.

- stricta Ledb. Sibir., Altai ♀ D.

Chorisema Lab.

(Papilionaceae)

- cordatum Lindl. Nov. Holl. ♀ T.

- diversifolium DeC. f. " " ♀ T.

- Henchmanni R. Br. " " ♀ T.

- Hügelii Benth. " " ♀ T.

- ilicifolium Lab. " " ♀ T.

- nanum Sims. " " ♀ T.

- rhombeum R. Br. " " ♀ T.

- triangulare Lindl. " " ♀ T.

Chorisporea DeC.

(Cruciferae)

- sibirica DeC. Asia bor. ♂ D.

- stricta DeC. " " ♂ D.

(vide: Matthiola).

Chroilema Bhd.

(Synanthereae)

- subcaesescens Bhd. Chili ♀ T.

Chrysanthemum Tourn.

(Synanthereae)

- coronarium L. Eur. aust. ♂ D.

" β. matricarioides.

- Roxburghii Desf. Ind. or. ♂ D.

(vide: Argyranthemum — Centaurea

— Ismelia — Leucanthemum — Matri-

caria — Nananthea — Pyrethrum).

- Chrysion Spach. (Violaceae)
 biflorum Spach. Alp. Subalp. 4 D.J.
 Chrysobotrya Spach. (Grossulariaceae)
 intermedia Spach. Amer. bor. 4 D.
 " β . flava — γ . sanguinea.
 Lindleyana Spach. Amer. bor. 4 D.
 revoluta Spach. " 4 D.
 Chrysocoma L. (Synanthereae)
 Coma aurea L. Cap. b. sp. 4 T.
 " β . patula L. — γ . cernua L.
 (vide: Linosyris).
 Chrysophyllum L. (Sapotaceae)
 Cainito L. Ind. occ. 4 C.
 cinense Hort. ? 4 C.
 Chrysopsis Nutt. (Synanthereae)
 villosa Nutt. Am. bor.-au. 4 DF.
 Chrysopteris Lk. (Polypodiaceae)
 aurea Lk. Ind. occ. 4 C.
 phymatodes Lk. Amer. trop. 4 C.
 sporodocarpa Lk. Mexico 4 C.
 Chrysosplenium Tourn. (Saxifragaceae)
 alternifolium L. Europa 4 D.J.
 Chrysostema Less. (Synanthereae)
 Tripteris Less. Am. bor.-aust. 4 D.
 Chrysostoma Lilja (Loasaceae)
 aurea Lilja California 4 CD.
 Chymocarpus D. Don. (Tropaeolineae)
 pentaphyllum D. Don. La Plata 4 FD.
 Cibotium Kaulf. (Polypodiaceae)
 Schiedeii Ch. et S. Mexico 4 C.
 Cicer Tourn. (Papilionaceae)
 arietinum L. Eur. aust. Or. 4 D.
 soongaricum Steph. Asia med. 4 D.
 Cichorium Tourn. (Synanthereae)
 Endivia L. Oriens 4 DF.
 Intybus L. Europa 4 D.
 pumilum L. Dalm. Graecia 4 D.
 Cicuta L. (Umbelliferae)
 maculata L. Amer. bor. 4 D.V.
 virosa L. Europa 4 D.V.
 Cieca Med. (Passifloraceae)
 gracilis K. Ind. occ. 4 C.
 heterophylla Med. " 4 C.
 litoralis K. Peruvia 4 C.
 lutea K. Am. bor.-au. 4 FD.
 minima Mönch. Amer. trop. 4 C.
 multiflora K. Ind. occ. 4 C.
 peltata K. Ind. occ. Am. b. 4 T.
 pubescens K. Amer. trop. 4 C.
 suberosa Mönch. " 4 C.
 Cimicifuga L. (Paeoniaceae)
 americana Mchx. Amer. bor. 4 D.
 foetida L. Eur. or. Sibir. 4 D.
 (vide: Botrophis).
 Cineraria L. (Synanthereae)
 geifolia H. Cap. b. sp. 4 F.
 lanosa DeC. " 4 F.
 lobata L'Her. " 4 F.
 (vide: Agathaea — Ligularia — Perical-
 lis — Senecio — Tephrosieris).
- Cinna L. (Gramineae)
 arundinacea L. Amer. bor. 4 D.
 filiformis Lk. " 4 D.
 glomerata Lk. " 4 D.
 mexicana Lk. Mex. Am. bor. 4 DF.
 sobolifera Lk. Amer. bor. 4 D.
 Cinnamomum Burm. (Laurineae)
 aromaticum N. E. Ind. or. 5 C.
 nitidum N. E. " 5 C.
 zeylanicum N. E. " 5 C.
 Cipura Aubl. (Irideae)
 Northiana Endl. Brasilia 4 C.
 Circaea Tourn. (Onagraceae)
 alpina L. Alpes, Sudet. 4 D.J.
 lutetiana L. Europa 4 D.
 Cirrhaea Lindl. (Orchideae)
 fusco-lutea Lindl. Brasilia 4 C.
 viridi-purpurea Lindl. " 4 C.
 Cirsium Tourn. (Synanthereae)
 acaule All. Europa 4 D.
 ambiguum All. Helv. Sabd. 4 D.J.
 arachnoideum M. B. Caucasia 4 D.
 arvense Scop. Europa 4 D.
 canum All. Eur. or. Asia 4 D.
 " β . pinnatifidum.
 ciliatum M. B. Taur. Asia bor. 4 D.
 controversum DeC. Delph. Ped. 4 D.J.
 dealbatum M. B. Caucasus 4 DF.
 decoloratum Koch Eur. med. 4 D.
 eriphorum Scop. Eur. med. au. 4 D.
 eristhales Scop. Alpes 4 D.J.
 ferox DeC. Eur. aust. 4 DF.
 fimbriatum Spr. Caucasia 4 D.
 giganteum Spr. Neap. Sic. Af. 4 FD.
 heterophyllum All. Montes Eur. 4 D.
 " β . helenioides All.
 lanceolatum Scop. Europa 4 D.
 lappaceum M. B. Caucasia 4 D.
 lilacinum K. Asia bor. 4 D.
 medium All. Eur. aust. 4 D.
 monspessulanum All. Eur. aust. occ. 4 D.
 neglectum Fisch. Sibiria 4 D.
 obvallatum M. B. Caucasus 4 D.J.
 ochroleucum All. Alp. occ. au. 4 D.J.
 odontolepis Boiss. Hispania 4 FD.
 oleraceum All. Europa 4 D.
 palustre Scop. " 4 D.
 pannonicum DeC. Eur. or. aust. 4 FD.
 pauciflorum Spr. Hungaria 4 FD.
 polyanthemum Spr. Eur. aust. 4 D.
 pratense DeC. " 4 D.
 pubigerum DeC. Oriens 4 FD.
 pyrenaicum All. Pyrenaei 4 DF.
 rivulare All. Eur. med. 4 D.
 " β . salisburgense W.
 serrulatum M. B. Ruth. aust. 4 D.
 siculum Spr. Sicilia 4 FD.
 spinosissimum Scop. Alpes 4 D.J.
 spinulosum Led. Asia bor. 4 D.
 tataricum W. et Gr. Eur. or. Asia 4 D.

Cirsium				Cladanthus			
tuberosum All.	Eur. med.	4 D.		proliferus DeC.	Afr. bor.	⊙ D.	
lucranicum Bess.	Ruth. aust.	⊙ D.		Clandestinaria DeC.	(Cruciferae)		
uliginosum M. B.	Caucasia	4 D.		erecta K.	Chili	⊙ D.	
(vide: Chamaepeuce — Echenais — Leuzea — Notobasis).				indica Spach.	Ind. or.	⊙ D.	
Cissus L.	(Ampelideae)			micropetala K.	Am. bor.-aust.	⊙ D.	
acida L.	Amer. aust.	4 C.		Clarkia Pursh	(Onagraceae)		
antarctica Vent.	Nov. Holl.	4 F.		pulchella Pursh	California	⊙ D.	
orientalis Lam.	Oriens	4 DF.		(vide: Phaeostoma).			
striata R. et P.	Peruvia	4 C.		Claytonia L.	(Portulacaceae)		
(vide: Ampelopsis).				alsinoides Sims.	Am. bor.-occ.	4 D.	
Cistanthe Spach	(Portulacaceae)			cubensis Bonpl.	Cuba	⊙ D.	
anceps Spach	Chili	⊙ 4 FD.		perfoliata Don.	Am. med. bor.	⊙ D.	
discolor Spach	"	⊙ 4 FD.		sibirica L.	Asia bor.	4 D.	
grandiflora Schlcht.	"	⊙ 4 FD.		Clematis L.	(Ranunculineae)		
speciosa Lilja	"	⊙ 4 FD.		angustifolia Jacq.	Eur. or.-aust.	4 D.	
Cistocarpium Spach	(Cruciferae)			banatica Wierzb.	Hungaria	4 D.	
utriculatum Spach	Eur. aust.	4 F.		cylindrica Sims.	Am. bor.-aust.	4 DF.	
Cistus Tourn.	(Cistineae)			erecta All.	Europa	4 D.	
albidus L.	Eur. aust.	4 F.		" β. corymbosa Poir.			
canescens K.	"	4 F.		Flammula L.	Eur. aust.	4 DF.	
creticus L.	Dalm. Graecia	4 F.		fragrans Ten.	Neapolis	4 DF.	
" β. crispatus.				glauca W.	Sibir. aust.	4 D.	
crispus L.	Eur. aust.	4 F.		integrifolia L.	Eur. or. Asia	4 D.	
diversifolius K.	"	4 F.		lanceifolia Wendr.	Eur. aust.	4 D.	
eriocephalus Viv.	"	4 F.		ochroleuca Ait.	Am. bor.-aust.	4 DF.	
garganicus Ten.	"	4 F.		orientalis L.	Cauc. Armen.	4 DF.	
grandiflorus Tausch	"	4 F.		reticulata Walt.	Am. bor.-aust.	4 DF.	
heterophyllus Desf.	Afr. bor.	4 F.		soongarica Bge.	Sibir. aust.	4 DF.	
incanus L.	Eur. aust.	4 F.		stricta Wendr.	?	4 D.	
oblongifolius K.	"	4 F.		Viorna L.	Am. bor.-aust.	4 DF.	
parviflorus Lam.	Graecia, Creta	4 F.		virginica L.	"	4 DF.	
purpureus Lam.	Oriens	4 F.		Vitalba L.	Eur. med.	4 D.	
roseus Tausch	Eur. aust.	4 F.		(vide: Atragene — Cheiropsis — Viti- cella).			
tauricus Prsl.	Tauria	4 F.		Cleome L.	(Capparideae)		
undulatus Dun.	Eur. aust.	4 F.		Eckloniana Schrad.	Cap. b. sp.	⊙ CF.	
villosus Lam.	"	4 F.		fugax Schrad.	"	4 C.	
(vide: Helianthemum — Ladanum — Ledonia — Rhodocistus — Stephano- carpus).				gigantea L.	Amer. trop.	4 C.	
Citharexylon L.	(Verbenaceae)			spinosa L.	"	⊙ C.	
cinereum L.	Amer. trop.	5 C.		viminea Schrad.	"	⊙ C.	
pentandrum Vent.	Ind. occ.	4 C.		(vide: Dactylaena — Gynandropsis — Polanisia — Siliquaria).			
quadrangulare Jacq.	"	5 C.		Clerodendron L.	(Verbenaceae)		
subseriatum Sw.	"	4 C.		buxifolium Spr.	?	4 C.	
villosum Jacq.	"	5 C.		emirnense Bojer	Madagasc.	4 C.	
Citrullus Neck.	(Cucurbitaceae)			fragrans Vent.	Japonia	4 T.	
amarus Schrad.	Cap. b. sp.	⊙ C.		" β. roseum.			
caffer Schrad.	"	⊙ C.		inermis R. Br.	Ind. or. China	4 C.	
Colocynthis Schrad.	Japonia	⊙ 4 C.		macrophyllum Sims.	Mascarenhas	4 C.	
vulgaris Schrad.	Ind. or.	⊙ C.		phlomidoides L. fil.	Ind. or.	4 C.	
Citrus L.	(Aurantiaecae)			squamatum Vahl.	China, Japon.	4 C.	
Aurantium L.	Asia aust.	5 F.		tomentosum R. Br.	Nov. Holl. trop.	4 C.	
decumana L.	"	5 F.		viscosum Vent.	Ind. or.	4 C.	
japonica Thbg.	Japonia	5 F.		Clethra L.	(Ericaceae)		
medica L.	Asia aust.	5 F.		alnifolia L.	Amer. bor.	4 D.	
vulgaris Riss.	"	5 F.		arborea Ait.	Madera	5 T.	
" β. myrtifolia Riss.	"			tomentosa Lam.	Am. bor.-aust.	4 DF.	
Cladanthus Cass.	(Synantheraceae)			Clanthus Soland.	(Papilionaceae)		
				puniceus Sol.	Nov. Zeel.	4 FD.	

- Clidemia* Don. (*Melastomaceae*)
elegans Don. Amer. aust. f. C.
velutina Don. Ind. occ. f. C.
Cliffortia L. (*Sanguisorbaceae*)
ilicifolia L. Cap. b. sp. f. T.
obcordata L. fil. " " f. T.
trifoliata L. " " f. T.
Clinopodium Tourn. (*Labiatae*)
aegyptiacum Lam. Eur. au. Afr. 4 DF.
vulgare L. Europa 4 D.
Clintonia Dougl. (*Lobeliaceae*)
elegans Dougl. Am. bor. occ. ② D.
pulchella Lindl. California ② D.
Clitoria L. (*Papilionaceae*)
ternatea L. Ind. or. f. C.
 (vide: *Centrosema* — *Vilmorinia*).
Clivia Lindl. (*Amaryllideae*)
nobilis Lindl. Cap. b. sp. 4 T.
Cluytia Ait. (*Euphorbiaceae*)
alaternoides L. Cap. h. sp. f. T.
polifolia Jacq. " " f. T.
pulchella L. " " f. F.
Clypeola L. (*Cruciferae*)
cyclodonta DeC. Gall. aust. ② D.
Jonthaspi L. Eur. aust. ② D.
Cneorum K. (*Surianaceae*)
tricoecum L. Eur. aust. occ. f. F.
Cnicus Vail. (*Synanthereae*)
Benedictus L. Eur. aust. Or. ② D.
 (vide: *Alfredia* — *Chamaepeuce* —
Cirsium — *Leuzea* — *Notobasis*).
Cnidium Cuss. (*Umbelliferae*)
apioides Spr. Eur. aust. 4 D.
dahuricum Turcz. Sibir. aust. 4 D.
 " *β. macrocarpum*.
Monnieri Cuss. Gall. aust. ② D.
venosum Koch. Eur. med., Sib. 4 D.
 (vide: *Aulocospermum* — *Cenolophium* —
Ligusticum — *Silaus*).
Cobaea Cav. (*Cobaeaceae*)
scandens Cav. Mexico 4 FD.
stipularis Benth. " 4 FD.
Coccinia W. et A. (*Cucurbitaceae*)
indica W. et A. Ind. or. f. C.
Coccoloba Jacq. (*Polygoniaceae*)
excoriata L. Ind. occ. 5 C.
laurifolia Jacq. Amer. trop. 5 C.
Cocculus DeC. (*Menispermaceae*)
laurifolius DeC. Ind. or. f. C.
Coccyganthe A. Braun. (*Sileneae*)
Tragi K. Europa 4 D.
 " *β. fl. albo*.
Cochlearia Tourn. (*Cruciferae*)
danica L. Eur. bor. ② D.
glastifolia L. Eur. occ. au. ② D.
officinalis L. Europa ② D.
 (vide: *Armoracia* — *Kernera*).
Cochliospermum Lag. (*Chenopodiaceae*)
altissimum Lag. Hisp. Ruth. au. ② D.
 " *β. Tournefortianum*.
Cochliospermum
fruticosum K. Eur. aust. f. F.
trigynum K. Hispania ② D.
Codariocalyx Hask. (*Papilionaceae*)
gyrans Hask. Ind. or. f. C.
Codiaeum Rumph. (*Euphorbiaceae*)
chrysostictum A. Juss. Ind. or. f. C.
Codonophora, vide: *Rytidophyllum*.
Coelestina Cass. (*Synanthereae*)
ageratoides Kth. Mexico f. T.
Coelogyne Lindl. (*Orchideae*)
fimbriata L. Ind. or. 4 C.
Coffea L. (*Rubiaceae*)
arabica L. Arab. Aethiop 5 C.
Coix L. (*Gramineae*)
exaltata Lk. Ind. or. 4 C.
Lachryma L. " ② CD.
Colchicum Tourn. (*Veratrineae*)
arenarium W. et K. Eur. au. or. 4 DF.
autumnale L. Europa 4 D.
 " *β. niveum* — *γ. fl. pleno*.
umbrosum Stev. Tauria 4 DF.
Coleonema B. et W. (*Diosmaceae*)
album B. et W. Cap. p. sp. f. T.
pulchrum Hook. " " f. T.
tenuifolium Hort. " " f. T.
Coleus Lour. (*Labiatae*)
barbatus Benth. Ind. or. f. C.
Colletia Comm. (*Rhamnaceae*)
spinosa Lam. Am. austr. f. C.
Collinsia Nutt. (*Scrophulariaceae*)
bicolor Benth. California ② D.
grandiflora Lindl. Am. bor. occ. ② D.
parviflora Lindl. " ② D.
sparsiflora F. et M. California " ② D.
Collinsonia L. (*Labiatae*)
canadensis L. Amer. bor. 4 D.
Colomia Nutt. (*Polemoniaceae*)
coccinea Lehm. Chili ② D.
gracilis Benth. Amer. bor. ② D.
grandiflora Dougl. Am. bor. occ. ② D.
 (vide: *Courtoisia*).
Colobachne P. B. (*Gramineae*)
Gerardi Lk. Alpes 4 D. J.
vaginata P. B. Eur. aust. 4 D.
Colocasia Neck. (*Araceae*)
antiquorum Schott. Ind. or. Aegypt. 4 C.
cucullata Schott. China aust. 4 C.
esculenta Schott. Ind. or. Aegypt. 4 C.
nymphaeaeifolia Kth. Ind. or. 4 C.
odora Brogn. " 4 C.
Cologania Kth. (*Papilionaceae*)
Broussonetii DeC. Amer. aust. f. C.
Columnnea Plum. (*Gesneraceae*)
hirsuta Sw. Jamaica f. C.
scandens L. Amer. trop. 4 C.
Schiedeana Schlcht. Mexico 4 C.
 (vide: *Stemodia*).
Coluria R. Br. (*Dryadeae*)
geoides R. Br. Asia hor. 4 D. J.

- Colutea** Tourn. (*Papilionaceae*)
 ↳ *arborescens* L. Eur. aust. ♀ D.
 ↳ *crocea* Tausch. ? ♀ D.
 ↳ *cuneata* Ait. *eruenta* Oriens ♀ DF.
 ↳ *haleppica* L. ♀ DF.
 ↳ *intermedia* Tausch. ? ♀ D.
 ↳ *media* W. Eur. aust. or. ♀ D.
 (vide: Lessertia — Sutherlandia).
- Comarum** L. (*Dryadineae*)
 ↳ *palustre* L. Europa ♀ D. V.
- Combretum** Loeff. (*Combretineae*)
 ↳ *grandiflorum* Don. Senegambia ♀ C.
 (vide: Poivre).
- Commelina** Dill. (*Commelinaceae*)
 ↳ *africana* L. Afr. aust. ♀ T.
 ↳ *angustifolia* Mchx. Am. bor. au. ♀ FD.
 ↳ *bengalensis* L. Ind. or. Cap. ⊙ CD.
 ↳ *carnea* Schlecht. Mexico ♀ FD.
 ↳ *clandestina* Mart. ? ♀ FD.
 ↳ *coelestis* W. Mexico ♀ FD.
 ↳ " *β. longepedunculata*. — *γ. scabra*.
 ↳ *communis* L. Ind. or. ⊙ CD.
 ↳ *debilis* Led. ? ♀ FD.
 ↳ *Karwinskii* Mart. Mexico ♀ FD.
 ↳ *orchioides* Booth ? ♀ FD.
 ↳ *parviflora* Lk. ? ♀ FD.
 ↳ *rubens* Red. Mexico ♀ FD.
 ↳ *scapigera* Mart. ? ♀ FD.
 ↳ *Schubertii* Zucc. Oriens ⊙ D.
 ↳ *stricta* Desf. Mexico ♀ FD.
 ↳ *tuberosa* L. " ♀ FD.
 ↳ *variabilis* Schlecht. " ♀ FD.
- Commersonia** Forst. (*Büttneriaceae*)
 ↳ *echinata* Forst. Molluc. Ocean. ♀ C.
 (vide: Büttneria).
- Condyllocarpus** Hoffm. (*Umbelliferae*)
 ↳ *apulus* Hoffm. Eur. aust. ⊙ D.
 ↳ *Hasselquistiae* K. Oriens ⊙ D.
 ↳ *officinalis* Hoffm. Eur. aust. ⊙ D.
- Conioselinum** Fisch. (*Umbelliferae*)
 ↳ *Czernaevia* F. et M. Sibir. au. ⊙ D. J.
 ↳ *dubium* Turcz. " or-aust. ⊙ D. J.
 ↳ *Fischeri* W. et Gr. Eur. or. Sib. ⊙ D. J.
 ↳ *univittatum* Turcz. Sibir. aust. ⊙ D. J.
- Conium** L. (*Umbelliferae*)
 ↳ *maculatum* L. Europa ⊙ D.
- Conobea**, vide: *Leucocarpus* — *Stemodia*.
- Conopodium** Wallr. (*Orchideae*)
 ↳ *platantherum* Wallr. Europa ♀ D. J.
- Conringia** Heist. (*Cruciferae*)
 ↳ *austriaca* Pers. Eur. or-aust. ⊙ D.
 ↳ *orientalis* Pers. Europa Asia ⊙ D.
 ↳ *planisliqua* F. et M. Georg. Soong. ⊙ D.
- Consolida** DeC. (*Ranunculineae*)
 ↳ *Ajacia* K. Eur. or-aust. ⊙ D.
 ↳ *arvensis* K. Europa ⊙ D.
 ↳ *divaricata* K. Oriens ⊙ D.
 ↳ *ornata* K. Eur. or. au. ? ⊙ D.
 ↳ *pubescens* K. Gall., Hisp. ⊙ D.
- Convallaria** L. (*Smilacineae*)
- Convallaria**
 ↳ *majalis* L. Eur., Asia bor. ♀ D.
 " *β. fl. roseo* — *γ. fl. pleno*.
 (vide: *Majanthemum* — *Ophiopogon* — *Polygonatum* — *Smilacina*).
- Convolvulus** Tourn. (*Convolvutineae*)
 ↳ *althaeoides* L. Eur. aust. ♀ FD.
 ↳ *arvensis* L. Europa ♀ D.
 ↳ *bryoniaefolius* Sims China ♀ FD.
 ↳ *Cantabrica* L. Eur. aust. ♀ DF.
 ↳ *capensis* W. Cap. b. sp. ♀ T.
 ↳ *Cneorum* L. Eur. aust. ♀ F.
 ↳ *elongatus* W. Canariae ⊙ D.
 ↳ *erubescens* Sims Nov. Holl. ♀ F.
 ↳ *farinosus* Jacq. Oriens ♀ FD.
 ↳ *fatmensis* Kze. Arabia ⊙ CF.
 ↳ *Hermanniae* L'Her. Peruvia ♀ T.
 ↳ *italicus* R. et S. Ital. Asia bor. ♀ FD.
 ↳ *lineatus* L. Eur. aust. ♀ F.
 ↳ *sabatius* Viv " " ♀ FD.
 ↳ *saxatilis* Vahl. Eur. aust. ♀ F.
 ↳ *Scammonia* L. Oriens ♀ FD.
 ↳ *siculus* L. Eur. aust. ⊙ D.
 ↳ *tricolor* L. " " ⊙ D.
 ↳ *undulatus* Cav. Hisp., Afr. b. ⊙ D.
 (vide: *Argyrea* — *Batatas* — *Calystegia* — *Ipomaea* — *Pharbitis* — *Quamoclit*).
- Conyza** L. (*Synanthereae*)
 ↳ *aegyptiaca* Ait. Aegyptus ⊙ CD.
 ↳ *altaica* DeC. Sibir. aust. ⊙ DF.
 ↳ *ambigua* DeC. Eur. aust. ⊙ D.
 ↳ *chilensis* Spr. Chili, Brasil. ⊙ FD.
 ↳ *Gouani* W. Canariae ⊙ FD.
 ↳ *incisa* Ait. Cap. b. sp. ♀ F.
 " *β. hirta*.
 ↳ *ivaefolia* Less. Cap. b. sp. ♀ F.
 (vide: *Cyanopsis* — *Erigeron* — *Ethulia* — *Inula* — *Phagnalon*).
- Corchorus** Tourn. (*Tiliaceae*)
 ↳ *acutangulus* L. Ind. occ. ♀ C.
 ↳ *hirsutus* L. Amer. trop. ♀ C.
 ↳ *hirtus* L. " " ⊙ C.
 ↳ *olitorius* L. Inter trop. ⊙ C.
 ↳ *pilolobus* Lk. Amer. trop. ♀ C.
 ↳ *siliquosus* L. " " ♀ C.
 ↳ *trilocularis* L. Arabia " ⊙ C.
- Cordia** L. (*Cordiaceae*)
 ↳ *bifurcata* R. et S. Peru ♀ C.
 ↳ *Myxa* L. Ind. or. Aeg. 5 C.
 ↳ *parviflora* Desf. Ind. occ. ♀ C.
 (vide: *Patagonula*).
- Cordylina** Comm. (*Asparagineae*)
 ↳ *congesta* Steudl. Nov. Holl. ♀ C.
 ↳ *ferrea* Endl. Ind. or. ♀ C.
 ↳ *reflexa* Endl. Mascarenh. ♀ C.
 ↳ *rubra* Hügl. Nov. Holl. ♀ T.
 ↳ *salicifolia* K. Ind. or. ♀ C.
 ↳ *terminalis* K. Java, Molluc. ♀ C.
 ↳ *umbraculifera* K. Ind. or. ♀ C.
- Coreopsis** L. (*Synanthereae*)

Coreopsis			
auriculata L.	Amer. bor. - aust.	4 D.	
lanceolata L.	" "	4 D.	
delphinifolia Lam.	" "	4 D.	
praecox Fres.	" "	4 DF.	
(vide: Bidens — Calliopsis — Chrysostemma).			
Corethrostylis Endl.	(<i>Büttneriaceae</i>)		
bracteata Endl.	Nov. Holl.	4 T.	
Coriandrum Tourn.	(<i>Umbelliferae</i>)		
melphitense T. et G.	Neapol. Sicil.	4 D.	
sativum L.	Eur. aust.	4 D.	
(vide: Bifora).			
Coriaria L.	(<i>Coriariaceae</i>)		
myrtifolia L.	Eur. aust.	4 FD.	
Corispermum Juss.	(<i>Chenopodiaceae</i>)		
canescens Kit.	Eur. or. - aust.	4 D.	
crassifolium Turcz.	Sibiria	4 D.	
hyssopifolium L.	Eur. aust.	4 D.	
intermedium Schwg.	Borussia	4 D.	
Marschallii Stev.	Ruth. aust.	4 D.	
nitidum Kit.	Eur. or. - aust.	4 D.	
orientale Lam.	Oriens	4 D.	
squamrosum L.	Eur. or., Asia	4 D.	
tenue L.	" "	4 D.	
Cornicina Boiss.	(<i>Papilionaceae</i>)		
Loeflingii K.	Hispania	4 D.	
Cornucopiae L.	(<i>Gramineae</i>)		
cucullatum L.	Graecia or.	4 D.	
Cornus Tourn.	(<i>Corniceae</i>)		
alba L.	Asia bor.	4 D.	
alternifolia L.	Amer. bor.	4 D.	
canadensis L.	" "	4 D.	
circinata L'Her.	" "	4 D.	
florida L.	" "	4 DF.	
mascula L.	Europa	4 D.	
paniculata L'Her.	Am. bor.	4 D.	
sanguinea L.	Europa	4 D.	
sericea L'Her.	" "	4 D.	
" β . asperifolia	Mchx. — γ . can-		
didissima Mill.			
stolonifera Mchx.	Amer. bor.	4 D.	
stricta Lam.	Amer. bor.	4 D.	
Coronaria L.	(<i>Sileneae</i>)		
tomentosa L.	Eur. aust.	4 D.	
Coronilla Tourn.	(<i>Papilionaceae</i>)		
coronata DeC.	Eur. aust.	4 FD.	
cretica L.	" "	4 D.	
glauca L.	" "	4 F.	
juncea L.	Gall. aust.	4 F.	
montana Scop.	Eur. med. au.	4 DF.	
orientalis Mill.	Oriens	4 F.	
procumbens DeC.	Gall. aust.	4 F.	
vaginalis Lam.	Eur. med. au.	4 DF.	
valentina L.	Eur. aust.	4 F.	
varia L.	Eur., Asia	4 D.	
" β . georgica.			
Correa Sm.	(<i>Diosmaceae</i>)		
alba Andr.	Nov. Holl.	4 F.	
ferruginea Hook.	" "	4 T.	
Correa			
longiflora H. Angl.	Nov. Holl.	4 T.	
pulchella Mackay	" "	4 T.	
rufa Gaertn.	" "	4 T.	
speciosa Andr.	" "	4 T.	
virens Sm.	" "	4 T.	
Corrigiola L.	(<i>Paronychiaceae</i>)		
litoralis L.	Europa	4 D.	
Cortusa L.	(<i>Primulaceae</i>)		
Matthioli L.	Alpes	4 D.	
Corvisartia Merat.	(<i>Synantheraceae</i>)		
Helenium Merat.	Eur. med.	4 D.	
Corycarpus Zea	(<i>Gramineae</i>)		
arundinaceus Zea	Amer. bor.	4 D.	
Corydalis Vent.	(<i>Fumariaceae</i>)		
aurea W.	Amer. b. au.	4 D.	
claviculata DeC.	Eur. aust.	4 D.	
glauca Pursh	Amer. bor.	4 D.	
(vide: Adlumia — Bulbocapnos — Calocapnos — Capnoides — Dikentra — Eucapnos).			
Corylus Tourn.	(<i>Cupuliferae</i>)		
americana L.	Amer. bor.	4 D.	
Avellana L.	Eur., Asia bor.	4 D.	
Columna L.	Eur. or. - aust.	4 D.	
rostrata Ait.	Amer. bor.	4 D.	
tubulosa W.	Eur. aust.	4 D.	
Corynephorus PB.	(<i>Gramineae</i>)		
canescens PB.	Europa	4 D.	
Corynocarpus Forst.	(<i>Myrsinaceae</i>)		
crinitus H. Erf.	Australia?	4 T.	
Cosmanthus Nolte	(<i>Hydrophyllineae</i>)		
fimbriatus Nolte	Amer. bor.	4 D.	
Cosmea W.	(<i>Synantheraceae</i>)		
bipinnata Cav.	Mexico	4 CD.	
diversifolia O. et D.	Am. bor. au.	4 DF.	
parviflora Kth.	Mexico	4 CD.	
Costus L.	(<i>Zingiberaceae</i>)		
speciosus Sm.	Ind. or.	4 C.	
Cotoneaster Med.	(<i>Pomaceae</i>)		
acuminata Lindl.	Nepalia	4 DF.	
buxifolia Wall.	"	4 DF.	
Fontanesiana Spach.	" ?	4 D.	
laxiflora Jacq. f.	Asia bor. med.	4 D.	
microphylla Lindl.	Nepalia	4 DF.	
numularia Lindl.	"	4 DF.	
rotundifolia Lindl.	"	4 DF.	
tomentosa Lindl.	Alp. Subalp.	4 D.	
vulgaris Lindl.	Europa	4 D.	
Cotula L.	(<i>Synantheraceae</i>)		
coronopifolia L.	Eur. occ.	4 D.	
filifolia Thb.	Cap. b. sp.	4 CD.	
pusilla Thb.	"	4 CD.	
(vide: Cenja — Cenocline — Dichrocephala — Grangea — Myriogyne — Pleiogyne).			
Cotyledon Tourn.	(<i>Crassulaceae</i>)		
coruscans Haw.	Cap. b. sp.	4 T.	
fascicularis Ait.	" "	4 T.	
hemisphaerica L.	" "	4 T.	

Cotyledon				Crataegus			
jasminiflora Salm-D.	Cap. b. sp.	† T.		Crusgalli L.	Amer. bor.	‡ D.	
orbiculata L.	" "	† T.		elliptica Ait.	" "	5 D.	
" β. obovata.	" "			flabellata Bosc	" "	‡ D.	
papillaris L. fil.	" "	† T.		flava Ait.	" "	5 D.	
ramosissima Salm-D.	" "	† T.		Fontanesiana Steud.	" "	5 D.	
rosulata K.	" "	† T.		glandulosa W.	Asia et Am-bor.	5 D.	
spuria L.	" "	† T.		latifolia Pers.	Amer. bor.	5 D.	
tuberculosa Lam.	" "	† T.		lucida Mill.	" "	5 D.	
ungulata Lam.	" "	† T.		" β. latifolia.			
(vide: Echeveria — Kalanchoe — Oro-				melanocarpa M.B.	Tauria	‡ D.	
stachys — Umbilicus).				mexicana M. et S.	Mexico	‡ F.	
Coulteria Kth.	(Caesalpiniaceae)			monogyna Jacq.	Europa	5 D.	
horrida Kth.	Columbia	‡ C.		" β. fl. pleno — γ. fl. rubro — δ.			
Courtoisia Rchb.	(Polemoniaceae)			fl. rubro pleno.			
Δbipinnatifida Rchb.	Am. bor.-occ. ⊙ D.			nigra W. et K.	Hungaria	5 D.	
Cousinia Cass.	(Synanthereae)			odorata Bosc	Am. bor.	‡ D.	
alata Schrenk	Sibir. aust. ⊙ DF.			Oliveriana Bosc	Oriens	5 DF.	
ΔHystrix C. A. Mey.	Pers. bor. 4 DF.			orientalis Bosc	" "	5 DF.	
Coussapoa Aubl.	(Artocarpineae)			Oxyacantha L.	Europa	‡ 5 D.	
latifolia Aubl.	Guiana	5 C.		" β. fl. pleno.			
radicans Hort.	?	5 D.		parvifolia Ait.	Amer. bor.	‡ D.	
Crambe Tourn.	(Cruciferae)			pectinata Bosc	Asia med.	‡ DF.	
Δaspera M. B.	Ruthen. aust. 4 D.			pruinosa Jacq. f	Amer. bor.	‡ D.	
Δcordifolia Stev.	Caucasia	4 D.		prunifolia Bosc	" "	5 D.	
filiformis Jacq.	Patagonia	⊙ FD.		punctata Ait.	" "	‡ D.	
grandiflora DeC.	Caucasia	4 D.		" β. aurea.			
Δhispanica L.	Hisp. Lusitan. ⊙ D.			Pyraecantha Pers.	Eur. aust.	‡ FD.	
Δjuncea M. B.	Caucasia	4 D.		pyrifolia Ait.	Amer. bor.	5 D.	
Δmaritima L.	Europa	4 D.		rubra Wend.	?	‡ D.	
Δorientalis L.	Oriens	4 D.		sanguinea Pall.	Sibiria	‡ 5 D.	
Δpinnatifida R. Br.	Eur. or. Cauc. 4 D.			spathulata Mchx.	Amer. bor.	5 D.	
ΔTataria Jacq.	Eur. or-aust. 4 D.			subvillosa Schrad.	" "	‡ D.	
Craniotome Rchb.	(Labiatae)			succulenta Schrad.	" "	‡ D.	
versicolor Rchb.	Nepalia	⊙ ‡ F.		tanacetifolia Pers.	Oriens	5 DF.	
Craspedia Forst.	(Synanthereae)			tomentosa L.	Amer. bor.	‡ D.	
Richea Cass.	Nov. Hol. Tasm. 4 F.			(vide: Aronia — Photinia — Pyrus —			
Crassula L.	(Crassulaceae)			Raphiolepis).			
acutifolia L.	Cap. b. sp.	† T.		Cremocephalum Cass.	(Synanthereae)		
arborescens W.	" "	† T.		cernuum Cass.	Ind. or.	⊙ CD.	
ciliata L.	" "	† T.		Crepis L.	(Synanthereae)		
columnaris L.	" "	† T.		adenantha Vis.	Dalmatia	⊙ D.	
ericoides Haw.	" "	† T.		agrestis W. et K.	Eur. med.	⊙ D.	
lactea Ait.	" "	† T.		alpestris Tsch.	Alpes	4 D. A.	
marginalis Ait.	" "	† T.		aurea Cass.	"	4 D. A.	
orbicularis L.	" "	† T.		biennis L.	Europa	⊙ D.	
perfossa Lam.	" "	† T.		blattarioides Vill.	Alpes	4 D. A.	
portulacacea L.	" "	† T.		chondrilloides Jacq.	Carniol. Illyr.	4 DF.	
Δpulchella Ait.	" "	⊙ CD.		Columnae Froel.	Neapolis	4 F.	
spathulata Thb.	" "	† T.		corymbosa Ten.	Italia	⊙ D.	
tetragona L.	" "	† T.		" β. glabra.			
(vide: Globulea — Rochea — Sphaeritis —				croatica Froel.	Hung. Croat.	4 DF.	
Tetraphyle — Thissantha).				diffusa DeC.	Europa	⊙ D.	
Crataegus Tourn.	(Pomaceae)			flexuosa Bhd.	Asia bor.	4 D.	
affinis Wend.	?	‡ D.		grandiflora Froel.	Alp. Sudet.	4 D. A.	
Azarolus L.	Eur. aust.	5 DF.		hieracioides W. et K.	Eur. med.	4 D.	
Celsiana Dum-C.	Oriens	5 DF.		lacera Ten.	Neapolis	4 FD.	
coccinea L.	Amer. bor.	5 D.		multicaulis Led.	Sibir. alt.	⊙ D.	
cordata Mill.	"	5 D.		oporinoides Boiss.	Hispania	4 F.	
coronata Wendl. f.	?	‡ D.		paludosa Mnch.	Europa	4 D. ∇.	

Crepis

parviflora Desf.	Oriens	⊙ D.
praemorsa Tsch.	Europa	⊙ D.
pulchra L.	Eur. aust.	⊙ D.
rigida W. et K.	Eur. or-aust.	⊙ D.
sibirica L.	Asia bor.	⊙ D.
sectorum L.	Europa	⊙ D.
" β. segetalis Roth.		
virens Vill.	Europa	⊙ D.
" β. pinnatifida W.		

(vide: Anisoderris — Barkhausia — Endoptera — Pterothera — Schmidtia — Willemetia).

Crinum L.

(Amaryllideae)

amabile Don.	Sumatra	⊙ C.
americanum L.	Amer. trop.	⊙ C.
asiaticum L.	Ind. or.	⊙ C.
augustum Roxb.	Mascarenhas	⊙ C.
bracteatum W.	Ind. or.	⊙ C.
Broussonetii Herb.	Amer. trop.	⊙ C.
Carreyanum Herb.	Mascarenhas	⊙ C.
Commelini Jacq.	Amer. trop.	⊙ C.
erubescens Ait.	Amer. trop.	⊙ C.
giganteum Andr.	Cap. b. sp.	⊙ T.
mexicanum Hort.	Mexico	⊙ C.

Crithmum Tourn.

(Umbelliferae)

maritimum L.	Eur. occ. aust.	⊙ F.
--------------	-----------------	------

Crithodium Lk.

(Gramineae)

aegyptiacum Trin.	Graec. Aeg. ⊙ 2 DF.	
-------------------	---------------------	--

Crithopyrum Lk.

(Gramineae)

Richardsonii Lk.	Amer. bor.	⊙ D.
------------------	------------	------

Crocus Tourn.

(Grideae)

albiflorus Kit.	Alp. Subalpes	⊙ D.
autumnalis Mill.	Eur. aust.	⊙ DF.
biflorus Mill.	Eur. or-aust.	⊙ D.
brachystemon K.	Eur. aust.	⊙ D.
longiflorus Raf.	" "	⊙ DF.
luteus Lam.	Eur. aust-or.	⊙ D.
Pallasii Goldb.	Tauria	⊙ D.
pusillus Ten.	Italia	⊙ D.
reticulatus M. B.	Taur. Cauc.	⊙ D.
sativus L.	Oriens	⊙ DF.
serotinus Sal.	Eur. aust.	⊙ DF.
suaveolens Bert.	Italia	⊙ DF.
sulfureus Ker	Oriens	⊙ D.
susianus Ker	"	⊙ D.
vernus z. AL.	Eur. med.-aust.	⊙ D.
" β. neapolitanus Sims. — γ. pictus		

Salisb.

Crossandra Salisb.

(Acanthineae)

infundibuliformis N.E.	Ind. or.	⊙ C.
------------------------	----------	------

Crotalaria Dillen.

(Papilionaceae)

biflora L.	Ind. or.	⊙ C.
capensis Jacq.	Cap. b. sp.	⊙ T.
genistella Kth.	Amer. aust.	⊙ C.
genistoides Lam.	Cap. b. sp.	⊙ CD.
Heldiana DeC.	?	⊙ C.
hirsuta W.	Ind. or.	⊙ C.
incana L.	Ind. occ.	⊙ C.
nitens Kth.	Columbia	⊙ C.

Crotalaria

ovalis Pursh.	Am. bo-aus.	⊙ CD.
parviflora Roth	" b. "	⊙ CD.
purpurea Vent.	Cap. b. sp.	⊙ T.
retusa L.	Ind. or.	⊙ C.
sagittalis L.	Am. bor-au.	⊙ CD.
semperflorens Vent.	Ind. or.	⊙ C.
striata A. Braun.	Abyssinia	⊙ C.
vestita Hort.	?	⊙ C.
villosa Thb.	Cap. b. sp.	⊙ CD.
Croton L.	(Euphorbiaceae)	
pennicillatus Vent.	Cuba	⊙ C.
(vide: Codiacum — Crozophora).		

Crowea Sm.

(Diosmaceae)

saligna Sm.	Nov. Holl.	⊙ T.
-------------	------------	------

Crozophora Neck.

(Euphorbiaceae)

tinctoria A. Juss.	Eur. au. Af. b.	⊙ CD.
--------------------	-----------------	-------

Crucianella L.

(Rubiaceae)

aegyptiaca L.	Eur. au. Af. b.	⊙ D.
angustifolia L.	Eur. aust.	⊙ D.
ciliata Lam.	Oriens	⊙ D.
gilanica Trin.	Pers. bor.	⊙ D.
glauca Rich.	"	⊙ D.
latifolia L.	Eur. aust.	⊙ D.
molluginoides M. B.	Eur. or-aust.	⊙ D.
monspeliaca L.	Eur. aust.	⊙ D.
patula L.	Hispania	⊙ D.
stylosa Trin.	Pers. bor.	⊙ D.
suaveolens C. A. Mey.	Caucasia	⊙ D.

Crupina Pers.

(Synanthereae)

vulgaris Pers.	Eur. aust.	⊙ D.
----------------	------------	------

Crusea Ch. et S.

(Rubiaceae)

hispidula Bartl.	Mexico	⊙ C.
rubra Ch. et S.	Ind. occ.	⊙ C.

Cryphiaanthus N. E.

(Acanthineae)

barbadensis N. E.	Ind. occ.	⊙ C.
lacteus N. E.	Mexico	⊙ C.

Crypsis Ait.

(Gramineae)

aculeata Ait.	Eur. aust.	⊙ D.
schoenoides Lam.	"	⊙ D.

Cryptantha Lehm.

(Borragineae)

glomerata Lehm.	Chili	⊙ D.
microcarpa F. et M.	"	⊙ D.

Cryptanthus O. et Dt.

(Bromeliaceae)

discolor O. et Dt.	Brasilia	⊙ C.
--------------------	----------	------

Cryptophragmium N. E.

(Acanthineae)

venustum N. E.	Ind. or.	⊙ C.
----------------	----------	------

Cryptostemma R. Br.

(Synanthereae)

calendulaceum R. Br.	Cap. b. sp.	⊙ D.
hypochondriacum R. Br.	"	⊙ D.

Cryptotaenia DeC.

(Umbelliferae)

canadensis DeC.	Amer. bor.	⊙ D.
Thomasii DeC.	Neapolis	⊙ FD.

Cucubalus Tourn.

(Sileneae)

bacciferus L.	Europa	⊙ D.
---------------	--------	------

Cucumis Tourn.

(Cucurbitaceae)

africanus L.	Afr. aust.	⊙ C.
anguinus L.	Ind. or.	⊙ C.
Anguria L.	Ind. occ.	⊙ C.

Cucumis			Cuspidocarpus Spenn. (<i>Labiatae</i>)	
arabicus DeC.	Arabia	⊙ C.	rupestris Spenn.	Germ. or aus. † DF.
Chate L.	Aegyp. Arab.	⊙ C.	Cussonia Thb.	(<i>Araliaceae</i>)
deliciosus Roth.	Ind. or.	⊙ C.	thyrsiflora Thb.	Cap. b. sp. † T.
dipsaceus Ehrbg.	Aegyptus	⊙ CD.	Cyanella L.	(<i>Liliaceae</i>)
Dudaim L.	Persia	⊙ C.	capensis L.	Cap. b. sp. † T.
flexuosus L.	Ind. or.	⊙ C.	Cyanopsis Blume	(<i>Synanthereae</i>)
Melo L.	Asia aust.	⊙ C.	pubescens DeC.	Ind. or. ⊙ CF.
" β. cantalupica	— γ. melitensis.		Cyanotis D. Don.	(<i>Commelinaceae</i>)
metuliferus E. Mey.	Afr. aust.	⊙ C.	cristata Don.	Ind. or. ⊙ C.
prophetaurum L.	Arab. Cap.	⊙ CD.	Cyathodes Lab.	(<i>Epacridae</i>)
pubescens W.	?	⊙ C.	acerosa R. Br.	Tasmania † F.
sativus L.	Asiamed-aust.	⊙ C.	Cycas L.	(<i>Cycadeae</i>)
" β. macrocarpus	Wendt.		revoluta Thb.	China, Japon. † CT.
serotinus Hab.	?	⊙ C.	Cyclamen Tourn.	(<i>Primulaceae</i>)
(vide: Citrullus — Luffa).			coul Mill.	Graecia, Oriens † F.
Cucurbita Tourn. (<i>Cucurbitaceae</i>)			europaeum L.	Europa † D.
aurantia W.	Asia med.	⊙ CD.	hederaefolium Ait.	Eur. aust. † FD.
" β. minor.			intermedium Wend.	" † FD.
ceratocreas Hab.	?	⊙ CD.	neapolitanum Ten.	Neapolis † FD.
clypeata Duch.	Asia med.	⊙ CD.	persicum Mill.	Graecia, Or. † F.
colocynthoides Ser.	?	⊙ CD.	repandum S. et Sm.	Ital. Graec. † FD.
maxima Duch.	Asia med.	⊙ CD.	Cyclanthera Schrad.	(<i>Cucurbitaceae</i>)
Melopepo L.	" "	⊙ CD.	pedata Schrad.	Mexico. ⊙ CD.
ovifera L.	" "	⊙ CD.	Cyclocoma M. T.	(<i>Chenopodiaceae</i>).
Pepo L.	" "	⊙ CD.	platyphylla M. T.	Amer. bor. ⊙ D.
reticulata Hab.	?	⊙ CD.	Cyclopia Vent.	(<i>Papilionaceae</i>).
Succado Sab.	?	⊙ CD.	galioides DeC.	Cap. b. sp. † T.
turbinata Mar.	?	⊙ CD.	Cydonia Tourn.	(<i>Pomaceae</i>)
verrucosa L.	?	⊙ CD.	chinensis Thouin	China † DF.
(vide: Citrullus — Lagenaria).			vulgaris Pers.	Eur. aust. † D.
Cullumia R. Br. (<i>Synanthereae</i>)			" β. lusitanica Mill.	
ciliaris R. Br.	Cap. b. sp.	† T.	(vide: Chaenomeles).	
Cunninghamia R. Br. (<i>Abietineae</i>)			Cymaria Benth. (<i>Labiatae</i>)	
sinensis R. Br.	China	5 F.	elongata Benth.	Ind. or. † C.
Cunonia L. (<i>Cunoniaceae</i>)			Cymbalaria Tourn. (<i>Scrophulariaceae</i>)	
capensis L.	Cap. b. sp.	† T.	acutangula K.	Eur. aust. † F.
Cuphea P. Br. (<i>Zythrineae</i>)			hederacea K.	Eur. med. au. † DF.
aequipetala Cav.	Mexico	† T.	pilosa K.	Neap., Sicil. † F.
floribunda Lehm.	"	† T.	Cymbidium Swt. (<i>Orchideae</i>)	
procumbens Kth.	"	⊙ D.	aloefolium Swt.	Ind. or. † C.
silenoideus N. E.	"	⊙ CD.	altum W.	Ind. occ. † C.
viscosissima Jacq.	"	⊙ D.	ensifolium Swt.	Japonia † TC.
Cupressus Tourn. (<i>Cupressineae</i>)			pendulum Swt.	Ind. occ. † C.
pendula Thb.	Japonia	5 F.	sinense W.	China † C.
sempervirens L.	Eur. aust.	5 F.	xiphiifolium Lindl.	" † C.
" β. horizontalis Mill.			Cynanchum L. (<i>Asclepiadeae</i>)	
(vide: Callitris — Chamaecyparis — Taxodium — Widdringtonia).			acutum L.	Eur. aust. † D.
Curculigo Gaertn. (<i>Hypoxideae</i>)			foetidum Kth.	Mexico † C.
sumatrana Lodd.	Sumatra	† C.	pulcherrimum Hort.	?
Curcuma L. (<i>Zingibereae</i>)			(vide: Sarcostemma — Vincetoxicum).	
aromatica Sal.	Ind. or.	† C.	Cynara Vaill. (<i>Synanthereae</i>)	
longa L.	" "	† C.	Cardunculus L.	Eur. aust. † DF.
Zedoaria Rose.	" "	† C.	ferox Ten.	Sicilia † DF.
Curtogyne Haw. (<i>Crassulacea</i>)			humilis L.	Eur. aust. † DF.
dejecta Haw.	Cap. b. sp.	† T.	Scolymus L.	" † DF.
Cuscuta Tourn. (<i>Cuscutaceae</i>)			spinosissima Prsl.	Sicilia † DF.
chilensis Ker	Chili	⊙ D.	Cynocardium W. et B. (<i>Cruciferae</i>)	
Epilinum Weihe	Europa	⊙ D.	Menziesii Endl.	Amer. bor. ⊙ D.
			virginicum W. et B.	" " ⊙ D.

<i>Cynodon</i> Rich.	(Gramineae)				
<i>Dactylon</i> Pers.	Eur. aust.	4.D.			
<i>Cynoglossum</i> Tourn.	(Borragineae)				
<i>apenninum</i> L.	Eur. aust.	2.D.			
<i>canescens</i> W.	Ind. or.	2.CD.			
<i>cheirifolium</i> L.	Eur. aust.	2.DF.			
<i>clandestinum</i> Desf.	Lusit. Afr.	2.DF.			
<i>Dioscoridis</i> Vill.	Gallia	2.DF.			
<i>furcatum</i> Wall.	Ind. or.	2.FD.			
<i>glochidiatum</i> Wall.	Ind. or.	2.FD.			
<i>lanceolatum</i> Forsk.	Arab., Cap.	2.CD.			
<i>longiflorum</i> Lehm.	Oriens	2.FD.			
<i>montanum</i> Lam.	Eur. med.	2.D.			
<i>officinale</i> L.	Europa	2.D.			
" <i>β. bicolor</i> W.					
<i>pictum</i> Ait.	Eur. aust.	2.FD.			
<i>virginicum</i> Gron.	Am. bor.	2.D.			
(vide: <i>Mattia</i> — <i>Omphalodes</i>).					
<i>Cynosurus</i> L.	(Gramineae)				
<i>cristatus</i> L.	Europa	2.D.			
<i>echinatus</i> L.	Eur. aust.	2.D.			
<i>Cyperus</i> Tourn.	(Cyperineae)				
<i>alternifolius</i> L.	Madagascar	4.C.			
<i>auricomus</i> Sieb.	Aegypt., Ind.	4.C.			
<i>badius</i> Desf.	Eur. occ. Afr.	4.FD.			
<i>compressus</i> L.	Amer. trop.	2.CF.			
<i>congestus</i> Vahl.	Cap. b. sp.	2.CD.			
<i>conglomeratus</i> Rottb.	Ind. or.	2.CD.			
<i>difformis</i> L.	Aeg., Ind.or.	2.CD.			
<i>distans</i> L. fil.	Ind. or.	4.C.			
<i>erythraeus</i> Schrad.	?	2.CD.			
<i>esculentus</i> L.	Eur. au. Aeg.	4.FD.			
<i>fastigiatus</i> Rottb.	Ind. or.	4.C.			
<i>flagellaris</i> Hochst.	Abyssinia	4.C.			
<i>flavescens</i> L.	Europa	2.D.			
<i>fuscus</i> L.	" aust.	2.D.			
<i>glomeratus</i> L.	" aust.	2.CD.			
<i>infucatus</i> Kth.	Brasilia	4.C.			
<i>Iria</i> L.	Ind. or.	4.C.			
<i>Jacquini</i> Schrad.	Ind. or.	4.C.			
<i>junciformis</i> Desf.	Afr. bor.	4.T.			
<i>kyllingioides</i> Vahl.	Ind. or.	4.C.			
<i>ligularis</i> L.	Amer. trop.	4.C.			
<i>longus</i> L.	Eur. aust.	4.FV.			
<i>mucronatus</i> Rottb.	Asia med. aus.	4.T.			
" <i>β. albus</i> .					
<i>myriostachys</i> Ten.	Neapolis	4.FD.			
<i>pannonicus</i> Jacq.	Hungaria	2.CD.			
<i>Paramatta</i> Mart.	Nov. Holl.	4.C.			
<i>patulus</i> Kit.	Eur. aust.	4.FD.			
<i>pictus</i> Ten.	Neapolis	4.FD.			
<i>polystachyus</i> Rottb.	Ind. or.	4.C.			
<i>reflexus</i> Vahl.	La Plata	4.T.			
<i>Sellowii</i> Lk.	"	4.T.			
<i>spectabilis</i> Bhd.	Nov. Holl.	4.FD.			
<i>strigosus</i> L.	Am. bor. aus.	4.FD.			
<i>Tenorei</i> Prsl.	Neap. Sicil.	4.FD.			
<i>venustus</i> R. Br.	Afr. trop.	4.C.			
<i>vegetus</i> W.	America	4.FD.			
<i>Cyphia</i> Berg.	(Goodeniaceae)				
<i>Cyphia</i>					
<i>sylvatica</i> Ekl.	Cap. b. sp.	4.T.			
<i>Cypripedium</i> L.	(Orchideae)				
<i>Calceolus</i> L.	Europa	4.D. A.			
<i>insigne</i> Wall.	Nepalia	4.T.C.			
<i>pubescens</i> W.	Amer. bor.	4.D. A.			
<i>spectabile</i> Swt.	"	4.F.			
<i>venustum</i> Wall.	Nepalia	4.T.			
<i>Cyrtanthus</i> Ait.	(Amaryllideae)				
<i>angustifolius</i> Ait.	Cap. b. sp.	4.T.			
<i>obliquus</i> Ait.	"	4.T.			
<i>pumilio</i> Schult.	"	4.T.			
<i>Cyrtomium</i> Prsl.	(Polypodiineae)				
<i>falcatum</i> Prsl.	Japonia	4.T.			
<i>Cyrtopodium</i> R. Br.	(Orchideae)				
<i>speciosum</i> Hort.	Amer. trop.	4.C.			
<i>Cyrtostemma</i> Koch.	(Dipsacineae)				
<i>acutiflorum</i> K.	Eur. aust.	4.FD.			
<i>ambiguum</i> K.	"	4.FD.			
<i>atropurpureum</i> Spach.	"	2.D.			
" <i>β. grandiflorum</i> .	"	2.D.			
<i>maritimum</i> K.	"	2.D.			
<i>Cysticapos</i> Boerh.	(Fumariaceae)				
<i>africana</i> Gaertn.	Cap. b. sp.	2.D.			
<i>Cystopteris</i> Bdh.	(Polypodiineae)				
<i>bulbifera</i> Bhd.	Amer. bor.	4.D. A.			
<i>fragilis</i> Bhd.	Europa	4.D. A.			
<i>rhaetica</i> Lk.	Alp. Sudet.	4.D. A.			
<i>Cytisus</i> Tourn.	(Papilionaceae)				
<i>aeolicus</i> Guss.	Sicilia	4.F.			
<i>albus</i> Lk.	Lusit. Afr. bor.	4.F.			
<i>alpinus</i> Mill.	Alpes	4.D.			
<i>Alschingeri</i> Vis.	Dalmatia	4.FD.			
<i>austriacus</i> L.	Eur. or. aust.	4.D.			
<i>biflorus</i> L'Her.	Eur. med. aus.	4.D.			
" <i>β. glaber</i> L. fil.	"	4.D.			
<i>canescens</i> Loisl	?	4.D.			
<i>capitatus</i> Jacq.	Eur. med. aus.	4.D.			
<i>caucasicus</i> Jacq. f.	Caucasia	4.D.			
<i>chrysobotrys</i> Fisch	?	4.F.			
<i>elongatus</i> W. et K.	Hungaria	4.D.			
<i>hirsutus</i> L.	Eur. aust.	4.D.			
<i>Laburnum</i> L.	"	4.D.			
" <i>β. quercifolius</i> .	"	4.D.			
<i>leucanthus</i> W. et K.	Eur. or. aust.	4.D.			
<i>multiflorus</i> Lindl	"	4.D.			
<i>nigricans</i> L.	Eur. med. aust.	4.D.			
<i>onustus</i> Tsch.	?	4.D.			
<i>polycephalus</i> Tsch.	Eur. aust.	4.D.			
<i>polytrichus</i> MB.	Tauria	4.D.			
<i>proliferus</i> L. fil.	Teneriffa	4.F.			
<i>prostratus</i> Scop.	Tyrol., Carn.	4.D.			
" <i>β. bisflorens</i> Host.	"	4.D.			
<i>purpureus</i> Scop.	Carn. Carin.	4.DF.			
<i>ramentaceus</i> Sieb.	Dalmatia	4.FD.			
<i>ruthenicus</i> Fisch.	Ruthenia	4.D.			
<i>sessilifolius</i> L.	Gall., Pedem.	4.D.			
<i>supinus</i> L.	Eur. med. or.	4.D.			
<i>triflorus</i> L'Her.	Eur. aust.	4.D.			
<i>uralensis</i> Led.	Ruthenia	4.D.			

Cytisus

(vide: Adenocarpus — Argyrolobium — Calophaca — Genista — Sarothamnus).

Czackia Andr. (Lilimeae)

Liliastrum Andr. Alpes 4 3 D.

Daboecia D. Don. (Cricaceae)

polifolia D. Don. Hibern. Pyren. 4 F.

" β. fl. albo.

Dactylaena Schrad. (Capparideae)

micrantha Schrad. ? C.

Dactylagrostis Lk. (Gramineae)

Richardsonii Lk. Amer. bor. 4 3 D.

Dactylis L. (Gramineae)

glomerata L. Europa 4 3 D.

" β. glaucescens W.

Dactyloctenium W. (Gramineae)

aegyptiacum W. Afr. b. Eur. a. C. D.

aristatum Lk. Aegypt. C. D.

Dactylogramma Lk. (Gramineae)

cinnoides Lk. Am. bor. occ. 4 D.

Dahlia Cav. (Synanthereae)

arborea Hort. Mexico 4 T.

coccinea Cav. 4 FD.

glabrata Lindl. 4 FD.

scapigera O. et Dt. 4 FD.

variabilis Desf. 4 F D.

Dalea L. (Papilionaceae)

alopeuroides L. Am. b. aust. D.

Lagopus W. Mexico D.

Danthonia DeC. (Gramineae)

decumbens DeC. Europa 4 D.

provincialis DeC. Eur. aust. 4 DF.

Daphne L. (Thymelaeaceae)

alpina L. Alpes 4 D. 4

Cneorum L. Eur. med. aust. 4 D.

collina Sm. Italia 4 F.

hybrida Swt. Hybr. 4 T.

indica L. China 4 T.

Laureola L. Eur. m. occ. 4 DF.

Mezereum L. Europa 4 D.

odora Thbg. China 4 T.

" β. variegata.

pontica L. Oriens 4 F.

Darlingtonia DeC. (Mimosaceae)

glandulosa DeC. Am. bor. aus. 4 DF.

Datisca L. (Datisceae)

cannabina L. Cret. Oriens 4 DF.

Datura L. (Solanaceae)

fastuosa L. Ind. or. C. D.

ferox L. D.

inermis Jacq. Abyssinia D.

Metel L. Asia aust. Afr. D.

muricata Bhd. ? D.

quercifolia Kth. Mexico D.

" β. inermis.

Stramonium L. Eur. Asia, Am. D.

Tatula L. Eur. aust. Asia D.

" β. gigantea.

(vide: Brugmansia — Ceratocaulos).

Daucus Tourn. (Umbelliferae)

Daucus

abyssinicus F. et. M. Abyssinia C. 2 DF.

aureus Desf. Eur. au. Afr. b. D.

bessarabicus DeC. Ruth. aust. D.

Bocconi Guss. Sicilia 2 DF.

Broteri Ten. Eur. aust. 2 DF.

Carota L. Europa 2 D.

Gingidium L. Sicil., Cors. 2 DF.

hispanicus Gou. Eur. aust. 2 DF.

hispidus Desf. Eur. au. Afr. 2 DF.

maritimus Lam. Gall. aust. 2 DF.

maximus Desf. Eur. au. Afr. 2 DF.

montevicensis Lk. La Plata 2 FD.

muricatus L. Italia, Afr. bor. D.

pulcherrimus Koch Tauria, Or. 2 D.

rigidus H. Par. ? 2 D.

siculum Ten. Sicil., Sard. 2 DF.

Davallia Sm. (Polypodiaceae)

canariensis Sw. Canariae 4 T.

Daviesia Sm. (Papilionaceae)

mimosoides R. Br. Nov. Holl. 4 T.

ulicina Sm. 4 T.

Deckera Schultz. (Synanthereae)

asplenioides Schultz. Afr. bor. 4 F.

canescens C. A. Mey. Caucasia 2 D.

Decumaria L. (Philadelphineae)

barbara L. Am. bor. aust. 4 DF.

sarmentosa Bosc. 4 DF.

Deeringia R. Br. (Amarantaceae)

celosioides R. Br. Nov. Holl. 4 T.

Delphinium Tourn. (Ranunculaceae)

acuminatum K. Asia bor. ? 4 D.

albiflorum DeC. Armenia 4 DF.

alpinum W. et K. Hungaria 4 D.

amoenum Stev. Sibiria 4 D.

angustilobum K. ? 4 D.

azureum Mchx. Amer. bor. 4 D.

cheilanthum Fisch. Sibir. aust. 4 D.

chinense Fisch. Asia or. 4 D.

ciliatum Stev. Caucasus 4 D.

crassifolium Schrad. Asia bor. 4 D.

cuneatum Stev. " " 4 D.

cyaneum Stev. " " 4 D.

dasycarpum Stev. " " 4 D.

densiflorum Tsch. ? " 4 D.

discolor Fisch. Asia bor. 4 D.

dissectum K. " " 4 D.

dictyocarpum Stev. " " 4 D.

elatum L. " " 4 D.

elegans DeC. Amer. bor. 4 D.

exaltatum Ait. " " 4 D.

fissum W. et K. Hungaria 4 DF.

flexuosum M. B. Caucasus 4 D.

formosum Tsch. ? 4 D.

fuscatum Rchb. ? 4 D.

glabellum Turcz. Sibiria 4 D.

grandiflorum L. " 4 D.

gratum Hffing. ? 4 D.

hybridum W. Taur. Caucas. 4 D.

inamoenum K. ? 4 D.

Delphinium

intermedium Ait.	Alp. Subalp. 2 D.
junceum DeC.	Eur. aust. ⑤ D.
laevigatum Tsch.	? 2 D.
laxiflorum DeC.	Siberia 2 D.
laxum Mill.	" ? 2 D.
lazulinum Rchb.	" ? 2 D.
lucidum K.	" ? 2 D.
montanum DeC.	Helvet., Pyren. 2 D.
ochroleucum Stev.	Cauc., Arm. 2 DF.
officinale Wend.	Eur. aust. ② FD.
palmatifidum DeC.	Asia bor. 2 D.
pictum W.	Eur. aust. ② FD.
pilosissimum DeC.	Asia bor. 2 D.
praecox K.	? 2 D.
punicum Pall.	Africa bor. 2 D.
pyramidale K.	" " 2 D.
ranunculifolium DeC.	Alpes " 2 D.
Requienii DeC.	Stöchades ② FD.
revolutum Desf.	? 2 D.
rubellum K.	? 2 D.
speciosum M. B.	Caucasus 2 D.
spurium Fisch.	Asia bor. 2 D.
Staphisagria L.	Eur. aust. ② FD.
sulcatum Rchb.	? 2 D.
tricolor Bhd.	Oriens 2 DF.
tridactylon Mchx.	Amer. bor. 2 D.
triste Fisch.	Dahuria 2 D.
truncatum K.	? 2 D.
urceolatum Jacq.	Amer. bor. 2 D.
variegatum K.	? 2 D.
velutinum Bert.	Italia 2 D.
villosum Stev.	Asia bor. 2 D.
vitifolium Mühlb.	Amer. bor. 2 D.
(vide: <i>Consolida</i>).	
Dendrobium Swt.	(<i>Orchideae</i>)
Calceolaria Hook.	Ind. or. 2 C.
fimbriatum Wall.	" 2 D.
moniliforme Swt.	Japonia 2 TC.
moschatum Wall.	Ind. or. 2 C.
Pierardi Roxb.	" " 2 C.
pulchellum Roxb.	" " 2 C.
speciosum Smt.	Nov. Holl. 2 C.
Dentaria Tourn.	(<i>Cruciferae</i>)
bulbifera L.	Europa 2 D. A.
(vide: <i>Cardamine</i>).	
Dermasea Haw.	(<i>Saxifragaceae</i>)
nivalis Haw.	Eur. bor. 2 D. A.
pensylvanica Haw.	Amer. bor. 2 D. A.
Deschampsia P. B.	(<i>Gramineae</i>)
caespitosa P. B.	Europa 2 D.
" β. involuta.	
junceae P. B.	Europa occ. 2 D.
Descurea Guett.	(<i>Cruciferae</i>)
binervis K.	Caucasia ⑤ D.
brachycarpa K.	Amer. bor. ⑤ D.
Cumingiana K.	Chili ⑤ D.
incana K.	Amer. bor. ⑤ D.
millefolia K.	Canariae 2 C.
nana K.	Sib. or. Casp. ② D.

Descurea

persica K.	Persia ⑤ D.
pumila K.	Pers., Amer. ⑤ D.
Sophia K.	Europa ⑤ D.
Desmanthus W.	(<i>Mimosaceae</i>)
depressus Kth.	Am. aust. 2 C.
diffusus W.	" 2 C.
strictus Bert.	Ind. occ. 2 C.
virgatus W.	Ind. or. 2 C.
Desmochaeta DeC.	(<i>Amarantaceae</i>)
atropurpurea DeC.	Ind. or. 2 C.
muricata DeC.	Moluccae 2 C.
Desmodium Desv.	(<i>Papilionaceae</i>)
abyssinicum DeC.	Abyssinia 2 T.
Aparines DeC.	Mexico 2 C.
canadense DeC.	Amer. bor. 2 D.
canescens DeC.	Am. bor. aus. 2 DF.
maculatum DeC.	Ind. or. 2 C.
heterocarpum DeC.	" " 2 C.
heterophyllum DeC.	" " 2 C.
laevigatum DeC.	Am. bor. aus. 2 DF.
marylandicum DeC.	" " 2 DF.
nutans Wall.	Ind. or. 2 C.
triquetrum DeC.	" " 2 C.
viridiflorum DeC.	Am. bor. au. 2 DF.
Deutzia Thbg.	(<i>Philadelphiceae</i>)
canescens Siebd.	Japonia 2 FD.
mitis Bartl.	" 2 FD.
sanguinea Hort.	" 2 FD.
scabra Thbg.	" 2 FD.
undulata Siebd.	" 2 FD.
Deyeuxia Sieb.	(<i>Gramineae</i>)
acutiflora P. B.	Eur. med. aus. 2 D.
confinis Kth.	Amer. bor. 2 D.
purpurea Kth.	Sibir. aust. 2 D.
pyramidalis K.	Europa 2 D.
sylvatica Kth.	" 2 D.
varia Kth.	" 2 D.
Dianella Lam.	(<i>Asparagineae</i>)
coerulea Curt.	Nov. Holl. 2 T.
divaricata R. Br.	" 2 F.
ensifolia Ait.	Ind. or. 2 C.
longifolia R. Br.	Nov. Holl. 2 T.
Dianthus L.	(<i>Sileneae</i>)
alpinus L.	Alpes 2 D. A.
arboreus L.	Creta 2 F.
arenarius L.	Eur. bor. med. 2 D.
Armeria L.	Europa ② D.
Arrostii Prsl.	Sicilia 2 DF.
asper W.	Eur. aust. 2 D.
attenuatus Sm.	Gall. aust. 2 DF.
atro rubens All.	Eur. aust. 2 DF.
barbatus L.	Germ. au. Gall. 2 DF.
bicolor M. B.	Tauria 2 D.
caesioides Sm.	Eur. med. 2 D.
campestris M. B.	Tauria 2 D.
carthusianorum L.	Europa 2 D.
Caryophyllus L.	Eur. aust. 2 DF.
caryophylloides Scht.	Illyria 2 DF.
caucasicus Sims	Caucasus 2 D.

Dianthus

chinensis L.	China	② D.
" β. hybridus.		
ciliatus Guss.	Italia	q. DF.
cingulatus Rehb.	?	q. D.
collinus W. et K.	Eur. aust.	q. D.
cruentus Griesb.	Rumelia	q. DF.
Cyri F. et M.	Oriens	⊙ D.
deltoides L.	Europa	q. D.
dentosus Fisch.	Sibiria	q. D.
discolor Sims.	Caucasia	q. D.
diutinus Kit.	Eur. or-aust.	q. D.
Fischeri Spr.	Ruthenia	q. D.
fimbriatus M. B.	Caucasia	q. DF.
floribundus Spach.	"	q. DF.
fragrans M. B.		q. D.
furcatus Balb.	Pedemont.	q. DF.
gallicus Pers.	Gall. aust.	q. DF.
glacialis Haenke	Alpes	q. D. A.
guttatus M. B.	Ruth. aust.	q. D.
hungaricus Pers.	Hungaria	q. D.
hypanicus Bess.	Ruth. aust.	q. D.
ibericus W.	Caucasia	q. D.
latifolius W.	?	q. DF.
leptopetalus W.	Caucasia	q. D.
Libanotis Lab.	Syria	q. F.
liburnicus B. et W.	Illyria	q. DF.
lineolatus DeC.	Gall. aust.	q. DF.
longicaulis Ten.	Neapolis	q. FD.
monspessulanus L.	Eur. aust.	q. D.
montanus M. B.	Caucasus	q. D.
nitidus W. et K.	Hungaria	q. D.
pallidiflorus Ser.	Ruth. aust. or. D.	q. D.
petraeus W. et K.	Hungaria	q. D.
plumarius L.	Eur. aust.	q. D.
" β. hortensis	— γ. scoticus.	
pratensis M. B.	Ruth. aust.	q. D.
Pseudo-Armeria M. B.	"	q. D.
pungens L.	Hispania	q. FD.
rupicola Biv.	Sicilia	q. FD.
sanguineus Vis.	Dalmatia	q. FD.
Seguieri Vill.	Eur. aust.	q. D.
serotinus W. et K.	Hungaria	q. D.
siculus Prsl.	Sicilia	q. FD.
suaveolens Spr.	?	q. D.
suffruticosus W.	?	q. F.
superbus L.	Europa	q. D.
sylvestris Wulf.	Germ. aust.	q. D. A.
trifasciculatus Kit.	Hungaria	q. D.
tergestinus Rehb.	Illyria	q. D.
virgineus L.	Eur. aust.	q. DF.
viridescens Vis.	Dalmatia	q. FD.
Waldsteinii Sternb.	Illyr. Hung.	q. D.
(vide: Kohlrauschia—	Tunica).	
Diasia DeC.	(Irideae)	
graminifolia DeC.	Cap. b. sp.	q. T.
iridifolia DeC.	"	q. T.
Dicerma DeC.	(Papilionaceae)	
pulchellum DeC.	Ind. or.	q. C.
Dichodon Bartl.	(Alsineae)	

Dichodon

anomalum Rehb.	Eur. or-aust.	⊙ D.
stellarioides Rehb.	Alpes	q. D. A.
Dichondra Forst.	(Convolvulineae)	
argentea W.	Mexico	q. C.
repanda W.	Amer. aust.	q. C.
repens Forst.	Nov. Holl., Tas.	q. T.
rotundifolia Lk.	Persia	q. T.
sericea Swt.	Ind. occ.	q. C.
Dichorisandra Mik.	(Commelinaceae)	
thyrsiflora Mik.	Brasilia	q. C.
Dichostylis N. E.	(Cyperineae)	
Micheliana N. E.	Eur. aust.	⊙ D.
Dichrocephala DeC.	(Synanthereae)	
latifolia DeC.	Ind. or.	⊙ CD.
Dicksonia L'Her.	(Polypodiaceae)	
adiantoides Humb.	Amer. trop.	q. C.
davallioides R. Br.	Nov. Holl.	q. C.
tenera Prsl.	Amer. trop.	q. C.
Dicliptera Juss.	(Acanthineae)	
Moritziana Schau.	Columbia	q. C.
laevigata Juss.	Mascarenh.	q. C.
resupinata Juss.	Mexico	⊙ C.
Diclytra, vide: Dikentra.		
Dictamnus L.	(Diosmaceae)	
albus L.	Europa	q. D.
" β. fl. albo.		
angustifolius Swt.	Altai	q. DF.
dauricus Bhd.	Sibir. aust.	q. DF.
Didelta L'Her.	(Synanthereae)	
cernua Less.	Cap. b. sp.	⊙ CD.
Didiscus DeC.	(Umbelliferae)	
coeruleus Hook.	Nov. Holl.	⊙ CD.
Didymochlaena Desv.	(Polypodiaceae)	
sinuosa Desv.	Ind. occ.	q. C.
Dieffenbachia Schott	(Arineae)	
Seguinum Schott	Amer. trop.	q. C.
Diervilla Tourn.	(Caprifoliaceae)	
canadensis W.	Amer. bor.	q. D.
Dietes Salisb.	(Irideae)	
iridioides Swt.	Cap. b. sp.	q. T.
Digitalis Tourn.	(Scrophulariaceae)	
australis Ten.	Neapolis	q. DF.
ferruginea L.	Eur. aust.	⊙ q. D.
Fontanesii Steud.	?	q. D.
fulva Lindl.	Eur. aust.	q. DF.
fuscescens W. et K.	Croatia	q. DF.
grandiflora Lam.	Eur. med.	q. D.
laciniata Lindl.	Hispania	q. F.
laevigata W. et K.	Croatia	⊙ q. DF.
lanata Ehrh.	Eur. or-aust.	⊙ D.
lutea L.	Eur. aust.	q. D.
media Roth	Eur. aust. occ.	q. D.
micrantha Roth	"	q. D.
minor L.	Hispania	q. DF.
nervosa Steud.	Caucasus	q. DF.
ochroleuca Jacq.	Eur. med.	q. D.
orientalis Lam.	Oriens	q. DF.
parviflora Jasq.	Eur. aust.	q. DF.
purpurascens Roth	"	⊙ q. D.

Digitalis				Diplazium Swt.	(<i>Polypodiaceae</i>)
<i>purpurea</i> L.	Eur.occ. aust. ② D.			<i>obtusum</i> Lk.	Brasilia ½ C.
<i>β. alba</i> —	γ. monstrosa.			<i>plantaginum</i> Swt.	Ind. occ. ½ C.
<i>sibirica</i> Mill.	Asia bor. ¼ D.			Diotis Desf.	(<i>Synanthereae</i>)
<i>Thapsi</i> L.	Hisp., Lusit. ② D.			<i>candidissima</i> Desf.	Eur. aust. occ. ½ F.
<i>tubiflora</i> Lindl.	?	¼ D.		Diplachne P. B.	(<i>Gramineae</i>)
(vide: <i>Isoplexis</i>).				<i>fascicularis</i> P. B.	Amer. bor. ② D.
Digitalia Scop.	(<i>Gramineae</i>)			Diplacus Nutt.	(<i>Scrophulariaceae</i>)
<i>aegyptiaca</i> W.	Eur. aus., Afr. ② D.			<i>aurantius</i> Don.	California ½ F.
<i>ciliaris</i> Pers.	Eur. aust. ② D.			<i>puniceus</i> Don.	½ F.
<i>erigona</i> Lk.	?	② D.		Diploaena R. Br.	(<i>Diosmaceae</i>)
<i>fimbriata</i> Lk.	Amer. trop. ② CD.			<i>Dampieri</i> Desf.	Nov. Holl. ½ T.
<i>horizontalis</i> W.	" " ② CD.			Diplopappus DeC.	(<i>Synanthereae</i>)
<i>humifusa</i> Pers.	Europa " ② D.			<i>fruticosus</i> Less.	Cap. b. sp. ½ T.
<i>mollissima</i> Schrad.	?	② CD.		<i>incanus</i> Lindl.	California ¼ FD.
<i>sanguinalis</i> Scop.	Europa ② D.			Diplophyllum Lehm.	(<i>Scrophulariaceae</i>)
<i>violascens</i> Lk.	Brasilia ② CD.			<i>crista galli</i> Otto	Caucasia ② D.
(vide: <i>Cynodon</i> — Reimaria).				Diplostephium Cass.	(<i>Synanthereae</i>)
Dikentra Borkh.	(<i>Fumariaceae</i>)			<i>amygdalinum</i> Cass.	Am. bor. ¼ D.
<i>cucullaria</i> DeC.	Amer. bor. ¼ D. J.			<i>umbellatum</i> DeC.	" " ¼ D.
Dillwynia Sm.	(<i>Papilionaceae</i>)			Diploxaxis DeC.	" " (<i>Cruciferae</i>)
<i>cinerascens</i> R. Br.	Nov. Holl. ½ T.			<i>catholica</i> DeC.	Eur. aust. ② D.
<i>ericaefolia</i> Sm.	" " ½ T.			<i>erucoides</i> DeC.	Eur. aust. ② D.
<i>glaberrima</i> Sm.	" " ½ T.			<i>muralis</i> DeC.	Europa ② D.
<i>rudis</i> Sieb.	" " ½ T.			<i>tenuifolia</i> DeC.	Eur. med. aus. ¼ D.
Dimorphothea Vaill.	(<i>Synanthereae</i>)			<i>viminea</i> DeC.	Gall., Ital. ② D.
<i>aurantiaca</i> DeC.	Cap. b. sp. ½ T.			Dipsacus Tourn.	(<i>Dipsacineae</i>)
<i>chrysanthemifolia</i> DeC.	" " ½ T.			<i>azureus</i> Schrenk	Soongaria ② DF.
<i>hybrida</i> DeC.	" " ② D.			<i>ferox</i> Loisl.	Eur. aust. ② D.
<i>pluvialis</i> Mönch	" " ② D.			<i>fullonum</i> Mill.	" " ② D.
Dineba DeC.	(<i>Gramineae</i>)			<i>Gmelini</i> M. B.	Tauria " ② D.
<i>aegyptiaca</i> DeC.	Aeg. Ar. Per. ② CD.			<i>laciniatus</i> L.	Eur. med. aus. ② D.
Dinema Lindl.	(<i>Orchideae</i>)			<i>pilosus</i> L.	Europa ② D.
<i>polybulbum</i> Lindl.	Ind. occ. ¼ C.			<i>sylvestris</i> Mill.	" " ② D.
Diodia L.	(<i>Rubiaceae</i>)			Diptera Borkh.	(<i>Saxifragaceae</i>)
<i>dasycephala</i> Ch. et S.	Brasil. aust. ¼ T.			<i>sarmentosa</i> Borkh.	China, Japon. ¼ T.
<i>virginica</i> L.	Am. bor. aust. ½ F.			Dipteracanthus N. E.	(<i>Acanthineae</i>)
Diosanthe K.	(<i>Sileneae</i>)			<i>ciliatus</i> N. E.	Ind. or. ½ C.
<i>Theophrasti</i> K. *)	Eur. aust. ¼ DF.			<i>oblongatus</i> N. E.	Am. bor. aust. ½ DF.
Dioscorea Plum.	(<i>Dioscoreaceae</i>)			<i>patulus</i> N. E.	Ind. or. ½ C.
<i>alata</i> L.	Ind. or. ¼ C.			<i>Schauerianus</i> N. E.	Am. aust. ½ C.
<i>bulbifera</i> L.	" " ½ C.			<i>strictus</i> N. E.	Am. bor. aust. ¼ DF.
<i>brasilensis</i> W.	Brasilia ½ C.			<i>viscidulus</i> N. E.	Brasilia ½ C.
<i>sativa</i> L.	Ind. or. ½ C.			Disandra L.	(<i>Scrophulariaceae</i>)
<i>septemloba</i> Thb.	Japonia ¼ T.			<i>prostrata</i> L.	Madeira ¼ T.
<i>villosa</i> L.	Amer. bor. ¼ D.			Dischisma Choix.	(<i>Selagineae</i>)
Diosma Berg.	(<i>Diosmaceae</i>)			<i>capitatum</i> Choix.	Cap. b. sp. ② CD.
<i>ambigua</i> B. et W.	Cap. b. sp. ½ T.			Disemma Lap.	(<i>Passifloraceae</i>)
<i>cupressina</i> Thb.	" " ½ T.			<i>adianthifolia</i> DeC.	Ins. Norfolk ½ T.
<i>ericoides</i> Thb.	" " ½ T.			<i>aurantiaca</i> Lab.	Nov. Caledon. ½ C.
<i>hirsuta</i> Thb.	" " ½ T.			<i>Herbertiana</i> DeC.	Nov. Holl. ½ C.
<i>linearis</i> Thb.	" " ½ T.			Disporum Salisb.	(<i>Veratrineae</i>)
<i>pinifolia</i> Fisch.	" " ½ T.			<i>fulvum</i> Salisb.	China ¼ F.
<i>succulenta</i> Berg.	" " ½ T.			Dizygandra Meisn.	(<i>Acanthineae</i>)
(vide: <i>Adenandra</i> — Agathosma — Barosma — Coleonema).				<i>ovata</i> Meisn.	Mexico ¼ C.
Diospyros L.	(<i>Ebenaceae</i>)			<i>strepens</i> Meisn.	Am. bor. aus. ¼ DF.
<i>Lotus</i> L.	Eur. au., Afr. ½ FD.			Dodartia Tourn.	(<i>Scrophulariaceae</i>)
<i>virginiana</i> L.	Am. bor. aust. ½ DF.			<i>orientalis</i> L.	Oriens ¼ D.
*) <i>Lychnis Fies Jovis</i> L.				Dodecatheon L.	(<i>Primulaceae</i>)
				<i>integrifolium</i> Mchx.	Am. bor. aust. ¼ DF.

Dodecatheon			Draba		
Meadia L.	Am. bor.-aust.	4 DF.	lutea Gil.	Eur. or., Asia	⊙ D.
Dodonaea L.	(<i>Sapindineae</i>)		muricella Whlbg.	Alpes	4 D. J.
attenuata Cungh.	Nov. Holl.	1 T.	memorosa L.	Eur. aust.-or.	⊙ D.
Burmänniana DeC.	Ind. or.	1 C.	ochroleuca Bge.	Altai	4 D. J.
dioica Roxb.	"	1 C.	repens M. B.	Caucasus	4 D. J.
pinnata Sm.	Nov. Holl.	1 T.	rupestris R. Br.	Scott. Nor.	4 D. J.
triquetra Andr.	"	1 T.	stellata Jacq.	Alpes	4 D. J.
viscosa L.	Amer. trop.	1 C.	tridentata DeC.	Caucasus	4 D. J.
Dolichos L.	(<i>Papilionaceae</i>)		(vide: Erophila — Koniga).		
abyssinicus Savi	Abyssinia	⊙ CD.	Dracaena Vand.	(<i>Asparagineae</i>)	
brasiliensis Savi	Brasilia	⊙ CD.	arborea Lk.	Africa trop.	1 C.
elegans H. Bonon.	?	⊙ CD.	Draco L.	Ind. or. Can.	1 CT.
glycinoides Kth.	Peruvia	4 C.	fragrans Ker	Guinea	1 C.
Hernandezii H. Par.	Mexico	⊙ C.	(vide: Cordyline).		
lignosus L.	Ind. or.	1 C.	Draccephalum Tourn.	(<i>Labiatae</i>)	
(vide: Lablab — Scytalis — Soja).			argunense Fisch.	Dahuria	4 DF.
Dolichos, vide: Ampelodesmos — Arundo.			austriacum L.	Eur. med.-or.	4 D.
Doodya R. Br.	(<i>Polypodiaceae</i>)		botryoides Stev.	Caucasia	4 D.
aspera R. Br.	Nov. Holl.	4 T.	fragile Turcz.	Dahuria	4 DF.
caudata R. Br.	"	4 T.	grandiflorum L.	Sibir. aust.	4 DF.
rupestris Sieb.	"	4 T.	imberbe Bge.	Sibir. altaica	4 DF.
Doronicum Tourn.	(<i>Synanthereae</i>)		nutans L.	Asia bor.	⊙ D.
austriacum Jacq.	Alpes	4 D. J.	pinnatum L.	"	4 DF.
caucasicum M. B.	Eu. au. Cauc.	4 D. J.	Ruyschianum L.	Eur. or., Asia	4 D.
Columnae Ten.	Alpes, Italia	4 D. J.	thymiflorum L.	"	⊙ D.
dentatum Lk.	?	4 D. J.	(vide: Cedronella — Lallelantia — Mol-		
macrophyllum Fisch.	Cauc., Pers.	4 D. J.	davica — Nepeta — Physostegia).		
Pardalianches L.	Subal. Alpes	4 D. J.	Dracontium, vide: Monstera.		
plantagineum L.	Eur. occ. aus.	4 D.	Dracunculus Tourn.	(<i>Arineae</i>)	
scorpioides W.	Alpes	4 D. J.	crinitus Schott	Balear. Sard.	4 FD.
(vide: Aronicum — Heterotheca).			vulgaris Schott	Eur. aust.	4 DF.
Dorstenia Plum.	(<i>Moriaceae</i>)		Dracopis Cass.	(<i>Synanthereae</i>)	
ceratosanthes Lodd.	Amer. trop.	4 C.	amplexicaulis Cass.	Mex. Am. bor.	⊙ D.
Contrayerva L.	"	4 C.	Drimia Jacq.	(<i>Liliaceae</i>)	
Dorycnium Tourn.	(<i>Papilionaceae</i>)		acuminata Lodd.	Cap. b. sp.	4 T.
argenteum DeC.	Aegyptus	1 T.	lanceaefolia Ker	"	4 T.
herbaceum Vill.	Eur. aust.	4 DF.	Dryandra R. Br.	(<i>Proteaceae</i>)	
incanum Ser.	"	1 F.	armata R. Br.	Nov. Holl.	1 T.
intermedium Led.	Ruth. au. Cau.	4 DF.	Dryas L.	(<i>Dryadeae</i>)	
latifolium W.	Taur., Cauc.	1 FD.	octopetala L.	Alpes	4 D. J.
suffruticosum Vill.	Gall., Hisp.	1 FD.	Drymaria W.	(<i>Paronychiaceae</i>)	
(vide: Bonjeania).			cordata W.	Amer. trop.	⊙ CD.
Draba Dillen.	(<i>Cruciferae</i>)		cubensis Regel	Cuba	⊙ CD.
aizoides L.	Eur. med.-au.	4 D. J.	divaricata Kth.	Peruvia	⊙ CD.
Aizoon Whlbg.	Carpati	4 D. J.	gracilis Ch. et S.	Mexico	⊙ CD.
algida Adams	Asia bor.	4 D. J.	villosa Ch. et S.	"	⊙ CD.
alpina L.	Alpes, Altai	4 D. J.	Drymonia Mart.	(<i>Gesneraceae</i>)	
arabisans Mchx.	Amer. bor.	⊙ D. J.	serrulata Mart.	Ind. occ.	1 C.
aurea Vahl.	Grönlandia	⊙ D. J.	Drypis Mich.	(<i>Sileneae</i>)	
confusa Ehrh.	Alpes	⊙ D. J.	spinosa L.	Eur. aust.	4 DF.
contorta Ehrh.	Alpes bor.	⊙ D. J.	Duranta L.	(<i>Verbenaceae</i>)	
cuspidata M. B.	Tauria	4 D. J.	Ellisia L.	Ind. occ.	1 C.
dasycarpa C. A. Mey.	Sibir. aust.	4 D. J.	microphylla Desf.	"	1 C.
eriopoda Turcz.	"	4 D. J.	Plumieri L.	Amer. trop.	1 C.
fladnitzensis Wulf.	Alpes	4 D. J.	Duvalia Haw.	(<i>Asclepiadeae</i>)	
frigida Saut.	"	4 D. J.	caespitosa Haw.	Afr. aust.	1 CT.
Gmelini Adams	Sibiria	4 D. J.	hirtella Haw.	"	1 CT.
incana L.	Alpes	⊙ D. J.	Duvaqua Kth.	(<i>Anacardiaceae</i>)	
japonica Whlbg.	Eur. arct.	4 D. J.	dependens DeC.	Chili	1 T.

Duvaua			
latifolia Gill.	Chili	† F.	
Dyckia Schult. f.	(<i>Bromeliaceae</i>)		
rariflora Schult. f.	Brasilia	‡ C.	
remotiflora O. et D.	"	‡ C.	
Dyschoriste N. E.	(<i>Acanthineae</i>)		
litoralis N. E.	Ind. or.	† C.	
Dysodia Cav.	(<i>Synantheraeae</i>)		
chrysanthemoides Lag.	Am. med. b.	⊙ CD.	
porophylla Lag.	Mexico	⊙ CD.	
Dysosmia DeC.	(<i>Passifloraceae</i>)		
foetida Jacq.	Amer. trop.	⊙ † C.	
Ecbalium Rich.	(<i>Cucurbitaceae</i>)		
officinatum Rich.	Eur. aust.	⊙ ‡ DF.	
Echeandia Ort.	(<i>Liliaceae</i>)		
albiflora K. (non Kth.)	Mexico	‡ T.	
terniflora Ort.	"	‡ T.	
Echenais Cass.	(<i>Synantheraeae</i>)		
carlinoides Cass.	Caucasia	⊙ DF.	
Echeveria DeC.	(<i>Crassulaceae</i>)		
bracteolata L. K. O.	Columbia	† T.	
coccinea DeC.	Mexico	† T.	
gibbiflora DeC.	"	† T.	
grandiflora Haw.	"	† T.	
racemosa Ch. et S.	"	† T.	
Echinacea Mönch.	(<i>Synantheraeae</i>)		
purpurea Mönch.	Am. bor.-au.	† DF.	
β. speciosa — γ. sibirica.			
serotina DeC.	Am. bor.-au.	‡ D. F.	
Echinaria Desf.	(<i>Gramineae</i>)		
capitata Desf.	Eur. aust.	⊙ D.	
Echinocactus Lk. et O.	(<i>Cactineae</i>)		
acuatus L. et O.	La Plata	† C.	
corynodes Otto	Amer. trop.	† C.	
Courantii Lem.	Mexico	† C.	
crispatus DeC.	"	† C.	
erinaceus Lem.	La Plata	† C.	
hypocrateriformis O. et D.	"	† C.	
Linkii Lem.	Mexico	† C.	
Ottonis Lem.	"	† C.	
phyllacanthus Mart.	"	† C.	
robustus Otto	"	† C.	
Scopa Lk. et O.	Brasilia	† C.	
Sellowianus Lk. et O.	La Plata	† C.	
tenuispinis Lk. et O.	Brasilia	† C.	
tortuosus Lk. et O.	"	† C.	
Echinochloa P. B.	(<i>Gramineae</i>)		
colona Lk.	Ind. or. Chin.	⊙ CD.	
Crus galli P. B.	Europa	⊙ D.	
echinata Lk.	Eur. aust.	⊙ D.	
frumentacea Lk.	Ind. or.	‡ C.	
zonalis K.	Sicilia	⊙ CD.	
Echinophora Tourn.	(<i>Umbelliferae</i>)		
spinosa L.	Eur. aust.	‡ FD.	
tenuifolia L.	"	‡ FD.	
Echinops L.	(<i>Synantheraeae</i>)		
banaticus Rochl.	Eur. aust.-or.	‡ D.	
dahuricus Fisch.	Sibir. aust.	‡ D.	
exaltatus Schrad.	?	⊙ D.	
paniculatus Jasq. f.	Eur. or.-aust.	⊙ D.	
Echinops			
persicus Stev.	Cauc. Pers.	⊙ D.	
platylepis Trautv.	?	‡ D.	
Ritro L.	Eur. aust.	‡ D.	
β. polycephalus.			
ruthenicus M. B.	Ruth. aust.	‡ D.	
sphaerocephalus L.	Eur. med. aust.	⊙ D.	
Tournefortii Led.	Caucasia	‡ D. F.	
Echinopsilon M. T.	(<i>Chenopodiaceae</i>)		
eriphorum M. T.	Hispania	⊙ D.	
hyssopifolium M. T.	Eur. aust.	⊙ D.	
sedoides M. T.	"	⊙ D.	
sericeum M. T.	Cap. b. sp.	† F.	
Echinopsis Zucc.	(<i>Cactineae</i>)		
Eyriesii Zucc.	La Plata	† C.	
β. glauca.			
multiplex Zucc.	Brasilia	† C.	
oxygona Zucc.	"	† C.	
Schellbasi Zucc.	"	† C.	
turbinata Zucc.	?	† C.	
Zuccarinii Pfeif.	?	† C.	
Echinopspermum Sw.	(<i>Borragineae</i>)		
barbatum Lehm.	Ruth. aust.	⊙ D.	
consanguineum F. et M.	Sibir. aust.	⊙ D.	
cristatum Bge.	"	⊙ D.	
deflexum Lehm.	Europa	⊙ D.	
heteracanthum Led.	Asia bor.	⊙ D.	
Lappula Lehm.	Europa	⊙ D.	
macranthum Led.	Sibir. altaica	⊙ D.	
marginatum Led.	Sibiria	⊙ D.	
patulum Lehm.	"	⊙ D.	
Redowskii Lehm.	Ruthenia	⊙ D.	
semiglabrum Led.	Sibir. aust.	⊙ D.	
squarrosus Rchb.	Europa	⊙ D.	
strictum Led.	Sib. aust.	⊙ D.	
virginicum Lehm.	Am. bor.-aus.	⊙ D. F.	
(vide: Krynitzkia).			
Echites , vide: Aganosma — Beaumontia —			
Strophanthus.			
Echium Tourn.	(<i>Borragineae</i>)		
amoenum F. et M.	Armen., Pers.	‡ D. F.	
brachyanthum Horn.	Madera	† T.	
candicans L. fil.	"	† T.	
collinum Fieb.	Europa	⊙ D.	
creticum L.	Graecia	⊙ D.	
cynoglossoides Poir.	Canariae	† T.	
fastuosum Jacq. f.	"	† T.	
foliosum Lehm.	"	† T.	
giganteum L. fil.	Teneriffa	† T.	
italicum L.	Eur. aust.	⊙ D.	
macranthum R. et S.	Afr. bor.	⊙ D.	
orientalae L.	Armenia	⊙ D.	
pannonicum Wierzb.	Hungaria	⊙ D.	
parviflorum Roth.	Eur. aust.	⊙ D.	
plantagineum L.	"	⊙ D.	
pustulatum S. et Sm.	"	⊙ D. F.	
recurvum Fieb.	Europa	⊙ D.	
rubrum L.	Eur. aust.	⊙ D.	
simplex DeC.	Teneriffa	† T.	
strictum L. fil.	"	† T.	

Echium					
<i>tenu Roth</i>	Afr. bor.	⊙ D.			
<i>tuberculatum H. et Lk.</i>	Lusitania	⊙ DF.			
<i>violaceum L.</i>	Eur. aust.	⊙ D.			
<i>virescens DeC.</i>	Teneriffa	† T.			
<i>vulgare L.</i>	Europa	⊙ D.			
<i>Wierzbickii Hab.</i>	Eur. or.	⊙ D.			
Eclipta L.	(<i>Synanthereae</i>)				
<i>erecta L.</i>	Inter trop.	⊙ CD.			
<i>hirsuta Bartl.</i>	?	⊙ CD.			
<i>longifolia Schrad.</i>	Ind. occ.	⊙ CD.			
<i>patula Schrad.</i>	?	⊙ CD.			
<i>procumbens Mchx.</i>	Am. bor. aus.	⊙ CD.			
Eclupes Gaertn.	(<i>Synanthereae</i>)				
<i>subpungens Less.</i>	Cap. b. sp.	† T.			
<i>trinervis Less.</i>	"	† T.			
Edwardsia Salisb.	(<i>Papilionaceae</i>)				
<i>grandiflora Sal.</i>	Nov. Zeel.	† F.			
<i>intermedia Tsch</i>	"	† F.			
<i>microphylla Sal.</i>	"	† F.			
Ehretia L.	(<i>Ehretiaceae</i>)				
<i>tinifolia L.</i>	Ind. occ.	† 5C.			
(vide: <i>Beurrieria</i>).					
Ehrharta Thb.	(<i>Gramineae</i>)				
<i>panicea Sm.</i>	Cap. b. sp.	‡ F.			
Eichhornia Kth.	(<i>Pontederaceae</i>)				
<i>speciosa Kth.</i>	Brasilia	‡ CV.			
Elaeagnus Tourn.	(<i>Elaeagnaceae</i>)				
<i>angustifolia L.</i>	Eur. aust.-or.	5 † D.			
" <i>β. orientalis L.</i> — <i>γ. soongarica</i>					
Fisch. — <i>δ. tiliensis Fisch.</i> — <i>ε. flava</i> —					
<i>ζ. fusca.</i>					
<i>commutata Bhd.</i>	?	† D.			
<i>nepalensis H. Angl.</i>	Nepalia	† DF.			
Elaeocarpus L.	(<i>Elaeocarpaceae</i>)				
<i>serratus L.</i>	Ind. or.	5C.			
Elaeodendron Jacq.	(<i>Celastrineae</i>)				
<i>australe Vent.</i>	Nov. Holl.	† T.			
Elaeoselinum Koch	(<i>Umbelliferae</i>)				
<i>meoides Koch</i>	Sicil. Afr. bor.	‡ F.			
<i>thapsoides DeC.</i>	Mexico	‡ T.			
Elatine Dill. (non L.)	(<i>Scrophulariaceae</i>)				
<i>caulirhizans K.</i>	Gall. aust. ?	‡ F.			
<i>cirrhusa K.</i>	Eur. aust.	⊙ D.			
<i>hastata Mönch.</i>	Europa	⊙ D.			
<i>spuria K.</i>	"	⊙ D.			
Eleocharis R. Br.	(<i>Cyperineae</i>)				
<i>palustris R. Br.</i>	Europa	‡ D. ∇			
Elephantopus L.	(<i>Synanthereae</i>)				
<i>carolinianus W.</i>	Am. bor. aust.	‡ FD.			
<i>mollis Kth.</i>	Amer. trop.	‡ C.			
<i>nudicaulis Poir.</i>	Am. bor. aust.	‡ FD.			
<i>scaber L.</i>	Ind. or.	‡ C.			
Eleusine Gaertn.	(<i>Gramineae</i>)				
<i>coracana Gaertn.</i>	Ind. or.	⊙ CD.			
<i>distans Lk.</i>	?	⊙ CD.			
<i>floccifolia Spr.</i>	Arabia	‡ T.			
<i>indica Gaertn.</i>	Ind. or.	‡ D.			
<i>oligostachya Lk.</i>	?	⊙ D.			
<i>Tocusso Fres.</i>	Abyssinia	⊙ CD.			
Eleusine					
(vide: <i>Dactyloctenium</i> — <i>Leptochloa</i>).					
Elisanthe Endl.	(<i>Sileneae</i>)				
<i>noctiflora K.</i>	Europa	⊙ D.			
<i>Zawadskii K.</i>	Carpati	‡ D. J.			
Ellipsaria K.	(<i>Cruciferae</i>)				
<i>chalepensis K.</i>	Oriens	‡ F.			
Ellisia L.	(<i>Hydrophyllineae</i>)				
<i>Nyctelaea L.</i>	Am. bor. aust.	⊙ D.			
Elodea Adans.	(<i>Hypericineae</i>)				
<i>virginica Nutt.</i>	Amer. bor.	† DF.			
Elsholzia W.	(<i>Labiatae</i>)				
<i>cristata W.</i>	Sibir. aust. Or.	⊙ D.			
Elvira Cass.	(<i>Synanthereae</i>)				
<i>biflora DeC.</i>	Ind. occ.	⊙ C.			
Elymus L.	(<i>Gramineae</i>)				
<i>arenarius L.</i>	Eur., Sibiria	‡ D.			
<i>canadensis L.</i>	Amer. bor.	‡ D.			
<i>Caput Medusae L.</i>	Eur. aust.	⊙ D.			
<i>crinitus Schreb.</i>	"	⊙ D.			
<i>dahuricus Turcz.</i>	Sibir. aust.	‡ D.			
<i>dasytachys Trin.</i>	"	‡ D.			
<i>europaeus L.</i>	Europa	‡ D.			
<i>geniculatus Curt.</i>	Angl., Holl.	‡ D.			
<i>giganteus Vahl</i>	Asia bor.	‡ D.			
<i>hordeiformis Desf.</i>	Amer. bor.	‡ D.			
<i>juncus Fisch.</i>	Asia bor.	‡ D.			
<i>lativalvis H. Br.</i>	Amer. bor.	‡ D.			
<i>philadelphicus L.</i>	"	‡ D.			
<i>propinquus Fres.</i>	"	‡ D.			
<i>sabulosus M. B.</i>	Asia bor.	‡ D.			
<i>sibiricus L.</i>	"	‡ D.			
<i>striatus W.</i>	Amer. bor.	‡ D.			
<i>tener. L. fil.</i>	Asia bor.	‡ D.			
" <i>β. ramosus Desf.</i>					
<i>villosus Mühlbg.</i>	Amer. bor.	‡ D.			
<i>virginicus L.</i>	"	‡ D.			
(vide: <i>Asprella</i> — <i>Hordeum</i>).					
Elyna Schrad.	(<i>Cyperineae</i>)				
<i>spicata Schrad.</i>	Alpes	‡ D. J.			
Emerus Tourn.	(<i>Papilionaceae</i>)				
<i>Cesalpini K.</i>	Eur. med. aust.	† D.			
Emex Neck.	(<i>Polygonaceae</i>)				
<i>spinosus Campd.</i>	Eur. aust.	⊙ D.			
Emilia Cass.	(<i>Synanthereae</i>)				
<i>sagittata DeC.</i>	Ind. or.	⊙ CD.			
<i>sonchifolia DeC.</i>	"	⊙ CD.			
Empetrum Tourn.	(<i>Empetrineae</i>)				
<i>nigrum L.</i>	Eur. Asiabor.	† D. J.			
Enarthrocarpus Lab.	(<i>Cruciferae</i>)				
<i>lyratus DeC.</i>	Aegyptus	⊙ D.			
Enckea Kth.	(<i>Piperineae</i>)				
<i>plantaginea Kth.</i>	Ind. occ.	† C.			
Endoptera DeC.	(<i>Synanthereae</i>)				
<i>aspera DeC.</i>	Eur. aust.	⊙ D.			
<i>Dioscoridis DeC.</i>	"	⊙ D.			
Enslenia Nutt.	(<i>Asclepiadeae</i>)				
<i>albida Nutt.</i>	Am. bor. aust.	‡ DF.			
Entelea R. Br.	(<i>Tiliaceae</i>)				
<i>arborescens R. Br.</i>	Nov. Holl.	5T.			

Eremogone			
cucubaloides K.	Armenia	4 FD.	
dahurica Fzl.	Sibir. aust.	4 DF.	
dianthoides K.	Armenia	4 DF.	
graminea C. A. Mey.	"	4 DF.	
graminifolia Fzl.	Ruth.au.Cauc.	4 D.	
Holostea K.	Caucasia	4 DF.	
junceae Fzl.	Sibir. aust.	4 D.	
longifolia Fzl.	Ruth. aust.	4 D.	
nardifolia Fzl.	Sibir. alt.	4 D.	
otitoides Fzl.	Asia bor.	4 D.	
pungens Fzl.	Hispania	4 F.	
rigida Fzl.	Ruth. aust.	4 D.	
stenophylla K.	Sibiria	4 D.	
Eremosparton F. et M.	(Papilionaceae)		
aphyllum F. et M.	Casp. Soong.	4 FD.	
Eremostachys Bge.	(Labiateae)		
laciniata Bge.	Cauc.Armen.	4 DF.	
molocelloides Bge.	Sibir. alt.	4 DF.	
Eremurus M. B.	(Liliaceae)		
caucasicus Stev.	Caucasia	4 DF.	
spectabilis M. B.	Ruth. aust.	4 DF.	
Eresda Spach	(Resedaceae)		
alba Spach	Eur. aust.	2 FD.	
fruticulosa K.	" "	4 FD.	
undata K.	" "	2 FD.	
Eria Lindl.	(Orchideae)		
stellata Lindl.	Nepalia	4 TC.	
Erianthus Mchx.	(Gramineae)		
Ravennae P. B.	Eur. aust.	4 F.	
saccharoides Mchx.	Am. hor-aust.	4 F.	
Erica Tourn.	(Ericaceae)		
abietina L.	Cap. b. sp.	4 T.	
" β . major.			
absinthoides L.	" "	4 T.	
Actaea Bedf.	" "	4 T.	
acuminata Andr.	Hybr.	4 T.	
" β . longifolia.			
aggregata Wendl.	Cap. b. sp.	4 T.	
Aitonia Andr.	" "	4 T.	
albena L.	" "	4 T.	
ambigua Wendl.	Hybr.	4 T.	
" β . alba	γ . hybrida	—	
δ . superba.			
arborea L.	Eur. aust.	4 FD.	
arbuscula Lodd.	Cap. b. sp.	4 F.	
ardens Andr.	" "	4 T.	
assurgens Lk.	" "	4 T.	
australis L.	Eur. aust.	4 FD.	
baccans L.	Cap. b. sp.	4 T.	
bicolor Thb.	" "	4 T.	
barbata Andr.	" "	4 T.	
Bergiana L.	" "	4 T.	
blanda Andr.	" "	4 T.	
Blandfordiana Andr.	" "	4 T.	
Bonplandiana Sims	" "	4 T.	
Bowieana Lodd.	" "	4 T.	
brachycrossa Tsch.	" "	4 T.	
bracteata Thb.	" "	4 T.	
bruniades Thb.	" "	4 T.	
Erica			
buccinaeformis Sol.	Cap. b. sp.	4 T.	
caesia Sol.	" "	4 T.	
callosa Wendl.	" "	4 T.	
calycina L.	" "	4 T.	
" β . minor.			
campanulata Andr.	" "	4 T.	
canaliculata Andr.	" "	4 T.	
canescens Wend.	" "	4 T.	
capitata L.	" "	4 T.	
carnea Scop.	Eur-med.	4 D.	
" β . purpurea γ . alba.			
cerinthoides L.	Cap. b. sp.	4 T.	
" β . magna — γ . superba.			
cernua L.	" "	4 T.	
Chamae-Tetralix Tsch.	" "	4 T.	
ciliaris L.	Angl., Lusit.	4 FD.	
cinerea L.	Eur. occ-au.	4 FD.	
" β . alba — γ . atropurpurea.			
coccinea Berg.	Cap. b. sp.	4 T.	
colorans Andr.	" "	4 T.	
comosa L.	" "	4 T.	
" β . alba.			
concinna Sol.	" "	4 T.	
conferta Andr.	" "	4 T.	
confertifolia Wendl.	" "	4 T.	
congesta Wendl.	" "	4 T.	
corifolia L.	" "	4 T.	
costata Andr.	" "	4 T.	
cruenta Sol.	" "	4 T.	
cubica L.	" "	4 T.	
" β . major.			
cucullata Tsch.	" "	4 T.	
curvirostris Salisb.	" "	4 T.	
daphneflora Salisb.	" "	4 T.	
decipiens Spr. f.	" "	4 T.	
decumbens H. Angl.	" "	4 T.	
delecta Tsch.	" "	4 T.	
densa Andr.	" "	4 T.	
dichrus Spr.	" "	4 T.	
discolor Andr.	" "	4 T.	
Donniana Lee	" "	4 T.	
droseraefolia Tsch.	" "	4 T.	
dumosa Andr.	" "	4 T.	
empetrifolia L.	" "	4 T.	
empetroides Andr.	" "	4 T.	
ephemera Tsch.	" "	4 T.	
Ewerana Dry.	" "	4 T.	
excelsa Tsch.	" "	4 T.	
exurgens Andr.	" "	4 T.	
filamentosa Andr.	" "	4 T.	
fimbriata Andr.	" "	4 T.	
flaccida Lk.	" "	4 T.	
flexuosa Andr.	" "	4 T.	
" β . alba.			
flocciflora Tsch.	" "	4 T.	
floribunda Wendl.	" "	4 T.	
formosa Thb.	" "	4 T.	
gilva Wendl.	" "	4 T.	
globosa Andr.	" "	4 T.	

Erica

gracilis Andr.	Cap. b. sp.	h T.
grandiflora L. fil.	" "	h T.
Hartnelli Roll.	" "	h T.
hirtiflora Curt.	" "	h T.
hispidula L. fil.	" "	h T.
Humeana Lodd.	" "	h T.
hyacinthoides Andr.	" "	h T.
ignescens Andr.	" "	h T.
imbricata L.	" "	h T.
incana Wendl.	" "	h T.
incarnata Thb.	" "	h T.
insulsa Bedf.	" "	h T.
intertexta Lodd.	" "	h T.
lachneaeifolia Salisb.	" "	h T.
laevis Andr.	" "	h T.
Lambertiana Andr.	" "	h T.
lanata Wendl.	" "	h T.
lateralis W.	" "	h T.
Lawsoniana Andr.	" "	h T.
laxa Andr.	" "	h T.
leucopelta Tsch.	" "	h T.
leucostoma Tsch.	" "	h T.
linearis Hort.	" "	h T.
Linneana Dry.	" "	h T.
longiflora Salisb.	" "	h T.
Mackai Hook.	Hibernia	h FD.
mammosa L.	Cap. b. sp.	h T.
" β . verticillata Andr. — γ . purpurea —		
δ . minor.		
margaritacea Sol.	" "	h T.
Massoni L.	" "	h T.
mediterranea L.	Hiber., Lus.	h FD.
melanthera L.	Cap. b. sp.	h T.
melastoma Andr.	" "	h T.
mirabilis Andr.	" "	h T.
mollissima Lodd.	" "	h T.
Monsonia L. fil.	" "	h T.
monadelphæ Andr.	" "	h T.
mucosa Andr.	" "	h T.
mucronata Andr.	" "	h T.
multiflora Andr.	Eur. aust.	h FD.
" β . alba.		
multumbellifera Tsch.	Cap. b. sp.	h T.
multumbraculata Tsch.	" "	h T.
Muscari Andr.	" "	h T.
nigrita L.	" "	h T.
nivea Lodd.	" "	h T.
nudiflora L.	" "	h T.
nutans Wendl.	" "	h T.
obesa Tsch.	" "	h T.
odorata Andr.	" "	h T.
Ollula Andr.	" "	h T.
oppositifolia Andr.	" "	h T.
pallida Wendl.	" "	h T.
paniculata L.	" "	h T.
parviflora L.	" "	h T.
patens Andr.	" "	h T.
pellucida Sol.	" "	h T.
peltata Andr.	" "	h T.

Erica

persoluta L.	Cap. b. sp.	h T.
" β . rubra.		
petiolata Thb.	" "	h T.
Petiverii W.	" "	h T.
physodes L.	" "	h T.
picta Bedf.	" "	h T.
Plukenetii L.	" "	h T.
plumosa Andr.	" "	h T.
polytrichifolia Salisb.	" "	h T.
praecox Lodd.	" "	h T.
princeps Andr.	" "	h T.
procera Wendl.	" "	h T.
pubescens L.	" "	h T.
" β . ovalaeiflora.		
pulchella Andr.	" "	h T.
purpurascens L.	" "	h T.
pygmaea Andr.	" "	h T.
pyramidalis Sol.	" "	h T.
pyramidiformis Wendl.	" "	h T.
pyrolaeifolia Salisb.	" "	h T.
quadraeflora Salisb.	" "	h T.
radiata Andr.	" "	h T.
ramentacea L.	" "	h T.
recurvata Andr.	" "	h T.
reflexa Lk.	" "	h T.
retorta L. fil.	" "	h T.
rosea Andr.	" "	h T.
rubens Andr.	" "	h T.
rubrocalycina Andr.	" "	h T.
saturejaefolia Tsch.	" "	h T.
scabriuscula Lodd.	" "	h T.
scoparia L.	Eur. aust.	h FD.
" β . viridipurpurea.		
Sebana Dry.	Cap. b. sp.	h T.
" β . fusca — γ . coccinea.		
serpyllifolia Andr.	Cap. b. sp.	h T.
Shannoniana Andr.	" "	h T.
socciflora Salisb.	" "	h T.
sordida Andr.	" "	h T.
Sparmanni L.	" "	h T.
sparsa Lodd.	" "	h T.
speciosa Andr.	" "	h T.
spicata Thb.	" "	h T.
spumosa L.	" "	h T.
spuria Andr.	" "	h T.
stricta Don.	" "	h T.
strigosa Sol.	" "	h T.
" β . ramulosa Viv.		
taxifolia Ait.	" "	h T.
tenella Andr.	" "	h T.
tenuiflora Andr.	" "	h T.
" β . carnea — γ . Cliffortiana.		
tenuifolia L.	Cap. b. sp.	h T.
tenuissima Wendl.	" "	h T.
teretiuscula Wendl.	" "	h T.
tetragona Thb.	" "	h T.
Tetralix L.	Europa	h D.
thalictriflora Lodd.	Cap. b. sp.	h C.
Thunbergii L. fil.	" "	h T.

Erica

tortuosa Lodd.	Cap. b. sp.	† T.
translucens Wendl.	" "	† T.
transparens Andr.	" "	† T.
triceps Lk.	" "	† T.
tricolor Nois.	" "	† T.
triflora L.	" "	† T.
trossula Lodd.	" "	† T.
tubiflora W.	" "	† T.
" β. purpurea.	" "	† T.
tubiuscula Lodd.	" "	† T.
turrigera Salisb.	" "	† T.
umbellata L.	" "	† T.
undulata Lodd.	" "	† T.
urceolaris Berg.	" "	† T.
vagans L.	Eur. aust.	† FD.
ventricosa L.	Cap. b. sp.	† D.
" β. coccinea — γ. hirsuta —		
" δ. nana — ε. praegnans.		
venusta Bedf.	Cap. b. sp.	† T.
Vernix Andr.	" "	† T.
versicolor Andr.	" "	† T.
verticillata Forsk.	Eur. aust.	† F.
vestita Thb.	Cap. b. sp.	† T.
" β. elegans — γ. fulgens.		
virescens Lk.	Cap. b. sp.	† T.
virgata Thb.	" "	† T.
viridiflora Andr.	" "	† T.
viscaria Thb.	" "	† T.
Willmoreana Knowl.	" "	† T.
(vide: Daboecia — Eremia — Penta-		
pera).		
Erigeron L.	(Synanthereae)	
acris L.	Europa	⊙ D.
alpinus L.	Alpes	‡ D. ‡
angulosus Gaud.	" "	‡ D. ‡
armeriaefolius Turcz.	Sibir. aust.	‡ D. F.
asperulus F. et M.	Chili	‡ T.
bellidifolius W.	Amer. bor.	‡ D.
bonariensis L.	Am. austr.	⊙ CD.
canadensis L.	Am. bor. Eur.	⊙ D.
caucasicus Stev.	Caucasus	‡ D. ‡
divaricatus Mchx.	Amer. bor.	⊙ D.
elongatus Led.	Sibir. aust.	‡ D.
glabratus Hoppe	Alpes	‡ D. ‡
grandiflorus Hoppe	" "	‡ D. ‡
podolicus Bess.	Eur. or.	⊙ D.
purpureus Ait.	Amer. bor.	‡ D.
serotinus Weihe	Eur. med.	⊙ D.
spinulosus H. et A.	Chili	⊙ FD.
uniflorus L.	Alpes	‡ D. ‡
Villarsii Bell.	" "	‡ D. ‡
(vide: Conyza — Inula — Jasonia —		
Polyactidium — Phalaecoloma).		
Erinus L.	(Scrophulariaceae)	
alpinus L.	Helv. Pyren.	‡ D. ‡
" β. hirsutus.		
Eriobotrya Lindl.	(Pomaceae)	
japonica Lindl.	China, Japon.	† F.
Eriocephalus L.	(Synanthereae)	

Eriocephalus

sericeus Gaudich.	Cap. b. sp.	† T.
Eriodendron DeC.	(Bombacineae)	
anfractuosum DeC.	India or.	5 C.
Eriophorum Tourn.	(Cyperineae)	
alpinum L.	Alpes Sudet.	‡ D. ‡
angustifolium Roth.	Europa	‡ D. ‡
vaginatum L.	" "	‡ D. ‡
Eriostemon Sm.	(Diosmaceae)	
salicifolius Sm.	Nov. Holl.	† T.
Eriosynaphe DeC.	(Umbelliferae)	
tortuosa F. et M.	Oriens	‡ FD.
Erobathos Spach.	(Ranunculineae)	
coarctatum Spach.	Oriens	⊙ D.
damascenum Spach.	" "	⊙ D.
Erodium L'Her.	(Geraniineae)	
alpinum L'Her.	Graec., Italia	‡ F.
arabicum Decais.	Arabia	⊙ D.
Botrys Bert.	Eur. aust.	⊙ D.
chium W.	Neap., Graec.	⊙ D.
ciconium W.	Eur. aust.	⊙ D.
cicutarium Sm.	Europa	⊙ D.
" β. pimpinellaefolium Cav.		
gruinum W.	Hispan., Afr.	⊙ D.
Gussoni Ten.	Neapolis	‡ F.
hymenodes L'Her.	Afr. bor.	‡ F.
Jacquinianum F. et M.	?	⊙ D.
incarnatum L'Her.	Cap. b. sp.	‡ T.
laciniatum Cav.	Lusit., Afr.	⊙ D.
malachoides W.	Eur. aust.	⊙ D.
moschatum W.	" "	⊙ D.
Reichardi DeC.	Balearae	‡ F.
romanum W.	Eur. aust.	‡ F.
sebaceum DeC.	Gall. aust.	⊙ D.
serotinum Stev.	Ruth. aust.	‡ D.
stellatum DeC.	Gall. aust.	⊙ D.
verbenaefolium DeC.	" "	⊙ D.
Erophila DeC.	(Cruciferae)	
minima C. A. Mey.	Caucasia	⊙ D.
vulgaris DeC.	Europa	⊙ D.
Erpetion DeC.	(Violaceae)	
reniforme Swt.	Nov. Holl.	‡ T.
Eruca Tourn.	(Cruciferae)	
sativa Lam.	Eur. aust.	⊙ D.
turgida Vis.	" "	⊙ D.
Erucaria Gaertn.	(Cruciferae)	
aleppica Gaertn.	Graec., Oriens	⊙ D.
Erucastrum DeC.	(Cruciferae)	
arabicum F. et M.	Arabia	⊙ D.
incanum Koch.	Eur. aust.	⊙ FD.
obtusangulum Rehb.	Eur. occ.	⊙ D.
Pollichii Sch. et Sp.	" "	⊙ D.
Ervum Tourn.	(Papilionaceae)	
agrigenitum Guss.	Sicilia	⊙ D.
Ervilia L.	Eur. aust.	⊙ D.
gracile DeC.	" "	⊙ D.
hirsutum L.	Europa	⊙ D.
Loiseleurii M. B.	Ruth. aust.	⊙ D.
monanthos L.	Eur. aust.	⊙ D.
pubescens DeC.	" "	⊙ D.

Ervum

sardoum Mor. Sardinia ♂ D.
tetraspermum L. Europa ♂ D.
(vide: Lens).

Eryngium Tourn.

(Umbelliferae)
alpinum L. Alpes 2 D.
amethystinum L. Eur.aust-or. 2 D.
aquaticum L. Am.bor-aus. 2 FD.
Bourgati Gouan Pyrenaei 2 DF.
bromeliaefolium Lar. Mexico 2 T.
campestre L. Europa 2 D.
comosum Lar. Mexico 2 T.
corniculatum Lam. Hisp., Lusit. 2 FD.
creticum L. Dalm.Graec. 2 FD.
dichotomum Desf. Eur.aust.Or. 2 DF.
dilatatum Lam. Eur.aust. 2 D.
ebracteatum Lam. Brasil. aust. 2 T.
falcatum Lar. Syria 2 F.
foetidum L. Am.bor-aust. 2 F.
giganteum L. Cauc.Armen. 2 DF.
maritimum L. Europa 2 D.
multifidum S. et Sm. Sicil.Graec. 2 FD.
paniculatum Lar. Chili 2 T.
planum L. Eur.or. 2 D.
pusillum L. Eur.aus.occ. 2 FD.
Spina alba Vill. Gallia 2 D.
tripartitum Desf. ? 2 D.

Erysimum L.

(Cruciferae)
altaicum C. A. Mey. Sib. austr. 2 DF.
Andrzejowskianum Bes. Taur., Cauc. 2 D.
asperum DeC. Amer. bor. 2 D.
aureum MB. Cauc.Armen. 2 D.
carnolicum Doll. Styria, Carn. 2 D.
cheiranthoides L. Europa 2 D.
collinum Andr. Ruth. aust. 2 D.
crassipes F. et M. Caucasia 2 D.
crepidifolium DeC. Eur.med. 2 D.
cuspidatum DeC. Taur., Cauc. 2 D.
diffusum Ehrh. Eur.med. 2 D.
dubium DeC. ? 2 D.
exaltatum Andr. Eur.or. 2 D.
Geyeri Rchb. Amer. bor. 2 D.
helveticum DeC. Alpes 2 D. A.
hieracifolium L. Europa 2 D.
lanceolatum R. Br. Eur.med-aus. 2 D.
leptophyllum Andr. Cauc.Armen. 2 D.
longisiliquum Schlei. Helvetia 2 D.
Marschalianum Andr. Ruth. aust. 2 D.
ochroleucum DeC. Alp. occ. 2 D. A.
odoratum Ehrh. Eur.med. 2 D.
repandum L. Europa 2 D.
rhaeticum DeC. Alpes 2 D. A.
Schultesii Schrad. ? 2 D.
squarrosus Andr. Eur.aust. 2 D.
versicolor Andr. Cauc., Pers. 2 D.
virgatum Roth. Eur.med. 2 D.
(vide: Alliaria — Chamaeplium — Con-
ringia — Syrenia).
Erythraea Renealm. (Gentianaceae)
Centaureum Pers. Europa 2 D.

Erythraea

conferta Pers. Angl., Lusit. 2 F.
ramosissima Pers. Europa ♂ D.
Erythrina L. (Papilionaceae)
caffra Thb. Afr. aust. 5 T.
Corallodendron L. Ind. occ. 5 CT.
Crista galli L. Brasilia 5 TD.
herbacea L. Am.bor-aus. 2 FD.
laurifolia Jacq. Am. aust. 2 TD.
picta L. Moluccae 2 C.
Erythronium L. (Liliaceae)
Dens canis L. Eu.au.Bohem. 2 D.
sibiricum F. et L. Sibir. aust. 2 D.
Erythrostemon L.K.O. (Caesalpinaceae)
Gilliesii L. K.O. Chili 2 T.
Escallonia Mut. (Escalloniaceae)
bifida Lk. et O. Brasil. aust. 2 T.
floribunda Kth. Andes 2 F.
montevidensis DeC. La Plata 2 T.
resinosa Pers. Andes 2 F.
serrata Smith Patagonia 2 F.
Eschscholtzia Cham. (Papaverineae)
californica Cham. California 2 DF.
" β. pallida.
crocea Benth. 2 DF.
" β. compacta Steudl.
Etheiranthus K.* (Liliaceae)
constrictus K. Eur. aust. 2 D.
Jacquini K. Eur. med. 2 D.
Milleri K. Eur. aust. 2 D.
" β. monstrosus.
maritimus K. Sicil., Afr. 2 FD.
Ethulia Cass. (Syntheranthaceae)
angustifolia Bojer Madagascar ♂ CD.
conyzoides L. Ind.or., Afr. ♂ CD.
" corymbosa H. Ber. Cap. b. sp. ♂ CD.
Eucalyptus L'Her. (Myrtineae)
elongata Lk. Nov. Holl. 5 T.
glaucua DeC. " " 5 T.
multiflora Poir. " " 5 T.
obliqua L'Her. " " 5 T.
pulverulenta Sims " " 5 T.
resinifera Sm. " " 5 T.
Eucapnos Bhd. (Fumariaceae)
eximius Bhd. Am.bor.aus. 2 D. A.
formosus Bhd. " 2 D. A.
Eucharidium F. et M. (Onagraceae)
concinnum F. et M. Nov.Californ. ♂ D.
grandiflorum F. et M. " " ♂ D.
Euclea L. (Styracineae)
racemosa L. Cap. b. sp. 2 T.
Eucomis L'Her. (Liliaceae)
punctata Ait. Cap. b. sp. 2 F.
" β. striata Don.
undulata Ait. Cap. b. sp. 2 F.
Eudianthe Rchb. (Sileneae)
Coeli rosa Rchb. Eur. aust. ♂ D.
laeta K. " ♂ D.
Eugenia Mich. (Myrtineae)

(*) Muscari sp. Aut.

Eugenia
capensis Zeyh. Cap. b. sp. ♀ T.
 (vide: *Acmena* — *Jambosa*).
Eulophia R. Br. (*Orchideae*)
streptopetala Lodd. Cap. b. sp. ♀ CT.
 (vide: *Galeandra*).
Eupatorium Tourn. (*Synanthereae*)
adenophorum Spr. Mexico ♀ T.
affine Wend. Amer. bor. ♀ D.
ageratoides L. fil. " " ♀ D.
album L. Am. bor.-aust. ♀ D.
altissimum L. " " ♀ D.
aromaticum L. " " ♀ D.
Bartlingianum Steudl. Chili ♀ T.
biceps Klzsch. Amer. trop. ♀ C.
calaminthaefolium Kth. Mexico ♀ T.
cannabinum L. Europa ♀ D.
deltoides Jacq. Mexico ♀ T.
maculatum L. Amer. bor. ♀ D.
Morisii Vis. Chili ♀ T.
paniculatum Schrad. Brasilia ⊙ CF.
perfoliatum L. Amer. bor. ♀ DF.
purpureum L. " " ♀ D.
sessilifolium L. " " ♀ DF.
syriacum L. Oriens ♀ DF.
verticillatum Mühlb. Am. bor. aust. ♀ DF.
Euphorbia L. (*Euphorbiaceae*)
agraria M. B. Ruth. aust. ♀ D.
amygdaloides L. Eur. med. aust. ♀ D.
angulata Jacq. Eur. or. ♀ D.
antiquorum L. Aegypt. Ind. or. ♀ C.
aspera M. B. Taur. Cauc. ♀ D.
atropurpurea Brouss. Teneriffa ♀ T.
biumbellata Poir. Eur. aust. ⊙ CD.
Bojeri Hook. Madagascaria ♀ C.
caespitosa Ten. Neapolis ♀ FD.
canescens L. Eur. aust. ⊙ D.
canariensis L. Canariae ♀ TC.
Caput Medusae L. Afr. aust. ♀ TC.
ceratocarpa Ten. Neapolis ♀ F.
cereiformis L. Afr. aust. ♀ TC.
Chamaesyce L. Eur. aust. ⊙ D.
Characias L. " " ♀ F.
condylocarpa M. B. Caucasia ♀ D.
coralloides L. Eur. aust. ♀ DF.
crispata Horn. " " ⊙ D.
Cyparissias L. Europa ♀ D.
dendroides L. Eur. aust. ♀ F.
dentata Mchx. Am. bor. aust. ⊙ D.
diversifolia Desf. Afr. bor. ⊙ CD.
dulcis L. Eur. med. ♀ D.
epithymoides L. Austr. Italia ♀ DF.
eriocarpa Bertol. Italia ♀ F.
erosa W. Afr. aust. ♀ TC.
Esula L. Europa ♀ D.
falcata L. Eur. med. aust. ⊙ D.
fruticosa Biv. Sicilia ♀ F.
fulgens Karw. Mexico ♀ C.
geniculata Ort. Amer. aust. ⊙ CD.
Gerardiana Jacq. Eur. med. ♀ D.

Euphorbia
glareosa M. B. Taur. Cauc. ♀ D.
globosa Sims. Afr. aust. ♀ C.
helioscopia L. Europa ⊙ D.
Hystrix Jacq. Afr. aust. ♀ TC.
italica Lam. Eur. aust. ⊙ D.
lactea Haw. Afr. aust. ♀ TC.
Lagascae Spr. Hispania ⊙ D.
Lathyrus L. Eur. aust. ⊙ D.
linariaefolia W. ? ♀ T.
literata L. Eur. aust. ⊙ D.
lucida W. et K. Eur. or. ♀ D.
macrorrhiza C. A. Mey. Sibir. aust. ♀ DF.
mammillaris L. Afr. aust. ♀ TC.
mauritanica L. Afr. bor. ♀ T.
melapetala Gasp. Sicilia ♀ F.
mellifera Ait. Madera ♀ T.
meloniformis Ait. Afr. aust. ♀ TC.
micrantha Steph. Eur. or. ⊙ D.
Myrsinites L. Eur. aust. ♀ F.
neapolitana Ten. Neapolis ♀ F.
neriifolia L. Ind. or. ♀ C.
nicaeensis All. Eur. aust. ♀ FD.
nudiflora Jacq. Ind. occ. ♀ C.
numulariaefolia W. Afr. bor. ♀ T.
officinatum L. Afr. med. aust. ♀ CT.
orientalis L. Oriens ♀ DF.
Ornithopus Jacq. Afr. aust. ♀ TC.
palustris L. Europa ♀ D.
pannonica Host Aust. Hung. ♀ D.
Paralias L. Eur. aust. ♀ DF.
pentagona Haw. Afr. aust. ♀ TC.
peplioides Gouan Eur. aust. ⊙ D.
Peplus L. Europa ⊙ D.
persica Jacq. Persia bor. ♀ DF.
Pithyusa L. Eur. aust. ♀ F.
picta Jacq. Amer. trop. ⊙ CF.
pilosa L. Eur. or. aust. ♀ DF.
pilulifera L. Ind. occ. ⊙ CF.
piscatoria Ait. Canar. Madera ♀ T.
platyphyllos L. Europa ⊙ D.
portlandica L. Eur. occ. aust. ♀ F.
procera M. B. Ruth. aust. ♀ D.
prostrata Ait. Ind. occ. ⊙ CD.
pubescens Vahl Afr. bor. ⊙ CD.
salicifolia Host Hungaria ♀ D.
sanguinea Thor. Amer. trop. ? ♀ C.
segetalis L. Eur. aust. ⊙ D.
serpens Kth. Amer. aust. ⊙ CD.
seticornis Poir. Gall. aust. ⊙ D.
spinosa L. Eur. aust. ♀ F.
splendens Bojer Mascarenhas ♀ C.
spongiosa Spr. Chili ⊙ F.
stricta L. Eur. med. aust. ⊙ D.
Szowitsii F. et M. Pers. bor. ⊙ D.
terraccina L. Italia ⊙ D.
Tirucalli L. Ind. or. ♀ C.
trigona Haw. " " ♀ C.
trigonocarpa Fisch. Ruth. aust. ♀ D.
trinervis Bertol. Eur. aust. ⊙ D.

Euphorbia			
undulata M. B.	Ruth. aus. Sibir. 4 D.	Faba	
uralensis Fisch.	Sibiria 4 D.	vulgaris β . minor Riv. — γ . porphyrea	
variegata Sims	Am. bor. aust. ① CF.	Rehb.	
verrucosa L.	Eur. med. 4 D.	Fabiana R. et P.	(<i>Solanaceae</i>)
virgata W. et K.	Eur. or. 4 D.	imbricata R. et P.	Chili 4 T.
Wulfeni Hoppe	Illyria 4 F.	Fabricia Gaertn.	(<i>Myrtineae</i>)
(vide: Pedilanthus — Poinsettia).		laevigata Gaertn.	Nov. Holl. 4 T.
Euphrasia Tourn.	(<i>Rhinanthineae</i>)	myrtifolia Gaertn.	4 T.
officinalis L.	Europa ① D.	Fagara Jacq.	(<i>Xanthoxylineae</i>)
Euphrosyne DeC.	(<i>Synanthereae</i>)	Pterota L.	Ind. occ. 4 C.
xanthiifolia K.	Amer. bor. ① D.	Fagelia Neck.	(<i>Papilionaceae</i>)
Eupomatia R. Br.	(<i>Anonaceae</i>)	bituminosa DeC.	Cap. b. sp. 4 T.
laurina R. Br.	Nov. Holl. 4 T.	Fagopyrum Tourn.	(<i>Polygoniceae</i>)
Eurya Thb.	(<i>Ternstroemiaceae</i>)	cymosum Meisn.	Nepalia ① 4 FD.
japonica Thb.	Japonia 4 F.	emarginatum Meisn.	Asia med. ① D.
Eurybia Cass.	(<i>Synanthereae</i>)	esculentum Mnch.	" " ① D.
aculeata DeC.	Nov. Holl. 4 T.	tataricum Gaertn.	" " ① D.
argyrophylla Cass.	" " 4 T.	Fagus Tourn.	(<i>Cupuliferae</i>)
ilicifolia DeC.	" " 4 T.	ferruginea Ait.	Amer. bor. 5 D.
lirata DeC.	" " 4 T.	sylvatica L.	Europa 5 D.
myrsinoides N. E.	" " 4 T.	folia. " β . atropurpurea — γ . aspleni-	
(vide: Biotia).		Falcaria Dillen.	(<i>Umbelliferae</i>)
Eurycles Salisb.	(<i>Amarylloideae</i>)	dahurica DeC.	Sibir. aust. 4 DF.
amboinensis Loud.	Moluccae 4 C.	Rivini Host.	Europa 4 D.
Euryops Cass.	(<i>Synanthereae</i>)	Faldermannia Bge.	(<i>Labiatae</i>)
linifolius DeC.	Cap. b. sp. 4 T.	parviflora Trautv.	Sibir. aust. ① D.
Eustachys Desv.	(<i>Gramineae</i>)	Falkia L.	(<i>Convolvulineae</i>)
distichophylla Kth.	Bras. Chili 4 T.	repens L.	Cap. b. sp. 4 T.
petraea Desv.	Ind. occ. Am. bo. 4 F.	Farsetia , vide: Berteroa — Fibigia.	
Eustrephus R. Br.	(<i>Liliaceae</i>)	Fegatella Raddi	(<i>Marchantiaceae</i>)
angustifolius R. Br.	Nov. Holl. 4 T.	officinalis Raddi	Europa 4 D. 4
Eutassa Salisb.	(<i>Abietinae</i>)	Fedia Mnch.	(<i>Valerianaceae</i>)
excelsa Lk.	Ins. Norfolk. 5 T.	cornucopiae Vahl	Eur. aust. ① D.
Eutaxia R. Br.	(<i>Papilionaceae</i>)	graciliflora F. et M.	Afr. bor. ① D.
Baxteri Kn. et W.	Nov. Holl. 4 T.	Felicia Cass.	(<i>Synanthereae</i>)
myrtifolia R. Br.	" " 4 T.	angustifolia N. E.	Cap. b. sp. 4 T.
Euthamia Nutt.	(<i>Synanthereae</i>)	rigidula DeC.	" " 4 T.
graminifolia Nutt.	Amer. bor. 4 D.	tenella N. E.	" " ① D.
Eutoca R. Br.	(<i>Hydrophyllineae</i>)	Ferraria L.	(<i>Iridaceae</i>)
divaricata Benth.	California ① D.	undulata L.	Cap. b. sp. 4 T.
viscida Benth.	" " ① D.	Ferula Tourn.	(<i>Umbelliferae</i>)
Wrangeliana F. et M.	Nov. Califor. ① D.	caspica M. B.	Ruth. aus. Cau. 4 D.
Evax Gaertn.	(<i>Synanthereae</i>)	communis L.	Eur. aust. 4 DF.
asterisciflora Pers.	Eur. aust. ① D.	glauca L.	4 DF.
pygmaea Pers.	" " ① D.	grandiflora H. Ber.	Mexico " 4 T.
Evonymus Tourn.	(<i>Celastrineae</i>)	neapolitana Ten.	Neapolis 4 FD.
americanus L.	Amer. bor. au. 4 DF.	tingitana L.	Afr. bor. 4 T.
angustifolius Pursh	" " 4 DF.	(vide: Eriosynaphe	— Opopanax —
atropurpurea Jacq.	" " 4 D.	Peucedanum).	
europaeus L.	Europa 4 D.	Ferulago Koch	(<i>Umbelliferae</i>)
japonicus Thb.	Japonia 4 FD.	campestris Bhd.	Tauria 4 D.
" β . albo-marginatus — γ . aureo-maculatus		Dodonaei K.	Eur. aust. 4 D.
latifolius Scop.	Eur. med. aust. 4 D.	sulcata K.	" " Afr. bo. 4 FD.
nanus M. B.	Caucasia 4 DF.	sylvatica Koch	Ruth. aust. 4 D.
obovatus Nutt.	Amer. bor. 4 D.	thyrsiflora Koch	Creta 4 F.
verrucosus Scop.	Eur. med. aust. 4 D.	Festuca L.	(<i>Gramineae</i>)
Faba Tourn.	(<i>Papilionaceae</i>)	alpina Gaud.	Alpes 4 D. 4
vulgaris Mnch.	Aegypt. Pers. ① D.	amethystina L.	Eur. med. 4 D.
		aspernna Lk.	Tauria 4 D.

Festuca

aurata Gaud.	Helvetia	4 D. A.
borealis M. et K.	Eur. bor.	4 D.
dimorpha Guss.	Neap. Sicil.	4 DF.
Drymeya M. et K.	Eur. med.	4 D. A.
duriuscula L.	Europa	4 D.
" β . hirsuta Host.		
elatior L.	Europa	4 D.
Fenas Lag.	Hispania	4 DF.
flavescens Gaud.	Alpes	4 D. A.
gigantea Vill.	Europa	4 D.
glauca Lam.	"	4 D.
hemipoa DeC.	Gall. aust.	4 D.
heterophylla Haenke	Europa	4 D.
nigrescens Lam.	Alpes	4 D. A.
ovina L.	Europa	4 D.
" β . tenuifolia Sibth.		
pannonica Wulf.	Aust. Hung.	4 D.
pectinella Dec.	Aegyptus	4 D.
pilosella Hall. f.	Alpes	4 D. A.
pratensis Huds.	Europa	4 D.
pubescens W.	Hungaria	4 D.
pumila Vill.	Alpes	4 D. A.
Rochellii Steudl.	Banatus	4 DF.
rubra L.	Europa	4 D.
" β . dumetorum L.		
spadicea Gouan.	Alpes	4 D. A.
vaginata W. et K.	Hungaria	4 D.
valesiaca Gaud.	Helvetia	4 D. A.
varia Haenk.	Alpes	4 D. A.
(vide: Brachypodium — Bromus — Diplachne — Glyceria — Sclerochloa — Vulpia).		
Festucaria Lk.	(Gramineae)	
psilantha Lk.	Eur. aust.	4 D.
tenuicula Lk.	"	4 D.
Fibigia Med.	(Cruciferae)	
clypeata Med.	Eur. aust.	2 DF.
eriocarpa K.	Graec., Oriens	4 F.
triquetra K.	Dalm., Graecia	4 F.
Ficaria Dillen.	(Ranunculineae)	
ranunculoides Mönch.	Europa	4 D.
Ficus Tourn.	(Morticeae)	
australis W.	Nov. Holl.	5 T.
bengalensis L.	Ind. or.	4 C.
capensis Thunb.	Cap. b. sp.	4 T.
Carica L.	Eur. aust.	5 FD.
citrifolia Lam.	Mexico	4 C.
clusiaefolia Schott	Brasilia	5 C.
diversifolia K.	Amer. aust.	4 C.
elastica Roxb.	Ind. or.	4 C.
hispida Thb.	" "	4 C.
Lichtensteinii Lk.	Cap. b. sp.	4 C.
lutescens Parm.	?	4 C.
martinicensis W.	Ind. occ.	5 C.
neriifolia Reinw.	Java	4 C.
nitida Thb.	Ind. or.	4 T.
phytolaccaefolia Desf.	?	5 C.
populnea W.	Ind. occ.	5 C.
quercifolia Lodd.	Ind. or.	4 C.

Ficus

religiosa L.	Ind. or.	5 C.
rubiginosa Desf.	" "	5 C.
salicifolia Vahl.	Arabia	5 C.
scabra Forst.	Oceania	5 CT.
stipulata Thb.	Japonia	4 C.
striata Roth.	Ind. or.	4 C.
ulmifolia Lam.	Java	4 C.
Filago Tourn.	(Synanthereae)	
gallica L.	Europa	4 D.
germanica L.	"	4 D.
pyramidata L.	Europa	4 D.
Fimbristylis Vahl	(Cyperinae)	
annua R. et S.	Eur. aust.	4 CD.
dichotoma Vahl	Afr. bor.	4 CD.
pubigera Bhd.	Am. bor. aust.	4 CD.
Firmiana Mars.	(Sterculiaceae)	
platanifolia S. et E.	China, Jap.	5 FD.
Flaveria Juss.	(Synanthereae)	
Contrayerba Pers.	Am. med. aust.	4 D.
Florestina Cass.	(Synanthereae)	
pedata Cass.	Mexico	4 CD.
Foeniculum Adans.	(Umbelliferae)	
dulce DeC.	Eur. aust. or.	4 D.
officinale All.	" "	4 DF.
piperitum DeC.	Eur. aust.	4 DF.
sativum Bertol.	Oriens ?	4 D.
Foenum graecum Tourn.	(Papilionaceae)	
ensiferum K.	Oriens ?	4 D.
gladiatum K.	Eur. aust.	4 D.
officinale Mnch.	Graecia	4 D.
Fontanesia Lab.	(Oleaceae)	
phillyreoides Lab.	Syria	4 F.
Forestiera Poir.	(Forestieraceae)	
acuminata Poir.	Am. bor. aust.	4 DF.
porulosa Poir.	"	4 DF.
Forskolea L.	(Urticaceae)	
angustifolia Retz.	Canariae	4 CD.
tenacissima L.	Afr. bor.	4 CD.
viridis Ehrbg.	Aegyptus	4 CD.
Fothergilla L.	(Loranthineae)	
alnifolia L.	Am. bor. aust.	4 DF.
Fougerouxia DeC.	(Synanthereae)	
recta DeC.	Mexico	4 CD.
Fourcroya Vent.	(Agaveae)	
gigantea Vent.	Amer. trop.	4 C.
Fragaria Tourn.	(Dryadeae)	
chiloensis Ehrh.	Am. aust. temp.	4 D.
" β . carolinensis Duh.		
collina Ehrh.	Europa	4 D.
elatior Ehrh.	"	4 D.
grandiflora Ehrh.	Am. aust. ?	4 D.
indica Andr.	Nepalia	4 FD.
mexicana Schlecht.	Mexico	4 FD.
vesca L.	Europa	4 D.
" β . semperflorens Hayn. — γ . effla-		
gellis Duch. — δ . monophylla Duch.		
virginiana Mill.	Amer. bor.	4 D.
Franciscea Pohl	(Scrophulariaceae)	
uniflora Pohl	Brasilia	4 C.

Francoa Cav. (<i>Francoaceae</i>)			Fumana	
Δ appendiculata Cav.	Chili	4 F.	Δ calycina K.	Italia 4 F.
Δ ramosa D. Don.	"	4 F.	Δ laevipes Spach	Eur. aust. 4 F.
Δ sonchifolia Cav.	"	4 F.	Δ procumbens K.	" 4 F.
Francoeuria Cass. (<i>Synantherae</i>)			Δ viscida Spach	Gall. Hispania 4 F.
crispa Cass.	Aegypt., Seneg. 4 T.		Δ vulgaris Spach	Eur. aust. 4 FD.
Frankenia L. (<i>Frankeniaceae</i>)			Fumaria Tourn. (<i>Fumariaceae</i>)	
laevis L.	Eur. aust. 4 F.		Δ alexandrina Ehrbg.	Aegyptus 4 D.
pulverulenta L.	Eur. au. or. Afr. 4 D.		Δ capreolata L.	Eur. aust. 4 D.
Fraxinus Tourn. (<i>Oleaceae</i>)			Δ officinalis L.	Europa 4 D.
excelsior L.	Europa 5 D.		Δ parviflora Lam.	Eur. occ. 4 D.
β . pendula Ait. — γ . aurea W.			Δ Vaillantii Loisl.	Europa 4 D.
δ . jaspidea W. — ϵ . variegata Hort.			(vide: Corydalis — Platycapnos).	
ζ . angustifolia Hort. — η . salicifolia			Funkia Spr. (<i>Liliaceae</i>)	
Hort. — θ . nana W. — ι . crispa Bosc			Δ albomarginata Hook	Japonia 4 DF.
κ . simplicifolia W.			Δ cucullata Siebd.	" 4 DF.
lentiscifolia Desf.	Syria 5 DF.		Δ ovata Spr.	" 4 DF.
obliqua Tausch.	?	5 D.	Δ Sieboldiana Lodd.	" 4 DF.
oxycarpa W.	Caucasia 5 D.		Δ subcordata Spr.	" 4 DF.
parvifolia W.	Oriens 5 DF.		Δ undulata O. et D.	" 4 DF.
rostrata Guss.	Sicilia 5 DF.		Gagea Satish. (<i>Liliaceae</i>)	
sambucifolia Vahl.	Amer. bor. 5 D.		Δ arvensis Schult.	Europa 4 D.
(vide: Calycomelia — Ornus).			Δ lutea Schult.	" 4 D.
Freirea Gaudich. (<i>Urticaceae</i>)			Δ minima Schult.	" 4 D.
Δ alsinifolia Gaudich.	Aegyptus 4 CD.		Δ stenopetala Rchb.	" 4 D.
Δ filiformis Gaudich.	Neapolis 4 CD.		Gaillardia Foug. (<i>Synantherae</i>)	
Freylinia Benth. (<i>Scrophulariaceae</i>)			Δ aristata Pursh.	Am. bor. aust. 4 DF.
Δ cestroides Colla	Cap. b. sp. 5 T.		Δ Drummondii DeC.	Texas 4 FD.
Δ undulata Benth.	" " 4 T.		Δ lanceolata Mchx.	Amer. bor. 4 D.
Fritillaria Tourn. (<i>Liliaceae</i>)			Galactites Mneh. (<i>Synantherae</i>)	
Δ latifolia W.	Caucasia 4 DF.		Δ tomentosa Mneh.	Eur. aust. 4 D.
Δ Meleagris L.	Eur. med. aust. 4 D.		Galanthus L. (<i>Liliaceae</i>)	
Δ minor Led.	Sibir. aust. 4 DF.		Δ nivalis L.	Europa 4 D.
Δ montana Hoppe	Eur. aust. 4 D.		β . fl. pleno	
Δ persica L.	Asia media 4 DF.		Δ plicatus L.	Ruth. aust. 4 DF.
Δ pyrenaica L.	Pyrenaei 4 D.		Galasia Cass. (<i>Synantherae</i>)	
Δ ruthenica Wickstr.	Caucasia 4 DF.		Δ villosa Cass.	Illyria 4 D.
(vide: Petilium).			Galatella Cass. (<i>Synantherae</i>)	
Frœlichia Mneh. (<i>Amarantaceae</i>)			Δ dracunculoides DeC.	Asia bor. 4 D.
Δ lanata Mneh.	Ind. occ. 4 C.		Δ fastigiata N. E.	" 4 D.
Fuchsia Plum. (<i>Onagraceae</i>)			Δ Hauptii Lindl.	Sibir. alt. 4 DF.
Δ coccinea Ait.	Chili 4 F.		β . grandiflora.	
Δ conica Lindl.	" 4 F.		Δ hyssopifolia N. E.	Amer. bor. 4 D.
Δ cordifolia Benth.	Mexico 4 F.		Δ insculpta N. E.	Eur. or. aust. 4 D.
Δ corymbiflora R. et P.	Peruvia 4 F.		Δ linifolia N. E.	Amer. bor. aust. 4 D.
Δ fulgens M. et S.	Mexico 4 T.		Δ punctata N. F.	Eur. aust. 4 D.
Δ globosa Lindl.	" 4 F.		Galaxia Thb. (<i>Iridaceae</i>)	
Δ gracilis Lindl.	" 4 F.		Δ ixiaeflora DeC.	Cap. b. sp. 4 T.
Δ macrostemma R. et P.	Chili 4 F.		Galeandra Lindl. (<i>Orchideae</i>)	
Δ radicans Miers.	Brasilia 4 FT.		Δ gracilis Lindl.	Guiana 4 C.
Δ rosea R. et P.	Chili 4 T.		Galega Tourn. (<i>Papilionaceae</i>)	
Δ serratifolia R. et P.	Peruvia 4 F.		Δ officinalis L.	Europa 4 D.
Δ splendens Zucc.	Mexico 4 FT.		Δ orientalis L.	Oriens 4 D.
Δ unguiculata Lilja	" 4 F.		Δ persica Pers.	Persia 4 DF.
Δ venusta Kth.	Columbia 4 T.		Galeobdolon Mneh. (<i>Labiatae</i>)	
et plures hybridae species.			Δ luteum Huds.	Europa 4 D.
(vide: Brebissonia — Kirschlegera —			Galeopsis Tourn. (<i>Labiatae</i>)	
Lyciopsis — Schufia — Skinnera).			Δ Ladanum L.	Europa 4 D.
Fumana Dun. (<i>Cistaceae</i>)			Δ ochroleuca Lam.	Eur. occ. 4 D.
Barrelieri K.	Italia 4 F.		Δ pubescens Bess.	Europa 4 D.

Genista

hispanica L.	Eur. aust.	‡FD.
laburnoides Mor.	?	‡F.
linifolia L.	Gall. Hispan.	‡F.
manica Poll.	Eur. aust.	‡DF.
multibracteata Tsch.	Asia bor.	‡D.
nervata Kit.	Eur. or-aust.	‡DF.
ovata W. et K.	Eur. aust.	‡DF.
patens DeC.	Hispania	‡F.
pilosa L.	Eur. occ. aust.	‡D.
procumbens W. et K.	Eur. or-aust.	‡D.
radiata Scop.	Eur. aust.	‡DF.
rhodopena Friv.	Rumelia	‡FD.
scariosa Viv.	Eur. aust-or.	‡DF.
sibirica L.	Asia bor.	‡D.
tinctoria L.	Europa	‡D.
triangularis W.	Banatus	‡DF.
virgata DeC.	Madera	‡F.
(vide: Cytisus — Eremosparton — Genistella — Retama — Sarothamnus).		

Genistella Tourn.

(Papilionaceae)

sagittalis K.	Eur. aust.	‡DF.
---------------	------------	------

Gentiana Tourn.

(Gentianaceae)

acaulis L.	Subalpes	‡D.
adscendens Pall.	Sibiria	‡D.‡.
asclepiadea L.	Alp. Subalp.	‡D.‡.
bavarica L.	Alpes	‡D.‡.
Cruciata L.	Europa	‡D.
macrophylla Pall.	Sibiria	‡D.‡.
pannonica Scop.	Alp. Subalp.	‡D.‡.
Pneumonanthe L.	Europa	‡D.
purpurea L.	Helvetia	‡D.‡.
Saponaria L.	Amer. bor.	‡D.‡.
septemfida Pall.	Sibiria	‡D.‡.
verna L.	Alp. Subalp.	‡D.‡.

(vide: Asterias).

Geranium Tourn.

(Geraniaceae)

aconitifolium L'Her.	Helv. Gallia	‡D.‡.
affine Led.	Sibir. austr.	‡DF.
angulatum Curt.	Rumelia	‡D.
argenteum L.	Alpes	‡D.‡.
bifolium Patr.	Sibir. aust.	‡DF.
bohemicum L.	Eur. med. aus.	⊙D.
carolinianum L.	Amer. bor.	⊙D.
cinereum Cav.	Pyrenaei	‡DF.
collinum M. B.	Taur. Cauc.	‡D.
columbinum L.	Europa	⊙D.
cristatum Stev.	Cauc. Armen.	‡DF.
dissectum L.	Europa	⊙D.
divaricatum Ehrh.	Eur. med. aust.	⊙D.
eriosomon Fiesch.	Sibir. austr.	‡DF.
ibericum Cav.	Cauc. Armen.	‡DF.
longipes DeC.	Ruth. aust. Cau.	‡D.
lucidum L.	Europa	⊙D.
macrorrhizum L.	Eur. aust.	‡DF.
"	β. variegatum.	
maculatum L.	Amer. bor.	‡D.
molle L.	Europa	⊙D.
nepalense Swt.	Nepalia	‡FD.
nodosum L.	Eur. occ. aust.	‡DF.

Geranium

palustre L.	Europa	‡D.
Phaeum L.	Eur. med. aust.	‡D.
platypetalum F. et M.	Caucasia	‡DF.
pratense L.	Europa	‡D.
"	β. album — γ. laciniatum.	
pusillum L.	Europa	⊙D.
pyrenaicum L.	Eur. med. aust.	‡D.
reflexum L.	Eur. aust.	‡DF.
Richardsonii F. et T.	Amer. bor.	‡D.
Robertianum L.	Europa	⊙D.
rotundifolium L.	"	⊙D.
sanguineum L.	"	‡D.
"	β. prostratum Cav.	
sibiricum L.	Ruth., Asiabor.	‡D.
striatum L.	Eur. aust-or.	‡FD.
sylvaticum L.	Europa	‡D.
tuberosum L.	Eur. aust. Cauc.	‡D.
Vlassovianum Fisch.	Sibir. aust.	‡D.

Geropogon L.

(Synanthereae)

glaber L.	Eur. aust.	⊙D.
-----------	------------	-----

Gesnera Plum.

(Gesneraceae)

aggregata Ker	Brasilia	‡C.
allagophylla Mart.	"	‡C.
bulbosa Ker	"	‡C.
Cooperi Paxt.	"	‡C.
Douglasii Lindl.	"	‡C.
"	β. verticillata.	
elongata Kth.	Columbia	‡C.
faucialis Lindl.	Brasilia	‡C.
hirsuta Kth.	Columbia	‡C.
latifolia Mart.	Brasilia	‡C.
Lindleyi Hook	"	‡C.
magnifica O. et D.	"	‡C.
prasinata Ker	"	‡C.
rutula Lindl.	"	‡C.
spicata Kth.	Columbia	‡C.
verticillata Cav.	Brasilia	‡C.
zebrina Paxt.	Amer. aust.	‡C.

(vide: Rytidophyllum — Tapeinotes).

Gesneriina Gaudich.

(Urticaceae)

arborea Gaudich.	Canariae	‡T.
------------------	----------	-----

Geum L.

(Dryadeae)

aethiopicum H. Bonon.	Aethiopia	‡DF.
album Gmel.	Amer. bor.	‡D.
brachypetalum Ser.	?	‡D.
canadense Murr.	Amer. bor.	‡D.
chilense Balb.	Chili	‡F.
coccineum S. et Sm.	Graec. Oriens	‡FD.
hirtum Whlbg.	Suecia	‡D.
hispidum Fries.	"	‡D.
inclinatum Schleich.	Alp. Sudet.	‡D.‡.
intermedium Ehrh.	Europa	‡D.
"	β. rubifolium Lej. — γ.	
dubium Horn.		
macrophyllum W.	Asia bor-or.	‡D.
rivale L.	Europa	‡D.
"	β. hybridum.	
strictum Ait.	Asia et Am. bor.	‡D.
sylvaticum Pourr.	Eur. aust. Afr.	‡DF.

- Geum**
 urbanum L. Europa 4.D.
 virginianum L. Amer. bor.-aus. 4.D.
 (vide: *Coluria* — *Sieversia*).
Gilia R. et S. (*Polemoniaceae*)
 achilleaeifolia Benth. California ② D.
 capitata Dougl. Am. bor.-occ. ② D.
 laciniata R. et P. Chili, Peruv. ② D.
 millefoliata F. et M. Nov. Califor. ② D.
 parviflora Spr. Am. bor.-occ. ② D.
 tricolor Benth. California ② D.
 (vide: *Ipomopsis* — *Leptosiphon* — *Navaretia*).
Gillenia Mnch. (*Spiraeaceae*)
 trifoliata Mnch. Amer. bor. 4.DF.
Gladiolus Tourn. (*Iridaceae*)
 angustus L. Cap. b. sp. 4.F.
 blandus Ait. " " 4.F.
 byzantinus Mill. Eur. aust.-or. 4.DF.
 Cardinalis Curt. Cap. b. sp. 4.FD.
 carneus Jacq. " " 4.F.
 Colvillei Swt. Hybr. " 4.FD.
 communis L. Europa 4.D.
 cuspidatus Jacq. Cap. b. sp. 4.F.
 elongatus Thb. " " 4.F.
 floribundus Jacq. " " 4.FD.
 gracilis Jacq. Cap. b. sp. 4.F.
 Herbertianus H. Angl. Hybr. 4.F.
 illyricus Koch Illyr., Dalm. 4.DF.
 imbricatus L. Europa 4.D.
 inflatus Thb. Cap. b. sp. 4.F.
 leucanthus Bouch. ? 4.D.
 psittacinus Hook. Cap. b. sp. 4.FD.
 roseus Bouch. ? 4.D.
 tristis L. Cap. b. sp. 4.FD.
 undulatus Jacq. " " 4.F.
 (vide: *Anisanthus* — *Anomatheca* — *Babiana* — *Beilia* — *Diasia* — *Hebea* — *Montbretia* — *Watsonia*).
Glandularia Gmel. (*Verbenaceae*)
 Aubletia Spach Am. bor.-aust. ② D.
 " β. Drummondii.
 erinoides K. Peruvia ② D.
 pulchella Spach La Plata 4.FD.
 " β. fl. albo.
Glaucium Tourn. (*Papaverineae*)
 corniculatum Curt. Eur. med. aust. ② D.
 elegans F. et M. Persia ② D.
 Fischeri Bhd. " ② D.
 flavum Crtz. Eur. aust. ② D.
 fulvum Sm. Persia ② D.
 rubrum S. et Sm. Graecia ② D.
 tricolor Bhd. Eur. aust. ② D.
 (vide: *Roemeria*).
Glaux Tourn. (*Primulaceae*)
 maritima L. Europa 4.D.
Glechoma L. (*Labiatae*)
 hederaceum L. Europa 4.D.
Gleditschia L. (*Caesalpiniaceae*)
 chinensis Lam. China 5DF.
- Gleditschia**
 ferox Desf. China 5DF.
 macracantha Desf. " 5DF.
 monosperma Walt. Am. bor.-aust. 5DF.
 triacanthos L. Amer. bor. 5D.
 " β. inermis.
 (vide: *Triaenodendron*).
Globularia Tourn. (*Globulariaceae*)
 cordifolia L. Eur. med. aust. 4.DF.
 nudicaulis L. Alpes 4.D. 4.
 salicina Lam. Madera 4.T.
 vulgaris L. Europa 4.D.
Globulea Haw. (*Crassulaceae*)
 obvallata Haw. Cap. b. sp. 4.T.
Gloxinia L'Her. (*Gesneraceae*)
 arborescens Coll. Amer. trop. 4.C.
 caulescens Lindl. Brasilia 4.C.
 " β. Youngiana O. et D.
 hirsuta Lindl. Brasilia 4.C.
 maculata L'Her. Amer. trop. 4.C.
 Menziesiana Young ? 4.C.
 rubra Paxt. Brasilia 4.C.
 speciosa Ker 4.C.
 " β. lactea — γ. candida — δ.
 grandiflora.
 (vide: *Sinningia*).
Glyceria R. Br. (*Gramineae*)
 distans Whlbg. Europa 4.D.
 festucaeformis Heynh. Eur. aust. 4.D.
 fluitans R. Br. Europa 4.D. 4.D.
 maritima M. et K. " 4.D.
 nervata Trin. Am. bor.-aust. 4.DF.
 soongarica Schrenk Sibir. aust. ② D.
 spectabilis M. et K. Europa 4.D. 4.D.
Glycine L. (*Papilionaceae*)
 debilis Ait. Ind. occ. ② C.
 (vide: *Amphicarpaea* — *Chaetocalyx* — *Fagelia* — *Hardenbergia* — *Kennedy* — *Leptocyanus* — *Rhynchosis* — *Wistaria*).
Glycyrrhiza Tourn. (*Papilionaceae*)
 asperima L. fil Asia bor. 4.D.
 dubia Bhd. ? 4.D.
 chinata L. Eur. or.-aust. 4.D.
 glabra L. Eur. aust. 4.D.
 glandulifera W. et K. Eur. or.-aust. 4.D.
 grandiflora Tsch. Asia bor. 4.D.
 lepidota Nutt. Amer. bor. 4.D.
 uralensis Fisch. Asia bor. 4.D.
Gnaphalium L. (*Synanthereae*)
 Berteronianum DeC. Chili 4.F.
 Candelabrum Horn. ? ② D.
 candidissimum Lam. Cap. b. sp. ② D.
 cephaloideum W. Nov. Holl. ② D.
 citrinum H. et A. Chili ② F.
 involueratum Forst. Nov. Holl. ② 4.F.
 luteo-album L. Europa ② D.
 paniculatum Coll. Chili ② F.
 pennsylvanicum W. Amer. bor. ② D.
 resedaefolium Trev. Chili ② D.
 Schraderi DeC. Amer. aust. ② ② D.

Gnaphalium			Goodia		
spicatum Lam.	Amer. aust.	⊙ D.	pubescens Sims	Tasmania	† F.
sylvaticum L.	Europa	⊙ D.	Goodyera R. Br.	(Orchideae)	
uliginosum L.	"	⊙ D.	discolor Ker.	Brasilia	‡ C.
undulatum L.	Cap. b. sp.	⊙ D.	Gossypium L.	(Malvaceae)	
velutinum W.	?	⊙ F.	arborescens L.	Ind. occ.	‡ C.
Vira-vira Mol.	Chili	⊙ D.	herbaceum L.	" "	⊙ ⊙ C.
(vide: Anaxeton — Antennaria — Evax			indicum Lam.	" "	⊙ ⊙ C.
— Filago — Helichrysum — Leontopodium			latifolium Murr.	?	⊙ ‡ C.
— Trichogyne).			suffruticosum H. Bon.	?	‡ C.
Gnidia L. (Thymeleaceae)			Grabowskya Schlecht.	(Ehretiaceae)	
aurea Eckl.	Cap. b. sp.	‡ T.	boerhaviaefolia Schlecht.	Brasil. aust.	† T.
capitata L.	" "	‡ T.	Grammocarpos Ser.	(Papilionaceae)	
imbricata L.	" "	‡ T.	azureus K.	Caucasia	⊙ D.
pinifolia L.	" "	‡ T.	calliceras K.	"	⊙ D.
simplex L.	" "	‡ T.	coeruleus K.	Eur. aust.	⊙ D.
Godetia Spach (Onagraceae)			— β. Bessierianus K.		
decumbens Spach	California	⊙ D.	uncinatus K.	Taur., Cauc.	⊙ D.
Lehmanniana Spach	Am. bor-occ.	⊙ D.	Grangea Adans.	(Synanthereae)	
lepida Lindl.	" "	⊙ D.	maderaspatana Poir.	Ind. or.	⊙ CF.
Lindleyana Spach	" "	⊙ D.	Graptophyllum N. E.	(Acanthineae)	
quadrivulnera Spach	" "	⊙ D.	hortense N. E.	Ind. or.	‡ C.
Romanzoffii Spach	" "	⊙ D.	Gratiola L.	(Scrophulariaceae)	
rubicunda Lindl.	California	⊙ D.	officinalis L.	Europa	‡ D.
tenella Spach	Chili	⊙ D.	Grevillea R. Br.	(Proteaceae)	
viminea Spach	California	⊙ D.	acanthifolia Sieb.	Nov. Holl.	† T.
vinosa Lindl.	"	⊙ D.	Baueri R. Br.	" "	† T.
Willdenowiana Spach	Am. bor-aust.	⊙ D.	bipinnatifida R. Br.	" "	† T.
Gottbachia DeC. (Cruciferae)			buxifolia R. B.	" "	† T.
tetragona Led.	Casp. Armen.	⊙ D.	juniperina R. Br.	" "	† T.
torulosa DeC.	Oriens	⊙ D.	Lawrenceana H. Angl.	" "	† T.
Goldfussia N. E. (Acanthineae)			linearis R. Br.	" "	† T.
anisophylla N. E.	Ind. or.	‡ C.	mucronulata R. Br.	" "	† T.
glomerata N. E.	" "	‡ C.	rosmarinifolia Cunng.	" "	† T.
Gomphocarpus R. Br.	(Asclepiadeae)		sulfurea Cunng.	" "	† T.
angustifolius Lk.	Mexico	‡ T.	Thelemaniana Hüg.	" "	† T.
fruticosus R. Br.	Cap. b. sp.	‡ T.	(vide: Manglesia).		
viridiflorus Spr.	Am. bor-aust.	‡ DF.	Grewia L. (Tiliaceae)		
Gompholobium Sm. (Papilionaceae)			flava DeC.	Cap. b. sp.	† T.
marginatum R. Br.	Nov. Holl.	† T.	occidentalis L.	" "	† T.
pubescens Hort.	" "	† T.	orientalis L.	Ind. or.	† T.
tetrathecodes Sieb.	" "	† T.	Griffinia Ker (Amaryllideae)		
Gomphrena L. (Amarantaceae)			hyacinthina Herb.	Brasilia	‡ C.
decumbens Jacq.	Mexico	⊙ CD.	Grindelia W.	(Synanthereae)	
globosa L. cum var.	Ind. or.	⊙ CD.	arguta Schrad.	Mexico	‡ F.
(vide: Froelichia — Mogiphanes).			ciliata Spr.	Am. bor-aust.	⊙ DF.
Gongora R. et P. (Orchideae)			crispa Otto	Am. aust. temp.	‡ F.
atropurpurea Hook.	Ind. occ.	‡ C.	glutinosa Dun.	Mexico	‡ T.
" β. pallida.			integrifolia DeC.	Am. bor-occ.	‡ DF.
maculata Lindl.	Guiana	‡ C.	inuloides W.	Mexico	‡ T.
Gonospermum Less. (Synanthereae)			squarrosa Dun.	Missouri	‡ DF.
elegans DeC.	Canariae	‡ FT.	Gronovia L. (Gronovaceae)		
multiflorum DeC.	"	‡ T.	scandens L.	Amer. aust.	⊙ C.
Goodenia Sm. (Goodeniaceae)			Guazuma Plum.	(Büttneriaceae)	
grandiflora Sims.	Nov. Holl.	⊙ ‡ T.	ulmifolia Lam.	Ind. occ.	‡ C.
ovata Sm.	"	† T.	Guizotia DeC.	(Synanthereae)	
Goniopteris Prsl.	(Polypodiaceae)		oleifera DeC.	Asia aust.	⊙ CD.
crenata Lk.	Ind. occ.	‡ C.	Gymnadenia Rich. (Orchideae)		
Goodia Salisb. (Papilionaceae)			conopsea Rich.	Europa	‡ D. A.
latifolia Salisb.	Tasmania	† F.	(vide: Peristylus).		

<i>Gymnocladus</i> Lam.	(<i>Caesalpiniaceae</i>)			
<i>canadensis</i> Lam.	Amer. bor.	5 D.		
<i>Gymnocline</i> Cass.	(<i>Synanthereae</i>)			
<i>achilleaefolia</i> K.	Sib. aust. Cauc.	4 D.		
<i>chilophylla</i> K.	Armenia	4 DF.		
<i>macrophylla</i> B. et F.	Eur. or-aust.	4 D.		
<i>myriophylla</i> K.	Caucasia	4 DF.		
<i>tanacetoides</i> K.	Sibir. altaica	4 D.		
<i>Gymnogramma</i> , vide: <i>Anogramma</i> —				
<i>Ceropteris</i> — <i>Neurogramma</i> .				
<i>Gymnostyles</i> , vide: <i>Soliva</i>				
<i>Gymnothrix</i> P. B.	(<i>Gramineae</i>)			
<i>adoensis</i> Hochst.	Abyssinia	4 T.		
<i>cenchroides</i> R. et S.	Cap. Ind.	4 T.		
<i>Gynandropsis</i> DeC.	(<i>Capparidaceae</i>)			
<i>muricata</i> Schrad.	Amer. trop.	⊙ C.		
<i>pentaphylla</i> DeC.	Ind. occ.	⊙ C.		
<i>speciosa</i> DeC.	Amer. trop.	⊙ ½ C.		
<i>Gypsophila</i> L.	(<i>Sileneae</i>)			
<i>acutifolia</i> Fisch.	Eur. au-or. Cau.	4 D.		
<i>ascendens</i> Jacq.	Graec. Oriens	4 DF.		
<i>altissima</i> L.	Sibir. aust.	4 D.		
<i>β. divaricata</i> .				
<i>armerioides</i> Ser.	Oriens	4 DF.		
<i>collina</i> Stev.	Ruth. aust.	4 D.		
<i>dahurica</i> Turcz.	Sibir. aust.	4 DF.		
<i>elegans</i> M. B.	Caucasia	⊙ D.		
<i>fastigiata</i> L.	Eur. med.	4 D.		
<i>glauca</i> Stev.	Caucasia	4 DF.		
<i>glomerata</i> Pall.	Ruth. aus. Cau.	4 D.		
<i>Gmelini</i> Bge.	Sibir. alt.	4 DF.		
<i>paniculata</i> L.	Eur. or. Asia	4 D.		
<i>β. effusa</i> Tsch.				
<i>perfoliata</i> L.	Oriens	4 DF.		
<i>prostrata</i> L.	"	4 DF.		
<i>repens</i> L.	Alpes	4 D. A.		
<i>saligna</i> Schrad.	?	4 D.		
<i>scorzoneraefolia</i> Desf.	Taur. Cauc.	4 D.		
<i>Steveni</i> Fisch.	Caucasia	4 D.		
<i>thesiifolia</i> Ser.	Ruth. aust. Asia	4 D.		
<i>trichotoma</i> Wendl.	" "	4 D.		
<i>tomentosa</i> L.	Oriens	4 DF.		
<i>viscosa</i> Murr.	"	⊙ D.		
(vide: <i>Tunica</i>).				
<i>Hablitzia</i> M. B.	(<i>Amarantaceae</i>)			
<i>tamoides</i> M. B.	Caucasia	4 D.		
<i>Habranthus</i> Herb.	(<i>Amaryllidaceae</i>)			
<i>adventus</i> Herb.	Chili	4 T.		
<i>Hacquetia</i> Neck.	(<i>Umbelliferae</i>)			
<i>Epipactis</i> DeC.	Alp. Subalp.	4 D. A.		
<i>Haemanthus</i> L.	(<i>Amaryllidaceae</i>)			
<i>albiflos</i> Jacq.	Cap. b. sp.	4 TC.		
<i>coccineus</i> L.	" "	4 TC.		
<i>pubescens</i> L.	" "	4 TC.		
<i>punicus</i> L.	" "	4 TC.		
<i>speciosus</i> Hort.	" "	4 TC.		
<i>tigrinus</i> Jacq.	" "	4 TC.		
<i>Hagenia</i> Mnch.	(<i>Sileneae</i>)			
<i>porrigens</i> K.	Oriens	⊙ D.		
<i>Hakea</i> Schrad.	(<i>Proteaceae</i>)			
<i>Hakea</i>				
<i>acicularis</i> R. Br.	Nov. Holl.	4 T.		
<i>amplexicaulis</i> R. Br.	" "	4 T.		
<i>Baxteri</i> R. Br.	" "	4 T.		
<i>ceratophylla</i> R. Br.	" "	4 T.		
<i>cristata</i> R. Br.	" "	4 T.		
<i>cucullata</i> Cungh.	" "	4 T.		
<i>dactyloides</i> Cav.	" "	4 T.		
<i>florida</i> R. Br.	" "	4 T.		
<i>gibbosa</i> Cav.	" "	4 T.		
<i>ilicifolia</i> R. Br.	" "	4 T.		
<i>Lamberti</i> R. Br.	" "	4 T.		
<i>microcarpa</i> R. Br.	Tasmania	4 T.		
<i>nitida</i> R. Br.	Nov. Holl.	4 T.		
<i>oleaefolia</i> R. Br.	" "	4 T.		
<i>petrophiloides</i> Makay	" "	4 T.		
<i>pugioniformis</i> Cav.	" "	4 T.		
<i>saligna</i> R. Br.	" "	4 T.		
<i>suaveolens</i> R. Br.	" "	4 T.		
<i>tuberculata</i> R. Br.	" "	4 T.		
<i>villosa</i> Hort.	" "	4 T.		
<i>Halesia</i> Ellis	(<i>Halesiaceae</i>)			
<i>tetraptera</i> L.	Amer. bor. aust.	4 DF.		
<i>Halimium</i> Dun.	(<i>Cistaceae</i>)			
<i>lepidotum</i> Spach	Hisp. Lusit.	4 T.		
<i>Halimodendron</i> Fisch.	(<i>Papilionaceae</i>)			
<i>argenteum</i> DeC.	Sibir. alt. Casp.	4 D.		
<i>Halimolobos</i> Tsch.	(<i>Cruciferae</i>)			
<i>stricta</i> Tsch.	Mexico	⊙ FD.		
<i>Halimus</i> Wallr.	(<i>Chenopodiaceae</i>)			
<i>portulacoides</i> Wallr.	Eur. occ. aust.	4 DF.		
<i>Halleria</i> L.	(<i>Scrophulariaceae</i>)			
<i>lucida</i> L.	Cap. b. sp.	4 T.		
<i>Hallia</i> Thb.	(<i>Papilionaceae</i>)			
<i>imbricata</i> Thb.	Cap. b. sp.	4 T.		
<i>Halocnemum</i> M. B.	(<i>Chenopodiaceae</i>)			
<i>caspicum</i> M. B.	Caspia	½ F.		
<i>Haloragis</i> Forst.	(<i>Haloragiceae</i>)			
<i>capensis</i> Noiss.	Cap. b. sp.	4 T.		
(vide: <i>Cercodia</i>).				
<i>Hamamelis</i> L.	(<i>Hamamelidaceae</i>)			
<i>virginica</i> L.	Amer. bor.	4 D.		
<i>Hamelia</i> Jacq.	(<i>Rubiaceae</i>)			
<i>chrysantha</i> Swt.	Ind. occ.	4 C.		
<i>Hardenbergia</i> Benth.	(<i>Papilionaceae</i>)			
<i>Comptoniana</i> Benth.	Nov. Holl.	4 T.		
<i>macrophylla</i> Benth.	" "	4 T.		
<i>monophylla</i> Benth.	" "	4 T.		
<i>Hariota</i> Adans.	(<i>Cactaceae</i>)			
<i>salicornioides</i> DeC.	Brasilia	½ C.		
<i>Harmogia</i> Schau.	(<i>Myrtaceae</i>)			
<i>virgata</i> Schau.	Nov. Holl.	4 T.		
<i>Harpalum</i> Cass.	(<i>Synanthereae</i>)			
<i>rigidum</i> Cass.	Amer. bor.	4 D.		
<i>Hartwegia</i> N. E.	(<i>Liliaceae</i>)			
<i>comosa</i> N. E.	Cap. b. sp.	4 T.		
<i>Hartmannia</i> Spach	(<i>Onagraceae</i>)			
<i>gauroides</i> Spach	Mexico	4 FD.		
<i>macrantha</i> Spach	"	⊙ D.		
<i>β. capensis</i> .				

Hasselquistia L.	(Umbelliferae)	Helianthemum		
aegyptiaca L.	Aeg. Oriens ⊙ CD.	apenninum DeC.	Eur. aust.	‡ DF.
cordata L. fil.	Oriens ⊙ D.	ciliatum Pers.	"	‡ DF.
Heckera Kth.	(Piperineae)	croceum Pers.	Hispania	‡ F.
sidaefolia Kth.	Brasilia ‡ C.	formosum Dun.	Lusitania	‡ F.
umbellata Kth.	Ind. occ. ‡ C.	denticulatum Thib.	Eur. aust.	⊙ D.
Hebenstreitia L.	(Selagineae)	grandiflorum DeC.	Alpes	‡ D. A.
dentata L.	Cap. b. sp. ⊙ CD.	hirsutum DeC.	Pyrenaei	‡ D. A.
β. integrifolia L.		hirtum Pers.	Eur. aust.	‡ DF.
scabra Thb.	Cap. b. sp. ⊙ CD.	hispidum Dun.	Gall. aust.	‡ DF.
tenuifolia Schrad.	" " ⊙ CD.	hyssopifolium Ten.	Neapolis	‡ F.
Hedeoma Pers.	(Labiales)	lavandulaefolium DeC.	Hispan. Gall.	‡ F.
hispida Pursh.	Amer. bor. ⊙ D.	ledifolium W.	Eur. aust.	⊙ D.
nepalensis Benth.	Nepalia ‡ F.	leptophyllum Dun.	Hispania	‡ F.
Hedera Tourn.	(Araliaceae)	lucidum Horn.	?	‡ F.
capitata Sm.	Ind. occ. 5 C.	mutabile Pers.	Eur. aust.	‡ DF.
chrysocarpa Walsh	Ind. bor. ‡ DF.	niloticum Pers.	Eur. aust. Afr.	⊙ D.
Helix L.	Europa ‡ D.	obscurum Pers.	Eur. aust.	‡ DF.
β. digitata — γ. hibernica — δ. variegata.		polifolium DeC.	"	‡ DF.
Hedychium Kön.	(Zingiberae)	pulverulentum DeC.	"	‡ DF.
coccinum Sm.	Ind. or. ‡ C.	rhodanthum Dun.	Hispania	‡ F.
coronarium L.	" " ‡ C.	roseum DeC.	Eur. aust.	‡ DF.
flavum Wall.	" " ‡ C.	rugosum Dun.	Lusitania	‡ F.
Gardnerianum Rosc.	" " ‡ C.	semiglabrum Rad.	Liguria	‡ F.
Hedypnois Tourn.	(Synanthereae)	serpyllifolium Mill.	Eur. aust.	‡ DF.
coronopifolia Ten.	Eur. aust. ⊙ D.	stroechadifolium Pers.	"	‡ F.
cretica W.	" " ⊙ D.	strictum Pers.	Hispania	‡ F.
pendula W.	" " ⊙ D.	sulfureum W.	"	‡ F.
persica M. B.	Asia med. ⊙ D.	venustum Swt.	?	‡ F.
polymorpha DeC.	Eur. aust. ⊙ D.	vulgare Gaertn.	Europa	‡ D.
sonchea Rchb.	? ⊙ D.	β. discolor Rchb.		
tubaeformis Ten.	Eur. aust. ⊙ D.	(vide: Fumana — Rhodax — Tuberaria).		
Hedysarum Tourn.	(Papilionaceae)	Helianthus L.	(Synanthereae)	
altaicum Fisch.	Sibir. altaica ‡ D.	altissimus L.	Amer. bor.	‡ D.
caucasicum M. B.	Caucasus ‡ D.	annuus L. cum. var.	Peru. Mexico	⊙ D.
coronarium L.	Italia ② ‡ FD.	angustifolius Mchx.	Am. bor. aust.	‡ DF.
β. album — γ. prostratum.		atrorubens L.	"	‡ DF.
neglectum Led.	Sibir. altaica ‡ D.	canus K.	Amer. bor.	‡ D.
obscurum L.	Alpes ‡ D. A.	Colossus Kze.	Amer. aust.	⊙ D.
sibiricum Poir.	Sibir. aust. ‡ D.	decapetalus L.	Amer. bor.	‡ D.
tauricum Pall.	Tauria ‡ D.	diffusus Sims.	"	‡ D.
(vide: Adesmia — Desmodium — Lespedeza — Lourea — Urania).		divaricatus L.	"	‡ D.
Heimia Lk. et O.	(Lythrineae)	erythrocarpus Bartl.	Amer. aust.	⊙ D.
myrtifolia Lk. et O.	Brasil. aust. ‡ F.	frondosus L.	Amer. bor.	‡ D.
salicifolia Lk. et O.	Mexico ‡ F.	giganteus L.	"	‡ D.
Helenium L.	(Synanthereae)	indicus L.	Amer. aust.	⊙ D.
altissimum H. Ber.	Amer. bor. ‡ D.	intermedius K.	Amer. bor.	‡ D.
autumnale L.	" ‡ D.	laetiflorus Pers.	"	‡ D.
californicum Dougl.	California ‡ DF.	leiocalyx K.	"	‡ D.
commutatum H. Ber.	Amer. bor. ‡ D.	lenticularis Dougl.	"	⊙ D.
mexicanum Kth.	Mexico ‡ FD.	macrocarpus DeC.	Amer. aust.	⊙ D.
quadridentatum Lab.	Am. bor. aust. ⊙ CD.	macrophyllum W.	Amer. bor.	‡ D.
varium Schrad.	Mexico ② FD.	Maximiliani Schrad.	"	‡ D.
Helianthemum Tourn.	(Cistineae)	mollis Lam.	"	‡ D.
acuminatum Pers.	Eur. aust. ‡ DF.	multiflorus L.	"	‡ DF.
aegyptiacum Mill.	" ? " ⊙ D.	β. fl. pleno.		
albiflorum H. Bas.	" ? " ‡ DF.	orgyalis DeC.	Am. bor. aust.	‡ DF.
		ovatus Lehm.	Mexico	⊙ D.
		parviflorus Bhd.	Amer. bor.	‡ D.

Helianthus			Heliosperma		
patens Lehm.	Mexico	⊙ D.	quadrifidum Gris.	Alpes	⊙ D. A.
petiolaris Nutt.	Am. bor. aust.	⊙ D.	Heliotropium Tourn.	(<i>Ehretiaceae</i>)	
prostratus W.	Amer. bor.	⊙ D.	corymbosum R. et P.	Peruvia	⊙ T.
ramosissimus Mill.	"	⊙ D.	curassavicum L.	Amer. trop.	⊙ C.
salicifolius O. et D.	Am. bor. aust.	⊙ D.	europaeum L.	Europa	⊙ D.
serotinus Tsch.	Amer. bor.	⊙ D.	parviflorum L.	Ind. or.	⊙ C.
serrulatus K.	"	⊙ D.	peruvianum L.	Peruvia	⊙ T.
strumosus L.	"	⊙ D.	suaveolens M. B.	Caucasia	⊙ F.
trachelifolius W.	"	⊙ D.	Helipterum DeC.	(<i>Synanthereae</i>)	
truncatus Schwz.	Am. bor. aust.	⊙ D.	faciculatum DeC.	Cap. b. sp.	⊙ T.
tuberosus L.	Brasil. aust.	⊙ D.	β. venustum.		
(vide: Harpalium — Tithonia).			humile DeC.	"	⊙ T.
Helichrysum Vaill.	(<i>Synanthereae</i>)		sesamoides DeC.	"	⊙ T.
angustifolium DeC.	Eur. aust.	⊙ F.	speciosissimum DeC.	"	⊙ T.
arenarium L.	Europa	⊙ D.	variegatum DeC.	"	⊙ T.
argenteum Thb.	Cap. b. sp.	⊙ T.	Helieborus Tourn.	(<i>Ranunculineae</i>)	
bracteatum W.	Nov. Holl.	⊙ C.	atrorubens W. et K.	Eur. or. aust.	⊙ D.
β. album — γ. macranthum			dumetorum W. et K.	"	⊙ D.
Benth.			foetidus L.	Eur. occ.	⊙ D.
crassifolium Less.	Cap. b. sp.	⊙ T.	intermedius Host	Eur. or. aust.	⊙ D.
crispum Less.	"	⊙ T.	lividus Ait.	Corsica	⊙ F.
ericaefolium Less.	"	⊙ T.	niger L.	Eur. med.	⊙ D.
fellinum Less.	"	⊙ T.	odorus W. et K.	Hungaria	⊙ D.
foetidum Cass.	"	⊙ F.	purpurascens W. et K.	Eur. or. aust.	⊙ D.
fulgidum W.	"	⊙ T.	spinulosus Tsch.	?	⊙ F.
glutinosum A. Braun	Abyssinia	⊙ T.	vaginatus Kit.	Hungaria	⊙ D.
grandiflorum Less.	Cap. b. sp.	⊙ T.	viridis L.	Eur. med. aust.	⊙ D.
maritimum Don	"	⊙ T.	Helminthia Juss.	(<i>Synanthereae</i>)	
niveum Grah.	Nov. Holl.	⊙ T.	echioides Gaertn.	Eur. aust.	⊙ D.
odoratissimum Less.	Cap. b. sp.	⊙ T.	humifusa Trev.	"	⊙ D.
orientale L.	Creta	⊙ F.	Helosciadium Koch	(<i>Umbelliferae</i>)	
retortum W.	Cap. b. sp.	⊙ T.	crassipes Koch	Cors. Sardin.	⊙ F.
rupestre DeC.	Neap. Sicilia	⊙ F.	lateriflorum Koch	America	⊙ D.
rutilans Less.	Cap. b. sp.	⊙ F.	Hemerocallis L.	(<i>Liliaceae</i>)	
stoloniferum W.	"	⊙ T.	disticha D. Don	Nepal. Japon.	⊙ D.
(vide: Anaxeton — Helipterum — Phae-nocoma).			flava L.	Eur. aust. or.	⊙ D.
Heliconia L.	(<i>Musaceae</i>)		fulva L.	Eur. aust.	⊙ D.
Bihai Sw.	Amer. trop.	⊙ C.	graminea Andr.	Sibiria	⊙ D.
humilis Jacq.	"	⊙ C.	(vide: Czackia — Funkia).		
psittacorum L. fil.	"	⊙ C.	Hemimeris, vide: Alonsoa.		
speciosa H. Belg.	"	⊙ C.	Hemionitis L.	(<i>Polypodiaceae</i>)	
Helicteres L.	(<i>Bombacineae</i>)		palmata L.	Ind. occ.	⊙ C.
jamaicensis Jacq.	Ind. occ.	⊙ C.	(vide: Anogramma — Ceropteris).		
Isora L.	Ind. or.	⊙ C.	Hemisteptia Bge.	(<i>Synanthereae</i>)	
ovata Lam.	Brasilia	⊙ C.	lyrata Bge.	China bor.	⊙ F.
Helioiphila Burm.	(<i>Cruciferae</i>)		Hepatica Dillen.	(<i>Ranunculineae</i>)	
arabioides Sims.	Cap. b. sp.	⊙ C.	triloba Chaix et var.	Europa	⊙ D.
crithmifolia W.	"	⊙ C.	Heraclium L.	(<i>Umbelliferae</i>)	
latisiliqua E. Mey.	"	⊙ C.	alpinum L.	Alpes occ. au.	⊙ D.
pilosa Lam.	"	⊙ C.	amplissimum Wendl.	?	⊙ D.
(vide: Leptormus — Ormiscus).			angustifolium L.	Europa	⊙ D.
Helioopsis Pers.	(<i>Synanthereae</i>)		asperum Fisch.	Caucasus	⊙ D.
buphthalmoides Dun.	Peruvia	⊙ C.	auritum Bisch.	Amer. bor.	⊙ D.
laevis Pers.	Amer. bor.	⊙ D.	barbatum Led.	Sibir. altaica	⊙ D.
scabra Don.	"	⊙ D.	caspicum Hort.	Caspia	⊙ D.
stricta Wendl.	"	⊙ D.	caucasicum Stev.	Caucasus	⊙ D.
Heliosperma Endl.	(<i>Sileneae</i>)		chorodanum DeC.	"	⊙ D.
alpestre Gris.	Alpes	⊙ D.	dissectum Led.	Sibir. altaica	⊙ D.
			elegans Jacq.	Eur. med. aust.	⊙ D.

Heracleum

Fischeri K.	Asia bor.	4 D.
flavescens W.	Alpes, Subalp.	4 D.
ligusticifolium M. B.	Ruth. aust.	4 D.
longifolium Jacq.	Alpes, Subalp.	4 D.
palmatum Baumg.	Alpes	4 D.
persicum Desf.	Pers. bor.	4 D.
pubescens M. B.	Taur. Cauc.	4 D.
pyrenaicum Lam.	Eur. aust.	4 D.
sibiricum L.	Eur. or. Asia	4 D.
speciosum Led.	Caucasus	4 D.
Sphondylium L.	Europa	4 D.
villosum Fisch.	Caucasus	4 D.
Wilhelmii F. et L.	"	4 D.
Heritiera Ait.	(Sterculiaceae)	
litoralis Ait.	Ind. or.	1 C.
Hermannia Tourn.	(Hermanniaceae)	
alnifolia L.	Cap. b. sp.	1 T.
althaeaeifolia L.	"	1 T.
angularis Jacq.	"	1 T.
arabica H. et St.	Arabia	1 CF.
aurea Jacq.	Cap. b. sp.	1 T.
candicans Ait.	"	1 T.
decumbens W.	"	1 T.
denudata L. fil.	"	1 T.
disticha Sch. et W.	"	1 T.
flammea Jacq.	"	1 T.
hyssopifolia L.	"	1 T.
inflata Lk. et O.	Mexico	1 T.
incana Cav.	Cap. b. sp.	1 T.
micans Sch. et W.	"	1 T.
mollis W.	"	1 T.
plicata W.	"	1 T.
scabra Cav.	"	1 T.
Hermione Salisb.	(Amaryllideae)	
cupularis Sal.	Eur. aust.	4 DF.
italica Haw.	Italia	4 F.
Jonquilla Haw.	Hisp., Gall.	4 DF.
polyantha K.	"	4 DF.
serotina K.	Eur. aust.	4 DF.
Tazetta Haw.	"	4 DF.
Herniaria Tourn.	(Paronychiaceae)	
cinerea DeC.	Eur. aust.	1 D.
glabra L.	Europa	1 D.
hirsuta L.	"	1 D.
macrocarpa S. et Sm.	Graecia	4 F.
Herpestes Gaertn.	(Scrophulariaceae)	
chilensis Spr.	Chili	4 T.
chrysanthia Ch. et S.	Mexico	1 CF.
Herreria R. et P.	(Smilacineae)	
stellata R. et P.	Chili	1 T.
Hertia Less.	(Synantheraeae)	
crassifolia Less.	Cap. b. sp.	1 F.
Hesiodia Mnch.	(Labiatae)	
montana Dum.	Eur. med. aus.	1 D.
Hesperis Tourn.	(Cruciferae)	
bicuspidata Poir.	Armenia	1 D.
fragrans Fisch.	Asia bor.	1 D.
inodora L.	Eur. Asia bor.	1 D.
laciniata All.	Eur. aust.	1 D.

Hesperis

matronalis L.	Eur. med. aust.	1 D.
β. nivea Baumg.	— γ. sibi-	
rica L.		
ramosissima Desf.	Sicil. Afr.	1 D.
runcinata W. et K.	Hungaria	1 D.
tristis L.	Eur. aust.	1 D.
Heteracia F. et M.	(Synantheraeae)	
Szowitsii F. et M.	Pers. bor.	1 D.
Heteromorpha Ch. et S.	(Umbelliferae)	
trifoliata E. et Z.	Cap. b. sp.	1 T.
Heteronoma Mart.	(Melastomaceae)	
diversifolium DeC.	Mexico	1 C.
subtripplinervium DeC.	"	1 C.
Heteropteris Kth.	(Malpighiaceae)	
argentea Kth.	Columbia	1 C.
purpurea Kth.	Ind. occ.	1 C.
Heterospermum Cav.	(Synantheraeae)	
pinnatum Cav.	Mexico	1 CD.
Heterothalamus Less.	(Synantheraeae)	
psiadioides Less.	La Plata	1 T.
Heterotheca Cass.	(Synantheraeae)	
inuloides Cass.	Mexico	1 T.
Heuchera L.	(Saxifragaceae)	
americana L.	Amer. bor. aust.	4 D.
caulescens Pursh	"	4 D.
cylindracea Dougl.	Am. bor. occ.	4 D.
divaricata Fisch.	Asia bor. or.	4 D.
hispida Pursh	Am. bor. aust.	4 D.
macrophylla Lodd.	"	4 D.
micrantha Dougl.	Am. bor. occ.	4 D.
villosa Mchx.	Am. bor. aust.	4 D.
(vide: Tolmiea).		
Hexacentris N. E.	(Acanthineae)	
coccinea N. E.	Ind. or.	1 C.
Hibbertia Andr.	(Dilleniaceae)	
grossulariaefolia Sal.	Nov. Holl.	1 T.
pedunculata R. Br.	"	1 T.
volubilis Andr.	"	1 T.
Hibiscus L.	(Malvaceae)	
amoenus Lk. et O.	La Plata	1 C.
armeniacus Bouch.	Oriens	1 D.
aquaticus DeC.	Italia	4 F.
attenuatus Boss.	Carol. aust.	1 T.
calycinus W.	Mascarenhas	1 C.
Cameroni K. et W.	Madagascar	1 C.
cannabinus L.	Ind. or.	1 CD.
diversifolius Jacq.	"	1 C.
domingensis Jacq.	Ind. occ.	1 C.
grandiflorus Mchx.	Am. bor. aust.	4 FD.
heterophyllum Vent.	Nov. Holl.	1 T.
hispidus Mill.	Cap. b. sp.	1 D.
hybridus Dietr.	?	1 C.
incanus Wendl.	Am. bor. aust.	4 FD.
lavateroides Moric.	Mexico	1 C.
liliiflorus Cav.	Mascarenhas	1 C.
militaris Cav.	Am. bor. aust.	4 DF.
Moscheutos L.	"	4 DF.
mutabilis L.	Ind. or.	1 C.
palustris L.	Amer. bor.	4 DF.

Hibiscus

pedunculatus Cav.	Cap. b. sp.	† T.
phoeniceus L. fil.	Ind. or.	† C.
Rainerianus Vis.	Africa	† C.
regius Hort.	?	† C.
Rosa sinensis L. et var.	Ind. or.	5 C.
roseus Thor.	Gall. aust.	‡ FD.
speciosus Ait.	Am. bor. aust.	‡ FD.
sphaerocarpus Bouch.	?	⊙ D.
syriacus L. et var.	Oriens	‡ DF.
ternatus Cav.	Cap. b. sp.	⊙ D.
Trionum L.	Eur. aust.	⊙ D.
vesicarius Cav.	Cap. b. sp.	⊙ D.
(vide: Abelmoschus — Kosteletzkya — Paritium — Pavonia).		
<i>Hieracium</i> Tourn. (<i>Synantheraeae</i>)		
acuminatum Led.	Asia bor.	‡ D.
affine Tsch.	Eur. med.	‡ D.
— " β . asperum Schleich.		
Allionii Tsch.	Eur. aust.	‡ D.
alpinum L.	Alp., Subalp.	‡ D.
ambiguum Schult.	?	‡ D.
amplexicaule L.	Alp., Subalp.	‡ D.
— " β . petraeum Hopp.		
andryaloides Vill.	Helv. Delphi.	‡ D.
angustifolium Hopp.	Alpes	‡ D.
aurantiacum L.	Alp., Subalp.	‡ D.
Auricula L.	Europa	‡ D.
auriculatum W.	?	‡ D.
Baubini Bess.	Eur. med.	‡ D.
bifurum M. B.	Eur. or.	‡ D.
boreale Frs.	Europa	‡ D.
brachiatum Bertol.	Eur. med.	‡ D.
bupleurifolium Tsch.	Alp., Sudet.	‡ D.
bupleuroides Gmel.	Alpes	‡ D.
calcareum Bhd.	Eur. aust.	‡ DF.
calyculatum Horn.	?	‡ D.
canescens Lk.	?	‡ D.
cerinthoides L.	Pyrenaei	‡ D.
— " β . decipiens.		
collinum Gochn.	Eur. med.	‡ D.
compositum Lap.	Pyrenaei	‡ D.
corymbosum Pers.	Europa	‡ D.
coronopifolium Bhd.	"	‡ D.
— " β . longifolium.		
crinitum S. et Sm.	Graec. Sicil.	‡ F.
cydoniaefolium Vill.	Alpes	‡ D.
cymosum L.	Europa	‡ D.
dentatum Hopp.	Alpes	‡ D.
— " β . angustifolium.		
denticulatum Sm.	Angl. Scot.	‡ D.
echioides Lamm.	Eur. or. aust.	‡ D.
eriphorum St. Arn.	Gall. aust.	‡ DF.
fallax W.	Eur. med.	‡ D.
— " β . Zizianum Tsch.		
flexuosum W. et K.	Alpes	‡ D.
foliosum W. et K.	Hung. Croat.	‡ D.
glabratum Hopp.	Alpes	‡ D.
glaucescens Bess.	Eur. or.	‡ D.
glaucum All.	Alpes	‡ D.

Hieracium

graveolens Fröl.	?	‡ D.
Halleri Vill.	Alpes	‡ D.
hirsutissimum K.	?	‡ D.
hirsutum Bhd.	Amer. bor.	‡ D.
incanum M. B.	Caucasus	‡ DF.
incisum Hopp.	Alpes	‡ D.
intybaceum Jacq.	"	‡ D.
Jacquini Vill.	"	‡ D.
— " β . intermedium Lap.		
Lactaris Bert.	Eur. aust.	‡ D.
laevigatum W.	Eur. or.	‡ D.
lanatum Vill.	Alpes occ.	‡ D.
Lawsonii Vill.	Delph. Pyre.	‡ D.
Ledebourii Fisch.	Ruthenia	‡ D.
Liotardi Vill.	Delphinatus	‡ D.
longifolium Schleich.	Helvetia	‡ D.
lycopifolium Froel.	German. occ.	‡ D.
murorum L.	Europa	‡ D.
nigrescens W.	Sudeti	‡ D.
obscurum Rehb.	Europa	‡ D.
Ottonianum K.	?	‡ D.
pallescens W. et K.	Alpes	‡ D.
Pelleterianum DeC.	Eur. occ.	‡ D.
picroides Vill.	Alpes	‡ D.
Pilosella L.	Europa	‡ D.
piloselloides Vill.	Alpes	‡ D.
porrifolium Jacq.	"	‡ D.
praealtum Vill.	Eur. med.	‡ D.
pratense Tsch.	"	‡ D.
prenanthoides Vill.	Alp. Sudeti	‡ D.
prostratum DeC.	Gallia	‡ DF.
pulmonarioides Vill.	Alpes	‡ D.
pulmonarium Sm.	Scotia	‡ D.
racemosum W. et K.	Carpati	‡ D.
radiocaulis Tsch.	Eur. bor.	‡ D.
ramosum W. et K.	Hung. Trans.	‡ D.
rotundatum Kit.	Austr. Hung.	‡ D.
rupestre All.	Helv. Pedem.	‡ D.
— " β . hirsutum.		
sabaudum All.	Eur. aust.	‡ D.
Sadlerianum K.	?	‡ D.
saxatile Jacq.	Alp., Subalp.	‡ D.
scabrum Mchx.	Amer. bor.	‡ D.
Schmidtii Tsch.	Eur. med.	‡ D.
Schraderi Schlei.	Alpes	‡ D.
setigerum Tsch.	Eur. med. or.	‡ D.
staticifolium All.	Alpes	‡ D.
Sternbergii Froel.	Bohemia	‡ D.
stoloniflorum W. et K.	Eur. med.	‡ D.
sudeticum Sternb.	Sudeti	‡ D.
sylvaticum Sm.	Europa	‡ D.
sylvestre Tsch.	Eur. med.	‡ D.
umbellatum L.	Europa	‡ D.
— " β . carpaticum Bess.		
undulatum Ait.	Hispania	‡ F.
Vaillantii Tsch.	Eur. med.	‡ D.
villosum L.	Alpes	‡ D.
— " β . valde pilosum Vill.		
virosus Pall.	Eur. or. au. Sib.	‡ D.

Hieracium				Horminum L.	(<i>Labiatae</i>)
vulgatum Frs.	Eur. bor. med.	4 D.		pyrenaicum L.	Alpes 4 D. A.
" β . Lachenalii Gmel. — γ . maculatum Sm.				Hornungia Rchb.	(<i>Cruciferae</i>)
Hierochloa Gmel.	(<i>Gramineae</i>)			petraea Rchb.	Eur. med.-aust. 2 D.
australis R. et S.	Eur. med.-au.	4 D. A.		Hosackia Dougl.	(<i>Papilionaceae</i>)
borealis R. et S.	Eur. bor. Sib.	4 D. A.		Purshiana Hook.	Amer. bor. 2 D.
Hillia Jacq.	(<i>Rubiaceae</i>)			Hosta Jacq.	(<i>Verbenaceae</i>)
longiflora Jacq.	Ind. occ.	4 C.		paniculata Dietr.	Mexico 4 C.
Himeranthus Endl.	(<i>Solanaceae</i>)			Hoteia M. et D.	(<i>Saxifragaceae</i>)
runcinatus Endl.	La Plata	4 F.		japonica M. et D.	Japonia 4 DF.
Hippia L.	(<i>Synanthereae</i>)			Houttuynia Thb.	(<i>Saururineae</i>)
frutescens L.	Cap. b. sp.	4 T.		cordata Thb.	China, Japon. 4 F.
Hippobroma G. Don	(<i>Lobeliaceae</i>)			Hovea R. Br.	(<i>Papilionaceae</i>)
longiflorum Don	Ind. occ.	4 C.		Celsi Bonpl.	Nov. Holl. 4 T.
Hippocrepis L.	(<i>Papilionaceae</i>)			purpurea Swt.	" 4 T.
biflora Spr.	Eur. aust.	2 D.		Hoya R. Br.	(<i>Asclepiadeae</i>)
ciliata W.	"	2 D.		carnosa R. Br.	China aust. 4 C.
comosa L.	Eur. med.-aus.	4 DF.		Potsii Trail.	" 4 C.
multisiliquosa L.	Eur. aust.	2 D.		viridiflora R. Br.	Ind. or. 4 C.
syriaca Ehrbg.	Oriens	2 D.		Huernia R. Rr.	(<i>Asclepiadeae</i>)
unisiliquosa L.	Eur. aust.	2 D.		barbata R. Br.	Afr. aust. 4 C.
Hippoglossum Hartm.	(<i>Borraginaceae</i>)			campanulata R. Br.	" 4 C.
virginianum Lilj.	Am. bor.-aust.	4 DF.		Hulthemia Dumort.	(<i>Rhodophoraceae</i>)
Hippophaë L.	(<i>Elaeagnaceae</i>)			berberifolia Dumort.	Pers. bor. 4 FD.
rhamnoides L.	Eur. med.-aust.	4 D.		Humea Sm.	(<i>Synanthereae</i>)
salicifolia Don.	Nepalia	4 DF.		elegans Sm.	Nov. Holl. 2 FD.
Hohenackeria F. et M.	(<i>Umbelliferae</i>)			Humulus L.	(<i>Cannabineae</i>)
bupleurifolia F. et M.	Caucasia	2 D.		Lupulus L.	Europa 4 D.
Holcus L.	(<i>Gramineae</i>)			Hunnemannia Swt.	(<i>Papaverineae</i>)
lanatus L.	Europa	4 D.		fumariaefolia Swt.	Mexico 2 F.
mollis L.	"	4 D.		Huperzia Bhd.	(<i>Lycopodiaceae</i>)
Holmskioldia Retz	(<i>Labiatae</i>)			Selago Bhd.	Europa 4 D. A.
sanguinea Retz	Ind. or.	4 C.		Hyacinthus Tourn.	(<i>Liliaceae</i>)
Hologymne Bartl.	(<i>Synanthereae</i>)			amethystinus L.	Hispania 4 DF.
californica Bartl.	California	2 D.		bracteosus K.	Oriens 4 DF.
glabrata Bartl.	"	2 D.		orientalis L. cum var.	" 4 DF.
Holopetalum DeC.	(<i>Geraniaceae</i>)			paradoxus F. et M.	" 4 DF.
ovatum Klzsch.	Cap. b. sp.	2 T.		(vide: Agraphis — Bellevalia — Etheiranthus — Muscari — Uropetalum).	
Holoschoenus Lk.	(<i>Cyperineae</i>)			Hydaticea Neck.	(<i>Saxifragaceae</i>)
atrovirens Lk.	Amer. bor.	4 D. V		cuneifolia K.	Alpes 4 D. A.
filiformis Rchb.	Eur. med.-aust.	4 D.		dentata K.	Scotia 4 D. A.
vulgaris Rchb.	"	4 D.		Geum K.	Helv. Pyren. 4 D. A.
Holosteum L.	(<i>Alsineae</i>)			hirsuta K.	Pyren. Hibe. 4 D. A.
Heuffelii Wierzb.	Europa	2 D.		hybrida K.	Delphinatus 4 D. A.
umbellatum L.	"	2 D.		punctata K.	Siberia 4 D. A.
Homogyne Cass.	(<i>Synanthereae</i>)			serrata K.	Hibernia 4 D. A.
alpina Cass.	Alp. Sudeti	4 D. A.		umbrosa K.	Angl. Pyren. 4 D. A.
Hordeum Tourn.	(<i>Gramineae</i>)			Hydrangea L.	(<i>Unoniaceae</i>)
bulbosum L.	Eur. aust.	4 DF.		arborescens L.	Amer. bor.-au. 4 DF.
distichum L.	Asia med. ?	2 D.		cordata Purch.	" 4 DF.
hexastichum L.	"	2 D.		Hortensia DeC.	China, Japon. 4 DF.
jubatum L.	Amer. bor.	2 D.		japonica Siebd.	Japonia 4 FD.
maritimum With.	Europa	2 D.		nivea Mehx.	Amer. bor.-au. 4 DF.
murinum L.	"	2 D.		quercifolia Bartr.	Florida 4 FD.
secalinum Schreb.	"	2 D.		Hydrocleis Rich.	(<i>Butomineae</i>)
trifurcartum Del.	"	4 D.		Humboldtii Endl.	Amer. aust. 4 C. V
vulgare L.	Asia med. ?	2 D.		Hydrocotyle Tourn.	(<i>Umbelliferae</i>)
" β . nigrum W.	— γ . coeleste Vib.			nitidula Rich.	Ind. or. 4 C.
Zeocriton L.	Asia med. ?	2 D.		sibthorpioides Lam.	Mascarenbas 4 C.

- Hydrocotyle**
vulgaris L. Europa 4.D. ▽
Hydrolea L. (*Hydroleaceae*)
spinosa L. Amer. aust. 4.C.
Hydrophyllum Tourn. (*Hydrophyllineae*)
canadense L. Amer. bor. 4.D.
virginicum L. 4.D.
Hymenandra DeC. f. (*Ardisiaceae*)
Wallichii DeC. f. Ind. or. 4.C.
Hymenanthera R. Br. (*Violaceae*)
dentata R. Br. Nov. Holl. 4.T.
Hymenocallis Salisb. (*Amaryllideae*)
amoena Herb. Guiana 4.C.
speciosa Salisb. Ind. occ. 4.C.
Hymenocarpus Savi (*Papilionaceae*)
circinatus Savi Eur. aust. ② D.
nummularius W. ② D.
Hymenophysa C. A. Mey. (*Cruciferae*)
pubescens C. A. Mey. Sibir. altaica 4.DF.
Hyoscyamus Tourn. (*Solanaceae*)
albus L. Europa aust. ② D.
aureus L. Creta, Oriens 4.F.
canariensis Ker Eur. aust. Afr. ② D.
Camerarii F. et M. Pers. bor. ② ② DF.
chloranthus Wend. Eur. aust. ② D.
niger L. Europa ② ② D.
" β. *agrestis* W. et K. — γ. *pallidus* W. et K.
pusillus L. Oriens ② D.
Senecionis W. Aegyptus 4.F.
(vide: *Physochlaina* — *Scopolia*).
Hyoseris L. (*Synantheraeae*)
lucida L. Eur. aust. 4.FD.
radiata L. " " 4.FD.
scabra L. " " ② D.
(vide: *Aposeris* — *Hedynois* — *Thrinacia*).
Hypercium Tourn. (*Fumariaceae*)
glaucescens Guss. Italia inf. ② D.
procumbens L. Eur. aust. ② D.
Hypericum Tourn. (*Hypericineae*)
albans Hoffg. Canariae 4.T.
ascyroides W. Am. bor.-aus. 4.FD.
barbatum L. Eur. aust. 4.DF.
crispum L. " " 4.F.
dentatum Loisl. Gall. aust. 4.F.
elegans Steph. Eur. or., Asia 4.D.
elongatum Led. Sibir. aust. 4.D.
hirsutum L. Europa 4.D.
hyssopifolium Vill. Gall. au. Taur. 4.FD.
Kalmianum Lam. Am. bor.-aust. 4.DF.
montanum L. Europa 4.D.
Montbretii Spach Oriens 4.F.
myrtifolium Lam. Amer. bor. 4.DF.
nepalense Chois. Nepalia 4.FD.
perforatum L. Europa 4.D.
pulchellum W. ? 4.DF.
pulehrum L. Europa 4.D.
punctatum Lam. Am. bor.-aus. 4.DF.
quadrangulare L. Europa 4.D.
Hypericum
Richeri Vill. Delph. Helv. 4.D. A.
songaricum Led. Sibir. aust. 4.D.
tetrapterum Fries. Europa 4.D.
tomentosum L. 4.D.
undulatum Schousb. Afr. bor. 4.FD.
(vide: *Androsaemum* — *Elodes* — *Eremanthe* — *Myriandra* — *Norysca* — *Olympia* — *Psorophytum* — *Roscynia* — *Triadenia* — *Webbia*).
Hypochaeris Vaill. (*Synantheraeae*)
arachnoidea Poir. Eur. aust. Afr. ② D.
Balbisii Loisl. Eur. med. aus. ② D.
glabra L. Europa ② D.
radicata L. ② D.
Salzmänniana DeC. Afr. bor. ② D.
(vide: *Achyrophorus*).
Hypolepis Bhd. (*Polypodiineae*)
spectabilis Lk. Brasilia 4.C.
Hypoxis L. (*Hypoxideae*)
decumbens L. Amer. trop. 4.C.
erecta L. Amer. bor. 4.DF.
gracilis Lehm. Brasilia 4.C.
sobolifera Jacq. Cap. b. sp. 4.T.
Hypoxis Jacq. (*Labiatae*)
canescens Kth. Amer. trop. ② C.
crispata Pohl Brasilia 4.C.
nepetoides Fisch. Ind. occ. 4.C.
pectinata Poit. Amer. trop. 4.C.
radiata W. Amer. bor.-aus. 4.F.
Hyssopus Tourn. (*Labiatae*)
officinalis L. Eur. aust. 4.D.
" β. *nepalensis*.
orientalis Adam Caucasus 4.D.
(vide: *Elsholtzia* — *Lophanthus*).
Iberis Dillen. (*Cruciferae*)
amara L. Eur. aust.-or. ② D.
" β. *lusitanica*.
coronaria D. Don. ? ② D.
Durandi L. et D. Gallia ② DF.
Garexiana All. Pedem. Pyre. 4.DF.
gibraltaria L. Hispania 4.F.
intermedia Guern. Eur. occ. ② D.
Lagascana DeC. Hispania ② D.
odorata L. Graecia ② D.
pinnata Gou. Eur. aust. ② D.
Pruiti Tin. Sicilia 4.F.
pubescens W. Hispania 4.F.
saxatilis L. Alp. occid. 4.D. A.
semperflorens L. Sicilia 4.F.
sempervirens L. Eur. aust.-or. 4.DF.
taurica DeC. Taur. Cauc. ② D.
Tenoreana DeC. Neapolis ② 4.DF.
umbellata L. Eur. aust. ② D.
" β. *speciosa*.
violacea Ait. ? ② D.
(vide: *Cynocardium* — *Teesdalia* — *Thlaspi*).
Ilex L. (*Ilicineae*)
angustifolia W. Am. bor.-aust. 4.FD.

Ilex

Aquifolium L.	Eur. occ.	5 FD.
" <i>β. ferox</i> Ait.		
balearica Desf.	Balear. Canar.	½ F.
Cassine Ait.	Am. bor.-aus.	½ FD.
opaca Ait.	" "	½ FD.
salicifolia Jacq.	Mascarenhas	½ C.
Illecebrum Rupp.	(<i>Paronychiaceae</i>)	
verticillatum L.	Europa	⊙ D.
(vide: <i>Aerua</i> — <i>Alternanthera</i> — <i>Buchholzia</i> — <i>Paronychia</i>).		
Illicium L.	(<i>Magnoliaceae</i>)	
floridanum Ellis	Florida	½ F.
parviflorum Mchx.	"	½ F.
religiosum Siebd.	China, Japon.	½ F.
Impatiens Rivin.	(<i>Balsaminaceae</i>)	
glanduligera Royle	Ind. or.	⊙ CD.
leptoceras Wall.	" "	⊙ CD.
Noli tangere L.	Europa	⊙ D.
parviflora DeC.	Sibiria	⊙ D.
tricornis Lindl.	Ind. or.	⊙ CD.
Imperata Cyr.	(<i>Gramineae</i>)	
cylindrica P. B.	Eur. aust.	¾ F.
Imperatoria Tourn.	(<i>Umbelliferae</i>)	
Ostruthium L.	Europa	¾ D.
(vide: <i>Ostericum</i> — <i>Tommasinina</i>).		
Incarvillea Juss.	(<i>Bignoniaceae</i>)	
chinensis Lam.	China Jap.	¾ FD.
Indigofera L.	(<i>Papilionaceae</i>)	
Anil L.	Amer. trop.	½ C.
amoena Ait.	Cap. b. sp.	½ T.
atropurpurea Ham.	Nepalia	½ F.
australis W.	Nov. Holl.	½ T.
divaricata Jacq.	"	½ T.
frutescens L. fil.	Cap. b. sp.	½ T.
hirsuta L.	Ind. or.	½ C.
incana Thb.	Cap. b. sp.	½ T.
procumbens L.	" "	½ T.
psoraleoides L.	" "	½ T.
pulchella Roxb.	Ind. or.	½ C.
tinctoria L.	" "	½ C.
Inga Plum.	(<i>Mimosaceae</i>)	
alba W.	Amer. aust.	½ C.
Intybellia Cass.	(<i>Synanthereae</i>)	
purpurea DeC.	Tauria	¾ FD.
Inula L.	(<i>Synanthereae</i>)	
bifrons L.	Eur. aust.	⊙ D.
Britanica L.	Europa	¾ D.
candida Cass.	Eur. aust.-or.	¾ DF.
caspica Led.	Caspia	¾ DF.
Conyza DeC.	Europa	⊙ D.
ensifolia L.	Eur. aust.	¾ D.
germanica L.	Eur. med.	¾ D.
graveolens Desf.	Eur. aust.	⊙ D.
hirta L.	Eur. med.-aust.	¾ D.
hybrida Baumg.	Eur. or.-aust.	¾ D.
lancifolia Wend.	Eur. med.	¾ D.
media M. B.	Ruth. aust.	¾ D.
Oculus Christi L.	Eur. or.-aust.	¾ D.
orientalis Lam.	Cauc. Arm.	¾ DF.

Inula

salicina L.	Eur. med.-aust.	¾ D.
semiaimplexicaulis Reu.	Helv. Pedem.	¾ D.
spiraeaeifolia L.	Eur. aust.	¾ D.
squarrosa L.	" "	¾ D.
suaveolens L.	" "	¾ D.
thapsoides Spr.	Caucasia	¾ D.
verbascifolia Poir.	"	¾ D.
(vide: <i>Corvisartia</i> — <i>Francoeuria</i> — <i>Jasonia</i> — <i>Limbarda</i> — <i>Pulicaria</i>).		
Ipomaea L.	(<i>Convolvulinaceae</i>)	
Aitoni Lindl.	"	½ C.
cordigera Mart.	Amer. trop.	⊙ C.
ficifolia Lindl.	La Plata	¾ F.
leucantha Jacq.	Amer. trop.	⊙ CD.
parviflora Vahl.	Ind. occ.	⊙ C.
Pes Tigridis L.	Ind. or.	⊙ C.
platensis Ker	La Plata	¾ FD.
polyantha R. et S.	Ind. occ.	¾ C.
Purga Wend.	Mexico	¾ FD.
sibirica Jacq.	Asia bor.	⊙ D.
ternata Jacq.	"	½ C.
(vide: <i>Argyrea</i> — <i>Batatas</i> — <i>Pharbitis</i> — <i>Quamoclit</i>).		
Ipomopsis Mchx.	(<i>Polemoniaceae</i>)	
Beyrichii Hort.	Am. bor.-aus.	⊙ FD.
elegans Mchx	" "	⊙ FD.
pulchella Swt.	" "	⊙ FD.
Iresine P. Br.	(<i>Amaranthaceae</i>)	
celosioides L.	Am. med. et bor.	¾ F.
nervosa Jacq. f.	"	¾ DF.
Iris Tourn.	(<i>Iridaceae</i>)	
acuta W.	Asia bor.	¾ D.
aequiloba Led.	Ruth. aust.	¾ D.
alata Lam.	Eur. aust. Afr.	¾ F.
arenaria W. et K.	Hungaria	¾ DF.
atomaria Bess.	Eur. or.	¾ D.
autumnalis Tsch.	"	¾ D.
biflora L.	Eur. aust. occ.	¾ D.
biglumis Vahl.	Asia bor.	¾ D.
Bloudowii Led.	Sibir. aust.	¾ DF.
bohemica Schm.	Bohem. Siles.	¾ D.
chinensis Curt.	China, Ind.	¾ F.
Clusiana Tsch.	Eur. aust.-or.	¾ DF.
crenulata K.	Eur. or.	¾ D.
cristata Ait.	Amer. bor.-au.	¾ DF.
cuprea Pursh.	"	¾ FD.
dichotoma Pall.	Sib. aust.	¾ DF.
falcata Tsch.	Bohemia	¾ D.
Fieberi Seidl	"	¾ D.
Fischeriana Sadl.	Asia bor.	¾ D.
flavescens Red.	Eur. aust.	¾ D.
flexuosa Murr.	Asia bor.	¾ D.
florentina L.	Italia	¾ FD.
foetidissima L.	Eur. occ.-aust.	¾ FD.
" <i>β. variegata</i> .		
furcata M. B.	Caucasus	¾ D.
germanica L.	Eur. med.-aust.	¾ D.
" <i>β. major</i> — <i>γ. odorata</i> — <i>δ.</i>		
alba Savi		

Iris

<i>graminea</i> L.	Eur. med-aust. 4 D.
<i>Güldenstaedtii</i> Lep.	Asia bor. 4 D.
<i>haematophylla</i> Fisch.	Sibir. aust. 4 D.
<i>halophila</i> Pall.	" " 4 D.
<i>heterophylla</i> H. Par.	Asia bor. 4 D.
<i>hungarica</i> W. et K.	Eur. or-aust. 4 D.
<i>laevigata</i> Fisch.	Asia bor. 4 D.
<i>livida</i> Boo.	? 4 D.
<i>lutescens</i> Lam.	Eur. aust. 4 D.
<i>maritima</i> Mill.	Eur. occ. 4 D.
<i>Matthioli</i> Tsch.	Eur. aust. 4 D.
<i>missouriensis</i> Mrts.	Amer. bor. 4 D.
<i>mongolica</i> Fisch.	Sibir. aust. 4 D.
<i>neglecta</i> Horn.	? 4 D.
<i>notha</i> M. B.	Caucasus 4 D.
<i>ochroleuca</i> L.	Asia bor. 4 D.
<i>Pallasii</i> Fisch.	" " 4 D.
<i>pallida</i> Lam.	Eur. aust-or. 4 D.
" <i>β. minor</i> .	
<i>persica</i> L.	Persia 4 FD.
<i>plicata</i> Lam.	? 4 D.
<i>prismatica</i> Pursh	Amer. bor. 4 D.
<i>Pseud-Acorus</i> L.	Europa 4 D. ∇
<i>pumila</i> L.	Eur. med-aust. 4 D.
" <i>β. azurea</i> — <i>γ. caesia</i> .	
<i>ruthenica</i> Ait.	Ruth. Asia 4 D.
<i>sambucina</i> L.	Eur. aust. 4 D.
" <i>β. japonica</i> Boo.	
<i>Schmidtii</i> Tsch.	? 4 D.
<i>setosa</i> Pall.	Sibiria 4 D.
<i>sibirica</i> L.	Eur. Sibiria 4 D.
" <i>β. fl. albo</i> — <i>γ. fl. pleno</i> .	
<i>sordida</i> W.	? 4 D.
<i>spuria</i> L.	Eur. occ. aust. 4 D.
<i>squalens</i> L.	Eur. aust. 4 D.
<i>stenogyna</i> DeC.	Asia bor. 4 D.
<i>suaveolens</i> Preisl.	? 4 D.
<i>susiana</i> L.	Oriens FD.
<i>Swertii</i> Lam.	? 4 D.
<i>Tauschiana</i> Preisl.	? 4 D.
<i>tenuifolia</i> Pall.	Sibir. aust. 4 D.
<i>tridentata</i> Pursh	Am. bor-aust. 4 FD.
<i>triflora</i> Balb.	Eur. aust. 4 D.
<i>tuberosa</i> L.	Eur. aust-or. 4 F.
<i>variegata</i> L.	Eur. or-aust. 4 D.
" <i>β. unicolor</i> — <i>γ. fulva</i> .	
<i>venusta</i> Schrad.	? 4 D.
<i>versicolor</i> L.	Amer. bor. 4 D.
<i>virginica</i> Gron.	" " 4 D.
<i>virescens</i> DeC.	? 4 D.
<i>xiphioides</i> Ehrh.	Hisp., Gall. 4 DF.
<i>Xiphium</i> L.	Hisp., Lusit. 4 DF.
(vide: <i>Diets</i> — <i>Moraea</i> — <i>Vieusseuxia</i>).	(<i>Cruciferae</i>)

Isatis Tourn.

<i>aleppica</i> Scop.	Graec. Oriens 4 D.
<i>alpina</i> All.	Pedemont. 2 D. A.
<i>banatica</i> Lk.	Eur. or-aust. 2 D.
<i>campestris</i> Stev.	Ruthenia 2 D.
<i>costata</i> C. A. Mey.	Sibir. alt. 2 D.

Isatis

<i>dasycarpa</i> Led.	Asia bor. 2 D.
<i>hebecarpa</i> DeC.	Tauria 2 D.
<i>iberica</i> Stev.	Cauc. Armen. 2 D.
<i>laevigata</i> Traut.	Asia bor. 2 D.
<i>litoralis</i> DeC.	Tauria 2 D.
<i>oblongata</i> DeC.	Asia bor. 2 D.
<i>praecox</i> Kit.	Eur. or-aust. 2 D.
<i>sabulosa</i> Stev.	Ruth. aust. 2 D.
<i>taurica</i> DeC.	" " 2 D.
<i>tinctoria</i> L.	Eur. med-aust. 2 D.
<i>Villarsii</i> Gaudich.	Eur. aust. 2 D.
<i>Ischaemum</i> L.	(<i>Graminae</i>)
<i>rugosum</i> Salisb.	Ind. or. 2 C.
<i>Ismelia</i> Cass.	(<i>Synanthreae</i>)
<i>versicolor</i> Cass.	Afr. aust. 2 D.
" <i>β. lutea</i> .	
<i>Isnardia</i> L.	(<i>Onagraceae</i>)
<i>alternifolia</i> DeC.	Am. bor-aust. 4 F. ∇
<i>palustris</i> L.	Eur. aust. 4 FD. ∇
<i>Isolepis</i> R. Br.	(<i>Cyperinae</i>)
<i>Eckloniana</i> Schrad.	Cap. b. sp. 2 CD.
<i>leptolaena</i> Schult.	Eur. aust. 2 CD.
<i>Michelliana</i> R. et S.	" " 2 CD.
<i>prolifera</i> R. Br.	Nov. Holl. 4 T.
<i>pygmaea</i> Kth.	Amer. aust. 2 CF.
<i>Saviana</i> Schult.	Eur. aust. 2 CD.
<i>setacea</i> R. Br.	Europa 2 D.
<i>venustula</i> Kth.	Cap. b. sp. 4 T.
<i>Isoplexis</i> Lindl.	(<i>Scrophulariaceae</i>)
<i>canariensis</i> Lindl.	Canariae 4 T.
<i>Sceptrum</i> Lindl.	Madera 4 T.
<i>Isotrema</i> Raf.	(<i>Aristolochiaceae</i>)
<i>Sipho</i> Raf.	Am. bor-aust. 4 DF.
<i>tomentosum</i> Spach	" " 4 DF.
<i>Isotoma</i> R. Br.	(<i>Lobeliaceae</i>)
<i>axillaris</i> Lindl.	Nov. Holl. 4 T.
<i>Itea</i> L.	(<i>Escalloniaceae</i>)
<i>virginica</i> L.	Am. bor-aust. 4 DF.
<i>Iva</i> L.	(<i>Synanthreae</i>)
<i>frutescens</i> L.	Am. bor-aust. 4 FD.
<i>Ixanthus</i> Griseb.	(<i>Gentianaceae</i>)
<i>viscosus</i> Griseb.	Canariae 4 T.
<i>Ixia</i> L.	(<i>Iridae</i>)
<i>alba</i> Eckl.	Cap. b. sp. 4 T.
<i>aristata</i> Thb.	" " 4 T.
<i>aulica</i> Ait.	" " 4 T.
<i>conica</i> Salisb.	" " 4 T.
<i>erecta</i> Berg.	" " 4 T.
<i>flexuosa</i> L.	" " 4 T.
<i>fucata</i> Ker.	" " 4 T.
<i>lilacina</i> Eckl.	" " 4 T.
<i>linearis</i> L. fil.	" " 4 T.
<i>maculata</i> L.	" " 4 T.
<i>polyantha</i> Bert.	" " 4 T.
<i>striata</i> Vahl.	" " 4 T.
(vide: <i>Babiana</i> — <i>Beilia</i> — <i>Galaxia</i> — <i>Montbretia</i> — <i>Ovieda</i> — <i>Romulea</i> — <i>Sparaxis</i>).	
<i>Ixiolirion</i> Fisch.	(<i>Amaryllidaceae</i>)

<i>Ixiolirion</i>		
montanum Herb.	Asia bor.	4 DF.
<i>Ixora</i> L.	(<i>Rubiaceae</i>)	
arboorea Roxb.	Ind. or.	5 C.
grandiflora Ker.	" "	5 C.
incarnata DeC.	" "	5 C.
<i>Jaborosa</i> Juss.	(<i>Solaniceae</i>)	
integrifolia Lam.	La Plata	4 F.
(vide: <i>Himeranthus</i>).		
<i>Jacaranda</i> Juss.	(<i>Bignoniaceae</i>)	
filicifolia D. Don	Guiana	5 C.
<i>Jacksonia</i> R. Br.	(<i>Papilionaceae</i>)	
scoparia R. Br.	Nov. Holl.	5 T.
<i>Jaegeria</i> Kth.	(<i>Synanthereae</i>)	
hirta Less.	Amer. trop.	5 CD.
<i>Jambosa</i> Rumph	(<i>Myrtineae</i>)	
australis DeC.	Nov. Holl.	5 T.
vulgaris DeC.	Ind. or.	5 C.
<i>Jasione</i> L.	(<i>Campanulaceae</i>)	
montana L.	Europa	5 D.
perennis Lam.	Eur. occ.	4 DF.
<i>Jasminum</i> Tourn.	(<i>Jasminiceae</i>)	
azoricum Vahl	Azorae	5 T.
flexile Vahl	Ind. or.	5 C.
fruticans L.	Eur. aust.	5 FD.
gracile Andr.	Nov. Holl.	5 T.
grandiflorum L.	Ind. or.	5 T.
hirsutum L.	" "	5 C.
humile L.	Madera	5 T.
nepalense Spr.	Nepalia	5 F.
odoratissimum L.	Madera	5 T.
officinale L.	Eur. aust.	5 FD.
pubigerum D. Don	Nepalia	5 F.
revolutum Sims	Ind. or.	5 F.
Sambac L.	" "	5 C.
simplicifolium Forst.	Polynesia	5 CT.
tortuosum W.	Cap. b. sp.	5 T.
volubile Jacq.	" "	5 T.
<i>Jasnia</i> Cass.	(<i>Synanthereae</i>)	
glutinosa DeC.	Eur. aust.	4 FD.
sicula DeC.	" "	5 CD.
tuberosa DeC.	Gall. Hispan.	4 DF.
<i>Jatropha</i> Kth.	(<i>Euphorbiaceae</i>)	
urens L.	Amer. trop.	5 C.
<i>Jeffersonia</i> Bart.	(<i>Berberideae</i>)	
diphylla Pers.	Am. bor. aust.	4 DF.
<i>Jirasekia</i> Schm.	(<i>Primulaceae</i>)	
tenella Rchb.	Eur. occ. au.	4 D. A.
<i>Jonidium</i> Vent.	(<i>Violaceae</i>)	
polygalaeifolium Vent.	Mexico	5 T.
<i>Juan-illoa</i> R. et P.	(<i>Solaniceae</i>)	
aurantiaca Brogn.	Peruvia	5 T.
<i>Juglans</i> L.	(<i>Juglandineae</i>)	
cinerea W.	Amer. bor.	5 D.
nigra L.	" "	5 D.
regia L.	Asia med.	5 D.
" β . maxima.		
(vide: <i>Carya</i>).		
<i>Juncus</i> Tourn.	(<i>Juncineae</i>)	
acutiflorus Ehrh.	Europa	4 D. V.
<i>Juncus</i>		
acutus L.	Eur. occ. aust.	4 DF.
alpinus Vill.	Alp. Subalp.	4 D. A.
Angelisii Ten.	Neapolis	4 F.
arcticus W.	Alpes	4 D. A.
aristulatus Mchx.	Am. bor. aust.	4 FD.
balticus Deth.	Germ. bor.	4 D.
bicornis Mchx.	Am. bor. aust.	4 DF.
bufonius L.	Europa	5 D. V.
conglomeratus L.	"	4 D. V.
effusus L.	"	4 D. V.
filiformis L.	Alp. Subalp.	4 D. A.
Gerardi Loisl.	Europa	4 D. V.
glaucus Sibth.	"	4 D.
inflexus L.	Eur. aust.	4 DF.
insularis Viv.	" "	5 FD.
lamprocarpus Ehrb.	Europa	4 D. V.
maritimus Lam.	"	4 D.
multiflorus Desf.	Eur. aust.	4 FD.
obtusiflorus Ehrh.	Europa	4 D. V.
pallidus R. Br.	Nov. Holl.	4 T.
trifidus L.	Alpes Sudet.	4 D. A.
<i>Juniperus</i> Tourn.	(<i>Cupressineae</i>)	
communis L.	Europa	5 D.
" β . suecica Mill.		
excelsa M. B.	Taur. Caucas.	5 DF.
Lycia L.	Eur. aust.	5 F.
macrocarpa S. et Sm.	Eur. aust. or.	5 F.
nana Schm.	Eur. med. mont.	5 D.
nepalensis H. Angl.	Nepalia	5 F.
phoenicea L.	Eur. aust.	5 F.
Pseudo-Sabina F. et M.	Sibir. aust.	5 DF.
Sabina L.	Eur. aust. mont.	5 D.
virginiana L.	Amer. bor.	5 D.
<i>Jurinea</i> Cass.	(<i>Synanthereae</i>)	
alata Cass.	Caucasia	5 D.
mollis Rchb.	Eur. or. aust.	4 D.
spectabilis F. et M.	Caucasus	4 DF.
subacaulis F. et M.	"	4 DF.
<i>Jussieuia</i> Houst.	(<i>Onagraceae</i>)	
acuminata Sw.	Ind. occ.	5 C.
angustifolia Lam.	Ind. or.	5 C.
erecta L.	Amer. trop.	5 C.
longifolia DeC.	Brasilia	5 C.
ovalifolia Sims	Madagascaria	5 C.
ramosa Jacq. f.	Brasilia	5 C.
scabra W.	"	4 C.
<i>Justicia</i> L.	(<i>Acanthineae</i>)	
bracteolata Jacq.	Amer. trop.	5 C.
carnea Lindl.	Brasilia	5 C.
elongata Vahl	Ind. or.	5 C.
formosa W.	Amer. trop.	5 C.
haematodes Schlicht.	Mexico	5 C.
hyssopifolia L.	Canariae	5 T.
nitida Jacq.	Ind. or.	5 C.
secunda Vahl	Ind. occ.	5 C.
(vide: <i>Adhatoda</i> — <i>Andrographis</i> — <i>Aphelandra</i> — <i>Beloperone</i> — <i>Birbaumia</i> — <i>Cryptophragmium</i> — <i>Dicliptera</i> — <i>Eranthemum</i> — <i>Gendarussa</i>		

Justicia		Kneiffia	
— Peristrophe —	Rhinacanthus —	glauca Spach	Am. bor. aust. 4 DF.
Schaueria).		gracilis Bartl.	Amer. bor. 4 DF.
Kaempferia L.	(Zingibereae)	maculata Spach	" " 4 DF.
Galanga L.	Ind. or. 4 C.	pumila Spach	" " 4 DF.
rotunda L.	" 4 C.	suffruticosa Spach	Am. bor. aust. 4 FD.
Kalanchoë Adans.	(Crassulaceae)	Kniphofia Mnch.	(Liliaceae)
aegyptiaca DeC.	Aegyptus 4 T.	aloides Mnch.	Cap. b. sp. 4 T.
laciniata DeC.	Java, Molucc. 4 C.	media Endl.	" " 4 T.
spathulata DeC.	China 4 TC.	Knowltonia Salisb.	(Ranunculineae)
Kalmia L.	(Ericaceae)	vesicatoria Sims	Cap. b. sp. 4 T.
angustifolia L.	Amer. bor. 4 DF.	Kochia Roth	(Chenopodiaceae)
" β . media	— γ . nitida.	arenaria Roth	Eur. aust. 4 D.
glauca Ait.	Amer. bor. 4 DF.	prostrata Schrad.	Eur. aust. Afr. 4 F.
latifolia L.	" 4 DF.	scoparia Schrad.	Eur. aust. Asia 4 D.
Kalbfussia Schultz	(Synanthereae)	virgata K.	" " 4 D.
Müller Schultz	Sardinia 4 D.	(vide: Echinopsilon).	
Salzmanni Schultz	Afr. aust. 4 D.	Koeleria Pers.	(Gramineae)
Kennedy Vent.	(Papilionaceae)	brachystachya DeC.	Pyrenaei 4 D.
apetala Lodd.	Nov. Holl. 4 T.	hispida L.	Eur. aust. 4 D.
commutata Tsch.	" " 4 T.	laxa Lk.	Aegyptus 4 D.
Maryattae Lindl.	" " 4 T.	phleoides Pers.	Eur. aust. 4 D.
nigricans Lindl.	" " 4 T.	(vide: Airochloa).	
prostrata R. Br.	" " 4 T.	Koelpinia Pall.	(Synanthereae)
rubicunda Vent.	" " 4 T.	linearis Pall.	Asia med. 4 D.
(vide: Hardenbergia — Leptocyanus Zichya).		Koelreuteria Laxm.	(Sapindineae)
Keutrophyllum Neck.	(Synanthereae)	paniculata Laxm.	China 5 DF.
lanatum DeC.	Eur. aust. 4 D.	Kohlrauschia Kth.	(Sileneae)
leucocaulon DeC.	" " 4 D.	prolifera Kth.	Europa 4 D.
tauricum F. et M.	Tauria 4 D.	velutina Rehb.	Eur. aust. 4 D.
Kernera Med.	(Cruciferae)	Koniga R. Br.	(Cruciferae)
saxatilis Rehb.	Alp. Subalp. 4 D. J.	maritima R. Br.	Eur. aust. 4 FD.
Keria DeC.	(Spiraeaceae)	nummularia Bge.	Aegyptus 4 D.
japonica DeC.	Japonia 4 DF.	Kosteletzky Prsl.	(Malvaceae)
" β . fl. pleno.		pentacarpa Led.	Eur. aust. or. 4 FD.
Kiggelaria L.	(Flacourtiaceae)	Krockeria Mnch.	(Papilionaceae)
africana L.	Cap. b. sp. 5 F.	edulis K.	Eur. aust. 4 D.
Kirilowia Bge.	(Chenopodiaceae)	Kruberia Hoffm.	(Umbelliferae)
eriantha Bge.	Songaria 4 D.	leptophylla Hoffm.	Eur. aust. 4 D.
pilosa Bge.	" 4 D.	Krynitzkia F. et M.	(Borragineae)
Kirschlegera Spach	(Onagraceae)	leiocarpa F. et M.	Nov. Califor. 4 D.
Lindleyi Spach	Mexico 4 T.	Kundmannia Scop.	(Umbelliferae)
lycioides Spach	Chili 4 F.	scicula DeC.	Eur. aust. 4 F.
Kitaibelia W.	(Malvaceae)	Kyllingia L. fil.	(Cyperineae)
vitifolia W.	Hungaria 4 DF.	cruciformis Schrad.	Amer. aust. 4 C.
Kleinia L.	(Synanthereae)	odorata Vahl	" " 4 C.
Anteuphorbium DeC.	Cap. b. sp. 4 T.	triceps Rottb.	Ind. or. 4 C.
articulata Haw.	" " 4 T.	Lablab Adans.	(Papilionaceae)
ficoides Haw.	" " 4 T.	nankinicus Sav.	China 4 CD.
Haworthii DeC.	" " 4 T.	vulgaris Sav.	Ind. or. 4 CD.
nerifolia Haw.	" " 4 T.	" β . purpureus	— γ . albislorus.
repens Haw.	" " 4 T.	Lachenalia Jacq.	(Liliaceae)
(vide: Porophyllum).		lucida Ker	Cap. b. sp. 4 T.
Knautia L.	(Dipsacineae)	orchioides Ait.	" " 4 T.
orientalis L.	Oriens 4 D.	pallida Ait.	" " 4 T.
(vide: Pteroccephalus — Trichera).		pendula Ait.	" " 4 T.
Kneiffia Spach	(Onagraceae)	quadricolor Jacq.	" " 4 T.
floribunda Spach	Am. bor. aust. 4 DF.	rubida Jacq.	" " 4 T.
Fraseri Spach	" " 4 DF.	tricolor Thb.	" " 4 T.
		Lachnaea L.	(Thymeleaceae)

Lachnaea				Lamium			
conglomerata L.	Cap. b. sp.	† T.		maculatum L.	Europa	‡ D.	
eriocephala L.	" "	† T.		niveum Schrad.	?	‡ D.	
purpurea Andr.	" "	† T.		rugosum Ait.	Eur. aust.	‡ D.	
Lactuca Tourn.	(<i>Synanthereae</i>)			purpureum L.	Europa	⊙ D.	
altissima M. B.	Caucasia	⊙ D.		(vide: Orvala).			
ambigua Schrad.	Eur. aust.	⊙ D.		Lantana L.	(<i>Verbenaceae</i>)		
augustana All.	" "	⊙ D.		aculeata L.	Amer. trop.	† C.	
elongata Mühlb.	Amer. bor.	⊙ D.		" β. pallida.			
Fischeriana DeC.	Sibiria	‡ D.		alba Mill.	" "	† C.	
maculata Horn.	?	⊙ D.		asperata Desf.	" "	† C.	
perennis L.	Europa	‡ D.		brasillosa Poepp.	Brasilia	† C.	
sagittata W. et K.	Hungaria	⊙ D.		Cammara L.	Amer. trop.	† C.	
saligna L.	Eur. med.	⊙ D.		" β. fl. roseo.			
sativa L.	Asia med.	⊙ D.		cinerea Lam.	" "	† C.	
" β. capitata DeC. — γ. laciniata Roth — δ. crispa Roth.				crenulata O. et D.	?	† C.	
Scariola L.	Europa	⊙ D.		Geroldiana O. et D.	Mexico	† C.	
stricta W. et K.	Eur. med. aust.	⊙ D.		glutinosa Poepp.	Peruvia	† C.	
undulata Led.	Sibir. altai.	⊙ D.		incana O. et D.	Mexico	† C.	
virgata H. Par.	?	⊙ D.		involucrata L.	Ind. occ.	† C.	
virosa L.	Eur. occ. aust.	⊙ D.		lilacina Desf.	Amer. aust.	† C.	
Ladanium Spach	(<i>Cistineae</i>)			melissaeifolia Ait.	Brasilia	† C.	
cyprum Spach	Cyprus, Or.	† F.		mista L.	Ind. occ.	† C.	
officinatum Spach	Hispan. Lusit	† F.		Moritziana O. et D.	Columbia	† C.	
Laelia Adans.	(<i>Cruciferae</i>)			multiflora Hort.	?	† C.	
orientalis Desv.	Eur. or. Asia	‡ D.		mutabilis Hook.	Ind. or.	† C.	
(vide: Amalias).				nivea Vent.	" "	† C.	
Lagascea Cav.	(<i>Synanthereae</i>)			" β. fl. carnea.			
mollis Cav.	Ind. occ.	⊙ CD.		purpurea Horn.	Amer. aust.	† C.	
Lagenaria Ser.	(<i>Cucurbitaceae</i>)			Radula Sw.	Ind. occ.	† C.	
idolatrata Ser.	Ind. or. Afr.	⊙ CD.		recta Ait.	" "	† C.	
vulgaris Ser.	Ind. or.	⊙ CD.		salviaefolia Jacq.	Afr. aust.	† T.	
" β. turbinata Ser. — γ. clavata Ser.	Ser. — γ. clavata			scabrida Ait.	Ind. occ.	† C.	
Lagerstroemia L.	(<i>Lythrineae</i>)			Sellowiana Lk. et O.	La Plata	† C.	
indica L.	China, Japon.	† F.		stricta Sw.	Ind. occ.	† C.	
Lagoecia L.	(<i>Umbelliferae</i>)			teucriifolia O. et D.	Mexico	† C.	
cuminoides L.	Eur. aust. Or.	⊙ D.		trifolia L.	Ind. occ.	† C.	
Lagopsis Benth.	(<i>Labiatae</i>)			variegata O. et D.	?	† C.	
incana Bge.	Sibir. altaica	‡ DF.		Lappa Tourn.	(<i>Synanthereae</i>)		
Lagunea Cav.	(<i>Malvaceae</i>)			major Gaertn.	Europa	⊙ D.	
lobata W.	Mascarenhas	⊙ C.		minor DeC.	"	⊙ D.	
Lagurus L.	(<i>Gramineae</i>)			tomentosa All.	"	⊙ D.	
ovatus L.	Eur. aust.	⊙ D.		Lappago Schreb.	(<i>Gramineae</i>)		
Lallemantia F. et M.	(<i>Labiatae</i>)			racemosa W.	Eur. aust.	⊙ D.	
canescens F. et M.	Oriens	⊙ D.		Lapsana Tourn.	(<i>Synanthereae</i>)		
iberica F. et M.	"	⊙ D.		communis L.	Europa	⊙ D.	
peltata F. et M.	"	⊙ D.		grandiflora M. B.	Taur. Cauc.	⊙ ‡ D.	
Lamarckia Mnch.	(<i>Gramineae</i>)			intermedia M. B.	"	⊙ ‡ D.	
aurea Mnch.	Eur. aust.	⊙ D.		Larhrea S. Hil.	(<i>Alsineae</i>)		
Lambertia Sm.	(<i>Proteaceae</i>)			Friesiana K.	Eur. bor.	‡ D. ∇	
echinata R. Br.	Nov. Holl.	† T.		glauca Godr.	Europa	‡ D. ∇	
formosa Sm.	"	† T.		graminea Godr.	"	‡ D.	
longifolia Lodd.	"	† T.		media Godr.	"	⊙ D.	
Lamium Tourn.	(<i>Labiatae</i>)			uliginosa Godr.	"	‡ D. ∇	
album L.	Europa	‡ D.		Larix Tourn.	(<i>Abietineae</i>)		
amplexicaule L.	"	⊙ D.		europaea DeC.	Europa	5 D.	
garganicum L.	Eur. aust.	‡ D.		microcarpa Poir.	Amer. bor.	5 D.	
longiflorum Ten.	"	‡ D.		Laserpitium Tourn.	(<i>Umbelliferae</i>)		
				angustifolium L.	Eur. aust.-or.	‡ DF.	
				asperum Crtz.	Europa	‡ D.	

Laserpitium

carniolicum Hladn.	Carniolia	4.D.4
gallicum L.	Eur. aust.	4.D.
glabrum Crtz.	Europa	4.D.
hirsutum Lam.	Alpes	4.D.4
hispidum M. B.	Taur.Caucas.	2.D.
marginatum W. et K.	Alpes	4.D.4
nitidum Zant.	Eur. aust.	2.D.
peucedanoides L.	Alpes	4.D.4
prutenicum L.	Eur. med.	4.D.
Siler L.	Alpes	4.D.4
Lasiagrostis Lk.	(Gramineae)	
altaica Schrad.	Sibir. aust.	4.D.
Calamagrostis Lk.	Eur. aust.	4.D.
splendens Kth.	Sibir. aust.	4.D.
Lasiandra DeC.	(Melastomaceae)	
argentea DeC.	Brasilia	4.C.
Lasiopetalum Sm.	(Bittneriaceae)	
ferrugineum Sm.	Nov. Holl.	4.T.
(vide: Rulingia — Thomasia).		
Lasiospermum Lag.	(Synanthereae)	
pedunculare Lag.	Cap. b. sp.	4.F.
radiatum Trev.	" "	2.FD.
Lasiopora Cass.	(Synanthereae)	
angustifolia Cass.	Caucasia	4.D.
latifolia F. et M.	Pers. bor.	4.DF.
Lasthenia Cass.	(Synanthereae)	
obtusifolia Cass.	Chili	4.CD.
(vide: Hologymne).		
Lathyrus Tourn.	(Papilionaceae)	
altaicus Led.	Sibir. aust.	4.D.
amphicarpos L.	Oriens	4.D.
angulatus L.	Eur. aust.	4.D.
annuus L.	" "	4.D.
Aphaca L.	" "	4.D.
armitaganeus K. et W.	Brasil. aust.	4.T.
articulatus L.	Eur. aust.	4.D.
azureus Hort.	?	4.D.
Cicera L.	Eur. aust.	4.D.
Clymenum L.	" "	4.D.
cornutus Horn.	" "	4.D.
ensifolius Bad.	Europa	4.D.
grandiflorus S. et Sm.	Graec. Neap.	4.DF.
heterophyllus L.	Eur. med. aust.	4.D.
hirsutus L.	Eur. aust.	4.D.
inconspicuus L.	Oriens	4.D.
incurvus Roth.	Asia bor.	4.D.
Langii K.	Hung. Dalm.	4.D.
latifolius L.	Eur. aust.	4.D.
leptophyllus M. B.	Caucasia	4.D.
longepedunculatus Led.	?	4.D.
odoratus L. et var.	Eur. aust.	4.D.
palustris L.	Europa	4.D.
pisiformis L.	Sibiria	4.D.
platyphyllos L.	Europa	4.D.
pratensis	" "	4.D.
purpureus Desf.	Eur. aust.	4.D.
sativus L. et var.	" "	4.D.
setifolius L.	" "	4.D.
sphaericus Retz.	" "	4.D.

Lathyrus

stans Vis.	Illyr. Dalm.	4.D.
sylvestris L.	Europa	4.D.
tingitanus L.	Afr. bor.	4.D.
tuberosus L.	Europa	4.D.
venosus Mühlb.	Amer. bor.	4.D.
(vide: Anurus — Ochrus).		
Laurentia Neck.	(Lobeliaceae)	
minuta DeC. f.	Cap. b. sp.	4.T.
tenella DeC. f.	Eur. aust.	4.F.
Laurus Tourn.	(Laurineae)	
nobilis L.	Eur. aust.	5.F.
(vide: Calosmon — Camphora — Cinnamonomum — Litsaea — Persea).		
Lavandula Tourn.	(Labiatae)	
coronopifolia Poir.	Oriens	4.F.
dentata L.	Eur. aust.	4.F.
elegans Desf.	Canariae	4.T.
latifolia Ehrh.	Eur. aust.	4.F.
multifida L.	" "	2.FD.
pinnata L. fil.	Canariae	4.T.
pubescens Decais.	Sinai	2.F.
Spica L.	Eur. aust.	4.D.
Stoechas L.	" "	4.F.
Lavatera L.	(Malvaceae)	
acerifolia Cav.	Canariae	4.T.
althaeaeifolia Mill.	Eur. aust.	4.CD.
cachemiriana Jacq.	Asia med.	4.CD.
hispidula Desf.	Afr. bor.	4.T.
lusitanica L.	Lusitania	4.F.
malacophylla K.	Eur. aust.	4.F.
micans L.	" "	4.F.
Olbia L.	" "	4.F.
" β . hybrida.		
plebeja Sims.	Nov. Holl.	4.CD.
salvitelensis Brign.	Italia	4.F.
thuringiaca L.	Eur. med.	4.D.
undulata Mill.	?	4.F.
unguiculata Desf.	Graecia	4.F.
(vide: Malva — Stegia).		
Lavauxia Spach	(Onagraceae)	
cuspidata Spach	Chili	4.FD.
mutica Spach	" "	4.FD.
Nuttalliana Spach	Texas	4.FD.
Lebeckia Thb.	(Papilionaceae)	
cytisoides Thb.	Cap. b. sp.	4.T.
pulchella E. Mey.	" "	4.T.
sericea Thb.	" "	4.T.
Lebretonia Schrk.	(Malvaceae)	
coccinea Schrk.	Brasilia	4.C.
Ledocarpon Desf.	(Ledocarpiaceae)	
pedunculare Lindl.	Chili	4.T.
Ledonia Dun.	(Cistineae)	
corbariensis Spach	Eur. aust-occ.	4.F.
hirsuta Spach	" "	4.F.
" β . hispida.	" "	4.F.
laxa Spach	" "	4.F.
" β . intermedia.	" "	4.F.
longifolia K.	" "	4.F.
salviaefolia K.	Eur. aust.	4.F.

- Ledonia**
 rugosa K. Eur. aust. h.F.
Ledum Rupp. (Ericaceae)
 latifolium Ait. Am. bor. h.DF.
 palustre L. Europa h.DF.
Leersia Soland. (Gramineae)
 oryzoides Sw. Europa h.D.▽
 virginica W. Amer. bor. h.D.▽
Leiophyllum Pers. (Ericaceae)
 thymifolium Pers. Am. bor. aust. h.DF.
Lemna L. (Lemnaceae)
 minor L. Europa h.D.▽
Lens Tourn. (Papilionaceae)
 esculenta Mnch. Eur. aust. h.D.
 " β. punctata — γ. nigra.
 Hohenackeri K. Armen. Pers. h.D.
 nigricans K. Eur. aust. h.D.
 Schreberi K. " " h.D.
Leonotis R. Br. (Labiateae)
 Leonurus R. Br. Cap. b. sp. h.T.
 nepetaefolia R. Br. Cap. Ind. h.CF.
Leontice L. (Berberideae)
 altaica Pall. Sibir. aust. h.D. h.
Leontodon L. (Synanthereae)
 asper Fisch. Eur. or. aust. h.D.
 Berinii Roth Eur. aust. h.DF.
 caucasicus Fisch. Caucasus h.D. h.
 croceus Haenk. Alpes h.D. h.
 crispus Vill. Alp. occ. aust. h.D. h.
 dubius Fisch. Europa h.D.
 hastilis L. " h.D.
 hispidus L. " h.D.
 " β. laciniatus.
 incanus Schrk. Alpes h.D. h.
 lucidus DeC. Italia h.DF.
 macrorrhizus Steud. " h.DF.
 Rosani DeC. " h.DF.
 saxatilis Rechb. Eur. aust. h.DF.
 squamosus L. Alp. Subalp. h.D. h.
 " β. crepidiformis.
 Taraxaci Loisl. Alpes h.D. h.
 Villarsii Loisl. Eur. aust. h.DF.
 (vide: Taraxacum).
Leontopodium R. Br. (Synanthereae)
 sibiricum Cass. Sibir. aust. h.DF.
Leonurus L. (Labiateae)
 altaicus Spr. Sibir. aust. h.D.
 Cardiac L. Europa h.D.
 caudatus H. Par. h.D.
 condensatus Horn Asia bor. h.D.
 crispus Murr. h.D.
 glaucescens Bge. Sibir. aust. h.D.
 lacerus Lindl. Nepalia h.D.
 multifidus Desf. Asia bor. h.D.
 neglectus Schrk. Europa h.D.
 tataricus L. Asia bor. h.D.
 villosus Desf. Tauria h.D.
 (vide: Chaiturus — Panzeria)
Lepechinia W. (Labiateae)
 spicata Ort. Mexico h.F.
- Lepia** Desv. (Cruciferae)
 campestris Desv. Europa h.D.
 Gussonei K. Sicilia h.D.
 hirta Desv. Eur. aust. h.D.
 sativa Desv. Oriens h.D.
 " β. crispa — γ. trivalvis — δ. la-
 tifolia. Oriens h.D.
 spinosa K. (Cruciferae)
Lepidium Tourn. Asia bor. h.D.
 amplexicaule W. Chili h.D.
 chilense Desf. Asia bor. h.D.
 cordatum W. Eur. or. aust. h.D.
 crassifolium W. et K. Chili h.F.
 Cunninghamianum F. et M. Asia bor. h.D.
 densiflorum Schrad. Cap. b. sp. h.F.
 Ecklonii Schrad. Eur. occ. aust. h.D.
 graminifolium L. Pyren. Hisp. h.F.
 heterophyllum Benth. Sibir. aust. h.D.
 lacerum C. A. Mey. Sibir. aust. h.D.
 latifolium L. Eur. med. aust. h.D.
 micranthum Led. Sibir. aust. h.D.
 perfoliatum L. Eur. aust. h.D.
 ruderales L. Europa h.D.
 sibiricum Schwg. Asia bor. h.D.
 suffruticosum L. Hispania h.F.
 (vide: Capsella — Cardaria — Cyno-
 cardamon — Ellipsaria — Hornungia
 — Lepia).
Lepidostephanus Bartl. (Synanthereae)
 madioides Bartl. California h.D.
Lepigonum, vide: Spergularia.
Lepismium Pfeif. (Castineae)
 commune Pfeif. Brasilia h.C.
 Myosurus Pfeif. " h.C.
 paradoxum Salm-D. " h.C.
Leptandra Nutt. (Scrophulariaceae)
 Meyeri G. Don Sibir. aust. h.D.
 sibirica Nutt. Asia bor. h.D.
 virginica Nutt. Amer. bor. h.D.
Leptochloa P. B. (Gramineae)
 domingensis Lk. Ind. occ. h.C.
 filiformis R. et S. Amer. trop. h.C.
 gracilis N. E. Brasilia h.C.
 mucronata Kth. Am. bor. aust. h.CD.
 tenerrima R. et S. Ind. or. h.C.
 virgata P. B. Ind. occ. h.C.
Leptocyamus Benth. (Papilionaceae)
 clandestinus Benth. Nov. Holl. h.T.
 microphyllus Benth. " h.T.
Leptopyrum Rechb. (Ranunculineae)
 fumarioides Rechb. Asia bor. h.D.
Leptormus DeC. (Cruciferae)
 pendulus E. et Z. Cap. b. sp. h.CD.
Leptosiphon Benth. (Polemoniceae)
 androsaceus Benth. California h.D.
 densiflorus Benth. " h.D.
Leptospermum Forst. (Myrtineae)
 aciculare Schau. Nov. Holl. h.T.
 attenuatum Sm. " h.T.
 buxifolium Wendl. " h.T.

Leptospermum				Leucadendron			
baccatum Sm.	Nov.	Holl.	h T.	squarrosus R. Br.	Cap. b. sp.	h T.	
Celsianum Ten.	"	"	h T.	tortum R. Br.	"	h T.	
emarginatum Wendl.	"	"	h T.	Leucaena Benth.	"	(Mimosaceae)	
flavescens Sm.	"	"	h T.	frondosa K.	Ind. or.	h C.	
glaucescens Schau.	"	"	h T.	glauca Benth.	Amer. trop.	h C.	
grandiflorum Lodd.	"	"	h T.	Linkii K.	"	h C.	
juniperinum Sm.	"	"	h T.	Leucanthemum Tourn	"	(Synanthereae)	
lanigerum Ait.	"	"	h T.	arcticum DeC.	Asia bor.	q D. J.	
β. latifolium.	"	"	h T.	atratum DeC.	Alpes	q D. J.	
myrtifolium. Sieb	"	"	h T.	cebenense DeC.	Gall. aust.	q DF.	
persicaeflorum Rehb.	"	"	h T.	graminifolium Lam.	Eur. aust.	q DF.	
pubescens Lam.	"	"	h T.	irkutianum DeC.	Asia bor.	q D.	
scoparium Sm.	"	"	h T.	montanum DeC.	Eur. aust.	q DF.	
squarrosus Gaertn.	"	"	h T.	sibiricum DeC.	Asia bor.	q D. J.	
stellatum Cav.	"	"	h T.	β. acutilobum.			
styphelioides Schau.	"	"	h T.	sinuatum DeC.	Sibir. aust.	q D.	
tonsum Schau.	"	"	h T.	vulgare Lam.	Europa	q D.	
villosus Schau.	"	"	h T.	β. fl. pleno.			
Lepturus R. Br.		(Gramineae)		Leucas R. Br.		(Labiatae)	
filiformis Trin.	Eur. aust.	⊙ D.		indica R. Br.	Ind. or.	⊙ CD.	
incurvatus Trin.	"	⊙ D.		martinicensis R. Br.	Ind. oce.	⊙ CD.	
pannonicus Kth.	"	⊙ D.		Schimperii Hochst.	Abyssinia	⊙ CD.	
subulatus Kth.	"	⊙ D.		zeylanica R. Br.	Ind. or.	⊙ CD.	
Lepyrodicles Fzl.		(Alsiaceae)		Leuceria Lag.		(Synanthereae)	
holosteoides Fzl.	Cauc. Armen.	⊙ D.		senecioides H. et A.	Chili	⊙ CD.	
stellarioides Schrenk	Sibir. aust.	⊙ D.		Leucocarpus D. Don		(Scrophulariaceae)	
Lerouxia Merat		(Primulaceae)		alatus D. Don	Mexico	⊙ FD.	
azorica K.	Azoriae	q T.		Leucojum L.		(Amaryllideae)	
nemorum Merat	Europa	q D. J.		aestivum L.	Eur. aust.	q D.	
Leschenaultia R. Br.		(Lobeliaceae)		vernum L.	Europa	q D.	
biloba Lindl.	Nov. Holl.	h T.		Leucopogon R. Br.		(Epacrideae)	
Drummondii Hort.	"	h T.		juniperinus R. Br.	Nov. Holl.	h T.	
formosa R. Br.	"	h T.		lanceolatus R. Br.	"	h T.	
oblata R. Br.	"	h T.		Richei R. Br.	"	h T.	
Lespedeza Mchx.		(Papilionaceae)		Leucopsidium DeC.		(Synanthereae)	
frutescens DeC.	Am. bor.-aust.	q FD.		arkansanum DeC.	Am. bor.-aus.	⊙ FD.	
juncea Pers.	Sibir. aust.	q DF.		Leucothoe D. Don.		(Ericaceae)	
longifolia DeC.	Louisiana	q DF.		axillaris D. Don	Am. bor.-aust.	h DF.	
polystachya Mchx.	Am. bor.-aust.	q DF.		buxifolia DeC.	Mascarenhas	h T.	
sessiliflora Nutt.	Am. bor.	q DF.		mariana DeC.	Am. bor.-aust.	h DF.	
villosa Pers.	Am. bor.-aust.	q DF.		Leuzea DeC.		(Synanthereae)	
Lessertia DeC.		(Papilionaceae)		altaica Fisch.	Sibir. aust.	q D.	
annua DeC.	Cap. b. sp.	⊙ CD.		carthamoides DeC.	Sibiria	q D.	
brachystachya DeC.	"	⊙ b T.		conifera DeC.	Eur. aust.-occ.	q DF.	
excisa DeC.	"	⊙ b T.		Levisticum Koch		(Umbelliferae)	
obtusata DeC.	"	⊙ b T.		officinale Koch	Eur. aust.	q D.	
perennans DeC.	"	q T.		Leycesteria Wall.		(Caprifoliaceae)	
Leucadendron Herm.		(Proteaceae)		formosa Wall.	Nepalia	h FD.	
abietinum R. Br.	Cap. b. sp.	h T.		Leyssera L.		(Synanthereae)	
adscendens R. Br.	"	h T.		capillifolia DeC.	Cap. b. sp.	⊙ CD.	
argenteum R. Br.	"	5 T.		gnaphalioides L.	"	b T.	
cinereum R. Br.	"	h T.		Liatris Schreb	"	(Synanthereae)	
floridum R. Br.	"	h T.		aspera Mchx.	Am. bor.-aust.	q DF.	
glabrum R. Br.	"	h T.		borealis Paxt.	Amer. bor.	q DF.	
Levisanus Berg.	"	h T.		macrostachya Mchx.	Am. bor.-aust.	q DF.	
marginatum Lk.	"	h T.		odoratissima W.	"	q DF.	
ovale R. Br.	"	h T.		pumila Lod.	"	q DF.	
plumosus R. Br.	"	h T.		spicata W.	"	q DF.	
salignum R. Br.	"	5 T.		squarrosa W.	"	q DF.	

- Libanotis** Crtz. (*Umbelliferae*)
 athamantoides DeC. Eur. aust. 4.D.
 buchformensis DeC. Asia bor. 4.D.
 condensata F. et M. " " 4.D.
 daucifolia Rchb. Eur. aust. 4.DF.
 montana All. Europa 4.D.
 " β . verticillata Wierzb.
 sibirica Koch Asia bor. 4.D.
 villosa Turcz. " " 4.D.
Libertia Spr. (*Iridaceae*)
 formosa Grah. Nov. Holl. 4.T.
 grandiflora R. Br. Nov. Zeel. 4.F.
 paniculata Spr. Nov. Holl. 4.T.
Lidbeckia Berg. (*Synantheraceae*)
 pectinata Berg. Cap. b. sp. 4.T.
Ligularia Cass. (*Synantheraceae*)
 altaica DeC. Sibir. aust. 4.D.
 macrophylla DeC. " " 4.D.
 renifolia C. A. Mey. Caucasus 4.D. A.
 robusta DeC. Sib. aust. 4.D.
 sibirica Cass. Eur. m. or. As. 4.D.
 speciosa F. et M. Sibir. aust. 4.D.
 thyrsioidea DeC. " " 4.D.
Ligusticum Tourn. (*Umbelliferae*)
 alatum Spr. Caucasus 4.D.
 pyrenaeum Gon. Pyrenaei 4.D.
 scoticum L. Eur. bor. Sib. 4.D. A.
 Seguieri Koch. Eur. aust. 4.DF.
 (vide: Cnidium — Malabaila — Molopospermum — Silaus).
Ligustridium Spach (*Oleaceae*)
 japonicum Spach Japonia 4.F.
 lucidum ~~4.F.~~ China 4.F.
Ligustrum Tourn. (*Oleaceae*)
 spicatum Ham. Nepalia 4.F.
 vulgare L. Europa 4.D.
Lilium Tourn. (*Liliaceae*)
 atrosanguineum Siebd. Japonia 4.DF.
 bulbiferum L. Eur. med. aust. 4.D.
 camtschatkense L. Camt. Am. bor. 4.D.
 canadense L. Amer. bor. 4.D.
 candidum L. Oriens 4.D.
 Catesbaei Walt. Am. bor. aust. 4.DF.
 chalcedonicum L. Eur. aust-or. 4.D.
 concolor Salisb. Cauc. China 4.DF.
 croceum Chaix. Eur. aust. 4.D.
 dahuricum Ker Sibir. aust. 4.DF.
 eximium Curt. Japonia 4.DF.
 longiflorum Thb. " 4.DF.
 Martagon L. Europa 4.D.
 " β . album — γ . aurantiacum δ . superbum.
 monadelphum M. B. Caucasus 4.DF.
 pomponium L. Asia med. 4.DF.
 peregrinum Mill. Oriens 4.DF.
 pumilum Red. Sibir. aust. 4.DF.
 pyrenaicum Gou. Pyrenaei 4.DF.
 " β . brevifolium H. Petr.
 spectabile Fisch. Sibir. aust. 4.D.
 superbum L. Amer. bor. 4.DF.
- Lilium**
 Szowitsianum F. et L. Colchis 4.DF.
 tenuifolium Fisch. Sibir. aust. 4.DF.
 tigrinum L. China, Jap. 4.DF.
 Limbarda Adans. (*Synantheraceae*)
 erithmoides K. Eur. aust. 4.DF.
 Limnanthemum Gmel. (*Menyantheae*)
 geminatum Grisb. Nov. Holl. 4.T. ∇
 Limnanthes R. Br. (*Lymnantheae*)
 Douglasii R. Br. Am. bor. occ. 4.D.
 Limoniastrum Mneh. (*Plumbagineae*)
 articulatum Mneh. Eur. aust. 4.F.
 Limosella L. (*Scrophulariaceae*)
 aquatica L. Europa 4.D. ∇
 Linaria Tourn. (*Scrophulariaceae*)
 acutiloba Fisch. Sibir. aust. 4.DF.
 albifrons Spr. Graecia 4.D.
 alpina Mill. Alpes 4.D. A.
 amethystina H. et Lk. Eur. aust-or. 4.D.
 aparinoides Spr. Sicil. Cypr. 4.D.
 bipartita W. Afr. bor. 4.D.
 bipunctata Dum-C. Hispania 4.D.
 capraria M. et DeN. J. Capraria 4.D.
 chalepensis Mill. Eur. aust. 4.D.
 chloraefolia Rchb. Tauria 4.D.
 dalmatica Mill. Eur. aust. 4.DF.
 delphinoidea Gay Hispania 4.D.
 flava Desf. Eur. aust. Afr. 4.D.
 genistaefolia Mill. Eur. or. 4.D.
 " β . procumbens H. Petr.
 italica Trev. Eur. aust. 4.DF.
 juncea Ait. " 4.D.
 linifolia Rchb. Eur. aust-or. 4.D.
 Loeselii Schwg. Germ. bor. occ. 4.D.
 macroura Rchb. Taur. Cauc. 4.D.
 micrantha Spr. Eur. aust. 4.D.
 parviflora Desf. Eur. aust. Afr. 4.D.
 Perezii Gay. Hispania 4.D.
 purpurascens Bhd. Eur. aust. 4.D.
 pyrenaica DeC. Pyrenaei 4.D. A.
 reflexa Desf. Eur. aust. 4.D.
 reticulata Desf. Lusit. Afr. bor. 4.D.
 silenifolia Fisch. Rumelia 4.DF.
 simplex DeC. Eur. aust. 4.D.
 striata DeC. " 4.D.
 " β . monspessulana " Chav."
 stricta Horn. Eur. aust. 4.D.
 supina Desf. " 4.DF.
 trionithophora W. Lusitania 4.F.
 triphylla Mill. Eur. aust. 4.D.
 tristis Mill. Hispania 4.F.
 versicolor Mneh. Gall. aust. 4.D.
 viscosa Dum-C. Hispania 4.D.
 vulgaris Mill. Europa 4.D.
 (vide: Chaenorhynchum — Cymbalaria — Elatine — Microrrhinum).
Lindenbergia Lehm. (*Scrophulariaceae*)
 urticaefolia Lehm. Ind. or. 4.D.
Linosyris Cass. (*Synantheraceae*)
 punctata Cass. Asia bor. 4.D.

Linowsyris				Litsaea Juss.	(<i>Laurineae</i>)
vulgaris Cass.	Europa	4 D.		glauca N. E.	Japonia 4 T.
Linum Tourn.		(<i>Linaceae</i>)		Lloydia Salisb.	(<i>Liliineae</i>)
acuminatum Ten.	Eur. aust.	⊙ D.		alpina Salisb.	Alpes 4 D. A.
aethiopicum Thb.	Cap. b. sp.	4 T.		Loasa Adans.	(<i>Loasaceae</i>)
africanum L.	Alpes "	4 T.		acerifolia Juss.	Chili ⊙ CD.
alpinum L.	Alpes "	4 D. A.		bryoniaefolia Schrad.	" ⊙ CD.
" β. montanum Schlei.				tricolor Ker	" ⊙ CD.
angustifolium Huds.	Eur. occ.	4 D.		triloba Juss.	Peruvia ⊙ CD.
arboresum L.	Creta	4 F.		Lobelia L.	(<i>Lobeliaceae</i>)
austriacum L.	Eur. or-aust.	4 D.		anceps Thb.	Cap. Nov. Holl. 4 T.
catharticum L.	Europa	⊙ D.		azurea Lindl.	Cap. b. sp. ⊙ 2 FD.
Cummingii Lodd.	Chili	4 T.		bicolor Curt.	" " ⊙ 4 FD.
diffusum Schult.	?	⊙ 4 D.		Cardinalis L.	Am. bor-aust. 4 FD.
flavum L.	Eur. or-aust.	4 D.		coerulea Hook.	Cap. b. sp. 4 F.
hirsutum L.	Eur. med-aus.	4 DF.		cuneifolia Lk.	" " 4 F.
humile Mill.	Eur. aust.	⊙ D.		Erinus L.	" " ⊙ 2 FD.
luteolum M. B.	Taur., Cauc.	⊙ D.		exaltata Pohl	Brasilia 4 C.
marginatum Poir.	Eur. aust-or.	4 D.		fenestralis Cav.	Mexico ⊙ F.
maritimum L.	Eur. austr.	4 FD.		fulgens W.	" 4 FD.
monogynum Forst.	Nov. Zeel.	4 4 F.		gracilis Andr.	Cap. b. sp. ⊙ CD.
nervosum W. et K.	Eur. or-aust.	4 D.		Hayneana Blum.	Ind. or. ⊙ CF.
nodiflorum L.	Eur. aust.	⊙ D.		hederacea Ait.	" 4 F.
pallescens Bge.	Sibir. aust.	4 DF.		heteromalla Schrad.	Cap. b. sp. 4 F.
perenne L.	Eur. or. Sibiria	4 D.		ilicifolia Ker	" 4 T.
punctatum Prsl.	Sicilia	4 FD.		inflata L.	Amer. bor. ⊙ DF.
quadrifolium L.	Cap. b. sp.	4 T.		laxiflora Kth.	Mexico 4 T.
suffruticosum L.	Hispania	4 F.		multiglandulosa Lk.	" 4 T.
tenuifolium L.	Eur. med-aus.	4 DF.		pubescens Ait.	Cap. b. sp. ⊙ 2 FD.
trigynum L.	Ind. or.	4 T.		ramosa Benth.	Mexico 4 FD.
usitatissimum L.	Eur. aust.	⊙ D.		splendens W.	" 4 FD.
β. fl. albo.				subnuda Benth.	" 4 FD.
Lippia L.		(<i>Verbenaceae</i>)		syphilitica L.	Amer. bor. 4 DF.
americana L.	Mexico	4 C.		triquetra L.	Cap. b. sp. 4 FD.
dulcis Trev.	Cuba	4 C.		urens L.	Eur. aust. ⊙ D.
filiformis Schrad.	Chili	4 T.		et plur. hybr. spec.	
nodiflora Rich.	Ind. occ.	4 C.		(vide: Centropogon — Enchysia —	
purpurea Jacq.	Mexico	4 C.		Hippobroma — Isotoma — Lauren-	
Schimper Hochst.	Abyssinia	4 C.		tia — Monopsis — Pratia — Tupa).	
Liquidambar L.		(<i>Balsamifluar</i>)		Lobostemon Lehm.	(<i>Boragineae</i>)
orientale Mill.	Oriens	4 F.		argenteus Buek	Cap. b. sp. 4 T.
styraciflua L.	Amer. bor.	5 D.		formosus Buek	" 4 T.
Liriodendron L.		(<i>Magnoliaceae</i>)		Lochnera Rebh.	(<i>Apocynaceae</i>)
tulipifera L.	Amer. bor.	5 D.		rosea Rebh.	Ind. or. 4 C.
Lissanthe R. Br.		(<i>Epacridae</i>)		" β. alba.	
ciliata R. Br.	Tasmania	4 T.		Loddigesia Sims	(<i>Papilionaceae</i>)
Lissochilos R. Br.		(<i>Orchideae</i>)		oxalidifolia Sims	Cap. b. sp. 4 T.
speciosus R. Br.	Afr. aust.	4 TC.		Loefflingia L.	(<i>Paromychiaceae</i>)
Listera R. Br.		(<i>Orchideae</i>)		hispanica L.	Eur. aust-occ. ⊙ D.
ovata R. Br.	Europa	4 D. A.		Loeselia L.	(<i>Polemoniaceae</i>)
Lithospermum Tourn.		(<i>Borraginaceae</i>)		coccinea G. Don	Mexico 4 T.
arvense L.	Europa	⊙ D.		Lolium L.	(<i>Gramineae</i>)
hypocrateriforme Schubl.	?	⊙ D.		arvense L.	Europa ⊙ D.
officinale L.	Europa	4 D.		" β. aristatum.	
purpureo-coeruleum L.	Eur. med-aust.	4 D.		Boucheanum Kth.	Eur. aust. 4 DF.
tenuiflorum L. fil.	Aegyptus	⊙ D.		complanatum Schrad.	" " ⊙ D.
(vide: Amsinckia — Cryptantha — Hip-				multiflorum Lam.	Eur. occ. ⊙ D.
poglossum — Rochelia).				perenne L.	Eur. bor. med. 4 D.
Lithraea Miers		(<i>Anacardiaceae</i>)		rigidum Gaud.	Eur. aust. ⊙ D.
venenosa Miers	Chili	4 T.		speciosum Stev.	Eur. aust-or. ⊙ D.

- Lolium**
temulentum L. Europa $\odot$ D.
Lomaria W. (*Polypodiaceae*)
australis Lk. Cap. b. sp. $\mathfrak{z}$ T.
Gilliesii H. et Gr. Chili $\mathfrak{z}$ T.
Spicant Desv. Europa $\mathfrak{z}$ D. J.
Lomatia R. Br. (*Proteaceae*)
longifolia R. Br. Nov. Holl. $\mathfrak{z}$ T.
silafolia R. Br. " $\mathfrak{z}$ T.
Lomatocarum F. et M. (*Umbelliferae*)
alpinum F. et M. Caucasus $\mathfrak{z}$ D. J.
Lomatophyllum W. (*Liliaceae*)
borbonicum W. Mascarenhas $\mathfrak{z}$ C.
Lonas Adans. (*Synanthereae*)
linodora Gaertn. Eur. aust. $\odot$ D.
Lonicera L. (*Caprifoliaceae*)
alpigena L. Alp. Subalp. $\mathfrak{z}$ D.
angustata Wendr. Sibiria $\mathfrak{z}$ D.
canescens Schousb. Sicilia, Afr. $\mathfrak{z}$ F.
caucasica Lodd. Caucasus $\mathfrak{z}$ D.
ciliata Mühlb. Amer. bor. $\mathfrak{z}$ D.
confusa DeC. Japon. China $\mathfrak{z}$ FD.
hispida Pall. Sibiria $\mathfrak{z}$ D.
iberica M. B. Armen., Georg. $\mathfrak{z}$ D.
Ledebourii Esch. Nov. Californ. $\mathfrak{z}$ DF.
nigra L. Europa $\mathfrak{z}$ D.
orientalis Lam. Oriens $\mathfrak{z}$ DF.
tatarica L. Asia bor. $\mathfrak{z}$ D.
" β . *pyrenaica* — γ . *sibirica*.
xylostoides Tsch. ? $\mathfrak{z}$ D.
Xylosteum L. Europa $\mathfrak{z}$ D.
(vide: *Caprifolium* — *Periclymenum* — *Xylosteum*).
Lopezia Cav. (*Onagraceae*)
coronata Andr. Mexico $\odot$ CD.
hirsuta Jacq. " $\odot$ CD.
racemosa Cav. " $\odot$ CD.
Lophanthus Benth. (*Labiatae*)
anisatus Benth. Am. bor.-aust. $\mathfrak{z}$ DF.
chinensis Benth. Chin. Sib. aust. $\mathfrak{z}$ D.
multifidus Benth. Sibir. aust. $\mathfrak{z}$ DF.
nepetoides Benth. Am. bor.-aust. $\mathfrak{z}$ DF.
rugosus F. et M. China bor. $\mathfrak{z}$ DF.
scrophulariaefolius Benth. Am. bo.-au. $\mathfrak{z}$ DF.
Lophospermum D. Don (*Scrophulariaceae*)
erubescens Don Mexico $\mathfrak{z}$ FD.
" β . *spectabile*.
scandens Don " $\mathfrak{z}$ FD.
Lotus Tourn. (*Papilionaceae*)
angustissimus L. Eur. aust. $\odot$ D.
arabicus L. Arabia $\odot$ CD.
ciliatus Ten. Sicilia $\mathfrak{z}$ FD.
coimbrensis Brot. Eur. aust. $\odot$ D.
corniculatus L. Europa $\mathfrak{z}$ D.
" β . *crassifolius* P. — γ . *vil-*
losus Thuil.
creticus L. Eur. aust., Or. $\mathfrak{z}$ F.
eytoides L. " " $\mathfrak{z}$ F.
glaberrimus DeC. " ? $\odot$ D.
glinoides DeC. Aegyptus $\odot$ CD.
- Lotus**
gracilis W. et K. Eur. or.-aust. $\odot$ D.
hispidus Desf. Gall. aust. $\odot$ D.
Jacobaeus L. Cap. b. sp. $\mathfrak{z}$ T.
major Scop. Europa $\mathfrak{z}$ D.
odoratus Sims Afr. bor. $\mathfrak{z}$ F.
ornithopodioides L. Eur. aust. $\odot$ D.
peregrinus L. " $\odot$ D.
suaveolens Poir. Gall. aust. $\mathfrak{z}$ DF.
tenuifolius Poll. Europa $\mathfrak{z}$ D.
(vide: *Anisolotus* — *Bonjeania* — *Dor-*
ryenium — *Hosackia* — *Kroeria* —
Tetragonolobus).
Lourea Neck. (*Papilionaceae*)
Vespertilionis Desv. Cochinchina $\odot$ C.
Lubinia Comm. (*Primulaceae*)
mauritanica Spr. Mascarenhas $\mathfrak{z}$ T.
Luculia Swt. (*Rubiaceae*)
gratissima Swt. Ind. or. $\mathfrak{z}$ C.
Luffa Tourn. (*Cucurbitaceae*)
acutangula Ser. Ind. or. $\odot$ C.
aegyptiaca Mill. Arab. Aegypt. $\odot$ C.
striata Schrad. Ind. or. $\odot$ C.
Lunaria Tourn. (*Cruciferae*)
biennis Mnh. Eur. occ.-aust. $\mathfrak{z}$ D.
rediviva L. Eur. med.-aust. $\mathfrak{z}$ D.
Lunularia Mich. (*Marchantiaceae*)
vulgaris Mich. Eur. aust. $\mathfrak{z}$ DF.
Lupinaster Mnh. (*Papilionaceae*)
pentaphyllus Mnh. Asia bor. $\mathfrak{z}$ D.
" β . *albens*.
Lupinus Tourn. (*Papilionaceae*)
albus L. Eur. aust. $\odot$ D.
angustifolius L. " $\odot$ D.
arbores Sims Mexico $\mathfrak{z}$ FD.
bicolor Lindl. Am. bor.-occ. $\odot$ D.
Douglasii Agd. California $\mathfrak{z}$ FD.
flexuosus Dougl. Am. bor.-occ. $\mathfrak{z}$ DF.
grandifolius Lindl. " $\mathfrak{z}$ D.
" β . *atropurpureus*.
Hartwegii Lindl. Mexico $\odot$ $\mathfrak{z}$ FD.
hirsutus L. Eur. aust. $\odot$ D.
lepidus Dougl. Amer. bor. $\mathfrak{z}$ DF.
linifolius Roth Sardin. Sicil. $\odot$ D.
litoralis Dougl. Am. bor.-occ. $\mathfrak{z}$ D.
lituratus Rchb. ? $\odot$ D.
lucidus Benth. California $\mathfrak{z}$ DF.
luteus L. Eur. aust.-occ. $\odot$ D.
Marschallianus Swt. ? $\mathfrak{z}$ D.
micranthus Dougl. Am. bor.-occ. $\odot$ D.
microcarpus Sims Chili $\odot$ D.
Milleri Hort. ? $\mathfrak{z}$ D.
" β . *bicolor*.
mutabilis Swt. Columbia $\odot$ D.
" β . *Cruikshanksii* Hook.
nanus Benth. California $\odot$ D.
nutcatensis Don Am. bor.-occ. $\mathfrak{z}$ D.
perennis L. Amer. bor. $\mathfrak{z}$ D.
pilosus L. Eur. aust. $\odot$ D.
polyphyllus Dougl. Am. bor.-occ. $\mathfrak{z}$ D.

- Lapinus**
 polyphyllus Dougl. β . albus — γ . bicolor
 — δ . speciosus.
 pulchellus Swt. Mexico 2 DF.
 rivularis Dougl. California 2 DF.
 " β . bicolor — γ . albus.
 succulentus Lindl. Chili ② D.
 Termis Forsk. Aegyptus ② D.
 tristis Benth. California 2 DF.
 (Resedaceae)
Luteola Tourn.
 crispata K. Sicilia ② D.
 tinctoria Mnch. Europa ② D.
 virescens K. Aegyptus ② D.
Luzula DeC. (Juncineae)
 albida Desv. Europa 2 D.
 " β . cuprina Rochl.
 campestris Desv. Europa 2 D.
 flavesceus Gaud. Alpes 2 D. A.
 Forsteri Desv. Eur. aust. Afr. 2 F.
 hyperborea R. Br. Eur. bor. 2 D. A.
 maxima W. Europa 2 D. A.
 nivea Desv. Alpes 2 D. A.
 pediformis DeC. Delph. Pyre. 2 D. A.
 pilosa W. Europa 2 D.
 spadicea Desf. Alp., Subalp. 2 D. A.
 spicata Desv. " " 2 D. A.
Lychnis Tourn. (Sileneae)
 Bungeana Fisch. China bor. 2 DF.
 chalcadonica L. et var. Asia med. 2 D.
 fulgens Fisch. Sibir. aust. 2 DF.
 grandiflora Jacq. China, Japon. 2 F.
 (vide: Agrostemma — Coccyanthe —
 Coronaria — Diosanthe — Eudianthe —
 Heliosperma — Melandryum — Petro-
 coptis — Viscaria).
Lyciopsis Spach (Onagraceae)
 baccularis K. Chili 2 F.
 thymifolia Spach Mexico 2 F.
Lycium L. (Solaniceae)
 afrum L. Afr. bor. 2 F.
 barbarum Mill. Eur. aust., Afr. 2 D.
 carolinianum Walt. Am. bor. aust. 2 DF.
 chilense Miers Chili 2 F.
 chinense Mill. China bor. 2 DF.
 europaeum L. Eur. aust. 2 DF.
 lanceolatum Poir. " " 2 DF.
 rigidum Thb. Cap. b. sp. 2 F.
 ruthenicum Murr. Ruth. aust., Sib. 2 D.
 tenue W. Cap. b. sp. 2 T.
 Trewianum R. et S. China 2 F.
 (vide: Grabowsky).
Lycopersicum Tourn. (Solaniceae)
 cerasiforme Dun. Amer. aust. ② CD.
 esculentum Mill. " " ② CD.
 Humboldtii Dun. " " ② CD.
 pyriforme Dun. " " ② CD.
Lycopodium Dillen. (Lycopodiaceae)
 alpinum L. Alp., Subalp. 2 D. A.
 clavatum L. Europa 2 D. A.
 (vide: Huperzia — Selaginella).
Lycopsis L.
 arvensis L.
 crispa Bert.
 variegata L.
 (vide: Nonnea).
Lycopus Tourn. (Labiatae)
 europaeus L. Europa 2 D.
 exaltatus L. fil. Eur. aust. 2 D.
 sinuatus Ell. Am. bor. aust. 2 DF.
 virginicus L. " " 2 DF.
Lycoris Herb. (Amaryllideae)
 aurea Herb. China 2 T.
Lygeum Loeffl. (Gramineae)
 spartum L. Hisp., Lusit. 2 F.
Lygodium Sw. (Aneimiaceae)
 microphyllum R. Br. Australia 2 C.
Lyonia Nutt. (Ericaceae)
 ligustrina DeC. Amer. bor. 2 DF.
Lyperia Benth. (Scrophulariaceae)
 pinnatifida Benth. Cap. b. sp. 2 T.
 violacea Benth. " " 2 T.
Lyssimachia Tourn. (Primulaceae)
 ciliata L. Amer. bor. 2 D.
 longifolia Pursh " " 2 D.
 Nummularia L. Europa " 2 D.
 punctata L. Eur. or. 2 D.
 verticillata Pall. Tauria 2 D.
 vulgaris L. Europa 2 D.
 (vide: Asterolinum — Ephemerum —
 Lerouxia — Naumburgia).
Lysinema R. Br. (Epacrideae)
 pungens R. Br. Nov. Holl. 2 T.
Lythrum L. (Lythrineae)
 alatum Pursh. Georgia, Mex. 2 T.
 diffusum Swt. Amer. bor. 2 D.
 Graefferi Ten. Eur. aust. ② D.
 Hyssopifolia L. Europa ② D.
 Salicaria L. " " 2 D.
 " β . gracile DeC. — γ . hexago-
 num Bercht.
 Thymifolia L. Eur. aust. ② D.
 tomentosum Mill. Taur., Caucas. 2 D.
 virgatum L. Europa 2 D.
Macleaya R. Br. (Papaverineae)
 cordata R. Br. China bor. 2 DF.
Macropodium R. Br. (Cruciferae)
 nivale R. Br. Sibir. aust. 2 D. A.
Macrorhynchium Less. (Synanthereae)
 laevigatum F. et M. Chili ② CD.
 pterocarpum F. et M. " " ② CD.
Madaria DeC. (Synanthereae)
 elegans DeC. California ② D.
Madia Mol. (Synanthereae)
 sativa Mol. Chili ② D.
 stellata F. et M. " " ② D.
 viscosa Cav. " " ② D.
Magnolia L. (Magnoliaceae)
 acuminata L. Amer. bor. 5 DF.
 conspicua Salisb. China 5 F.
 cordata Michx. Amer. bor. 5 DF.

Magnolia

fusca Andr.	China	⊥ F.
glaucula L.	Am. bor. aust.	5 DF.
grandiflora L.	Carol., Florida	5 F.
Kobus DeC.	Japonia	5 DF.
obovata Thb.	"	⊥ DF.
Umbrella Lam.	Amer. bor.	5 DF.
Mahernia L.	(<i>Hermanniaceae</i>)	
fragrans Rehb.	Cap. b. sp.	⊥ T.
glabrata Cav.	" "	⊥ T.
incisa Jacq.	" "	⊥ T.
pinnata L.	" "	⊥ T.
Mahonia Nutt.	(<i>Berberideae</i>)	
Aquifolium Nutt.	Am. bor. occ.	⊥ DF.
fascicularis DeC.	" "	⊥ DF.
Mairia DeC.	(<i>Synanthereae</i>)	
taxifolia DeC.	Cap. b. sp.	⊥ T.
Majanthemum Wigg.	(<i>Smilacineae</i>)	
bifolium DeC.	Europa	⊥ D.
Majorana Tourn.	(<i>Labiatae</i>)	
conferta K.	Oriens	⊥ F.
crassifolia Benth.	"	⊥ F.
hortensis Mnch.	Oriens, Afr.	⊙ CD.
nerosa Benth.	Arab., Aeg.	⊥ F.
Onites Benth.	Eur. aust. or.	⊥ F.
smyrnaea N. E.	Oriens	⊥ F.
Malabaila Tsch.	(<i>Umbelliferae</i>)	
Hacquetii Tsch.	Carniolia	⊥ D. √
Malachium Fries	(<i>Alsiaceae</i>)	
aquaticum Fries	Europa	⊥ D. √
Malacha L.	(<i>Malvaceae</i>)	
alceaefolia L.	Columbia	⊙ C.
capitata L.	Ind. or.	⊙ C.
fasciata Jacq.	Amer. trop.	⊙ C.
radiata L.	" "	⊙ C.
triloba Desf.	" "	⊙ C.
Malcolmia R. Br.	(<i>Cruciferae</i>)	
africana R. Br.	Eur. aust. Afr.	⊙ D.
" β. divaricata.		
chia DeC.	Graecia, Or.	⊙ D.
laxa DeC.	Sibir. aust.	⊙ D.
maritima R. Br.	Eur. aust.	⊙ D.
stenopetala Bhd.	" "	⊙ D.
Malope L.	(<i>Malvaceae</i>)	
trifida Cav.	Hisp., Afr. bor.	⊙ D.
" β. grandiflora.		
Malpighia L.	(<i>Malpighiaceae</i>)	
aquifolia L.	Amer. trop.	⊥ C.
coccifera L.	" "	⊥ C.
glabra L.	" "	⊥ C.
Malva Tourn.	(<i>Malvaceae</i>)	
abyssinica A. Braun	Abyssinia	⊙ D.
aegyptiaca L.	Hisp. Afr. bor.	⊙ D.
Alcea L.	Europa	⊥ D.
americana L.	Ind. occ.	⊙ CD.
" β. alnifolia.		
antillarum Zuccg.	Ind. occ.	⊙ CD.
arborescens Dill.	Eur. aust.	⊙ ⊥ FD.
asperima Jacq.	Cap. b. sp.	⊥ F.
balsamica Jacq.	" "	⊥ F.

Malva

betuloides Schrad.	Java	⊙ ⊥ C.
Biasoletiana Kze.	Eur. aust.	? ⊙ D.
borbonica W.	Mascarenhas	⊥ C.
borealis Wallm.	Eur. bor. med.	⊙ D.
brasiliensis Desv.	Brasilia	⊙ ⊥ C.
capensis Cav.	Cap. b. sp.	⊥ F.
capitata Cav.	Peruvia	⊥ C.
collina Mor.	Italia	⊙ D.
concinna K. et W.	Amer. aust.	⊥ T.
cordifolia H. Ber.	"	? ⊙ D.
Creeana Hook.	"	? ⊥ T.
crispa Cav.	Oriens	⊙ D.
cymbalariaefolia Desv.	"	⊥ F.
divaricata Andr.	Cap. b. sp.	⊥ F.
excelsa Presl	Sicilia	⊙ D.
fastigiata Cav.	Eur. aust.	⊥ FD.
fragrans Jacq.	Cap. b. sp.	⊥ F.
gangetica L.	Ind. or.	⊙ CD.
grossulariaefolia Cav.	Cap. b. sp.	⊥ F.
italica Pollin.	Eur. aust.	⊥ DF.
lasiomelanocarpa Savi	"	? ⊥ F.
limensis L.	Peruvia	⊙ D.
lobata Cav.	Eur. aust. occ.	⊥ FD.
mauritania L.	Eur. aust. Afr.	⊙ D.
microcarpa Desf.	Aegyptus	⊙ D.
Morenii Pall.	Italia	⊥ DF.
moschata L.	Eur. occ.	⊥ DF.
" β. laciniata Desv.		
nepalensis Sm.	Nepalia	⊙ D.
nicaeensis All.	Eur. aust.	⊙ D.
ovata Cav.	Brasilia	⊙ ⊥ C.
oxyacanthoides Horn.	Cap. b. sp.	⊥ F.
parviflora L.	Eur. aust. Afr.	⊙ D.
peruviana L.	Peruvia	⊙ D.
polystachya Cav.	"	⊥ C.
Pseudo-Lavatera WetB.	Creta, Canar.	⊙ D.
pulchella Bhd.	Nepal., China	⊙ D.
purpurata Lindl.	Chili	⊥ T.
reversa Hort.	Cap. b. sp.	⊥ F.
rotundifolia L.	Europa	⊙ ⊙ D.
scabra Cav.	Peruvia	⊥ C.
scabrosa Bert.	Cap. b. sp.	⊥ F.
serrata H. Par.	"	? ⊥ T.
spicata L.	Ind. occ.	⊙ ⊥ C.
stricta Jacq.	Cap. b. sp.	⊥ F.
subtriflora Lag.	Mexico	⊥ T.
sylvestris L.	Europa	⊙ ⊙ D.
Tenoreana K.	Sicil., Neap.	⊥ F.
tricuspidata R. Br.	Ind. occ.	⊙ CD.
verticillata L.	China	⊙ D.
virgata Cav.	Cap. b. sp.	⊥ F.
(vide: Modiola — Sphaeralcea).		
Malvaviscus Dillen.	(<i>Malvaceae</i>)	
angulatus K.	Amer. trop.	⊥ C.
arborescens Cav.	" "	5 C.
cordatus K.	" "	⊥ C.
mollis DeC.	" "	⊥ C.
tomentosus K.	" "	⊥ C.
Mammillaria Haw.	(<i>Cactineae</i>)	

Mammillaria				Maranta			
auriceps Lem.	Mexico	♂ F.		arundinacea L.	Ind. occ.	♂ C.	
cirrhiifera Mart.	"	♂ F.		Tonchat Aubl.	Amer. trop.	♂ C.	
columnaris Mart.	"	♂ F.		(vide: Calathea).			
cornifera DeC.	"	♂ F.		Margyricarpus R. et P. (<i>Sanguisorbaceae</i>)			
coronaria Haw.	"	♂ F.		setosus R. et P.	Peruvia, Chili	♂ T.	
densa Lk. et O.	"	♂ F.		Marianthemum Schrk. (<i>Campanulaceae</i>)			
discolor Haw.	"	♂ F.		alpinum K.	Alpes	♂ D. J.	
dolichocentra Lem.	"	♂ F.		barbatum K.	"	♂ D. J.	
echinata DeC.	"	♂ F.		dichotomum K.	Eur. aust.	⊙ D.	
elongata DeC.	"	♂ F.		divergens K.	Eur. or. aust.	⊙ D.	
erianantha Otto	"	♂ F.		grandiflorum K.	Eur. aust.	⊙ D.	
flavescens DeC.	"	♂ F.		Grosseckii K.	Banatus	♂ D.	
fulvispina Haw.	"	♂ F.		laciniatum K.	Graecia	⊙ FD.	
Gallioti H. Drsd.	"	♂ F.		lamiifolium K.	Asia bor.	♂ D.	
glochidiata Mart.	"	♂ F.		lingulatum K.	Croat. Dalm.	⊙ FD.	
gracilis Pfeif.	"	♂ F.		sarmaticum K.	Caucasia	♂ DF.	
inuncinata Lem.	"	♂ F.		saxifragum K.	"	♂ D. J.	
Karwinskiana Mart.	"	♂ F.		sibiricum K.	Eur. m.-au. Asia	⊙ D.	
longimamma Haw.	"	♂ F.		tomentosum K.	Oriens	⊙ FD.	
obscura Scheidw.	"	♂ F.		Marianthus Hügl. (<i>Pilosporineae</i>)			
Oderiana Lem.	"	♂ F.		coeruleo-punctatus L. K. O. Tasmania	♂ F.		
parvimamma Haw.	Ind. occ.	♂ F.		Marica, vide: Cipura — Phalocallis.			
phaeacantha Lem.	Mexico	♂ F.		Mariscus Vahl. (<i>Cyperineae</i>)			
polyedra Mart.	"	♂ F.		aggregatus W.	Mexico	♂ C.	
polythele Mart.	"	♂ F.		ovularis Vahl	Am. bor.-aust.	♂ F.	
prolifera Haw.	Amer. aust.	♂ C.		patulus Schrad.	Amer. aust.	⊙ ♂ C.	
pusilla DeC.	Ind. occ.	♂ C.		umbellatus Vahl	Ind. or.	⊙ ♂ C.	
quadrispina Mart.	Mexico	♂ F.		Marrubium Tourn. (<i>Labiatae</i>)			
rhodantha Lk. et O.	"	♂ F.		affine Horn	?	♂ D.	
" β. Andreae Otto — γ. Wend-				Alyssum L.	Eur. aust.	♂ DF.	
landii.				apulum Ten.	"	♂ D.	
Schelhasii Pfeif.	Mexico	♂ F.		astracanicum Jacq.	Caucasus	♂ D.	
Schiedeana Ehrbg.	"	♂ F.		candidissimum L.	Eur. aust.	♂ DF.	
setosa Pfeif.	"	♂ F.		catariaefolium Desv.	Oriens	♂ DF.	
simplex Haw.	Ind. occ.	♂ F.		incanum Desr.	Eur. aust.	♂ DF.	
Stella aurata Mart.	Mexico	♂ F.		leonuroides Desr.	Caucasus	♂ D.	
subcrocea DeC.	"	♂ F.		paniculatum Desr.	Eur. med. aust.	♂ D.	
subpolyedra Salm-D.	"	♂ F.		parviflorum F. et M.	Caucasia	♂ D.	
tentaculata Lk. et O.	"	♂ F.		persicum C. A. Mey.	Pers. bor.	♂ DF.	
tenuis DeC.	"	♂ F.		peregrinum L.	Eur. aust.	♂ D.	
triacantha DeC.	"	♂ F.		propinquum F. et M.	Caucasia	♂ D.	
vetula Mart.	"	♂ F.		sericeum Boiss.	Hispania	♂ FD.	
vivipara Haw.	Louisiana	♂ F.		supinum L.	Eur. aust.	♂ D.	
Wildiana Otto	Mexico	♂ F.		yulgare L.	Europa	♂ D.	
Mandevilla Lindl. (<i>Apocynaceae</i>)				(vide: Beringeria — Lagopsis).			
suaveolens Lindl.	La Plata	♂ T.		Martynia L. (<i>Pedaliineae</i>)			
Mandragora Tourn. (<i>Solaniceae</i>)				diandra Glox.	Mexico	⊙ C.	
vernalis Bertol.	Eur. aust.	♂ FD.		fallax Kze.	"	⊙ C.	
Manettia Mut. (<i>Solaniceae</i>)				fragrans Lindl.	"	⊙ C.	
glabra Ch. et S.	Brasilia	♂ C.		proboscidea Glox.	"	⊙ C.	
Manglesia Endl. (<i>Proteaceae</i>)				Maruta Cass. (<i>Synanthereae</i>)			
cuneata Endl.	Nov. Holl.	♂ T.		Cotula DeC.	Europa	⊙ D.	
Mantisia Sims (<i>Zingibereae</i>)				fuscata DeC.	Eur. aust.	⊙ D.	
saltatoria Sims	Ind. or.	♂ C.		lithuanica Bess.	Eur. or.	⊙ D.	
Manulea, vide: Lyperia — Palmstruckia —				Matricaria Tourn. (<i>Synanthereae</i>)			
Sphenandra.				capensis L.	Cap. b. sp.	♂ T.	
Marchantia March. (<i>Marchantiaceae</i>)				Chamomilla L.	Europa	⊙ D.	
polymorpha L.	Europa	♂ D. ∇		inodora L.	"	⊙ D.	
Maranta Plum. (<i>Cannaceae</i>)				pusilla W.	Eur. aust.-or.	⊙ D.	

Matricaria		
(vide: Cenocline — Sphaeroclinium).		
Matthiola R. Br.	(Cruciferae)	
annua Swt.	Eur. aust.	⊙ D.
β. hybrida.		
arborescens Schrad.	Sibir. "	† F.
deflexa Bge.	Sibir. aust.	② † FD.
fenestralis R. Br.	Creta	② FD.
glabrata DeC.	Eur. aust.	② † FD.
gracca Swt.	" "	② † FD.
incana R. Br.	" "	② † FD.
parviflora R. Br.	Hispania	⊙ D.
patens Prsl.	Sicilia	⊙ D.
rupestris DeC.	"	† F.
saxatilis Bhd.	Lusitania	② † FD.
sinuata R. Br.	Eur. aust.	② FD.
tortulosa DeC.	Cap. b. sp.	† T.
tricuspidata R. Br.	Eur. aust.	⊙ D.
Mattia Schult.	(Borragineae)	
Columnae G. Don	Italia	② FD.
magellensis G. Don	Nepalia	② FD.
umbellata Schult.	Hungaria	‡ DF.
Maurandia Ort.	(Scrophulariaceae)	
antirrhiniflora W.	Mexico	† FD.
Barclayana Lindl.	"	† FD.
β. rosea.		
semperflorens Ort.	"	† FD.
Maxillaria R. et P.	(Orchideae)	
aromatica Grah.	Mexico	‡ C.
Barringtoniae Lodd.	Ind. occ.	‡ C.
decolor Lindl.	"	‡ C.
guttata Hort.	Brasilia	‡ C.
Harrisoniae Lindl.	"	‡ C.
picta Hook.	"	‡ C.
tetragona Lindl.	"	‡ C.
Mazus Lour.	(Scrophulariaceae)	
rugosus Lour.	Asia aust.	⊙ CD.
Meconopsis Vig.	(Papaverinae)	
cambrica Vig.	Angl. Pyren.	‡ D. A.
Medicago Tourn.	(Papilionaceae)	
aculeata W.	Eur. aust.	⊙ D.
apiculata W.	" "	⊙ D.
arboorea L.	" "	† F.
arenaria Ten.	Neapolis	⊙ D.
Berteroniana Moris	Chili	⊙ D.
Bonplandiana H. Par.	La Plata	⊙ D.
canellata M. B.	Caucasus	‡ D.
carstiensis Wulf.	Carinthia	‡ D.
caspica Fisch.	Caspia	⊙ D.
ciliaris W.	Eur. aust.	⊙ D.
coronata Lam.	"	⊙ D.
cretacea M. B.	Tauria	‡ D.
denticulata W.	Eur. aust.	⊙ D.
disciformis DeC.	"	⊙ D.
distans Poir.	"	⊙ D.
Echinus DeC.	Gall. aust.	⊙ D.
elegans Jacq.	Eur. aust.	⊙ D.
falcata L.	Europa	‡ D.
Gerardi W. et K.	Eur. aust.	⊙ D.
glomerata Balb.	Pedemont.	‡ DF.

Medicago		
glutinosa M. B.	Caucasus	‡ DF.
granatensis W.	Hispania	⊙ D.
intertexta W.	Eur. aust.	⊙ D.
laciniata All.	" "	⊙ D.
lappacea Desr.	" "	⊙ D.
litoralis Rohd.	" "	⊙ D.
maculata W.	" "	⊙ D.
marginata W.	" "	⊙ D.
marina L.	" "	‡ F.
media Pers.	Europa	‡ D.
minima L.	"	⊙ D.
β. longiseta.		
mollissima Roth	Eur. aust.	⊙ D.
Murex W.	" "	⊙ D.
muricoleptis Tin.	Sicilia	⊙ D.
nigra W.	Gall. aust.	⊙ D.
obscura Retz	" "	⊙ D.
orbicularis L.	Eur. aust.	⊙ D.
praecox DeC.	Gall. aust.	⊙ D.
prostrata Jacq.	Eur. or-aust.	‡ D.
rigidula Desr.	Gall. aust.	⊙ D.
sardoa Moris	Sardinia	⊙ D.
sativa L.	Europa	‡ D.
β. chilensis.		
scutelloides All.	Eur. aust.	⊙ D.
sphaerocarpa Bert.	" "	⊙ D.
spinulosa DeC.	" "	⊙ D.
striata Bast.	" "	⊙ D.
strumaria Horn.	" "	⊙ D.
Tenoreana Ser.	Neapolis	⊙ D.
Terebellum W.	Eur. aust.	⊙ D.
tornata Desr.	" "	⊙ D.
β. minor.		
tribuloides Desr.	Gall. aust.	⊙ D.
truncatula Gaertn.	Eur. aust.	⊙ D.
tuberculata W.	" "	⊙ D.
turbinata W.	" "	⊙ D.
uncinata W.	" "	⊙ D.
(vide: Hymenocarpus — Melilotus — Nephromedica).		
Melaleuca L.	(Myrtineae)	
armillaris Sm.	Nov. Holl.	5 T.
brachyphylla Schau.	" "	† T.
calycina R. Br.	" "	5 T.
decussata R. Br.	" "	† T.
densa R. Br.	" "	5 T.
β. minor — γ. ovalifolia.		
diosmaefolia Andr.	Nov. Holl.	5 T.
discolor Rehb.	" "	† T.
divaricata Don	" "	† T.
ericafolia Sm.	" "	5 T.
erubescens Otto	" "	† T.
fulgens R. Br.	" "	† T.
hypericifolia Sm.	" "	5 T.
imbricata Lk.	" "	5 T.
incana R. Br.	" "	5 T.
lanceolata Otto	" "	5 T.
linariaefolia Sm.	" "	5 T.
nodosa Sm.	" "	† T.

Melaleuca

Otonis Schau.	Nov. Holl.	† T.
propinqua Schau.	" "	5 T.
pulchella R. Br.	" "	† T.
Sprengelioides DeC.	" "	† T.
squamea Lab.	Tasmania	† T.
squarrosa Sm.	Nov. Holl.	5 T.
striata Lab.	" "	† T.
stypelioides Sm.	" "	5 T.
thymifolia Sm.	" "	† T.
thymoides Lab.	" "	† T.
uncinata R. Br.	" "	† T.
uniflora Spr.	" "	† T.
vestita Hort.	" "	† T.
Waeberi Rehb.	" "	† T.
Melampodium L.	(<i>Synanthereae</i>)	
divaricatum DeC.	Amer. aust. ⊙ CD.	
longifolium Cav.	" " ⊙ CD.	
perfoliatum Kth.	" " ⊙ CD.	
rhomboideum DeC.	" " ⊙ CD.	
Melandryum Roehl.	(<i>Sileneae</i>)	
apetalum Fzl.	Europa arct. † D. A.	
brachypetalum Fzl.	Asia bor. † D. A.	
" β. villosum.		
nemorale Fzl.	Banatus † DF.	
pratense Roehl.	Europa † D.	
" β. fl. roseo.		
saxatile K.	Sibir. aust. † D. A.	
sibiricum K.	Asia bor. † D.	
sylvestre Roehl.	Europa † D.	
triste Fzl.	Sibir. aust. † D. A.	
Melanoselinum Hoffm.	(<i>Umbelliferae</i>)	
decipiens Hoffm.	? † F.	
Melanthera Rohr	(<i>Synanthereae</i>)	
deltoidea Mchx.	Ind. occ. ⊙ C.	
hastata Mchx.	Ind. occ. Carol. ⊙ C.	
Melastoma Burm.	(<i>Melastomaceae</i>)	
cymosum DeC.	Guinea † C.	
(vide: Clidemia — Heteronoma — La-		
sandra — Pleroma — Sagraea).		
Melia L.	(<i>Meliaceae</i>)	
Azedarach L.	Eu. au-or. Asia 5 F.	
sempervirens Sw.	Ind. occ. † T.	
Melanthus Tourn.	(<i>Melanthineae</i>)	
comosus Vahl.	Cap. b. sp. † T.	
major L.	" " † T.	
minor L.	" " † T.	
Melica L.	(<i>Gramineae</i>)	
altissima L.	Eur. aust-or. † D.	
caffrorum Schrad.	Afr. aust. † T.	
ciliata L.	Europa † D.	
minuta L.	Eur. aust. † FD.	
nutans L.	Europa † D.	
pyramidalis Lam.	Eur. aust. † FD.	
uniflora Retz.	Europa † D. A.	
Melilotus Tourn.	(<i>Papilionaceae</i>)	
alba Lam.	Europa ⊙ D.	
Bonplandii Ten.	La Plata ⊙ D.	
Cupani H. Bonon.	Sicilia ⊙ D.	
dentata Pers.	Eur. med. ⊙ D.	

Melilotus

glomerata Fisch.	Armenia ⊙ D.
gracilis DeC.	Eur. aust. ⊙ D.
italica Lam.	" " ⊙ D.
longifolia Ten.	" " ⊙ D.
lupulina Trautv.	Europa ⊙ D.
macrorrhiza Pers.	Eur. med. aust. ⊙ D.
messanensis Desf.	Sicilia, Afr. ⊙ D.
neapolitana Ten.	Neap., Sicilia ⊙ D.
officinalis Lam.	Europa ⊙ D.
" β. pallida Bess.	
parviflora Desf.	Eur. aust. ⊙ D.
suaveolens Led.	Sibir. aust. ⊙ D.
sulcata Desf.	Afr. bor. ⊙ D.
taurica Ser.	Ruth. aust. ⊙ D.
(vide: Grammocarpus — Foenumgrae-	
cum).	
Melissa Tourn.	(<i>Labiatae</i>)
hirsuta Balb.	Eur. aust. † DF.
officinalis L.	" " † D.
(vide: Acinos — Calamintha — He-	
deoma — Horminum — Micromeria).	
Melittis L.	(<i>Labiatae</i>)
Melissophyllum L.	Europa † D. A.
Melocactus Tourn.	(<i>Cactineae</i>)
amoenus Hoffg.	Columbia † C.
Melochia L.	(<i>Hermanniaceae</i>)
pyramidata L.	Ind. occ. † C.
Melodinus Forst.	(<i>Apocynineae</i>)
scandens Forst.	Nov. Caledon. † T.
Melothria L.	(<i>Cucurbitaceae</i>)
pendula L.	Amer. aust. ⊙ C.
Meniocus Desv.	(<i>Cruciferae</i>)
linifolius Desv.	Eur. aust-or. ⊙ D.
Menispermum Tourn.	(<i>Menispermineae</i>)
canadense L.	Amer. bor. † D.
dahuricum DeC.	Sibir. aust. † D.
Menonvillea DeC.	(<i>Cruciferae</i>)
filifolia F. et M.	Chili ⊙ F.
Mentha Tourn.	(<i>Labiatae</i>)
aquatica L.	Europa † D.
arvensis L.	" † D.
austriaca Jacq.	" † D.
balsamea W.	Eur. aust. † D.
citrate Ehrh.	Europa † D.
crispata Schrad.	Eur. aust. † D.
crispifolia Wend.	? † D.
diffusa Lej.	Belgia † D.
domestica Tsch.	? † D.
gentilis L.	Eur. occ. aust. † D.
gratissima Wigg.	Europa † D.
hirta W.	" † D.
incana W.	Eur. aust. † D.
laevigata W.	? † D.
lavandulacea W.	Hispania † DF.
macrostachya Ten.	Italia † DF.
Michellii Ten.	" † DF.
mollissima Borkh.	Europa † D.
neglecta Ten.	Italia † D.
nemorosa W.	Europa † D.

Mentha

piperita L.	Anglia	q. D.
pubescens W.	Eur. aust.	q. D.
Requienii Benth.	Corsica	q. FD.
Rivini Tsch.	Eur. austr.	q. D.
rotundifolia L.	" "	q. D.
" β . variegata.	" "	" "
rubra Sm.	Europa	q. D.
sativa L.	"	q. D.
serotina Ten.	Italia	q. D.
suavis Guss.	"	q. DF.
sylvestris L.	Europa	q. D.
tenuis Mchx.	Amer. bor.	q. D.
undulata W.	Eur. aust.	q. D.
urticaefolia Ten.	" "	q. DF.
villosa Beck.	Europa	q. D.
viridis L.	"	q. D.

(vide: Preslia — Pulegium).

Mentzelia L. (*Loasaceae*)

hispidia W.	Mexico	h. C.
-------------	--------	-------

Menyanthes Tourn. (*Menyantheae*)

trifoliata L.	Europa	q. D. ∇
---------------	--------	----------------

Mercurialis Tourn. (*Euphorbiaceae*)

annua L.	Europa	o. D.
----------	--------	-------

ovata St. et H.	Eur. med. aust.	q. D.
-----------------	-----------------	-------

perennis L.	Europa	q. D.
-------------	--------	-------

Merendera Ram. (*Veratrineae*)

caucasica M. B.	Caucasus	q. DF.
-----------------	----------	--------

Meriolyx Raf. (*Onagraceae*)

serrulata Raf.	Am. bor. aust.	q. FD.
----------------	----------------	--------

Mesembryanthemum Dill. (*Mesembryan-**themicae*)

acinaciforme L.	Cap. b. sp.	h. T.
-----------------	-------------	-------

acutum Haw.	" "	h. T.
-------------	-----	-------

aequilaterum Haw.	Nov. Holl.	h. T.
-------------------	------------	-------

albidum L.	Cap. b. sp.	h. T.
------------	-------------	-------

aloides Haw.	" "	q. T.
--------------	-----	-------

aurantium Haw.	" "	h. T.
----------------	-----	-------

barbatum L.	" "	h. T.
-------------	-----	-------

bibracteatum Haw.	" "	h. T.
-------------------	-----	-------

bifidum Haw.	" "	q. T.
--------------	-----	-------

calamiforme L.	" "	q. T.
----------------	-----	-------

caninum Haw.	" "	q. T.
--------------	-----	-------

capitatum Haw.	" "	h. T.
----------------	-----	-------

clavatum Jacq.	" "	h. T.
----------------	-----	-------

coccineum Haw.	" "	h. T.
----------------	-----	-------

copticum L.	Aegyptus	o. CF.
-------------	----------	--------

cordifolium L. fil.	Cap. b. sp.	h. T.
---------------------	-------------	-------

corniculatum L.	" "	h. T.
-----------------	-----	-------

crassifolium L.	" "	h. T.
-----------------	-----	-------

croceum Jacq.	" "	h. T.
---------------	-----	-------

cruciatum Haw.	" "	q. T.
----------------	-----	-------

crystallinum L.	Cap., Canar.	o. CD.
-----------------	--------------	--------

cultratum Salm-D.	Cap. b. sp.	q. T.
-------------------	-------------	-------

curvifolium Haw.	" "	h. T.
------------------	-----	-------

cylindricum Haw.	" "	q. T.
------------------	-----	-------

deflexum Ait.	" "	h. T.
---------------	-----	-------

deltoides Mill.	" "	h. T.
-----------------	-----	-------

densum Haw.	" "	h. T.
-------------	-----	-------

depressum Haw.	" "	q. T.
----------------	-----	-------

Mesembryanthemum

difforme L.	Cap. b. sp.	q. T.
-------------	-------------	-------

diminutum Haw.	" "	q. T.
----------------	-----	-------

diversifolium Haw.	" "	h. T.
--------------------	-----	-------

dolabriforme L.	" "	h. T.
-----------------	-----	-------

dubium Haw.	" "	h. T.
-------------	-----	-------

echinatum Ait.	" "	h. T.
----------------	-----	-------

edule L.	" "	h. T.
----------	-----	-------

elegans Jacq.	" "	h. T.
---------------	-----	-------

felinum Haw.	" "	q. T.
--------------	-----	-------

floribundum Haw.	" "	h. T.
------------------	-----	-------

forficatum L.	" "	h. T.
---------------	-----	-------

geminiflorum Haw.	" "	h. T.
-------------------	-----	-------

glaucum L.	" "	h. T.
------------	-----	-------

Haworthii W.	" "	h. T.
--------------	-----	-------

heteropetalum Haw.	" "	h. T.
--------------------	-----	-------

hispidum L.	" "	h. T.
-------------	-----	-------

inaequale Haw.	" "	h. T.
----------------	-----	-------

latum Haw.	" "	h. T.
------------	-----	-------

linguaeforme Haw.	" "	q. T.
-------------------	-----	-------

" β . rufescens Haw. — γ . per-

viride.

longum Haw.	Cap. b. sp.	q. T.
-------------	-------------	-------

loreum Haw.	" "	h. T.
-------------	-----	-------

lunatum W.	" "	h. T.
------------	-----	-------

magnipunctatum Haw.	" "	q. T.
---------------------	-----	-------

maximam Haw.	" "	h. T.
--------------	-----	-------

medium Haw.	" "	q. T.
-------------	-----	-------

micans L.	" "	h. T.
-----------	-----	-------

multipunctatum Salm-D.	" "	h. T.
------------------------	-----	-------

muricatum Haw.	" "	h. T.
----------------	-----	-------

murinum Haw.	" "	h. T.
--------------	-----	-------

mustelinum Salm-D.	" "	q. T.
--------------------	-----	-------

mutabile Haw.	" "	h. T.
---------------	-----	-------

noctiflorum L.	" "	h. T.
----------------	-----	-------

obliquum Haw.	" "	h. T.
---------------	-----	-------

parviflorum Haw.	" "	h. T.
------------------	-----	-------

patens W.	" "	h. T.
-----------	-----	-------

perfoliatum Mill.	" "	h. T.
-------------------	-----	-------

pinnatifidum L. fil.	" "	o. CD.
----------------------	-----	--------

polyanthum Haw.	" "	h. T.
-----------------	-----	-------

pomeridianum L.	" "	o. CF.
-----------------	-----	--------

praepingue Haw.	" "	q. T.
-----------------	-----	-------

" β . angustum.

pugioniforme L.	" "	h. T.
-----------------	-----	-------

pulchellum Haw.	" "	h. T.
-----------------	-----	-------

purpurascens Salm-D.	" "	h. T.
----------------------	-----	-------

pyropaeum Haw.	" "	o. CF.
----------------	-----	--------

quadrididum Haw.	" "	h. T.
------------------	-----	-------

roseum Haw.	" "	h. T.
-------------	-----	-------

Salmii Haw.	" "	q. T.
-------------	-----	-------

salmoneum Haw.	" "	h. T.
----------------	-----	-------

sarmentosum Haw.	Nov. Holl.	h. T.
------------------	------------	-------

scalpratum Haw.	Cap. b. sp.	q. T.
-----------------	-------------	-------

scapigerum Haw.	" "	q. T.
-----------------	-----	-------

serratum L.	" "	h. T.
-------------	-----	-------

simile Haw.	" "	h. T.
-------------	-----	-------

speciosum Haw.	" "	h. T.
----------------	-----	-------

spectabile Haw.	" "	h. T.
-----------------	-----	-------

spinosum L.	" "	h. T.
-------------	-----	-------

Mesembryanthemum

splendens L.	Cap. b. sp.	† T.
stellatum Mill.	" "	† T.
subulatum Mill.	" "	‡ T.
tenellum Haw.	" "	† T.
tenuiflorum Jacq.	" "	† T.
tetragonum Thb.	" "	† T.
tigrinum Haw.	" "	‡ T.
tortuosum L.	" "	† T.
Tripolium L.	" "	② T.
tuberosum L.	" "	† T.
umbellatum L.	" "	† T.
uncinatum Mill.	" "	† T.
uncinellum Salm-D.	" "	† T.
unidentum Haw.	" "	† T.
vaginatum Haw.	" "	† T.
verruculatum L.	" "	† T.
violaceum DeC.	" "	† T.

Mespilus Tourn.

germanica L.	Eur. med.-aust.	† D.
Smithii DeC.	Oriens ?	† D.
(vide: Amelanchier — Aronia — Coto-		
neaster — Crataegus — Eriobotrya).		

Messerschmidia L. (Ehretiaceae)

hirsutissima R. et S.	Amer. aust.	† C.
volubilis R. et S.	Ind. occ.	† C.
(vide: Tournefortia).		

Metabasis DeC. (Synanthereae)

aetnensis DeC.	Eur. aust.	① D.
cretensis DeC.	" "	② FD.

Methonica Herm.

superba Lam.	Ind. or.	‡ C.
--------------	----------	------

Metrosideros Sm. (Myrtaceae)

corifolius Vent.	Nov. Holl.	5 T.
------------------	------------	------

Meum Tourn. (Umbelliferae)

athamanticum Jacq.	Europa	‡ D. A.
Mutellina Gaertn.	Alp. Sudeti	‡ D. A.

Mibora Adans. (Gramineae)

verna P. B.	Eur. med.-occ.	① D.
-------------	----------------	------

Michauxia L'Her. (Campanulaceae)

campanuloides L'Her.	Oriens	② FD.
laevigata Vent.	Persia	② FD.

Michelaria Dumort. (Gramineae)

arduennensis Dumort.	Belgia	② DF.
----------------------	--------	-------

Micranthus Pers. (Iridaeae)

plantagineus Eckl.	Cap. b. sp.	‡ T.
--------------------	-------------	------

Microlonchus Cass. (Synanthereae)

salmanticus DeC.	Eur. aust.	① D.
------------------	------------	------

Micromeria Benth. (Labiatae)

filiformis Benth.	Eur. aust.	‡ F.
-------------------	------------	------

graeca Benth.	" "	‡ F.
---------------	-----	------

intermedia K.	Caucasus	† DF.
---------------	----------	-------

juliana Benth.	Eur. aust.	‡ F.
----------------	------------	------

marifolia Benth.	" "	† F.
------------------	-----	------

montana Rehb.	" "	† DF.
---------------	-----	-------

parviflora Rehb.	Dalmatia	† F.
------------------	----------	------

pygmaea Rehb.	Eur. aust.	† DF.
---------------	------------	-------

tenuifolia Rehb.	" "	‡ F.
------------------	-----	------

variegata Rehb.	" "	† DF.
-----------------	-----	-------

Micropetalum Tsch. (Saxifragaceae)

Micropetalum

rotundifolium Haw.	Alpes	‡ D. A.
--------------------	-------	---------

Micropetelea Spach	(Ulmineae)	
--------------------	------------	--

chinensis Spach	China	† F.
-----------------	-------	------

Micropus L. (Synanthereae)

californicus F. et M.	California	① D.
-----------------------	------------	------

erectus L.	Eur. aust.	① D.
------------	------------	------

supinus L.	" "	① D.
------------	-----	------

Microrhinum Endl. (Scrophulariaceae)

litorale K.	Eur. aust.	① D.
-------------	------------	------

" β. pterospermum.		
--------------------	--	--

viscidum K.	Europa	① D.
-------------	--------	------

Microseris Don (Synanthereae)

pygmaea H. et A.	Chili	① D.
------------------	-------	------

Microsorium Lk. (Polypodiaceae)

irregulare Lk.	Mascarenhas	‡ C.
----------------	-------------	------

Microtea Sw. (Phytolaccaceae)

debilis Sw.	Ind. occ.	① C.
-------------	-----------	------

Mikania W. (Synanthereae)

scandens W.	Am. bor.-aust.	‡ FD.
-------------	----------------	-------

Milium L. (Gramineae)

effusum L.	Europa	‡ D.
------------	--------	------

vernale M. B.	Taur. Cauc.	① D.
---------------	-------------	------

(vide: Gastridium — Piptatherum).		
-----------------------------------	--	--

Milleria L. (Synanthereae)

quinqueflora L.	Amer. trop.	① C.
-----------------	-------------	------

Millina Cass. (Synanthereae)

leontodontoides Cass.	Neap. Sicilia	‡ F.
-----------------------	---------------	------

Mimetes Salisb. (Proteaceae)

purpurea R. Br.	Nov. Holl.	† T.
-----------------	------------	------

Mimosa Tourn. (Mimosaceae)

acanthocarpa Benth.	Mexico	† T.
---------------------	--------	------

asperata W.	Amer. trop.	† C.
-------------	-------------	------

" β. laevis.		
--------------	--	--

prostrata H. Ber.	La Plata	† CT.
-------------------	----------	-------

pubida L.	Amer. trop.	① C.
-----------	-------------	------

sensitiva L.	Brasilia	† C.
--------------	----------	------

violacea Bonpl.	Amer. aust.	† C.
-----------------	-------------	------

Mimulus L. (Scrophulariaceae)

alatus Ait.	Amer. bor.	‡ DF.
-------------	------------	-------

cardinalis Dougl.	California	‡ DF.
-------------------	------------	-------

" β. superbus.		
----------------	--	--

floribundus Dougl.	"	① D.
--------------------	---	------

glandulosus Lehm.	Amer. bor.	① D.
-------------------	------------	------

guttatus DeC.	California	‡ DF.
---------------	------------	-------

juteus L.	Chili	‡ DF.
-----------	-------	-------

" β. quinquevulnerus H. Ber.		
------------------------------	--	--

moschatus Dougl.	Am. bor.-occ.	‡ FD.
------------------	---------------	-------

pilosusculus Kth.	Peruvia	① ‡ F.
-------------------	---------	--------

propinquus Lindl.	Amer. bor.	‡ FD.
-------------------	------------	-------

ringens L.	" "	‡ DF.
------------	-----	-------

rivularis Nutt.	" "	‡ DF.
-----------------	-----	-------

roseus Dougl.	California	‡ FD.
---------------	------------	-------

" β. superbus.		
----------------	--	--

variegatus H. Par.	Chili	‡ F.
--------------------	-------	------

Minuartia Loeffl. (Ainsineae)

campestris L.	Hispania	① D.
---------------	----------	------

fastigiata Rehb.	Eur. med. aus.	① D.
------------------	----------------	------

montana L.	Hispania	① D.
------------	----------	------

rostrata Rehb.	Alpes	‡ D. A.
----------------	-------	---------

Mirabilis L.	(<i>Nyctagineae</i>)
ambigua Trautv.	Mexico ☉ 4.FD.
dichotoma L.	" ☉ 4.FD.
hybrida Lep.	Columbia ☉ 4.FD.
Jalapa L. et var.	Mexico ☉ 4.FD.
longiflora L.	" ☉ 4.FD.
planiflora Trautv.	" ☉ 4.FD.
Mitchella L.	(<i>Rubiaceae</i>)
repens L.	Amer. bor. 4.D. 4.
Mitella Tourn.	(<i>Saxifragaceae</i>)
diphylla L.	Amer. bor. 4.D. 4.
prostrata Michx.	" 4.D. 4.
Mitellopsis Meisn.	(<i>Saxifragaceae</i>)
Drummondii Meisn.	Amer. bor. 4.D. 4.
Mnemon Spach	(<i>Violaceae</i>)
calcaratum Spach	Alpes 4.D. 4.
cornutum Spach	Pyrenaei 4.D. 4.
declinatum K.	Hungaria ☉ 4.FD.
grandiflorum Spach	Sibir. aust. 4.D. 4.
" β. hybridum, plur. var.	
hirsutum Spach	Gall. Belgia 4.FD.
occultum K.	Persia bor. ☉ D.
tricolor Spach	Europa ☉ 4.D.
" β. arvense.	
Modiola Mnh.	(<i>Malvaceae</i>)
caroliniana G. Don	Am. bor.-aust. ☉ D.
decumbens G. Don	Amer. trop. 4.FD.
Möhringia L.	(<i>Alsineae</i>)
muscosa L.	Alp. Subalp. 4.D. 4.
pendula Fzl.	Banatus 4.D. 4.
pentandra Gay	Pyrenaei 4.D. 4.
trinervia Clairv.	Europa 4.D.
Moenchia Ehrh.	(<i>Alsineae</i>)
erecta G. M. S.	Eur. med.-aust. ☉ D.
Mogiphanes Mart.	(<i>Amarantaceae</i>)
Jacquini Schrad.	Brasilia ☉ 4.C.
patula Mart.	" ☉ 4.C.
virgata Schrad.	" ☉ 4.C.
Mohria Sw.	(<i>Aneimiaceae</i>)
thuriifraga Sw.	Mascar. Cap. 4.C.
Moldavica Tourn.	(<i>Labiatae</i>)
peregrina K.	Asia bor. 4.D.
punctata Mnh.	Eur. or.-aust. ☉ D.
" β. alba.	
Molinia Mnh.	(<i>Gramineae</i>)
coerulea Mnh.	Europa 4.D.
" β. altissima Lk.	
Mollugo L.	(<i>Portulacaceae</i>)
Cerviana Ser.	Eur. aust. ☉ D.
verticillata L.	Am. bor.-aust. ☉ D.
Molopospermum Koch	(<i>Umbelliferae</i>)
Cicutarium DeC.	Eur. aust. 4.DF.
Moluccella L.	(<i>Labiatae</i>)
laevis L.	Oriens ☉ D.
(vide: Chasmane).	
Momordica Tourn.	(<i>Cucurbitaceae</i>)
Balsamina L.	Ind. or. ☉ C.
Charantia L.	" ☉ C.
(vide: Ecballium — Luffa).	
Monarda L.	(<i>Labiatae</i>)

Monarda	
affinis Lk.	Amer. bor. 4.D.
amplexicaulis Bisch.	" " 4.D.
altissima W.	" " 4.D.
barbata Wendr.	" " 4.D.
citriodora Cerv.	Mex. Am. bor. 4.F.
clinopodia L.	Amer. bor. 4.D.
commutata Wendr.	" " 4.D.
didyma L.	" " 4.DF.
fistulosa L.	" " 4.D.
glabrescens Preisl.	" " 4.D.
hirta Wendr.	" " 4.D.
hybrida Wendr.	" " 4.D.
" β. punctata.	
involucrata Wendr.	" " 4.D.
Kalmiana Pursh	" " 4.DF.
lilacina Wendr.	" " 4.D.
media W.	" " 4.D.
mollis L.	" " 4.D.
oblongata Ait.	" " 4.D.
punctata L.	Am. bor.-aust. 4.FD.
purpurea Pursh	Amer. bor. 4.D.
rugosa Ait.	" " 4.D.
undulata Tsch.	" " 4.D.
urticaefolia Tsch.	" " 4.D.
violacea Desf.	" " 4.D.
(vide: Blephilia).	
Monetia L'Her.	(<i>Illiciaceae</i>)
barlerioides L'Her.	Ind. or. 4.C.
Monocosmia Fzl.	(<i>Portulacaceae</i>)
corrigioloides Fzl.	Chili ☉ D.
Monolepis Schrad.	(<i>Chenopodiaceae</i>)
trifida Schrad.	Amer. bor. ☉ D.
Monolopia DeC.	(<i>Synanthereae</i>)
major DeC.	California ☉ D.
Monopsis Salisb.	(<i>Lobeliaceae</i>)
debilis Prsl.	Cap. b. sp. ☉ CD.
litigiosa F. et M.	" " ☉ CD.
Monotoca R. Br.	(<i>Epacrideae</i>)
albans R. Br.	Nov. Holl. 4.T.
Monsonia L. fil.	(<i>Geraniaceae</i>)
lobata Mont.	Cap. b. sp. 4.F.
pilosa W.	" " 4.T.
(vide: Holopetalum).	
Monstera Adans.	(<i>Arineae</i>)
Adansonii Schott.	Amer. trop. 4.C.
Montanaea L. et Lx.	(<i>Synanthereae</i>)
tomentosa L. et Lx.	Mexico 4.C.
Montbretia DeC.	(<i>Irideae</i>)
aequimaculata K.	Cap. b. sp. 4.T.
carnea K.	" " 4.T.
erocata Endl.	" " 4.T.
deusta Endl.	" " 4.T.
fenestrata Endl.	" " 4.T.
glauca K.	" " 4.T.
lineata K.	" " 4.T.
longiflora K.	" " 4.T.
maculata K.	" " 4.T.
magniflora K.	" " 4.T.
miniata K.	" " 4.T.

Montbretia				Musa			
pulchella K.	Cap. b. sp.	4 T.		chinensis Swt.	China aust.	4 C.	
securigera K.	" "	4 T.		coccinea Andr.	Ind. or.	4 C.	
squalida Dec.	" "	4 T.		paradisiaca L.	" "	4 C.	
tripunctata K.	" "	4 T.		rosacea Jacq.	Mascarenhas	4 C.	
Moraea L.		(Iridaceae)		Uranoscopus Colla	Moluccae	4 C.	
Candolleana Spr.	Cap. b. sp.	4 T.		Muscari Tourn.	(Liliaceae)		
edulis Ker	" "	4 T.		botryoides Mill.	Eur.med.aust.	4 D.	
polystachya Ker	" "	4 T.		commutatum Guss.	Sicilia	4 FD.	
Tenoreana Swt.	Eur. aust.	4 F.		dilutum Tsch.	?	4 DF.	
(vide: Aristea — Dietes — Pardan- thus).				pallens Bess.	Ruth. aust.	4 D.	
Moricandia Dec.		(Cruciferae)		parviflorum Desf.	Sicil.Afr.bor.	4 FD.	
arvensis Dec.	Eur. aust.	2 DF.		racemosum W.	Eur.med.aust.	4 D.	
sonchifolia Bge.	China bor.	2 DF.		(vide: Bellevallia — Ettheiranthus — Muscarmia).			
Morina Tourn.		(Dipsacinae)		Muscarmia K.	(Liliaceae)		
elegans F. et L.	Nepalia	4 DF.		orientalis K*)	Oriens	4 DF.	
Morphixia Ker		(Iridaceae)		Musschia Dumort.	(Campanulaceae)		
linearis Ker	Cap. b. sp.	4 T.		aurea Dumort.	Madera	4 T.	
Morus Tourn.		(Morinae)		Mutisia L. fil.	(Synantheraceae)		
alba L.	China	5 D.		peduncularis Cav.	Peruvia	4 T.	
" β . gentilis — γ . hispanica — δ . sinensis — ϵ . persica — ζ . nigra.				speciosa Hook.	Brasilia	4 T.	
canadensis Poir.	Amer. bor.	5 D.		Myagrum Tourn.	(Cruciferae)		
intermedia Perrot.	Manilla?	4 FD.		perfoliatum L.	Eur. aust.	2 D.	
Morettiana Gera	?	5 D.		Myogalum Lk.	(Liliaceae)		
nigra L.	Persia	5 DF.		nutans Lk.	Eur.med.aust.	4 D.	
rubra W.	Amer. bor.	5 D.		thyrsoides Endl.	Cap. b. sp.	4 T.	
scabra W.	"	5 D.		Myoporum Banks.	(Myoporinae)		
Morisia Cass.		(Synantheraceae)		acuminatum R. Br.	Nov. Holl.	4 T.	
dentata Dec.	Cap. b. sp.	4 T.		ellipticum R. Br.	" "	4 T.	
Moscharia R. et P.		(Synantheraceae)		parvifolium R. Br.	" "	4 T.	
pinnatifida R. et P.	Chili	2 CD.		tuberculatum R. Br.	" "	4 T.	
Moschosma Rehb.		(Labiales)		Myosotis Rupp.	(Borraginae)		
ocymoides Benth.	Ind. or.	2 CD.		alpestris Schm.	Alp.Subal.	2 4 D.	
polystachyum Benth.	"	2 CD.		caespitosa Schultz	"	4 D. ∇	
Mozinia Ort.		(Euphorbiaceae)		" β . macrocalyx F. et M.			
spathulata Ort.	Mexico	4 C.		californica F. et M.	California	2 D.	
Mühlenbergia Schreb.		(Graminae)		hispida Schlecht.	Europa	2 D.	
diffusa W.	Am.bor.aust.	4 DF.		intermedia Lk.	"	2 D.	
(vide: Cinna — Podosaemum).				micrantha Pall.	Asia bor.	4 D. ∇	
Mulgedium Cass.		(Synantheraceae)		palustris With.	Europa	4 D. ∇	
alpinum Cass.	Alp.Subalp.	4 D. ∇		peduncularis Trev.	Astracania	2 D.	
floridanum Dec.	Am.bor.aus.	2 DF.		stricta Lk.	Europa	2 D.	
leucophaeum Dec.	" ?	2 DF.		sylvatica Ehrh.	"	2 4 D.	
multiflorum Dec.	" ?	2 DF.		" β . lactea Bönng.			
sibiricum Dec.	Asia bor.	4 D.		Myosurus Dillen.	(Ranunculinae)		
tataricum Dec.	"	4 D.		minimus L.	Europa	2 D.	
Mundia Kth.		(Polygalaceae)		Myrcia Dec.	(Myrtinae)		
spinosa Dec.	Cap. b. sp.	4 T.		acris Dec.	Ind. occ.	5 C.	
Munychia Neck.		(Synantheraceae)		Myriaetis Less.	(Synantheraceae)		
Cymbalariae N. E.	Cap. b. sp.	2 4 T.		Gmelini Dec.	Pers. bor.	4 DF.	
Muraltia Neck.		(Polygalaceae)		Myriandra Spach	(Hypericinae)		
Heisteria Dec.	Cap. b. sp.	4 T.		prolifera Spach	Amer. bor.	4 DF.	
mixta L. fil.	"	4 T.		Myrica L.	(Myricaceae)		
Muraya Kön.		(Aurantiinae)		carolinensis Mill.	Am.bor.aust.	4 DF.	
exotica L.	Ind. or.	4 C.		cerifera L.	Amer. bor.	4 T.	
Murucuja Juss.		(Passifloraceae)		cordifolia L.	Cap. b. sp.	4 T.	
ocellata Pers.	Ind. occ.	4 C.		Gale L.	Eur. Am. bor.	4 D.	
Musa Tourn.		(Musaceae)		laciniata W.	Cap. b. sp.	4 T.	

*) Muscari moschatum W.

<i>Myrica</i>				<i>Nelumbium</i> Juss.	(<i>Nelumbiaceae</i>)
<i>quercifolia</i> L.	Cap. b. sp.	† T.		<i>speciosum</i> W.	Asia aust. † C. ∇
<i>segregata</i> Jacq.	Amer. aust.	† T.		<i>Nemesia</i> Vent.	(<i>Scrophulariaceae</i>)
<i>serrata</i> Lam.	Cap. b. sp.	† T.		<i>chamaedryfolia</i> Vent.	Cap. b. sp. † T.
<i>Myricaria</i> Desv.	(<i>Tamariscineae</i>)			<i>floribunda</i> Lehm.	" " ⊙ CD.
<i>dahurica</i> DeC.	Sibir. aust.	† DF.		<i>Nemophantes</i> Raf.	" " (<i>Illiciaceae</i>)
<i>germanica</i> Desv.	Eur. med. aust.	† DF.		<i>canadensis</i> DeC.	Canada † DF.
<i>Myriogyne</i> Less.	(<i>Synanthereae</i>)			<i>Nemophila</i> Bart.	(<i>Hydrophyllaceae</i>)
<i>minuta</i> Less.	Asia aust.	⊙ CD.		<i>aurita</i> Lindl.	California ⊙ D.
<i>Myriophyllum</i> Vaill.	(<i>Haloragaceae</i>)			<i>atomaria</i> F. et M.	Nov. Californ. ⊙ D.
<i>spicatum</i> L.	Europa	† D. ∇		<i>insignis</i> Dougl.	California ⊙ D.
<i>Myrrhis</i> Tourn.	(<i>Umbelliferae</i>)			<i>liniflora</i> F. et M.	" ⊙ D.
<i>odorata</i> Scop.	Eur. med. aust.	† D. ∇		<i>parviflora</i> Dougl.	" ⊙ D.
(vide: <i>Anthriscus</i> —	<i>Chaerophyllum</i>).			<i>peduncularis</i> Dougl.	" ⊙ D.
<i>Myrsine</i> L.	(<i>Ardisiaceae</i>)			<i>phacelioides</i> Bart.	Amer. bor. ⊙ D.
<i>africana</i> L.	Cap. b. sp.	† T.		<i>Neottia</i> L.	(<i>Orchideae</i>)
<i>mitis</i> Spr.	" "	† T.		<i>latifolia</i> Rich.	Europa † D. ∇
<i>retusa</i> Ait.	" "	† T.		(vide: <i>Goodyera</i> —	<i>Spiranthes</i>).
<i>Myrsiphyllum</i> W.	(<i>Asparagineae</i>)			<i>Nepeta</i> Rivin.	(<i>Labiatae</i>)
<i>asparagoides</i> W.	Cap. b. sp.	† T.		<i>austriaca</i> Host	Austria † D.
<i>Myrtus</i> Tourn.	(<i>Myrtineae</i>)			<i>azurea</i> R. Br.	Abyssinia † F.
<i>belgica</i> Mill.	Eur. aust.	† F.		<i>botryoides</i> Ait.	Asia bor. ⊙ D.
<i>baetica</i> Mill.	Eur. aust.	† F.		<i>Cataria</i> L.	Europa † D.
" <i>β. variegata</i> .				<i>coerulea</i> Ait.	Eur. aust. † D.
<i>communis</i> L.	" "	† 5 F.		<i>cyanea</i> Stev.	Caucasia † DF.
" <i>β. variegata</i> — <i>γ. fl. pleno</i> .				<i>fissa</i> C. A. Mey.	" † DF.
<i>italica</i> Mill.	Eur. aust.	† 5 F.		<i>granatensis</i> Boiss.	Hispania † DF.
<i>lusitanica</i> L.	" "	† 5 F.		<i>grandiflora</i> M. B.	Caucasia † D.
<i>tarentina</i> Mill.	" "	† 5 F.		<i>graveolens</i> Vill.	Eur. aust. † D.
<i>mucronata</i> L.	" "	† 5 F.		<i>imbricata</i> Lag.	Hispania † DF.
<i>tenuifolia</i> Sm.	Nov. Holl.	† T.		<i>incana</i> Ait.	Eur. aust. † DF.
<i>Nabalus</i> Cass.	(<i>Synanthereae</i>)			<i>italica</i> L.	" † DF.
<i>suavis</i> DeC.	Am. bor. aust.	† DF.		<i>latifolia</i> DeC.	Pyren., Hisp. † DF.
<i>Nananthea</i> DeC.	(<i>Synanthereae</i>)			<i>longiflora</i> Vent.	Pers. bor. † DF.
<i>perpusilla</i> DeC.	Corsica	† F.		<i>macrantha</i> Fisch.	Asia bor. † D.
<i>Nandina</i> Thb.	(<i>Berberideae</i>)			<i>Meyeri</i> Benth.	Caucasia † DF.
<i>domestica</i> Thb.	China, Japon.	† F.		<i>multibracteata</i> Desf.	Afr. bor. † DF.
<i>Napaea</i> L.	(<i>Malvaceae</i>)			<i>Mussini</i> Henk.	Caucasia † D.
<i>laevis</i> L.	Am. bor. aust.	† D.		" <i>β. speciosa</i> .	
<i>scabra</i> L.	" "	† DF.		<i>Nepetella</i> L.	Eur. aust. † D.
<i>Narcissus</i> Tourn.	(<i>Amaryllideae</i>)			<i>nuda</i> L.	Eur. med. aust. † D.
<i>biflorus</i> Curt.	Eur. occ. aust.	† D.		<i>pannonica</i> L.	Eur. aust. or. † D.
<i>poeticus</i> L.	Eur. med. aust.	† D.		<i>reticulata</i> Desf.	Afr. bor. † DF.
(vide: <i>Ajax</i> — <i>Hermione</i> — <i>Queltia</i>).				<i>tuberosa</i> L.	Eur. aust. † DF.
<i>Nardosmia</i> Cass.	(<i>Synanthereae</i>)			<i>ucrainica</i> L.	Ruth. aust. † D.
<i>fragrans</i> Rehb.	Eur. aust.	† F.		<i>violacea</i> L.	Eur. aust. † D.
<i>Nardus</i> L.	(<i>Gramineae</i>)			(vide: <i>Lophanthus</i> —	<i>Micromeria</i>).
<i>stricta</i> L.	Europa	† D.		<i>Nephrodium</i> Mchx.	(<i>Polypodiaceae</i>)
<i>Nasturtium</i> Boerh.	(<i>Cruciferae</i>)			<i>exaltatum</i> Lk.	Amer. aust. † C.
<i>officinale</i> R. Br.	Europa	† D. ∇		<i>Schkuhrii</i> Lk.	" † C.
(vide: <i>Clandestina</i> — <i>Roripa</i>).				<i>tenerum</i> R. Br.	Nov. Holl. † C.
<i>Nauembergia</i> Mnch.	(<i>Primulaceae</i>)			<i>tuberosum</i> Lk.	Mascarenhas † C.
<i>thyrsiflora</i> Rehb.	Europa	† D. ∇		<i>Nephromedea</i>	(<i>Papilionaceae</i>)
<i>Navarretia</i> R. et P.	(<i>Polemontineae</i>)			<i>radiata</i> K*)	Eur. aust. ⊙ D.
<i>involuta</i> R. et P.	Chili	⊙ D.		<i>Neptunia</i> Lour.	(<i>Mimosaceae</i>)
<i>Negundo</i> Mnch.	(<i>Aceriaceae</i>)			<i>oleracea</i> Lour.	Ind. or. † C. ∇
<i>fraxinifolium</i> Nutt.	Amer. bor.	5 D.		<i>Nerine</i> Herb.	(<i>Amaryllideae</i>)
<i>Neja</i> G. Don	(<i>Synanthereae</i>)			<i>curvifolia</i> Herb.	Cap. b. sp. † T.
<i>falcata</i> N. E.	Brasil. aust.	† T.		<i>sarniensis</i> Ker	Japonia Cap. † T.
<i>gracilis</i> Don	Mexico	† T.			

*) *Medicago radiata* L.

<i>Nerine</i>				<i>Nigritella</i>			
undulata Herb.	Cap. b. sp.	♂ T.		angustifolia Rich.	Alpes	♂ D. J.	
<i>Nerium</i> Tourn.		(<i>Apocyniaceae</i>)		<i>Nissolia</i> Jacq.		(<i>Papilionaceae</i>)	
odorum Ait. et var.	Ind. or.	♂ T.		fruticosa Jacq.	Mexico	♂ C.	
Oleander L. et pl. var.	Eur. aust. Or.	♂ F.		<i>Nitraria</i> L.		(<i>Nitrariaceae</i>)	
<i>Neumannia</i> Brogn.		(<i>Bromeliaceae</i>)		Schoberi L.	Sibir. Casp.	♂ D.	
imbricata Brogn.	Mexico	♂ C.		"	β. soongarica.		
<i>Neslia</i> Desv.		(<i>Cruciferae</i>)		<i>Nolana</i> L.		(<i>Nolanaceae</i>)	
apiculata F. et M.	Arabia	⊙ D.		atriplicifolia Desf.	Peruvia	⊙ CD.	
paniculata Desv.	Europa	⊙ D.		paradoxa Lindl.	Chili	⊙ CD.	
<i>Nicandra</i> Adans.		(<i>Solaniceae</i>)		prostrata L. fil.	Peruvia	⊙ CD.	
physaloides Gaertn.	Peruvia	⊙ D.		<i>Noltea</i> Rehb.		(<i>Rhamnaceae</i>)	
<i>Nicotiana</i> Tourn.		(<i>Solaniceae</i>)		africana Rehb.	Cap. b. sp.	♂ T.	
acuminata Sims	Chili	⊙ CD.		<i>Nonnea</i> Med.		(<i>Borraginaceae</i>)	
alata Lk. et O.	Brasilia	⊙ CD.		alba DeC.	Gall. aust.	⊙ D.	
auriculata Berter.	Chili	⊙ CD.		flavescens G. Don	Caucasia	⊙ D.	
Berteroniana Desf.	"	⊙ CD.		pulla DeC.	Europa	⊙ D.	
cerinthoides Horn.	Amer. aust.	⊙ CD.		rosea Lk.	Sibir. aust.	⊙ D.	
chinensis Fisch	China	⊙ CD.		versicolor Swt.	Caucasia	⊙ D.	
commutata F. et M.	Amer. aust.	⊙ CD.		vesicaria Rehb.	Eur. aust.	⊙ D.	
fragrans Bhd.	"	⊙ CD.		<i>Norysea</i> Spach		(<i>Hypericaceae</i>)	
fruticosa L.	Afr. aust.	♂ FD.		chinensis Spach	China, Japon.	♂ F.	
glauca Grah.	La Plata	♂ T.		<i>Nothoscordium</i> Kth.		(<i>Liliaceae</i>)	
Langsdorffii Weinm.	Brasilia	⊙ CD.		euosmon Kth.	Brasil. aust.	♂ F.	
longepetiolata Agd.	Amer. aust.	⊙ CD.		fragrans Kth.	Am. bor. aust.	♂ F.	
longiflora Cav.	La Plata	⊙ CD.		"	β. gracile.		
macrophylla Spr.	Amer. aust.	⊙ CD.		striatellum Kth.	Chili	♂ F.	
marylandica Schubl.	?	⊙ CD.		striatum Kth.	Am. bor. aust.	♂ F.	
mexicana Schlecht.	Mexico	⊙ CD.		<i>Notobasis</i> Cass.		(<i>Synanthereae</i>)	
micrantha Desf.	Amer. aust.	⊙ CD.		syriaca Cass.	Eur. aust. Or.	⊙ D.	
multivalvis Lindl.	Am. bor. aust.	⊙ D.		<i>Notoceras</i> R. Br.		(<i>Cruciferae</i>)	
noctiflora Hook.	Chili	⊙ CD.		canariense R. Br.	Canariae	⊙ CD.	
paniculata L.	Peruvia	⊙ CD.		hispanicum DeC.	Hispania	⊙ D.	
persica Lindl.	Persia	⊙ CD.		<i>Nothochlaena</i> R. Br.		(<i>Polypodiaceae</i>)	
plumbaginifolia Viv.	Amer. aust.	⊙ CD.		Marantae R. Br.	Eur. aust.	♂ F.	
quadrivalvis Pursh	Am. bor. aust.	⊙ D.		nivea Desv.	Amer. aust.	♂ C.	
rustica L.	America	⊙ D.		sulcata Mey.	China	♂ C.	
sanguinea Lk. et O.	"	⊙ CD.		tenera Gill.	Chili	♂ T.	
solanifolia Walp.	Chili	♂ T.		<i>Nuphar</i> Sm.		(<i>Nymphaeaceae</i>)	
suaveolens Lehm.	Nov. Holl.	⊙ CD.		advenum Ait.	Amer. bor.	♂ D. ∇	
<i>Tabacum</i> L.	Amer. aust.	⊙ CD.		luteum Sm.	Europa	♂ D. ∇	
"	β. pallida	— γ. gigantea.		<i>Nuttalia</i> DeC.		(<i>Malvaceae</i>)	
vincaeflora Lag.	Amer. aust.	⊙ CD.		malvaeflora F. et Fr.	Mexico	♂ F.	
(vide: <i>Petunia</i> — <i>Saianthus</i>).				<i>Nuxia</i> Benth.		(<i>Scrophulariaceae</i>)	
<i>Nierembergia</i> R. et P.		(<i>Solaniceae</i>)		saligna Bhd.	Cap. b. sp.	♂ F.	
angustifolia Kth.	Mexico	♂ T.		<i>Nyctarium</i> Vent.		(<i>Solaniceae</i>)	
calycina Hook.	La Plata	♂ T.		amazonicum Lk.	Mexico	♂ C.	
filicaulis Lindl.	"	♂ T.		Fontanesianum G. Don	Brasilia	⊙ CD.	
gracilis Hook.	"	♂ T.		rostratum Lk.	Mexico	⊙ CD.	
intermedia Grah.	Peruvia	♂ T.		triphyllum H. Angl.	Ind. or.	♂ C.	
<i>Nigella</i> Tourn.		(<i>Ranunculineae</i>)		Vespertilio Lk.	Mexico	♂ C.	
arvensis L.	Europa	⊙ D.		<i>Nymphaea</i> Boerh.		(<i>Nymphaeaceae</i>)	
hispanica L.	Hispania	⊙ D.		alba L.	Europa	♂ D. ∇	
sativa L.	Eur. aust.	⊙ D.		coerulea Savign.	Aegyptus	♂ C. ∇	
segetalis M. B.	Eur. aust. or.	⊙ D.		Lotus L.	"	♂ C. ∇	
(vide: <i>Erobathos</i> — <i>Nigellastrum</i>).				odorata Ait.	Amer. bor.	♂ D. ∇	
<i>Nigellastrum</i> Mnch.		(<i>Ranunculineae</i>)		stellata W.	Ind. or.	♂ C. ∇	
corniculatum K.	Oriens	⊙ D.		<i>Nyssa</i> L.		(<i>Nyssaceae</i>)	
orientale Mnch.	"	⊙ D.		villosa Mchx.	Amer. bor.	♂ DF.	
<i>Nigritella</i> Rich.		(<i>Orchideae</i>)		<i>Obeliscaria</i> Cass.		(<i>Synanthereae</i>)	

Obeliscaria				Odenlandia Plum.	(<i>Rubiaceae</i>)
columnaris DeC.	Am. bor.-aust.	q. D.		biflora L.	Ind. or. ⊙ C.
Drummondii Grah.	Texas	② FD.		Deppeana Ch. et S.	Mexico ⊙ C.
pinnata DeC.	Amer. bor.	q. D.		lactea Ch. et S.	Ind. or. ⊙ C.
Obione Gaertn.	(<i>Chenopodiaceae</i>)			pumila DeC.	" " ⊙ C.
sibirica K.	Asia bor.	⊙ D.		Olea Tourn.	(<i>Oleaceae</i>)
Ochrus Tourn.	(<i>Papilionaceae</i>)			americana L.	Carol. Florid. ⊙ F.
lathyroides Med.	Eur. aust.	⊙ D.		capensis L.	Cap. b. sp. ⊙ T.
Ochtidium DeC.	(<i>Cruciferae</i>)			europaea L.	Oriens Eur. aus. 5 F.
aegyptiacum DeC.	Aegypt. Or.	⊙ D.		fragrans Thb.	Japon., China ⊙ F.
Ocimum Tourn.	(<i>Labiatae</i>)			intermedia Tsch.	" ? ⊙ F.
acutum Thb.	Japonia	q. T.		maderensis H. Cels.	Madera ⊙ T.
atrovirens H. Kew.	?	⊙ C.		undulata Jacq.	Cap. b. sp. ⊙ T.
Basilicum L.	Ind. or.	⊙ CD.		verrucosa Lk.	" " ⊙ T.
— " β. album — γ. bullatum Lam.				Olearia Mneh.	(<i>Synanthereae</i>)
— δ. laciniatum — ε. nigrum.				dentata Mneh.	Nov. Holl. ⊙ T.
carnosum Lk. et O.	Brasil. aust.	q. T.		Oligomeris Camb.	(<i>Resedaceae</i>)
citriodorum Vis.	Nubia	⊙ C.		subulata Camb.	Aegyptus ⊙ CD.
gratissimum L.	Ind. or.	⊙ C.		Olinia Thb.	(<i>Oliniaceae</i>)
minimum L.	" "	⊙ CD.		capensis Klzsch.	Cap. b. sp. ⊙ T.
sanctum L.	" "	⊙ C.		cymosa Thb.	" ⊙ T.
Sellowii Benth.	Brasil. Mex.	q. C.		Olympia Spach	(<i>Hypericaceae</i>)
suave W.	Madagascar	⊙ C.		glauca Spach	Graecia ⊙ F.
Odontarrhena C. A. Mey.	(<i>Cruciferae</i>)			Omphalodes Tourn.	(<i>Borraginaceae</i>)
alpestris Led.	Eur. aust.	⊙ DF.		linifolia Mneh.	Eur. aust. ⊙ D.
argentea Led.	" "	⊙ DF.		scorpioides Schrk.	Eur. med.-aust. ⑤ D.
Bertolonii C. A. Mey.	Italia	⊙ DF.		verna Mneh.	Eur. aust. q. D.
muralis Endl.	Eur. or.-aust.	⊙ D.		Onagra Tourn.	(<i>Onagraceae</i>)
obovata C. A. Mey.	Sibir. aust.	⊙ DF.		elata K.	Amer. bor. ⊙ D.
tortuosa C. A. Mey.	Eur. or.-aust.	⊙ DF.		erosa K.	" " ⊙ D.
Oedera L. fil.	(<i>Synanthereae</i>)			media K.	" " ⊙ D.
prolifera L. fil.	Cap. b. sp.	⊙ T.		muricata Mneh.	" " Eur. ⊙ D.
Oenanthe Tourn.	(<i>Umbelliferae</i>)			parviflora Mneh.	" " ⊙ D.
apifolia Brot.	Eur. aust.-occ.	q. DF.		Simsiana K.	Mexico ⊙ DF.
australis Wulf.	Carnia	q. D.		salicifolia Spach	Amer. bor. ⊙ D.
crocata L.	Eur. occ.	q. DF.		vulgaris Spach	Am. bor. Eur. ⊙ D.
fistulosa L.	Europa	q. D.		— " β. suaveolens.	
Lachenalii Gmel.	Eur. occ.	q. D.		Oncidium Sw.	(<i>Orchideae</i>)
peucedanifolia Poll.	" "	q. D.		altissimum Sm.	Ind. occ. q. C.
Phellandrium Lam.	Europa	⊙ D. √		carthagenense Sw.	Amer. aust. q. C.
pimpinelloides L.	Eur. aust.	q. D.		flexuosum Sims	Brasilia q. C.
prolifera L.	" "	q. DF.		Papilio Lindl.	Ind. occ. q. C.
silafolia M. B.	" "	q. D.		Onobrychis Tourn.	(<i>Papilionaceae</i>)
Oenothera L.	(<i>Onagraceae</i>)			alba Desv.	Hungaria q. D.
chilensis Desf.	Chili	⊙ D.		angustifolia H. Drsd.	" ? q. D.
Drummondii Hook.	Texas	⊙ ② FD.		arenaria DeC.	Eur. or., Sibir. q. D.
humifusa Nutt.	Florida	⊙ CD.		Caput galli Lam.	Eur. aust. ⊙ D.
longiflora Jacq.	La Plata	⊙ FD.		carpathica DeC.	Carpathi q. D.
mollissima L.	Am. aus.-temp.	⊙ D.		conferta Desv.	Caucasus q. D.
nocturna Jacq.	Cap. b. sp.	⊙ D.		Crista galli Lam.	Eur. aust. ⊙ D.
odorata L.	Patagonia	⊙ D.		gracilis Bess.	Ruth. aust. q. D.
Sellowii Lk. et O.	Bras. aust.	⊙ ② FD.		incurvata Horn.	" ? q. D.
sinuata L.	Am. bor.-aust.	⊙ D.		Michauxii DeC.	Asia med. q. DF.
stricta Led.	Chili	⊙ D.		montana DeC.	Eur. occ. q. D.
undulata Ait.	Am. aus.-temp.	⊙ D.		petraea Desv.	Caucasus q. D.
villosa Thb.	Cap. b. sp.	⊙ D.		procumbens Stev.	Caucas. Arm. q. D.
(vide: Boisduvalia — Godetia — Hartmannia — Kneiffia — Lavauxia — Meriolyx — Onagra — Pachylophus — Sphaerostigma — Xylopleurum).				radiata M. B.	" " q. DF.
				sativa L.	Europa q. D.
				— " β. exaltata F. — γ. tanaitica Spr.	

<i>Onobrychis</i>					
<i>saxatilis</i> All.	Eur. aust-occ.	2 DF.			
<i>Onoclea</i> L.			(<i>Polypodiaceae</i>)		
<i>sensibilis</i> L.	Am. bor.-aus.	2 D. J.			
<i>Ononis</i> L.			(<i>Papilionaceae</i>)		
<i>alopeuroides</i> L.	Eur. aust.	2 D.			
<i>antiquorum</i> L.	" "	2 D.			
<i>biflora</i> Desf.	Afr. bor.	2 D.			
<i>brevifolia</i> Guss.	Sicilia	2 D.			
<i>Cherleri</i> L.	Eur. aust.	2 D.			
<i>Columnae</i> All.	" "	2 DF.			
<i>fruticosa</i> L.	Gallia, Hisp.	2 FD.			
<i>hircina</i> Jacq.	Eur. med. aust.	2 D.			
<i>minutissima</i> L.	Eur. aust.	2 FD.			
<i>mitissima</i> L.	" "	2 D.			
<i>mollis</i> Lag.	" "	2 D.			
<i>monophylla</i> Desf.	Afr. bor.	2 D.			
<i>Natrix</i> L.	Eur. aust.	2 FD.			
<i>ornithopodioides</i> L.	" "	2 D.			
<i>ramosissima</i> Desf.	Sicil. Afr. bor.	2 F.			
<i>reclinata</i> L.	Gall. aust.	2 D.			
<i>repens</i> L.	Europa	2 D.			
<i>rotundifolia</i> L.	Alpes	2 D. A.			
<i>sicula</i> Guss.	Sicilia	2 D.			
<i>spinosa</i> L.	Europa	2 D.			
<i>viscosa</i> L.	Eur. aust.	2 D.			
<i>Onopordon</i> Vaill.			(<i>Synanthereae</i>)		
<i>Acanthium</i> L.	Europa	2 D.			
<i>acaule</i> L.	Caucasia	2 D.			
<i>arabicum</i> L.	Eur. aust.	2 D.			
<i>graecum</i> Gou.	Eur. aust-or.	2 D.			
<i>heteracanthum</i> C.A. Mey.	Caucasia	2 D.			
<i>illyricum</i> L.	Eur. aust.	2 D.			
<i>intermedium</i> Schult.	" "	2 D.			
<i>pyrenaicum</i> DeC.	Eur. aust-or.	2 D.			
<i>tauricum</i> W.	Ruth. aust.	2 D.			
<i>viridis</i> DeC.	Eur. aust.	2 D.			
<i>Onosma</i> L.			(<i>Borragineae</i>)		
<i>arenarium</i> W. et K.	Hungaria	2 DF.			
<i>echioides</i> L.	Eur. aust.	2 D.			
<i>montanum</i> S. et M.	" "	2 DF.			
<i>setosum</i> Led.	Caspia	2 DF.			
<i>sericeum</i> W.	Caucasus	2 DF.			
<i>Onosmodium</i> Mchx.			(<i>Borragineae</i>)		
<i>hispidum</i> Mchx.	Am. bor.-aust.	2 DF.			
<i>Opercularia</i> Gaertn.			(<i>Rubiaceae</i>)		
<i>aspera</i> Gaertn.	Nov. Zeeland	2 F.			
<i>Ophiopogon</i> Ker			(<i>Ophiopogoneae</i>)		
<i>japonicus</i> Ker	Japon. China	2 FD.			
<i>spicatus</i> Ker	" "	2 F.			
<i>Oplismenus</i> P. B.			(<i>Gramineae</i>)		
<i>undulatifolius</i> R. et S.	Eur. aust.	2 F.			
(vide: <i>Echinochloa</i>).					
<i>Opopanax</i> Koch			(<i>Umbelliferae</i>)		
<i>Chirionium</i> Koch	Eur. aust.	2 FD.			
<i>glabrum</i> Bhd.	" "	2 FD.			
<i>Oporinia</i> Don			(<i>Synanthereae</i>)		
<i>autumnalis</i> Don	Europa	2 D.			
<i>pratensis</i> Less.	" "	2 D.			
<i>Opulus</i> Tourn.			(<i>Sambucineae</i>)		
<i>Opulus</i>					
<i>edulis</i> K.	Amer. bor.	2 D.			
<i>Oxycoccus</i> K.	Europa	2 D.			
<i>vulgaris</i> Borkh.	" "	2 D.			
<i>β. roseus.</i>					
<i>Opuntia</i> Tourn.			(<i>Cactineae</i>)		
<i>albicans</i> Salm-D.	Mexico	2 T.			
<i>amyclea</i> Ten.	Neapolis	2 F.			
<i>andicola</i> H. Angl.	Amer. aust.	2 F.			
<i>aurantiaca</i> Gill.	Chili	2 F.			
<i>brasiliensis</i> Haw.	Brasilia	2 C.			
<i>candelabriformis</i> Mart.	Mexico	2 T.			
<i>coccinellifera</i> Mill.	Amer. trop.	2 C.			
<i>corrugata</i> H. Angl.	" ?	2 C.			
<i>crassa</i> Haw.	Mexico	2 T.			
<i>curassavica</i> Mill.	Amer. aust.	2 C.			
<i>cylindrica</i> DeC.	Peruvia	2 C.			
<i>decipiens</i> DeC.	Mexico	2 T.			
<i>decumana</i> Haw.	Amer. trop.	2 T.			
<i>dejecta</i> Salm-D.	Cuba	2 C.			
<i>Dilleniana</i> DeC.	Amer. trop.	2 C.			
<i>elatiator</i> Mill.	" ?	2 C.			
<i>extensa</i> Salm-D.	" ?	2 C.			
<i>exuviata</i> DeC.	Mexico	2 T.			
<i>ferox</i> Haw.	Amer. trop.	2 T.			
<i>Ficus indica</i> L.	Amer. aust.	2 T.			
<i>foliosa</i> Salm-D.	Amer. trop.	2 C.			
<i>fragilis</i> Haw.	Am. bor.-aust.	2 F.			
<i>glaucescens</i> Otto	Mexico	2 T.			
<i>glomerata</i> Haw.	Amer. trop.	2 C.			
<i>horrida</i> Salm-D.	" "	2 C.			
<i>imbricata</i> DeC.	Mexico	2 T.			
<i>italica</i> Ten.	Italia	2 F.			
<i>Kleiniae</i> DeC.	Mexico	2 T.			
<i>lanceolata</i> Haw.	Amer. trop.	2 C.			
<i>leptocaulis</i> DeC.	Mexico	2 T.			
<i>leucacantha</i> Otto	"	2 T.			
<i>leucotricha</i> DeC.	"	2 T.			
<i>megacantha</i> Salm-D.	"	2 T.			
<i>microdasys</i> Lehm.	"	2 T.			
<i>monacantha</i> Haw.	Amer. trop.	2 C.			
<i>nana</i> DeC.	Mexico	2 T.			
<i>nigricans</i> Haw.	Amer. trop.	2 C.			
<i>oblongata</i> Wendl.	Mexico	2 T.			
<i>orbiculata</i> Salm-D.	Chili ?	2 T.			
<i>platyacantha</i> Salm-D.	"	2 T.			
<i>Poeppigii</i> Otto	"	2 T.			
<i>polyantha</i> Haw.	Amer. aust.	2 C.			
<i>Pseudo-Tuna</i> Salm-D.	" "	2 C.			
<i>pubescens</i> Wendl.	Mexico	2 T.			
<i>pusilla</i> Salm-D.	Amer. trop.	2 C.			
<i>ramulifera</i> Salm-D.	Mexico	2 T.			
<i>rosea</i> DeC.	"	2 T.			
<i>rubescens</i> Salm-D.	Brasilia	2 C.			
<i>Salmiana</i> Parm.	"	2 C.			
<i>sericea</i> Don	Chili	2 T.			
<i>spinosissima</i> Mill.	Ind. occ.	2 C.			
<i>spinulifera</i> Salm-D.	Mexico	2 T.			
<i>Stapeliae</i> DeC.	"	2 T.			
<i>stricta</i> Haw.	Amer. trop.	2 C.			

Opuntia					
sulfurea Gill.	Chili	♂ T.			
tomentosa Salm-D.	Amer. trop.	♂ C.			
triacantha DeC.	" "	♂ C.			
tuberosa Haw.	" "	♂ C.			
tunicata Otto	Mexico	♂ T.			
Tuna Mill.	Amer. aust.	♂ C.			
vulgaris Mill.	Am. bor.-aust.	♂ F.			
Orbea Haw.	(<i>Asclepiadeae</i>)				
anguinea Haw.	Afr. aust.	♂ C.			
buffonia Haw.	" "	♂ C.			
marginata Haw.	" "	♂ C.			
marmorata Loud.	" "	♂ C.			
mutabilis Haw.	" "	♂ C.			
" <i>β. veneta.</i>	" "				
normalis Loud.	" "	♂ C.			
picta Haw.	" "	♂ C.			
planiflora Haw.	" "	♂ C.			
variegata Haw.	" "	♂ C.			
Orchis Tourn.	(<i>Orchideae</i>)				
fusca Jacq.	Eur. med.	♂ D. J.			
latifolia L.	Europa	♂ D. J.			
maculata L.	"	♂ D. J.			
majalis Rehb.	"	♂ D. J.			
Morio L.	"	♂ D. J.			
(vide: <i>Conopsidium</i> — <i>Gymnadenia</i> — <i>Nigritella</i> — <i>Peristylus</i>).					
Oreoselinum Tourn.	(<i>Umbelliferae</i>)				
austriacum Hoffm.	Eur. med.-aust.	♂ D.			
dahuricum Bess.	Sibir. aust.	♂ D.			
montanum Hoffm.	Eur. occ.-aust.	♂ D.			
peucedanoides Hoffm.	Pedemont.	♂ D. J.			
rablense Hoffm.	Tyrol. Carinth.	♂ D.			
Origanum Tourn.	(<i>Labiatae</i>)				
creticum L.	Eur. aust.	♂ F.			
heracleoticum L.	" "	♂ FD.			
hirtum Koch	" "	♂ FD.			
intermedium Sav.	" "	♂ FD.			
laxiflorum Royle.	Nepalia	♂ FD.			
vulgare L.	Europa	♂ D.			
" <i>β. virens.</i>					
(vide: <i>Amaracus</i> — <i>Majorana</i>).					
Orithya Don	(<i>Liliineae</i>)				
oxypetala Don	Sibir. aust.	♂ DF.			
Orlaya Hoffm.	(<i>Umbelliferae</i>)				
grandiflora Hoffm.	Eur. med.-aust.	♂ D.			
maritima Koch	Eur. aust.	♂ D.			
platycarpus Koch	" "	♂ D.			
Ormenis Cass.	(<i>Synanthereae</i>)				
coronopifolia Less.	Eur. aust.	♂ D.			
mixta DeC.	"	♂ D.			
Ormiscus DeC.	(<i>Cruciferae</i>)				
amplexicaulis E. et Z.	Cap. b. sp.	♂ D.			
pusillus E. et Z.	"	♂ D.			
Ornithidium Salisb.	(<i>Orchideae</i>)				
coccineum Salisb.	Ind. occ.	♂ C.			
Ornithogalum Tourn.	(<i>Liliineae</i>)				
byzantium Ten.	Rumelia	♂ FD.			
caudatum Ait.	Cap. b. sp.	♂ T.			
collinum Guss.	Neap. Sicil.	♂ F.			
Ornithogalum					
comosum L.	Eur. aust.	♂ DF.			
Ecklonii F. et M.	Cap. b. sp.	♂ T.			
exscapum Ten.	Eur. aust.	♂ DF.			
Gussonei Ten.	Sicilia	♂ FD.			
lacteum Jacq.	Cap. b. sp.	♂ T.			
lanceolatum Lab.	Syria	♂ F.			
latifolium L.	Arab. Aegypt.	♂ F.			
longebracteatum Jacq.	Cap. b. sp.	♂ T.			
montanum Cyr.	Neap. Sicil.	♂ F.			
narbonense L.	Eur. aust.	♂ D.			
Noccaeanum Balb.	" "	♂ DF.			
pilosum Thb.	Cap. b. sp.	♂ T.			
pyramidale L.	Eur. aust.	♂ D.			
refractum Kit.	Hungaria	♂ D.			
Rudolphii Jacq.	Cap. b. sp.	♂ T.			
scilloides Jacq.	" "	♂ T.			
spirale H. Drsd.	" ?	♂ T.			
stachyoides Ait.	Cap. b. sp.	♂ T.			
sulfureum Bert.	Eur. aust.	♂ DF.			
umbellatum L.	Europa	♂ D.			
(vide: <i>Gagea</i> — <i>Myogalum</i> — <i>Nothoscordium</i>).					
Ornithopus L.	(<i>Papilionaceae</i>)				
compressus L.	Eur. aust.	♂ D.			
Ornus Mch.	(<i>Oleaceae</i>)				
americana Pursh	Amer. bor.	♂ D.			
europaea Pers.	Eur. aust.	♂ D.			
" <i>β. diversifolia</i> Wierzb.					
Orobus Tourn.	(<i>Papilionaceae</i>)				
albus L. fil.	Eur. med.-aust.	♂ D.			
alpestris W. et K.	Eur. or.-aust.	♂ D. J.			
angustifolius L.	Sibiria	♂ D.			
atropurpureus Desf.	Sicil. Afr. bor.	♂ D.			
aurantius Stev.	Caucasus	♂ DF.			
aureus Stev.	Tauria	♂ DF.			
canescens L. fil.	Eur. aust.	♂ DF.			
capensis Spr.	Cap. b. sp.	♂ T.			
digitatus M. B.	Eur. aust.-or.	♂ DF.			
flaccidus Kit.	Croatia	♂ DF.			
galegaeformis H. Par.	" ?	♂ D.			
Jordani Ten.	Neapolis	♂ DF.			
lacteus M. B.	Eur. or.	♂ D.			
laevigatus W. et K.	Hungaria	♂ D.			
lathyroides L.	Sibiria	♂ D.			
linifolius Wendr.	" ?	♂ D.			
luteus L.	Eur. med.-aust.	♂ D.			
niger L.	Europa	♂ D.			
roseus Led.	Caucasus	♂ DF.			
saxatilis Vent.	Gall. aust.	♂ D.			
stenophyllus K.	" ?	♂ D.			
sylvaticus L.	Anglia	♂ D.			
tenuifolius Roth	Europa	♂ D.			
tuberosus L.	"	♂ D.			
variegatus Ten.	Eur. aust.	♂ D.			
venosus W.	Sibiria	♂ D.			
vernus L.	Europa	♂ D.			
Orostachys Fisch.	(<i>Crassulaceae</i>)				
malachophylla Fisch.	Sibir. aust.	♂ FD.			
spinosa Swt.	Asia med.	♂ F.			

Orphium E. Mey.	(<i>Gentianaceae</i>)	Oxalis	
frutescens E. Mey.	Cap. b. sp. ½ T.	Martiana Zucc.	Brasilia ¾ T.
Orvala L.	(<i>Labiatae</i>)	micrantha Bert.	Chili ② CD.
lamioides DeC.	Eur. aust. ¾ DF.	Nirbelii Dehn.	?
Oryza Tourn.	(<i>Gramineae</i>)	multiflora Jacq.	Cap. b. sp. ¾ T.
latifolia Desv.	Amer. trop. ② C.	pentaphylla Sims	" " ¾ T.
sativa L.	Asia trop. ② C.	polyphylla Jacq.	" " ¾ T.
" β. aristata.		purpurea Jacq.	" " ¾ T.
Osmunda Tourn.	(<i>Osmundaceae</i>)	reptatrix Jacq.	" " ¾ T.
palustris Schrad.	Amer. aust. ¾ C.	rigidula Jacq.	" " ¾ T.
regalis L.	Europa ¾ D. A.	rosacea Jacq.	Cap. b. sp. ¾ T.
Osteospermum L.	(<i>Synanthereae</i>)	rosea Jacq.	Chili ② CD.
glandulosum DeC.	Cap. b. sp. ¾ T.	rubella Jacq.	Cap. b. sp. ¾ T.
moniliferum L.	" " ¾ T.	speciosa Jacq.	" " ¾ T.
pisiferum L.	" " ¾ T.	stricta L.	Europa ② D.
spinosum L.	" " ¾ T.	tetraphylla Cav.	Mexico ¾ FD.
(vide: Garuleum).		tricolor Jacq.	Cap. b. sp. ¾ T.
Ostercicum Hoffm.	(<i>Umbelliferae</i>)	variabilis Jacq.	" " ¾ T.
pratense Hoffm.	Eur. or. ¾ D.	versicolor L.	" " ¾ T.
Ostrya Mich.	(<i>Cupuliferae</i>)	violacea L.	Amer. bor. ¾ D. A.
virginica W.	Amer. bor. 5 D.		(<i>Nyctagineae</i>)
vulgaris W.	Eur. aust. 5 D.	Oxybaphus L'Her.	Mexico ¾ T.
Osyris L.	(<i>Santalineae</i>)	Cervantesii Lag.	Peru. Mexico ¾ T.
alba L.	Eur. aust. ¾ F.	glabrifolius Vahl.	Amer. aust. ¾ T.
Othonna L.	(<i>Synanthereae</i>)	paniculatus H. Par.	Peruvia ¾ C.
coronopifolia L.	Csp. b. sp. ¾ T.	viscosus L'Her.	(<i>Vacciniaceae</i>)
cylindrica DeC.	" " ¾ T.	Oxycoccoos Tourn.	Europa ¾ D. A.
quinquerradiata Thb.	" " ¾ T.	palustris L.	(<i>Papilionaceae</i>)
Ototropis N. E.	(<i>Papilionaceae</i>)	Oxylobium Andr.	arborescens R. Br.
sambuensis N. E.	Nepalia ¾ T.	argenteum H. Belg.	Tasmania ¾ T.
Ovieda Spr.	(<i>Iridaeae</i>)	cordifolium Andr.	Nov. Holl. ¾ T.
corymbosa Spr.	Cap. b. sp. ¾ T.	scandens Benth.	" " ¾ T.
Oxalis L.	(<i>Oxalideae</i>)		" (<i>Polygoniceae</i>)
Acetosella L.	Europa ¾ D. A.	Oxyria Hill	Alpes ¾ D. A.
alba Swt.	Am. aust. temp. ¾ T.	reniformis Hook.	(<i>Papilionaceae</i>)
amoena Jacq.	Cap. b. sp. ¾ T.	Oxytropis DeC.	Siberia ¾ D. A.
asinina Jacq.	" " ¾ T.	ambigua DeC.	Sibir. aust. ¾ D. A.
Bowiei Ait.	" " ¾ T.	argyrophylla Led.	Alpes ¾ D. A.
breviscapa Jacq.	" " ¾ T.	campestris DeC.	Sibir. aust. ¾ DF.
carnosa Mol.	Chili ½ T.	deflexa DeC.	" " ¾ DF.
cernua Thb.	Cap. b. sp. ¾ T.	diffusa Led.	" " ¾ D.
compressa L. fil.	" " ¾ T.	floribunda DeC.	" " ¾ D.
corniculata L.	Europa ② ¾ D.	glabra DeC.	Eur. med. Asia ¾ D.
" β. longepedunculata.		pilosa DeC.	Sibir. aust. ¾ DF.
cruentata Jacq.	Cap. b. sp. ¾ T.	prostrata DeC.	Ruth. or. Sibir. ¾ D.
crassicaulis Zucc.	Chili, Mex. ¾ FD.	soongarica DeC.	Sibir. aust. ¾ DF.
Deppei Lodd.	Mexico ¾ FD.	sulfurea Fisch.	Asia bor. ¾ D. A.
Ehrenbergii Schlcht.	" ¾ FD.	uralensis DeC.	(<i>Synanthereae</i>)
filicaulis Jacq.	Cap. b. sp. ¾ T.	Ozothamnus R. Br.	Nov. Holl. ¾ T.
hirtella Jacq.	" " ¾ T.	diosmaefolius DeC.	(<i>Onagraceae</i>)
incarnata L.	" " ¾ T.	Pachylophus Spach	Am. bor. aus. ② DF.
lanata L. fil.	" " ¾ T.	Nuttalii Spach	(<i>Umbelliferae</i>)
lancaefolia Jacq.	" " ¾ T.	Pachypleurum Led.	Sibir. aust. ¾ D. A.
lasianhra Grah.	Mexico ¾ FD.	alpinum Led.	" " ¾ D. A.
laxa Hook.	Chili ② CD.	cachroides Turcz.	" " ¾ D. A.
laxula Jacq.	Cap. b. sp. ¾ T.	Pachysandra Mchx.	(<i>Euphorbiaceae</i>)
leporina Jacq.	" " ¾ T.	procumbens Mchx.	Amer. bor. ¾ DF.
livida Jacq.	" " ¾ T.	Paederota L.	(<i>Scrophulariaceae</i>)
macrophylla Horn.	" " ¾ T.	Ageria L.	Alpes ¾ D. A.
macrorrhiza Gill.	Chili ¾ T.	Bonarota L.	" ¾ D. A.
		Paeonia Tourn.	(<i>Paeoniaceae</i>)

Paeonia

- albiflora* Pall. Asia bor. ④ D.
 " *β. candida* And. — *γ. tatarica* And. — *δ. rubescens* And. — *ε. Humelii* — *ζ. fragrans* — *η. fimbriata*.
anomala L. Asia bor. ④ D.
arietina And. Oriens ④ D.
 " *β. Andersonii* DeC. — *γ. oxoniensis*.
commutata Wendr. ? ④ D.
corallina Retz. Eur. aust. ④ D.
decora And. Eur. or. — *aus. Or. ④ D.*
 " *β. Pallasii* And. — *γ. praecox* Sab. — *δ. elatior* And.
erecta Sab. ? ④ D.
fimbriata H. Angl. Oriens ④ D.
humilis Retz. Hispania ④ D.
 " *β. angustifolia* And. — *γ. gallica* Sab. — *δ. leiocarpa* And.
hybrida Pall. Taur. Cauc. ④ D.
intermedia C. A. Mey. Asia bor. ④ D.
lanceolata Salm-D. Eur. aust. ④ D.
leiocarpa Hort. ? ④ D.
lobata Desf. Lusitania ④ D.
microcarpa Salm-D. ? ④ D.
Moutan Sims China bor. ④ DF.
multifida Salm-D. ? ④ D.
officinalis L. Eur. aust. ④ D.
 " *β. festiva* Tausch — *γ. anemoneiflora* Salm-D. — *δ. angustifolia* Salm-D. — *ε. albicans* And. — *ζ. rosea* And. — *η. Sabini* And.
paradoxa And. Eur. occ. — *aust. ④ D.*
 " *β. fimbriata* And.
peregrina Mill. Eur. aust. ④ D.
 " *β. compacta* And. — *γ. Grewwillei* And.
pubens Sims Eur. aust. ④ D.
rosea Host Eur. or. — *aust. ④ D.*
 " *β. angustifolia*.
Russi Biv. Sicilia ④ D.
sessiliflora Sims Eur. aust. ④ D.
splendens Sab. ? ④ D.
tenuifolia L. Eur. aus. — *or. Asia ④ D.*
triternata Pall. Ruth. aust. ④ D.
villosa Desf. ? ④ D.
 " *β. major*.
Palafoxia Lag. (*Synanthereae*)
linearis Lag. Mexico ④ T.
Palavia Cav. (*Malvaceae*)
malvaefolia Cav. Peruvia ④ D.
Palimbria Bess. (*Umbelliferae*)
Chabraei DeC. Eur. med. — *aust. ④ D.*
 " *β. maxima*.
petraea K. Illyria ④ D.
Schottii K. " ④ D.
selinoides K. Dalmatia ④ D.
Paliurus Tourn. (*Rhamnaceae*)
australis Gaertn. Eur. aust. ④ DF.
Pallenis Cass. (*Synanthereae*)

Pallenis

- spinosa* Cass. Eur. aust. ② FD.
Palmstruckia Retz. (*Scrophulariaceae*)
foetida K. Cap. b. sp. ② CD.
hispida K. " " ④ T.
polyantha K. " " ④ T.
Panax L. (*Araliaceae*)
aculeatus Ait. China ④ F.
Pancratium L. (*Amaryllidaceae*)
illyricum L. Eur. aust. ④ DF.
maritimum L. " " ④ DF.
 (vide: *Eurycles* — *Hymenocallis*).
Pandanus L. (*Pandanaceae*)
utilis Bory. Mascar. Madag. 5C.
Pandera F. et M. (*Chenopodiaceae*)
pilosa F. et M. Armenia ② D.
Panicum L. (*Gramineae*)
altissimum Jacq. ? ② CD.
aspernum Lag. ? ② CD.
attenuatum W. Ind. or. ② CD.
capillare L. Amer. bor. ② D.
coloratum L. Afr. med. — *aus. ② CD.*
concinnum Schrad. ? ② C.
erucaeforme S. et Sm. Eur. aust. — *or. ② CD.*
maximam Jacq. Afr. med. ② CD.
miliaceum L. Asia aust. ② D.
nudiglume Hochst. Abyssinia ④ C.
numidianum Lam. Afr. bor. ② CD.
plicatum Lam. Mascarenhas ④ C.
proliferum Lam. Amer. bor. ② D.
prostratum Lam. Ind. occ. ④ C.
pulchrum H. Berol. ? ② C.
virgatum L. Am. bor. — *aust. ④ D.*
 (vide: *Digitaria* — *Echinochloa* — *Oplismenus* — *Setaria* — *Sporobolus* — *Tricholaena*).
Panzeria Mnch. (*Labiateae*)
lanata Pers. Sibiria ② ④ DF.
sibirica K. " ② D.
Papaver Tourn. (*Papaveraceae*)
aculeatum Thb. Cap. b. sp. ② F.
alpinum L. Alpes ④ D. J.
amoenum Lindl. Ind. or. bor. ② D.
Argemone L. Europa ② D.
 " *β. leiocarpum* K.
argemonoides Ces. Eur. aust. ② D.
bracteatum Lindl. Oriens ④ D.
Burseri Crtz. Alpes ④ D. J.
caucasicum M. B. Caucasus ② D.
commutatum F. et M. Georgia, Pers. ② D.
croceum Led. Sibir. altaica ④ D. J.
dubium L. Europa ④ D.
floribundum Desf. Armenia ② DF.
hispidum Desf. Persia ② DF.
hybridum L. Eur. occ. — *aust. ② D.*
intermedium DeC. f. ? ④ D.
laevigatum M. B. Ruth. aust. ② D.
nudicaule L. Eur. aus. — *Sib. ④ D. J.*
opiiferum Forsk. Oriens ② D.
orientale L. " ④ D.

Papaver			Passiflora		
pavoninum Schrenk	Soongaria	⊙ D.	limbata Ten.	Amer. aust.	h C.
Rhoeas L.	Europa	⊙ D.	Loudoni Swt.	Hybr.	h CT.
" β. intermedium Beck.			lunata Juss.	Peruvia	h C.
somniferum L.	Asia med.	⊙ D.	Maximiliani Bory.	Brasilia	h C.
" β. officinale Gmel.			pallidiflora Bert.	"	h C.
Papyrus Bruce (Cyperineae)			pedata L.	Ind. occ.	h C.
antiquorum W.	Aegypt. Sic.	4 CF. ∇	phoenicea Lindl.	Amer. aust.	h C.
auricomus Schrad.	Aegyptus	4 CF.	punctata L.	Peruvia	h C.
Pardanthus Ker (Irideae)			quadrangularis L.	Amer. trop.	h C.
chinensis Ker	China, Japon.	4 FD.	racemosa Brot.	Brasilia	h C.
Parietaria Tourn. (Urticaceae)			Raddiana DeC.	"	h C.
diffusa M. et K.	Eur. occ. aust.	4 DF.	rubra L.	Ind. occ.	h C.
erecta M. et K.	Eur. med. aust.	4 D.	serratifolia L.	Amer. trop.	h C.
micrantha Led.	Sibir. aust.	⊙ D.	subpeltata Ort.	Mexico	h C.
(vide: Freirea — Thaumuria).			Vespertilio L.	Amer. trop.	h C.
Paris L. (Smilacineae)			(vide: Cieca — Disemma — Dysosmia — Murucuja).		
quadrifolia L.	Europa	4 D. A.	Pastinaca Tourn. (Umbelliferae)		
Paritium A. Juss. (Malvaceae)			armena F. et M.	Armenia	② DF.
tiliaceum A. Juss.	Ind. or.	5 C.	divaricata Desf.	Eur. aust.	② D.
Parkinsonia L. (Caesalpinaceae)			Fleischmanni Hladn.	Carnia	② D.
aculeata L.	Amer. trop.	h C.	graveolens M. B.	Ruth. aust.	② D.
Parnassia Tourn. (Parnassiaceae)			intermedia F. et M.	?	② D.
palustris L.	Europa	4 D. ∇	latifolia DeC.	Eur. aust.	② D.
Paronychia Tourn. (Paronychiaceae)			opaca Bhd.	"	② D.
arabica DeC.	Arabia	⊙ CD.	pimpinellaeifolia M. B.	Cauc. Armen.	② D.
bonariensis DeC.	La Plata	⊙ 4 F.	sativa L.	Europa	② D.
capitata Lam.	Eur. aust.	4 F.	(vide: Opoponax — Palimbina).		
Parthenium L. (Synanthereae)			Patagonula L. (Cordiaceae)		
Hysterophorus L.	Mex. Ind. occ.	⊙ CD.	americana L.	Bras. au. Patag.	h F.
integrifolium L.	Am. bor. aust.	4 D.	Patersonia R. Br. (Irideae)		
Paschalia Ort. (Synanthereae)			glabrata R. Br.	Nov. Holl.	4 T.
glauca Ort.	Chili	4 F.	glauca R. Br.	Tasmania	4 F.
Paspalum L. (Gramineae)			Patrinia Juss. (Valerianaceae)		
dilatatum Poir.	La Plata	4 T.	intermedia R. et S.	Sibir. aust.	4 D. A.
elegans Flug.	?	4 T.	rupestris Juss.	"	4 D. A.
filiforme Sw.	Ind. oc. Am. b.	⊙ CD.	scabiosaefolia Lk.	"	4 D. A.
membranaceum Lam.	Peruvia	4 C.	sibirica Juss.	"	4 D. A.
platense Spr.	La Plata	4 T.	Paulownia S. et Z. (Scrophulariaceae)		
scrobiculatum L.	Ind. or.	4 C.	imperialis Sieb.	Japonia	5 DF.
stoloniferum Bosc.	Peruvia	⊙ CD.	Pavetta L. (Rubiaceae)		
Passerina L. (Thymelaeaceae)			indica L.	Ind. or.	h C.
filiformis L.	Cap. b. sp.	h T.	Pavia Boerh. (Hippocastanieae)		
hirsuta L.	Eur. aust.	h F.	flava DeC.	Amer. bor.	5 D.
spicata L. fil.	Cap. b. sp.	h T.	glabra Spach	"	5 D.
Passiflora L. (Passifloraceae)			hybrida DeC.	"	5 D.
alata Ait.	Peruvia	h C.	macrostachya DeC.	Am. bor. aust.	h DF.
alba Lk. et O.	Brasilia	h CT.	pallida Spach	Amer. bor.	5 D.
albida Ker	"	h C.	rubescens K.	"	5 D.
biflora Lam.	Amer. trop.	h C.	rubra Lam.	"	h DF.
capsularis L.	Ind. occ.	h C.	Pavonia Cav. (Malvaceae)		
coerulea L.	Am. aust. tem.	h F.	Columella Cav.	Mascarenhas	h C.
coeruleo-racemosa Sab.	Hybr.	h T.	hastata Cav.	Brasilia	h C.
Colvillei Swt.	"	h T.	hispida Spr.	?	h C.
edulis Sims	Brasilia	h C.	praemorsa Cav.	Cap. b. sp.	h T.
filamentosa Cav.	Amer. trop.	h C.	Schimperiaana Hochst.	Abyssinia	h C.
glauca Ait.	"	h C.	spinifex W.	Amer. trop.	h C.
holosericea L.	"	h C.	Pedicularis Tourn. (Scrophulariaceae)		
incarnata L.	Amer. temp.	h F.	sudetica W.	Sudeti	4 D. A.
kermesina Lk. et O.	Brasilia	h CT.			13*

Pedicularis					
tuberosa L.	Alpes	4 D. A.			
Pedilanthus Neck.		(<i>Euphorbiaceae</i>)			
carinatus Spr.	Ind. occ.	4 C.			
Peganum L.		(<i>Rutaceae</i>)			
Harmala L.	Eur. aust. Or.	4 D. F.			
Pelargonium L'Her.		(<i>Geraniaceae</i>)			
acerifolium L'Her.	Cap. b. sp.	4 F.			
alchemilloides W.	" "	4 F.			
althaeoides L'Her.	" "	4 F.			
amoenum Swt.	" "	4 F.			
anceps Ait.	" "	4 F.			
angulosum Ait.	" "	4 F.			
articulatum W.	" "	4 F.			
atrofuscum Swt.	" "	4 F.			
australe W.	Nov. Holl.	4 CD.			
Beaufortianum Pers.	Cap. b. sp.	4 F.			
betulinum Ait.	" "	4 F.			
bicolor Ait.	" "	4 F.			
Brownii Swt.	" "	4 F.			
calycinum Swt.	" "	4 F.			
canariense W.	Canariae	4 F.			
capitatum Ait.	Cap. b. sp.	4 F.			
carinatum Swt.	" "	4 F.			
ceratophyllum L'Her.	" "	4 F.			
columbinum Jacq.	" "	4 T.			
Colvillei Swt.	" "	4 F.			
concinnum Swt.	" "	4 F.			
conduplicatum W.	" "	4 F.			
coriandrifolium Jacq.	" "	4 F.			
crataegifolium Swt.	" "	4 F.			
crenatum Hffg.	" "	4 F.			
crispum Ait.	" "	4 F.			
cucullatum Ait.	" "	4 F.			
cuspidatum W.	" "	4 F.			
decipiens Haw.	" "	4 F.			
denticulatum Jacq.	" "	4 F.			
dondiaefolium Lk.	" "	4 F.			
echinatum Curt.	" "	4 F.			
elegans W.	" "	4 F.			
eximium Swt.	" "	4 F.			
expansum Swt.	" "	4 F.			
exstipulatum Ait.	" "	4 F.			
flavum Ait.	" "	4 F.			
floribundum Ait.	" "	4 F.			
formosissimum Desf.	" "	4 F.			
formosum Swt.	" "	4 F.			
fragrans W.	" "	4 F.			
gibbosum W.	" "	4 F.			
glutinosum Ait.	" "	4 F.			
grandiflorum W.	" "	4 F.			
graveolens Ait.	" "	4 F.			
grossularioides Ait.	" "	4 F.			
Heritieri Jacq.	" "	4 F.			
heterogamum L'Her.	" "	4 F.			
hirtum Jacq.	" "	4 T.			
holosericeum Swt.	" "	4 F.			
humifusum W.	" "	4 CD.			
hybridum Ait.	" "	4 F.			
illustre Swt.	" "	4 F.			
Pelargonium					
imbricatum Swt.	Cap. b. sp.	4 F.			
inquinans Ait.	" "	4 F.			
inodorum W.	Nov. Holl.	4 CD.			
lacerum Jacq.	Cap. b. sp.	4 F.			
lappaceum Hffg.	" "	4 F.			
lateripes L'Her.	" "	4 F.			
lateritium W.	" "	4 F.			
lobatum W.	" "	4 F.			
macranthum Swt.	" "	4 F.			
malvaefolium Jacq.	" "	4 F.			
monstrum Ait.	" "	4 F.			
multiflorum Swt.	" "	4 F.			
multinerve Swt.	" "	4 F.			
myrrhifolium Ait.	" "	4 F.			
nervosum Swt.	" "	4 F.			
odoratissimum Ait.	" "	4 T.			
orphanum Hffg.	" "	4 F.			
papilionaceum Ait.	" "	4 F.			
particeps Swt.	" "	4 F.			
paucidentatum Swt.	" "	4 F.			
pellatum Ait.	" "	4 F.			
quercifolium Ait.	" "	4 F.			
Radula Ait.	" "	4 F.			
" β . coccineum.	" "				
raduloides Hffg.	" "	4 F.			
reniforme Curt.	" "	4 F.			
roseum W.	" "	4 F.			
" β . variegatum.	" "				
scandens Ehrh.	" "	4 F.			
scutatum Swt.	" "	4 F.			
semitrilobum Jacq.	" "	4 F.			
" β . scandens.	" "				
Smithii Swt.	" "	4 F.			
speciosum W.	" "	4 F.			
spectabile Swt.	" "	4 F.			
Spinii Colla	" "	4 F.			
splendens W.	" "	4 F.			
stenopetalum Ehrh.	" "	4 F.			
tabulare L'Her.	" "	4 F.			
terebinthaceum Cav.	" "	4 F.			
ternatum Jacq.	" "	4 F.			
tomentosum Jacq.	" "	4 F.			
tricolor Curt.	" "	4 T.			
trilobatum Schrad.	" "	4 F.			
triste Ait.	" "	4 T.			
venustum Swt.	" "	4 F.			
vitifolium Ait.	" "	4 F.			
zonale W.	" "	4 F.			
et plur. aliae hybr. spec.					
Peliosanthes Andr.		(<i>Ophiopogoneae</i>)			
Teta Andr.	Ind. or.	4 C.			
Pellaea Lk.		(<i>Polypodiaceae</i>)			
atropurpurea Lk.	Am. bor. aust.	4 F.			
Calomelanos Lk.	Cap. b. sp.	4 CT.			
flexuosa Lk.	Mexico	4 CT.			
hastata Lk.	Cap. b. sp.	4 CT.			
sagittata Lk.	Mexico	4 CT.			
Peltaria L.		(<i>Cruciferae</i>)			
alliacea L.	Eur. or. aust.	4 D. F.			

Penaea L.	(Penaeaceae)	Peperomia	
mucronata L.	Cap. b. sp. $\frac{1}{2}$ T.	magnoliaefolia Dietr.	Amer. aust. $\frac{1}{2}$ C.
Pennicillaria Sw.	(Gramineae)	obtusifolia Dietr.	" " $\frac{1}{2}$ C.
elongata Schrad.	Senegalia $\odot$ C.	pellucida Kth.	" " $\odot$ C.
spicata W.	Ind. or. $\odot$ C.	pereskiaefolia Kth.	Columbia $\frac{1}{2}$ C.
Pennisetum Rich.	(Gramineae)	polystachya Hook.	Ind. occ. $\frac{1}{2}$ C.
cenchroides Rich.	Cap. b. sp. $\odot$ CD.	rubricaulis Dietr.	Brasilia $\frac{1}{2}$ C.
versicolor Schrad.	?	septemnervia R. et P.	Peruvia $\frac{1}{2}$ C.
violaceum Rich.	Senegalia $\odot$ C.	verticillata L.	Ind. occ. $\frac{1}{2}$ C.
Pentagonaster Klzsch.	(Myrtineae)	Peplis L.	(Lythrineae)
Baxteri Klzsch.	Nov. Holl. $\frac{1}{2}$ T.	biflora Salzmann.	Afr. bor. $\odot$ CD.
Pentameris P. B.	(Gramineae)	Portula L.	Europa $\odot$ D.
airoides N. E.	Cap. b. sp. $\odot$ CD.	Pereskia Plum.	(Cactineae)
Pentapera Klzsch.	(Ericaceae)	aculeata Mill.	Ind. occ. $\frac{1}{2}$ C.
sicula Klzsch.	Sicilia $\frac{1}{2}$ F.	Bleo DeC.	Mexico, Colum. $\frac{1}{2}$ C.
Pentapetes L.	(Dombeyaceae)	grandifolia Haw.	Brasilia $\frac{1}{2}$ C.
phoenicea L.	Ind. or. $\odot$ $\frac{1}{2}$ C.	Pititache Karw.	Mexico $\frac{1}{2}$ C.
Pentaple Rchb.	(Alsinaceae)	Pericallis D. Don	(Synanthereae)
mantica Rchb.	Eur. aust. $\odot$ D.	cruenta Don	Teneriffa $\frac{1}{2}$ T.
Penthorum L.	(Crassulaceae)	" β . hybrida	
sedoides L.	Amer. bor. $\frac{1}{2}$ DF.	lactea Don	" $\frac{1}{2}$ T.
Pentstemon L'Her.	(Scrophulariaceae)	maderensis Don	Madera $\frac{1}{2}$ T.
acuminatus Dougl.	Am. bor-occ. $\frac{1}{2}$ DF.	Periclymenum Tourn.	(Caprifoliaceae)
amoenus Kze.	Amer. bor. $\frac{1}{2}$ DF.	proliferum K.	Amer. bor. $\frac{1}{2}$ DF.
atropurpureus G. Don	Mexico $\frac{1}{2}$ FD.	sempervirens Mill.	" " $\frac{1}{2}$ DF.
barbatus Nutt.	" $\frac{1}{2}$ FD.	Perilla L.	(Labiatae)
campanulatus W.	" $\frac{1}{2}$ FD.	ocymoides L.	Ind. or. $\odot$ CD.
centranthifolius Benth.	California $\frac{1}{2}$ FD.	Periploca Tourn.	(Asclepiadineae)
Cobaea Nutt.	Am. bor-aust. $\frac{1}{2}$ FD.	graeca L.	Eur. aust. $\frac{1}{2}$ DF.
confertus Dougl.	Amer. bor. $\frac{1}{2}$ D.	Periptera DeC.	(Malvaceae)
crassifolius Paxt.	Mexico $\frac{1}{2}$ FD.	punicea DeC.	Mexico $\odot$ $\frac{1}{2}$ C.
diffusus Dougl.	Am. bor-occ. $\frac{1}{2}$ FD.	Peristrophe N. E.	(Acanthineae)
Digitalis Nutt.	Am. bor-aust. $\frac{1}{2}$ DF.	bicalyculata N. E.	Ind. or. $\odot$ C.
fruticosus Boe.	Mexico $\frac{1}{2}$ F.	speciosa N. E.	" " $\frac{1}{2}$ C.
gentianoides G. Don	" $\frac{1}{2}$ F.	Peristylus Blum.	(Orchideae)
" β . coccineus.		albidus Lindl.	Alp. Subalp. $\frac{1}{2}$ D. A.
glandulosus Dougl.	Am. bor-occ. $\frac{1}{2}$ DF.	viridis Lindl.	" " $\frac{1}{2}$ D. A.
gracilis Nutt.	Amer. bor. $\frac{1}{2}$ DF.	Pernettya Gaudich.	(Ericaceae)
hirsutus W.	" " $\frac{1}{2}$ D.	mucronata Gaudich.	Fret. Magell. $\frac{1}{2}$ FD.
laevigatus Ait.	" " $\frac{1}{2}$ D.	Persea Gaertn.	(Laurineae)
Makayanus K. et. W.	" " $\frac{1}{2}$ DF.	carolinensis N. E.	Am bor-aust. $\frac{1}{2}$ FD.
Murrayanus Hook.	Texas $\frac{1}{2}$ FD.	indica Spr.	Madera 5 T.
nemorosus Trautv.	Am. bor-occ. $\frac{1}{2}$ FD.	Persica Tourn.	(Amygdalineae)
ovatus Dougl.	" " $\frac{1}{2}$ DF.	vulgaris Mill.	Persia 5 DF.
procerus Dougl.	" " $\frac{1}{2}$ D.	" β . fl. pleno.	
pubescens Ait.	Amer. bor. $\frac{1}{2}$ D.	Perymenium Schrad.	(Synanthereae)
pulchellus Lindl.	Mexico $\frac{1}{2}$ FD.	discolor Schrad.	Mexico $\frac{1}{2}$ T.
Richardsonii Dougl.	Am. bor-occ. $\frac{1}{2}$ FD.	Petalostemon Mchx.	(Papilionaceae)
roseus G. Don	Mexico $\frac{1}{2}$ FD.	candidus Mchx.	Amer. bor. $\frac{1}{2}$ DF.
speciosus Dougl.	Am. bor-occ. $\frac{1}{2}$ DF.	violaceus Mchx.	" " $\frac{1}{2}$ DF.
triphyllus Dougl.	" " $\frac{1}{2}$ DF.	Petasites Tourn.	(Synanthereae)
venustus Dougl.	" " $\frac{1}{2}$ FD.	albus Gaertn.	Europa $\frac{1}{2}$ D.
Peperomia R. et P.	(Piperineae)	niveus Cass.	Alpes $\frac{1}{2}$ D. A.
acuminata R. et P.	Peruvia $\frac{1}{2}$ C.	spurius Rchb.	Eur. bor. med. $\frac{1}{2}$ D.
amplexifolia Dietr.	Ind. occ. $\frac{1}{2}$ C.	vulgaris Desf.	Europa $\frac{1}{2}$ D.
blanda Kth.	Columbia $\frac{1}{2}$ C.	" β . hybridus Dill.	
cuneifolia Dietr.	" $\frac{1}{2}$ C.	Petilium L.	(Liliineae)
inaequalifolia Kth.	Peruvia $\frac{1}{2}$ C.	imperiale L.	Eur. aust. $\frac{1}{2}$ D.
incana Dietr.	Brasilia $\frac{1}{2}$ C.	Petiveria Plum.	(Petiveriaceae)
maculosa Hook.	Ind. occ. $\frac{1}{2}$ D.	aliacea L.	Amer. trop. $\frac{1}{2}$ C.

- Petrocarvi** Tsch. (Umbelliferae)
 cretense Tsch. Alpes ④ D. J.
- Petrocoptis** A. Braun (Sileneae)
 pyrenaica Braun Pyrenaei ④ D. J.
- Petrophila** R. Br. (Proteaceae)
 sessilis Siebr. Nov. Holl. ④ T.
- Petroselinum** Hoffm. (Umbelliferae)
 peregrinum Lag. Peruvia ② FD.
 sativum Hoffm. Eur. aust. ② DF.
 " β. crispum — γ. tuberosum.
 selinoides DeC. ? ④ DF.
- Petunia** Juss. (Solanieae)
 mirabilis Rchb. et var. Hybr. ② ④ FD.
 nyctaginiflora Juss. La Plata ② ④ FD.
 parviflora Juss. " " ② CD.
 violacea Lindl. " " ② ④ FD.
- Peucedanum** Tourn. (Umbelliferae)
 angelicaefolium Turcz. Sibir. aust. ④ D.
 arenarium W. et K. Eur. or-aust. ④ D.
 Bessierianum DeC. Ruth. aust. ④ D.
 elatum Led. Sibir. aust. ④ DF.
 gallicum Pers. Eur. occ. aust. ④ D.
 longifolium W. et K. Banatus ④ DF.
 Morisoni Bess. Sibiria ④ D.
 officinale L. Europa ④ D.
 Petteri Vis. Dalmatia ④ DF.
 ruthenicum M. B. Ruth. aust. ④ D.
 sibiricum W. Eur. or-au. Asia ④ D.
 tauricum M. B. Tauria ④ D.
 (vide: Cervaria — Oreoselinum — Palimbia — Silaus — Thyselinum — Tommasinia).
- Phaca** L. (Papilionaceae)
 abbreviata Led. Sibir. aust. ④ D. J.
 alpina L. Alpes ④ D. J.
 " β. helvetica.
 astragaloides DeC. " ④ D. J.
 frigida L. " ④ D. J.
 lapponica Whlbg. Helv. Lapp. ④ D. J.
 membranacea Fisch. Sibir. aust. ④ D. J.
 oroboides DeC. Norv. Lapp. ④ D. J.
 villosa Nutt. Am. bor.-aust. ④ DF.
- Phacelia** Juss. (Hydrophyllineae)
 bipinnatifida Mchx. Amer. bor. ② D.
 circinata Jacq. f. Chili, Peruv. ② FD.
 tanacetifolia Benth. California ② D.
- Phacocarpus** Bhd. (Fumariaceae)
 Cracca Bhd. Cap. b. sp. ② CD.
- Phaeostoma** Spach (Onagraceae)
 elegans Lilj. Amer. bor. ② D.
 rhomboidea K. " " ② D.
- Phaenocoma** D. Don (Synanthereae)
 prolifera Don Cap. b. sp. ④ T.
- Phaenopus** DeC. (Synanthereae)
 vimineus DeC. Eur. med.-aust. ② D.
- Phaëtusa** Gaertn. (Synanthereae)
 americana Gaertn. Am. bor.-aust. ④ FD.
- Phagnalon** Cass. (Synanthereae)
 rupestre DeC. Eur. aust. ④ F.
 saxatile Cass. " " ④ F.
- Phagnalon**
 sordidum DeC. Eur. aust. ④ F.
- Phajus** Lour. (Orchideae)
 grandiflorus Lour. China, Coch. ④ C.
- Phalacrodiscus** Less. (Synanthereae)
 arvensis F. et M. Asia bor. ② D.
- Phalacrolooma** Cass. (Synanthereae)
 acutifolium Cass. Am. bor. Eu. ② ② D.
 Beyrichii F. et M. Carolina ② ② FD.
- Phalaris** L. (Gramineae)
 angusta N. E. Brasilia ② D.
 canariensis L. Eur. aust. ② D.
 coerulescens Desf. " " ④ FD.
 minor Retz. " " ② D.
 nodosa L. " " ④ FD.
 paradoxa L. " " ② D.
 (vide: Alopecurus — Baldingera — Phleum).
- Phalocallis** Herb. (Iridaceae)
 plumbea Herb. Mexico ④ FD.
- Pharbitis** Choix. (Convolvulinaceae)
 cuspidata Don Peruvia ② CD.
 hederacea Choix. Am. bor.-aust. ② D.
 hispida Choix. et var. Amer. aust. ② D.
 Learii Lindl. La Plata ④ FD.
 lilacina Schlcht. Mexico ④ T.
 Nil Choix. As. et Am. tro. ② CF.
 scabrida Don ? ② D.
- Pharnaceum** L. (Portulacaceae)
 fluviale E. et Z. Cap. b. sp. ④ T.
- Phaseolus** Tourn. (Papilionaceae)
 caffer Hab. Afr. aust. ② D.
 Caracalla L. Ind. or. ④ ④ C.
 chlorospermus Ten. Asia trop. ② C.
 citrinus Sav. ? ② D.
 compressus DeC. et var. Asia aust. ② D.
 eriospermus Sav. ? ② C.
 gonospermus Sav. ? ② D.
 haematocarpus Sav. et var. ? ② D.
 Hernandezii Sav. Mexico ② C.
 lathyroides L. Ind. occ. ② C.
 lunatus L. Ind. or. ② CD.
 multiflorus W. Amer. aust. ② CD.
 " β. variegatus.
- Mungo** L. Ind. or. ② C.
 nigerrimus Zuccg. Asia aust. ② D.
 oblongus Sav. et var. " " ② D.
 perennis Walt. Amer. bor. ④ DF.
 philadelphicus Sav. ? ② D.
 principissae Sav. ? ② D.
 Ricciardianus Ten. ? ② CD.
 saponaceus Sav. ? ② C.
 semierectus L. Amer. aust. ② D.
 sphaericus Sav. et var. ? ② C.
 trilobus Roth Ind. or. ② D.
 tumidus Sav. ? ② D.
 umbilicallis Sav. Ind. or. ② D.
 viridissimus Ten. " " ② C.
 vulgaris L. et var. Asia aust. ② D.
- Philadelphus** L. (Philadelphineae)

Philadelphus

coronarius L.	Asia, Eur. aus.	h D.
" β. nanus Mill.		
floribundus Schrad.	Amer. bor.	h D.
Gordonianus Lindl.	Am. bor-occ.	h D.
grandiflorus W.	Amer. bor.	h D.
inodorus L.	" "	h D.
latifolius Schrad.	" "	h D.
laxiflorus Schrad.	" "	h D.
laxus Schrad.	" "	h D.
speciosus Schrad.	" "	h D.
triflorus Wall.	Nepalia	h FD.
verrucosus Schrad.	Amer. bor.	h D.
Zeyheri Schrad.	"	h D.
Philibertia Kth.	(Asclepiadineae)	
gracilis D. Don	La Plata	h T.
Philodendron Schott	(Arineae)	
cannaefolium Mart.	Brasilia	h C.
crassinervium Lindl.	Amer. aust.	h C.
panduraefolium Kth.	Brasilia	h C.
pinnatifidum Kth.	Amer. srop.	h C.
tripartitum Schott	"	h C.
Phillyrea Tourn.	(Oleaceae)	
angustifolia L.	Eur. aust.	h F.
latifolia L.	" "	h F.
ligustrifolia R. et S.	" "	h F.
media W.	" "	h F.
Philydium Banks	(Philydrineae)	
lanuginosum Banks	China, Nov. Hol.	h C.
Phleboanthe Tsch.	(Labiatae)	
Laxmanni Tsch.	Eur. or. aust.	h DF.
Phleum L.	(Gramineae)	
alpinum L.	Alp. Subalp.	h D. A.
pratense L.	Europa	h D.
" β. nodosum L. — γ. Bertoloni DeC.		
(vide: Achnodon — Chilochoa).		
Phlojodicarpus Turcz.	(Umbelliferae)	
dahuricus Turcz.	Sibir. aust.	h DF.
Phlomis Tourn.	(Labiatae)	
agraria Bge.	Sibir. aust.	h D.
alpina Pall.	" "	h D.
cretica Prsl.	Creta	h F.
ferruginea Ten.	Neapolis	h F.
fruticosa L.	Eur. aust.	h F.
" β. tunicata.		
Herba venti L.	"	h DF.
italica Sm.	Eur. aust-occ.	h F.
lanata W.	Neap. Creta	h F.
Nissolii L.	Oriens	h FD.
pungens L.	Eur. or-aust.	h DF.
purpurea L.	Hispania	h F.
Russelliana Lag.	Oriens	h DF.
samia L.	Graecia	h DF.
tuberosa L.	Eur. or-aust.	h D.
" β. dahurica.		
viscosa Poir.	Oriens	h F.
(vide: Eremostachys — Leucas).		
Phlox L.	(Polemoniaceae)	
acuminata Pursh	Am. bor-aust.	h D.

Phlox

acuminata β. superba.		
carolina L.	Am. bor-aust.	h DF.
cordata Ell.	" "	h DF.
crassifolia Don	" "	h DF.
divaricata L.	" "	h DF.
Drummondii Hook.	Texas, Mex.	h CD.
glaberrima L.	Am. bor-aust.	h DF.
missourica Hort.	" "	h DF.
nivalis Swt.	" "	h DF.
ovata L.	" "	h DF.
paniculata L.	" "	h D.
" β. alba.		
penduliflora Swt.	" "	h DF.
pilosa Mchx.	" "	h DF.
procumbens Lehm.	" "	h DF.
pyramidalis Sm.	" "	h DF.
reflexa Swt.	" "	h DF.
reptans Mchx.	" "	h DF.
scabra Swt.	" "	h DF.
setacea L.	" "	h DF.
stolonifera Sims	" "	h DF.
suaveolens Ait.	" "	h DF.
" β. violacea.		
subulata L.	" "	h D.
suffruticosa Vent.	" "	h FD.
triflora Mchx.	" "	h DF.
undulata Ait.	" "	h D.
virginica Lodd.	" "	h DF.
et plur. hybridae spec.		
Phoenix Kaempf.	(Palmae)	
dactylifera L.	Arab. Aegypt.	h C.
Pholidota Lindl.	(Orchideae)	
imbricata Lindl.	Ind. or.	h C.
Phormium Forst.	(Liliineae)	
tenax Forst.	Nov. Zeel.	h F.
Photinia Lindl.	(Pomaceae)	
serrulata Lindl.	Japon. China	h F.
Phragmites Trin.	(Gramineae)	
communis Trin.	Europa	h D. ∇
Phryma L.	(Verbenaceae)	
leptostachya L.	Am. bor-aust.	h DF.
Phrynium W.	(Cannaceae)	
spicatum Roxb.	Pegu	h C.
Phyllica L.	(Rhamnaceae)	
Commelini Spr.	Cap. b. sp.	h T.
cylindrica Wendl.	" "	h T.
pinifolia L.	" "	h T.
plumosa L.	" "	h T.
(vide: Soulangaea-Tylanthus-Walpersia).		
Phyllanthus L.	(Euphorbiaceae)	
acuminatus Vahl	Guiana	h C.
cantoniensis Horn.	China	h CF.
heterophyllus Hort.	?	h C.
juglandifolius W.	Mexico	h C.
Niruri L.	Ind. or.	h C.
obovatus W.	Am. bor-aus.	h CD.
Vitis Idaea Kön.	Ind. or.	h C.
(vide: Geblera — Xylophylla).		
Phyllis L.	(Rubiaceae)	

Phyllis L.			
Nobla L.	Canariae	† T.	
Phyllocactus Lk.	(Cactineae)		
Ackermannii Lk.	Mexico	‡ C.	
" β . coccineus.			
Hookeri Lk.	Brasilia	‡ C.	
latifrons Lk.	Mexico	‡ C.	
Plukenetii K. *)	Amer. trop.	‡ C.	
speciosus K. **)	Mexico	‡ C.	
Physalis L.	(Solaniceae)		
Alkekengi L.	Eur. med. aust.	‡ D.	
angulata L.	Ind. occ.	⊙ CD.	
arborescens L.	Mexico	† T.	
chenopodifolia Lam.	Peruvia	‡ FD.	
curassavica L.	Amer. aust.	‡ TC.	
flexuosa L.	Eur. aust.	† F.	
foetens Poir.	Amer. trop.	⊙ CD.	
lancifolia N. E.	Peruv., Mex.	⊙ CD.	
Linkiana N. E.	Brasilia	⊙ CD.	
minima L.	Ind. or.	⊙ CD.	
pennsylvanica L.	Am. bor. aust.	‡ FD.	
peruviana L.	Amer. aust.	‡ FD.	
pruinosa L.	Ind. occ.	⊙ CD.	
pubescens L.	Am. bor. aust.	⊙ CD.	
sommifera L.	Eur. aust.	† F.	
viscosa L.	Am. bor. aust.	‡ FD.	
" β . microphylla.			
Physematium Kaulf.	(Polypodiineae)		
molle Kaulf.	Mexico	‡ C.	
Perrinianum Prsl.	Ind. occ. Am. b.	‡ T.	
Physocarpus Camb.	(Spiraeaceae)		
opulifolius K.	Amer. bor.	† D.	
Physocaulis DeC.	(Umbelliferae)		
nodosa Tsch.	Eur. aust.	⊙ D.	
Physochlaina G. Don	(Solaniceae)		
orientalis G. Don	Cauc. Armen.	‡ D.	
physaloides G. Don	Sibir. aust.	‡ D.	
Physolapidium Schrenk	(Cruciferae)		
repens Schrenk	Soongaria	‡ DF.	
Physolobium Benth.	(Papilionaceae)		
elatum Benth.	Nov. Holl.	† T.	
Physospermum Cass.	(Umbelliferae)		
aquilegiaefolium Koch	Eur. aust.	‡ DF.	
Cicutarium Spr.	Caucasus	‡ DF.	
Physostegia Benth.	(Labiales)		
imbricata Hook.	Texas	‡ DF.	
ludoviciana Hort.	Am. bor. aust.	‡ DF.	
speciosa Swt.	Amer. bor.	‡ D.	
virginiana Benth.	"	‡ D.	
Phyteuma L.	(Campanulaceae)		
betonicaefolium Vill.	Alpes	‡ D. A.	
campanuloides M. B.	Cauc. Armen.	‡ DF.	
canescens W. et K.	Eur. or. aust.	‡ D.	
Charmellii Vill.	Alpes	‡ D. A.	
hemisphaericum L.	"	‡ D. A.	
laevigatum H. Ber.	?	‡ D. A.	
limonifolium S. et Sm.	Eur. aust. or.	‡ DF.	
Michellii All.	Alpes	‡ D. A.	
Phyteuma			
orbiculare L.	Europa	‡ D. A.	
persicaefolium Hopp.	Alpes	‡ D. A.	
pulchellum F. et M.	Caucasus	‡ DF.	
rigidum W.	Oriens	‡ DF.	
Scheuchzeri All.	Alpes	‡ D. A.	
" β . corniculatum Gaud.			
scorzoneraefolium Vill.	Alpes	‡ D. A.	
spicatum L.	Europa	‡ D. A.	
Phytolacca Tourn.	(Phytolaccaceae)		
decandra L.	Am. bor. aust.	‡ DF.	
dioica L.	Amer. aust.	‡ C.	
dodecandra L'Her.	?	‡ C.	
icosandra L.	Asia aust.	‡ C.	
octandra L.	Ind. occ.	‡ C.	
stricta Hoffm.	Amer. aust.	‡ C.	
Picea Lk.	(Abietineae)		
alba Lk.	Amer. bor.	5 D.	
canadensis Lk.	"	5 D.	
excelsa Lk.	Europa	5 D.	
nigra Lk.	Amer. bor.	5 D.	
rubra Lk.	"	5 D.	
Picnomon Adans.	(Synantheraceae)		
Acarna Cass.	Eur. aust.	⊙ 2 DF.	
Picridium Desf.	(Synantheraceae)		
arabicum Steudl.	Arabia	⊙ D.	
tingitanum Desf.	Sicil., Afr. b.	⊙ D.	
vulgare Desf.	Eur. aust.	⊙ D.	
Picris L.	(Synantheraceae)		
dahurica Fisch.	Sibir. aust.	2 D.	
hieracioides L.	Europa	⊙ D.	
" β . ruderalis Schm.			
lacinata Vis.	Dalmatia	⊙ FD.	
pauciflora W.	Eur. aust.	⊙ D.	
Sprengeriana Lam.	"	⊙ D.	
Piddingtonia DeC. f.	(Lobeliaceae)		
nummularia DeC. f.	Ind. or.	‡ T.	
Pilea Lindl.	(Urticaceae)		
mucosa Lindl.	Ind. occ.	⊙ CF.	
Pilosella (Thal) K. *)	(Cruciferae)		
Thaliana K.	Europa	⊙ D.	
Pimelea B. et S.	(Thymelaeaceae)		
decussata R. Br.	Nov. Holl.	† T.	
diosmaefolia Lodd.	"	† T.	
drupacea Lab.	Tasmania	† T.	
hispida R. Br.	Nov. Holl.	† T.	
hypericina Cungh.	"	† T.	
incana R. Br.	Tasmania	† T.	
ligustrina Lab.	Nov. Holl.	† T.	
nivea Lab.	Tasmania	† T.	
rosea R. Br.	Nov. Holl.	† T.	
sylvestris R. Br.	"	† T.	
Pimpinella L.	(Umbelliferae)		
Anisum L.	Aegyptus	⊙ D.	
aromatica M. B.	Caucasus	⊙ D.	
cretica Poir.	Graecia	‡ F.	
magna L.	Europa	‡ D.	
" β . dissecta Retz.			
nigra W.	Eur. bor.	‡ D.	

*) Cerus phyllanthoides DeC.

**) C. Phyllanthus DeC.

*) Arabidis vel Sisimbrii sp. Aut.

Pimpinella					
<i>orientalis</i> Gou.	Eur. or.	4 D.			
<i>peregrina</i> L.	Eur. aust.	2 D.			
<i>rotundifolia</i> M. B.	Caucasus	4 D. A.			
<i>rugosa</i> Rehb.	?	4 D.			
<i>Saxifraga</i> L.	Europa	4 D.			
Pinellia Ten.					
<i>tuberifera</i> Ten.	Japonia	4 DF.			
Pinus Tourn.					
<i>brutia</i> Ten.	Neapolis	5 F.			
<i>Cembra</i> L.	Alpes	5 D.			
<i>halepensis</i> Mill.	Eur. aust. Or.	5 F.			
<i>Hamiltoni</i> Ten.	Neapolis	5 F.			
<i>Laricio</i> Poir.	Eur. aust.	5 DF.			
<i>maritima</i> Lamb.	" "	5 F.			
<i>nigricans</i> Host.	Aust. Hung.	5 D.			
<i>Pinaster</i> Ait.	Eur. aust.	5 F.			
<i>Pinea</i> L.	" "	5 F.			
<i>Pumilio</i> Hke.	Alp. Subalp.	4 D.			
<i>rigida</i> Mill.	Amer. bor.	5 D.			
<i>Strobilus</i> L.	" "	5 D.			
<i>sylvestris</i> L.	Europa	5 D.			
<i>Taeda</i> L.	Amer. bor.	5 D.			
<i>variabilis</i> Lamb.	" "	5 D.			
(vide: <i>Abies</i> — <i>Cedrus</i> — <i>Cunninghamia</i> — <i>Lari</i> — <i>Picea</i>).					
Piper L.					
<i>bullatum</i> Vahl.	Ind. occ.	4 C.			
<i>prunifolium</i> Jacq.	Columbia	4 C.			
<i>reticulatum</i> L.	Ind. occ.	4 C.			
<i>rugosum</i> Lam.	" "	4 C.			
<i>scabridum</i> Schott	Brasilia	4 C.			
<i>spurium</i> Lk.	?	4 C.			
<i>unguiculatum</i> R. et P.	Peruvia	4 C.			
(vide: <i>Enkea</i> — <i>Heckeria</i> — <i>Peperomia</i> — <i>Steffensia</i>).					
Piptanthus Swt.					
<i>nepalensis</i> Swt.	Nepalia	4 T.			
Piptatherum P. B.					
<i>coerulescens</i> P. B.	Eur. aust.	4 FD.			
<i>frutescens</i> K.	Neap. Creta	4 F.			
<i>holciforme</i> R. et S.	Taur. Cauc.	4 DF.			
<i>multiflorum</i> P. B.	Eur. aust.	4 DF.			
<i>paradoxum</i> P. B.	" "	4 DF.			
Piptoclaina G. Don					
<i>supina</i> G. Don	Eur. or-aust.	2 D.			
Piqueria Cav.					
<i>trinervia</i> Cav.	Mexico	4 T.			
Pisonia Plum.					
<i>fragrans</i> Desf.	Ind. occ.	4 C.			
Pistolocheia Raf.					
<i>labiosa</i> K.	Brasilia	4 C.			
Pistacia L.					
<i>Lentiscus</i> L.	Eur. aust.	5 F.			
<i>mutica</i> F. et M.	?	4 F.			
Pisum Tourn.					
<i>abyssinicum</i> A. Braun	Abyssinia	2 D.			
<i>arvense</i> L.	Asia med.	2 D.			
<i>Jomardi</i> Schrk.	Aegyptus	2 D.			
<i>maritimum</i> L.	Eur. occ. aust.	4 D.			
Pisum					
<i>sativum</i> L.	Asia med.	2 D.			
" <i>β. macrocarpum</i> Ser. — <i>γ. um-</i>					
<i>bellatum</i> L. — <i>δ. quadratum</i> L. —					
<i>ε. humile</i> Mill.					
<i>thebaicum</i> W.	Aegyptus	2 D.			
Pitcairnia L'Her.					
<i>albiflora</i> Spr.	Brasilia	4 C.			
<i>angustifolia</i> Ait.	Ind. occ.	4 C.			
<i>bromeliaefolia</i> L'Her.	" "	4 C.			
<i>latifolia</i> Ait.	" "	4 C.			
<i>mexicana</i> Hort.	Mexico	4 C.			
<i>odoratissima</i> H. Gall.	Amer. aust.	4 C.			
<i>ramosa</i> Jacq.	" "	4 C.			
Pittosporum Sol.					
<i>coriaceum</i> Ait.	Madera	4 T.			
<i>revolutum</i> DeC.	Nov. Holl.	4 T.			
<i>Tobira</i> Ait.	Japonia	4 T.			
<i>undulatum</i> Ait.	Nov. Holl.	4 T.			
<i>viridiflorum</i> Sims.	Cap. b. sp.	4 T.			
Plagianthus Forst.					
<i>divaricatus</i> Forst.	Nov. Zeel.	4 T.			
Plagiobotrys F. et M.					
<i>rufescens</i> F. et M.	Chili	2 D.			
Plagiurus L'Her.					
<i>ageratifolius</i> L'Her.	Eur. aust. Afr.	4 F.			
Planera Gmel.					
<i>ulmifolia</i> Mchx.	Am. bor-aust.	5 DF.			
(vide: <i>Zelkova</i>).					
Plantago Tourn.					
<i>abyssinica</i> Hochst.	Abyssinia	4 DF.			
<i>adpersa</i> Bhd.	Lusitania	4 F.			
<i>afra</i> L.	Sicil. Afr. bor.	4 F.			
<i>alpina</i> L.	Alpes	4 D. A.			
" <i>β. bidentata</i> Mur.					
<i>altissima</i> Jacq.	Eur. or-aust.	4 D.			
" <i>β. irrigua</i> Fisch.					
<i>amplexicaulis</i> Cav.	Hispan. Afr.	2 D.			
<i>arenaria</i> W. et K.	Eur. med.	2 D.			
<i>aristata</i> Mchx.	Amer. bor.	2 D.			
<i>asiatica</i> L.	Asia bor. med.	4 D.			
<i>Bellardi</i> All.	Eur. aust.	2 D.			
<i>camtschatica</i> Cham.	Asia bor-or.	4 D. A.			
<i>carinata</i> Schrad.	Eur. aust.	4 DF.			
<i>carnosa</i> Lam.	Cap. b. sp.	4 F.			
<i>cordata</i> Lam.	Amer. bor.	4 D.			
<i>Cornuti</i> Gou.	Eur. aust.	4 FD.			
<i>Coronopus</i> L.	Europa	2 D.			
" <i>β. Columnae</i> Gou.					
<i>crispa</i> Jacq.	Eur. aust.	4 DF.			
<i>cucullata</i> Lam.	Amer. bor.	4 D.			
<i>Cumingiana</i> F. et M.	Chili	4 F.			
<i>cylindrica</i> Forsk.	Aegyptus	4 F.			
<i>Cynops</i> L.	Eur. aust.	4 D.			
<i>divaricata</i> Zuccg.	" "	2 D.			
<i>d'Urvillei</i> DeC.	Chili	4 F.			
" <i>β. californica</i> F. et M.					
<i>eriotachya</i> Ten.	Neapolis	2 D.			
<i>Eschscholtziana</i> F. et M.	Chili	4 F.			
<i>exaltata</i> Horn.	Asia bor.	4 D.			

Plantago

- agestianoides S. et Sm. Oriens 4.FD.
 graminea Lam. Eur.med.-aus. 4.DF.
 Hookeriana F. et M. Texas ①D.
 hungarica W. et K. Hungaria 4.D.
 Lagopus L. Eur. aust. ①D.
 lanata W. Asia aust. ①D.
 lanceolata L. Europa 4.D.
 Loefflingii L. Hispania ①D.
 " β . caspica F. et M.
 macrorrhiza Poir. Ital. Afr. b. ②4.FD.
 major L. Europa 4.D.
 " β . bracteata Mnh.
 maritima L. Europa 4.D.
 " β . ciliata Koch
 maxima Ait. Eur. or. Sibir. 4.D.
 media L. Europa 4.D.
 " β . alpestris Wierzb.
 mexicana Lk. Mexico 4.F.
 " β . californica F. et M.
 microcephala Poir. Asia aust. ①D.
 montana Lam. Alpes 4.D. 4.
 " β . holosericea.
 parviflora Desf. Afr. bor. ①D.
 Psyllium L. Eur. aust. ①D.
 pumila L. Graec. Aegypt. ①D.
 recurvata L. Eur. aust. 4.F.
 salsa Pall. Ruth. aust. 4.DF.
 saxatilis M. B. Caucasus 4.DF.
 scorzoneraefolia Lam. Oriens 4.F.
 sericea W. et K. Eur. aust. 4.FD.
 Seetzenii Bhd. Arabia 4.T.
 sibirica Desf. Asia bor. 4.D.
 squarrosa Murr. Aegyptus ①D.
 stricta Schousb. Eur. aust. Afr. ①D.
 subulata L. " " 4.DF.
 tenuiflora W. et K. Eur. or.-aust. ①D.
 truncata Cham. Chili ①D.
 virginica L. Amer. bor. ①D.
 Platanus Tourn. (Plataniceae)
 acerifolia W. Oriens 5.D.
 cuneata W. " 5.D.
 digitata Boo. ? 5.D.
 occidentalis L. Amer. bor. 5.D.
 Platycapnos DeC. (Fumariaceae)
 spicatus Bhd. Lusitania ①D.
 Platycerium Desf. (Polypodiaceae)
 alicorne Blum. Afr. trop. 4.C.
 Platycodon DeC. f. (Campanulaceae)
 grandiflorus DeC. f. Sibir. aust. 4.DF.
 Platylodium Sm. (Papilionaceae)
 triangulare R. Br. Tasmania 4.F.
 Platypteris, vide: Verbesina.
 Platystemon Benth. (Papaverineae)
 californicus Benth. California ①D.
 leiocarpos F. et M. ①D.
 Platystigma Benth. (Papaverineae)
 lineare Benth. California ①D.
 Plectranthus L'Her. (Labiatae)
 australis R. Br. Nov. Holl. ①CD.

Plectranthus

- cordifolius Don Ind. or. 4.C.
 fruticosus L'Her. Cap. b. sp. 4.T.
 graveolens R. Br. Nov. Holl. 4.T.
 parviflorus W. Amer. aust. 4.T.
 (vide: Coleus).
 Plectritis DeC. (Valerianaceae)
 congesta DeC. Am. bor.-occ. ①D.
 Pleiogyne C. Koch (Synanthereae)
 anthemoides C. Koch Hisp. Aegypt. ①CD.
 microcephala C. Koch Cap. b. sp. ①CD.
 nudicaulis C. Koch " ①CD.
 Pleroma Don (Melastomaceae)
 heteromallum Don Brasilia 4.C.
 vimineum Don " 4.C.
 Pleurospermum Hoffm. (Umbelliferae)
 austriacum Hoffm. Alp. Sudeti 4.D. 4.
 uralense Hoffm. Sibiria 4.D. 4.
 (vide: Malabaila).
 Pluchea Cass. (Synanthereae)
 bifrons DeC. Carolina 4.DF.
 Dioscoridis DeC. Aegyptus 4.F.
 subdecurrens Cass. Mexico 4.C.
 Plumbagella Spach (Plumbagineae)
 micrantha Spach Sibir. aust. ①D.
 Plumbago Tourn. (Plumbagineae)
 capensis Thb. Cap. b. sp. 4.TD.
 coerulea Kth. Peruvia 4.C.
 europaea L. Eur. aust. 4.D.
 lapathifolia M. B. Cauc. Georg. 4.D.
 rosea L. Ind. or. 4.C.
 scandens L. Columbia 4.C.
 zeylanica L. Ind. or. 4.C.
 Poa L. (Gramineae)
 alpina L. Alp. Subalp. 4.D. 4.
 angustifolia L. Europa 4.D.
 annua L. " ①D.
 arundinacea Lk. Cauc. Armen. 4.DF.
 autumnalis Mühlb. Am. bor.-aust. 4.D.
 badensis Hke. Austria 4.D.
 bulbosa L. Europa 4.D.
 " β . alpina.
 caesia Sm. Scotia, Helv. 4.D.
 cenisia All. Alpes 4.D. 4.
 compressa L. Europa 4.D.
 concinna Gaud. Eur. aust. 4.D.
 fertilis Host. Europa 4.D.
 glauca Sm. Alpes 4.D. 4.
 hybrida Gaud. Mont. Eur. m. 4.D. 4.
 nemoralis L. Europa 4.D.
 " β . coarctata Hall. f. — 4.F.
 formula Gaud. — δ . 4.F.
 montana Gaud. —
 e. glaucescens Roth.
 pratensis L. Europa 4.D.
 sterilis M. B. Tauria 4.D.
 sudetica Hke. Mont. Subal. 4.D. 4.
 supina Schrad. Alpes 4.D. 4.
 trivialis L. Europa 4.D.
 viridis Schreb. Amer. bor. 4.D.
 (vide: Eragrostis — Glyceria).

- Pocockia* Ser. (*Papilionaceae*)
cretica Ser. Creta, Afr. bor. ⊙ D.
Podalyria Lam. (*Papilionaceae*)
biflora Lam. Cap. b. sp. † T.
myrtillifolia W. " " † T.
oleaeifolia H. Ber. " " † T.
sericea R. Br. " " † T.
styracifolia Sims " " † T.
Podanthes Haw. (*Asclepiadineae*)
roriflua Haw. Afr. aust. † C.
Podocarpus L'Her. (*Taxineae*)
elongatus L'Her. China 5 F.
Mackii H. Belg. " 5 F.
macrophyllus Wall. Japon. Nepal. 5 F.
Podolepis Lab. (*Synanthereae*)
gracilis Grah. Nov. Holl. ⊙ CD.
Podophyllum L. (*Berberideae*)
peltatum L. Amer. bor. † D.F.
Podosaeum Kth. (*Gramineae*)
tenuiflorum Lk. Amer. bor. † D.
Podospermum DeC. (*Synanthereae*)
calcitrapaeifolium DeC. Eur. aust. ⊙ D.
canum C. A. Mey. Caucasia † D.
Jacquinianum Koch Eur. or-aust. † D.
laciniatum DeC. Eur. med. aust. ⊙ D.
octangulare Roth Eur. med. aust. ⊙ D.
Podotheca Cass. (*Synanthereae*)
angustifolia Less. Nov. Holl. ⊙ CD.
Pogostemon Desf. (*Labiatae*)
plectranthoides Desf. Ind. or. † C.
Poinsettia Grah. (*Euphorbiaceae*)
cyatophora Bartl. Amer. trop. ⊙ C.
pulcherrima Grah. Mexico † C.
Poirrea Comm. (*Combretineae*)
comosa Swt. Guinea † C.
Polanisia Raf. (*Capparideae*)
dodecandra DeC. Ind. or. ⊙ C.
graveolens Raf. Am. bor-aus. ⊙ CD.
viscosa DeC. Ind. or. ⊙ C.
Polemonium Tourn. (*Polemoniaceae*)
coeruleum L. Eur. Asia bor. † D.
album.
gracile W. Asia bor. † D.
humile Pall. " † D.
mexicanum Cerv. Mexico ⊙ † D.
muricatum Lag. " † F.
pulchellum Bge. Sibir. aust. † D.F.
pulcherrimum Hook. Am. bor-occ. † D.F.
sibiricum Swt. Asia bor. † D.
Polianthes L. (*Liliaceae*)
tuberosa L. Ind. or. † F.
β. fl. pleno.
Pollichia Sol. (*Paronychiaceae*)
campestris Ait. Cap. b. sp. ⊙ † T.
Pollinia Spr. (*Gramineae*)
Gryllus Spr. Eur. aust. † D.F.
Polyactidium DeC. (*Synanthereae*)
delphinifolium DeC. Mexico ⊙ F.D.
Polyarrhena Cass. (*Synanthereae*)
reflexa Cass. Cap. b. sp. † T.
Polycarpaea Lam. (*Paronychiaceae*)
latifolia Poir. Canariae ⊙ CD.
Teneriffae Lam. " ⊙ CD.
Polycarpon Loeßl. (*Paronychiaceae*)
tetraphyllum L. Eur. aust. ⊙ D.
Polycnemum L. (*Amarantaceae*)
arvense L. Europa ⊙ D.
Heuffelii Lang. Hungaria ⊙ D.
verrucosum Lang. " ⊙ D.
Polygala Tourn. (*Polygalaceae*)
bracteolata Thb. Cap. b. sp. † T.
cordifolia Thb. " " † T.
grandiflora Lodd. " " † T.
latifolia Ker. " " † T.
myrtifolia L. " " † T.
oppositifolia L. " " † T.
speciosa Sims. " " † T.
umbellata Thb. " " † T.
virgata Thb. " " † T.
vulgaris L. Europa † D.
Zeyheri Spr. Cap. b. sp. † T.
 (vide: *Chamaebuxus* — *Mundia* — *Muraltia*).
Polygonatum Tourn. (*Smilacineae*)
latifolium Desf. Eur. aust. † D.
multiflorum All. Europa † D.
β. bracteatum Schl. Europa † D.
officinale All. " † D. J.
verticillatum All. " † D. J.
Polygonum Tourn. (*Polygonaceae*)
acidulum W. Asia bor. † D.
alpestre C. A. Mey. Caucasus † D.
alpinum All. Eur. aust. † D.
amphibium L. Europa † D.
β. natans W. ∇
amplexicaule Don Ind. or. † F.
arenarium W. et K. Hungaria ⊙ D.
articulatum L. Amer. cor. † D.
aviculare L. Europa ⊙ D.
Bellardi All. Eur. aust. ⊙ D.
Bistorta L. Europa † D.
bistortoides Pursh. Amer. bor. † D.
chinense L. China, Nepal. † F.
coccineum Mühlb. Amer. bor. † D.
Convolvulus L. Europa ⊙ D.
divaricatum L. Asia bor. † D.
dumetorum L. Europa ⊙ D.
elegans Ten. Neapolis † D.
graciliflorum Wierzb. Banatus ⊙ F.D.
Hydropiper L. Europa ⊙ D. ∇
lapathifolium L. " ⊙ D.
laxiflorum Whe. " ⊙ D.
Laxmanni Lep. Asia bor. † D.
maritimum L. Eur. aust. † F.
minus Huds. Europa ⊙ D.
nodosum Pers. " ⊙ D.
ochreatum L. Asia bor. † D.
orientale L. Asia med. aust. ⊙ D.

Polygonum					
↳ Persicaria L.	Europa	⊙ D.			
↳ Roberti Loisl.	Gallia	⊔ FD.			
↳ salignum W.	Asia bor.	⊔ D.			
↳ sibiricum Lxm.	" "	⊔ D.			
↳ sericeum Pall.	" "	⊔ DF.			
↳ tinctorium Lour.	China	⊙ ⊔ FD.			
↳ undulatum Murr.	Asia bor.	⊔ D.			
↳ virginianum L.	Amer. bor.	⊔ D.			
↳ viviparum L.	Alp. Subalp.	⊔ D. ⊔			
(vide: Fagopyrum — Sarcogonum).					
Polymnia L.		(<i>Synanthereae</i>)			
↳ Uvedalia L.	Mex. Am. bor.	⊔ FD.			
Polypodium L.		(<i>Polypodiineae</i>)			
↳ calcareum Sm.	Europa	⊔ D. ⊔			
↳ cambricum L.	Anglia	⊔ D. ⊔			
↳ concinnum W.	Amer. aust.	⊔ C.			
↳ Dryopteris L.	Europa	⊔ C.			
↳ laetum Radd.	Brasilia	⊔ C.			
↳ longifolium Cav.	Columbia	⊔ C.			
↳ molliculum Kze.	?	⊔ C.			
↳ Phegopteris L.	Europa	⊔ D. ⊔			
↳ polystichum Lk.	Brasilia	⊔ C.			
↳ pycnosorum Lk.	Ind. occ.	⊔ C.			
↳ subtetragonum Lk.	Brasilia	⊔ C.			
↳ vulgare L.	Europa	⊔ D.			
(vide: Aspidium — Asplenium — Bathmum — Chrysopteris — Cystopteris — Goniopteris — Microsorium — Nephrodium — Polystichum — Tectaria — Woodsia).					
Polypogon Desf.		(<i>Gramineae</i>)			
↳ maritimus W.	Eur. aust.	⊙ D.			
↳ mexicanus Schlecht.	Mexico	⊙ D.			
↳ monspeliensis Desf.	Eur. aust.	⊙ D.			
Polystichum Roth		(<i>Polypodiineae</i>)			
↳ acrostichoides Sw.	Amer. bor.	⊔ D. ⊔			
↳ aculeatum Schott	Europa	⊔ D. ⊔			
↳ Lonchitis Schott	Alp. Subalp.	⊔ D. ⊔			
Pomaderris Lab.		(<i>Rhamnaceae</i>)			
↳ apetala Lab.	Nov. Holl.	⊔ T.			
↳ betulina Cunng.	" "	⊔ T.			
↳ elliptica Lab.	" "	⊔ T.			
↳ phyllaefolia Lodd:	" "	⊔ T.			
Pontederia L.		(<i>Pontederiaceae</i>)			
↳ cordata L.	Ind. oc. Am. b.	⊔ T. ∇			
(vide: Eichhornia).					
Populus Tourn.		(<i>Salicineae</i>)			
↳ alba L.	Europa	5 D.			
↳ balsamifera L.	Amer. bor.	5 D.			
↳ benzoefera Tsch.	?	5 D.			
↳ candicans Ait.	Amer. bor.	5 D.			
↳ canescens Sm.	Europa	5 D.			
↳ hudsonica Mchx.	Amer. bor.	5 D.			
↳ laurifolia Led.	Sibir. aust.	5 D.			
↳ Lindleyana Hort.	?	5 D.			
↳ monilifera Ait.	Amer. bor.	5 D.			
↳ nigra L.	Europa	5 D.			
↳ pyramidalis Roz.	Italia ?	5 D.			
↳ tremula L.	Europa	5 D.			
Porlieria R. et P.		(<i>Zygophyllineae</i>)			
↳ hygrometrica R. et P.	Peruvia, Chili	⊔ T.			
Porophyllum Vail.		(<i>Synanthereae</i>)			
↳ coloratum DeC.	Mexico	⊙ CF.			
↳ ellipticum Cass.	Amer. aust.	⊙ CF.			
↳ linifolium DeC.	" "	⊔ T.			
Portulaca Tourn.		(<i>Portulacaceae</i>)			
↳ Gilliesii Hook.	Chili	⊙ ⊔ T.			
↳ " β. coccinea.					
↳ grandiflora Hook.	"	⊙ ⊔ T.			
↳ latifolia Horn.	?	⊙ D.			
↳ mucronata Lk.	?	⊙ CD.			
↳ oleracea L.	Europa	⊙ D.			
↳ pilosa L.	Amer. aust.	⊙ CD.			
↳ quadrifida L.	Aeg. Asia aust.	⊙ C.			
↳ rostellata Brign.	Brasilia	⊙ ⊔ F.			
↳ Thelusionii Hook.	Chili	⊙ ⊔ T.			
Potentilla L.		(<i>Dryadineae</i>)			
↳ adpressa K.	?	⊔ D.			
↳ agrimonoides M. B.	Cauc. Sib. aust.	⊔ D.			
↳ altaica Bge.	Sibir. aust.	⊔ D.			
↳ anserina L.	Europa	⊔ D.			
↳ arachnoidea Dougl.	Amer. bor.	⊔ D.			
↳ argentea L.	Europa	⊔ D.			
↳ " β. impolita W. Hlbg.					
↳ arguta Pursh	Amer. bor.	⊔ D.			
↳ astracanica Jacq.	Ruth. aust.	⊔ D.			
↳ atrosanguinea Lodd.	Nepalia	⊔ DF.			
↳ aurea L.	Alpes	⊔ D. ⊔			
↳ bifurca W.	Eur. or. Sibir.	⊔ D.			
↳ Bigelowiana Wendr.	Amer. bor.	⊔ D.			
↳ bipinnatifida Dougl.	" "	⊔ D.			
↳ calabra Ten.	Neapolis	⊔ DF.			
↳ canadensis L.	Amer. bor.	⊔ D.			
↳ canescens Bess.	Europa	⊔ D.			
↳ caulescens L.	Alpes	⊔ D. ⊔			
↳ chrysantha Trev.	Eur. or.	⊔ D.			
↳ cinerea Chaix	Eur. med. aust.	⊔ D.			
↳ collina Wib.	Germania	⊔ D.			
↳ colorata Lehm.	Nepalia	FDF.			
↳ conferta Bge.	Sibir. aust.	⊔ D.			
↳ dasycphylla Bge.	" "	⊔ D.			
↳ dealbata Bge.	" "	⊔ D.			
↳ desertorum Bge.	" "	⊔ D.			
↳ diffusa W.	Eur. or.	⊔ D.			
↳ dissecta Pursh	Amer. bor.	⊔ D.			
↳ divaricata DeC.	Eur. aust.	⊔ D.			
↳ effusa Lehm.	Amer. bor.	⊔ D.			
↳ floribunda Pursh	" "	⊔ D.			
↳ fragarioides L.	Ruth. Sibiria	⊔ D.			
↳ fragiformis W.	Sibir. aust.	⊔ D.			
↳ fruticosa L.	Eur. aust.	⊔ D.			
↳ garipensis Eckl.	Cap. b. sp.	⊙ CD.			
↳ gelida C. A. Mey.	Sib. aus. Cau.	⊔ D. ⊔			
↳ geoides M. B.	Tauria	⊔ D.			
↳ glabra Lodd.	Sibir. aust.	⊔ DF.			
↳ glandulosa Lindl.	California	⊔ DF.			
↳ gracilis Dougl.	Amer. bor.	⊔ D.			
↳ grandiflora L.	Alpes	⊔ D. ⊔			
↳ Güntheri Pohl	Europa	⊔ D.			

Potentilla

haematochrus Lehm.	Mexico	♀.FD.
Hippiana Lehm.	Amer. bor.	♀.D.
Hopwoodiana Swt.	Hybrida	♀.DF.
hirta L.	Eur. aust.	♀.D.
hispidula Nestl.	Asia bor.	♀.D.
iberica H. Par.	Iberia	♀.DF.
incisa Desf.	Eur. aust.	♀.D.
intermedia L.	" "	♀.D.
laciniosa W. et K.	Eur. or-aust.	♀.D.
laeta Rchb.	Dalmatia	♀.D.
lineata Trev.	Nepalia	♀.DF.
Loddigesii Spr.	Asia bor.	♀.D.
megalontodon Lehm.	?	♀.D.
micrantha Ram.	Alpes	♀.D. ♀.
millegrana Dougl.	Amer. bor.	♀.D.
missurica Schrad.	" "	♀.D.
Morisonii DeC.	" "	♀.D.
multifida L.	Eur. aust.	♀.D.
" β. angustifolia.		
Neumanniana Rch.	Germania	♀.D.
norvegica L.	Eur. bor. med.	♀.D.
obscura W.	Europa	♀.D.
odorata Mart.	?	♀.D.
opaca L.	Europa	♀.D.
ornithopoda Tsch.	Siberia	♀.D.
patula W. et K.	Eur. or-aust.	♀.D.
pedata W.	Eur. aust.	♀.D.
pennsylvanica L.	Amer. bor.	♀.D.
" β. strigosa Lehm.		
pilosa W.	Europa	♀.D.
pulcherrima Lehm.	Amer. bor.	♀.D.
recta L.	Europa	♀.D.
reptans L.	"	♀.D.
Richardsonii Ten.	Amer. bor.	♀.D.
Romanzoffii Led.	?	♀.D.
rupestris L.	Europa	♀.D.
Russeliana Swt.	Hybr.	♀.DF.
ruthenica W.	Eur. or. Asia	♀.D.
salisburgensis Hke.	Alpes	♀.D. ♀.
" β. gracilis.		
sericea L.	Siberia	♀.D.
Sprengeliana Lehm.	"	♀.D.
stellulata Rochl.	Banatus	♀.DF.
stolonifera Lehm.	Camtschatka	♀.D.
strigosa Pall.	Asia bor.	♀.D.
subpinnata Led.	" "	♀.D.
supina L.	Europa	♀.D.
tanacetifolia W.	Asia bor.	♀.D.
taurica W.	Ruth. aust.	♀.D.
Tenoreana Jacq. fil.	Italia	♀.D.
Thomasii Ten.	Neapolis	♀.DF.
thuringiaca Bhd.	Germania	♀.D.
Tonguei H. Angl.	Hybr.	♀.DF.
umbrosa Stev.	Tauria	♀.D.
virgata Lehm.	?	♀.D.
viscosa Don	Siberia	♀.D.
Wrangeliana F. et L.	Nov. Californ.	♀.DF.
Poterium L.	(Sanguisorbaceae)	
garganicum Ten.	Neapolis	♀.DF.

Poterium

glaucescens Rchb.	Europa	♀.D.
" β. guestphalicum Böngb.		
hybridum L.	Eur. aust.	♀.DF.
mauritanicum Boiss.	Hisp. Afr. b.	♀.FD.
polygamum W. et K.	Hungaria	♀.D.
Sanguisorba L.	Europa	♀.D.
spinosum L.	Graec. Oriens	♀.F.
verrucosum Lk.	Aegypt. Arab.	♀.FD.
Pothos, vide: Anthurium	— Monstera —	
Symplocarpus.		
Prangos Lindl.	(Umbelliferae)	
ferulacea Lindl.	Oriens	♀.DF.
Prasium L.	(Labiateae)	
majus L.	Eur. aust.	♀.F.
Prenanthes Vaill.	(Synanthereae)	
purpurea L.	Montes Eur.	♀.D. ♀.
tenuifolia L.	Alp. occ. aus.	♀.D. ♀.
(vide: Chondrilla — Nabalus — Phae-nopus).		
Preslia Opiz	(Labiateae)	
cervina Fres.	Eur. aust.	♀.D.
Primula Tourn.	(Primulaceae)	
acaulis Jacq. et var.	Eur. med. aust.	♀.D.
elatior Jacq. et var.	" "	♀.D.
inflata Lehm.	Eur. aust.	♀.D.
macrocalyx Bge.	Sibir. aust.	♀.D.
marginata Carl.	Alpes	♀.D. ♀.
officinalis Jacq.	Europa	♀.D.
" β. inclusa.		
suaveolens Bertol.	Eur. aust.	♀.D.
(vide: Aleuritica — Auganthus — Auricula).		
Prinos L.	(Illiciaceae)	
glaber L.	Am. bor. aust.	♀.DF.
padifosius W.	" "	♀.DF.
verticillatus L.	" "	♀.DF.
(vide: Nemopanthes).		
Prionopsis Nutt.	(Synanthereae)	
ciliata Nutt.	Arkansas	♀.FD.
Priva Adans.	(Verbenaceae)	
mexicana Pers.	Mexico	♀.T.
Prosopis L.	(Mimosaceae)	
torquata DeC.	Amer. trop.	♀.C.
(vide: Algarobia).		
Prostanthera Lab.	(Labiateae)	
Lasianthus Lab.	Nov. Holl.	♀.T.
rotundifolia R. Br.	" "	♀.T.
violacea R. Br.	" "	♀.T.
Protea L.	(Proteaceae)	
fulva Tsch.	Cap. b. sp.	5 T.
Lepidocarpus R. Br.	" "	5 T.
Melaleuca R. Br.	" "	5 T.
mellifera Thb.	" "	5 T.
Scolymus Thb.	" "	5 T.
(vide: Leucadendron — Mimetes).		
Prunella L.	(Labiateae)	
aequinoctialis Kth.	Mexico	♀.DF.
alba Pall.	Europa	♀.D.
australis Swt.	Nov. Holl.	♀.DF.

Prunella

grandiflora L.	Europa	4 D.
intermedia Brot.	Eur. aust.	4 D.
pensylvanica W.	Amer. bor.	4 F.
vulgaris L.	Europa	4 D.
" β . parviflora Poir — γ . hirta		
Wendr. — δ . pinnatifida P.		

Prunus Tourn. (*Amygdalineae*)

candicans W.	?	4 D.
cerasifera Ehrh.	Amer. bor. ?	5 D.
Cocumilia Den.	Neapolis	4 DF.
divaricata Led.	Caucasia	4 DF.
domestica L.	Eur. aust.	5 D.

" β . fl. pleno.		
insititia L.	Europa	5 D.
maritima Wgh.	Amer. bor.	4 D.
spinosa L.	Europa	4 D.
xanthocarpa K.	?	4 D.
(vide: Armeniaca — Cerasus).		

Psiadia Jacq. (*Synanthereae*)

glutinosa Jacq.	Mascarenhas	4 T.
-----------------	-------------	------

Psidium L. (*Myrtineae*)

acre Ten.	Amer. aust.	5 C.
Cattleyanum Sab.	Brasilia	5 C.
montanum Sw.	Ind. occ.	5 C.
pomiferum L.	Amer. trop.	5 C.
pyriferum L.	" "	5 C.

Psilonema C. A. Mey. (*Cruciferae*)

calycinum C. A. Mey.	Europa	4 D.
----------------------	--------	------

Psilurus Trin. (*Gramineae*)

ardoides Trin.	Eur. aust.	4 D.
----------------	------------	------

Psoralea L. (*Papilionaceae*)

aculeata L.	Cap. b. sp.	4 T.
albicans E. et Z.	" "	4 T.
aphylla L.	" "	4 T.
argentea Thb.	" "	4 T.
bracteata L.	" "	4 T.
capitata L.	" "	4 T.
conferta Bertol.	" "	4 T.
corylifolia L.	Asia aust.	4 C.
dentata DeC.	Cap. b. sp.	4 T.
glandulosa L.	Chili	4 T.
hirta L.	Cap. b. sp.	4 T.
intermedia Bess.	" "	4 T.
involuta Thb.	" "	4 T.
lathyrifolia Balb.	" "	4 T.
macrostachya DeC.	California	4 FD.
multicaulis Jacq.	Cap. b. sp.	4 T.
odoratissima Jacq.	" "	4 T.
Onobrychis Nutt.	Am. bor.-aust.	4 FD.
parviflora Tsch.	Cap. b. sp.	4 T.
pinnata L.	" "	4 T.
procera Bert.	" "	4 T.
speciosa W. et Z.	" "	4 T.
spicata L.	" "	4 T.
striata Thb.	" "	4 T.
tenuifolia L.	" "	4 T.
triflora Thb.	" "	4 T.
verrucosa L.	" "	4 T.

(vide: Aspalathium).

Psorophytum Spach (*Hypericineae*)

balearicum K.	Balearae	4 F.
---------------	----------	------

Psychine Desf. (*Cruciferae*)

stylosa Desf.	Afr. bor.	4 FD.
---------------	-----------	-------

Psychotria L. (*Rubiaceae*)

undata Jacq.	Ins. Baham.	4 C.
--------------	-------------	------

Ptarmica Tourn. (*Synanthereae*)

alpina DeC.	Alpes	4 D.
-------------	-------	------

" β . angustifolia K.		
-----------------------------	--	--

atrata DeC.	Alpes	4 D. 4.
-------------	-------	---------

biserrata DeC.	Cauc. Armen.	4 D.
----------------	--------------	------

cartilaginea K.	Eur. or.	4 D.
-----------------	----------	------

Clavennae DeC.	Alpes	4 D. 4.
----------------	-------	---------

cristata DeC.	Italia	4 D.
---------------	--------	------

foliosa K.	?	4 D.
------------	---	------

grandiflora DeC.	Caucasus	4 DF.
------------------	----------	-------

Impatiens DeC.	Asia bor.	4 D.
----------------	-----------	------

lingulata DeC.	Hung. Trans.	4 D. 4.
----------------	--------------	---------

macrophylla DeC.	Alpes	4 D. 4.
------------------	-------	---------

mongolica DeC.	Sibir. aust.	4 DF.
----------------	--------------	-------

serrata DeC.	Asia bor.	4 D.
--------------	-----------	------

salicifolia K.	" "	4 D.
----------------	-----	------

speciosa DeC.	" "	4 D.
---------------	-----	------

stricta K.	" ? "	4 D.
------------	-------	------

valesiaca DeC.	Helvetia	4 D. 4.
----------------	----------	---------

vulgaris DeC.	Europa	4 D.
---------------	--------	------

" β . fl. pleno.		
------------------------	--	--

Ptelea L. (*Pteleaceae*)

trifoliata L.	Am. bor.-aust.	5 D.
---------------	----------------	------

Pteris L. (*Polypodiineae*)

allosora Lk.	Brasilia	4 C.
--------------	----------	------

Aquilina L.	Europa	4 D. 4.
-------------	--------	---------

argentea Gmel.	Asia bor.	4 D. 4.
----------------	-----------	---------

arguta Vahl	Lusit. Afr. bor.	4 T.
-------------	------------------	------

chrysocarpa H. et Gr.	Nepalia	4 F.
-----------------------	---------	------

crenata Sw.	China, Philipin.	4 C.
-------------	------------------	------

cretica L.	Eur. aust.	4 F.
------------	------------	------

deflexa Lk.	Brasilia	4 C.
-------------	----------	------

falcata R. Br.	Nov. Holl.	4 C.
----------------	------------	------

intramarginalis Kaulf.	Brasilia	4 C.
------------------------	----------	------

lata Kaulf.	"	4 C.
-------------	---	------

leptophylla Sw.	"	4 C.
-----------------	---	------

longifolia L.	Ind. occ.	4 C.
---------------	-----------	------

nemoralis W.	Mascarenhas	4 C.
--------------	-------------	------

palmata W.	Amer. aust.	4 C.
------------	-------------	------

pedata L.	Amer. temp.	4 T.
-----------	-------------	------

repandula Lk.	Brasilia	4 C.
---------------	----------	------

serrulata L.	Ind. or.	4 C.
--------------	----------	------

tremula R. Br.	Nov. Holl.	4 C.
----------------	------------	------

(vide: Pellaea).

Pterocarya Kth. (*Juglandineae*)

caucasica C. A. Mey.	Caucasus	4 DF.
----------------------	----------	-------

Pterocephalus Vaill. (*Dipsacineae*)

palaestinus Coult.	Oriens	4 D.
--------------------	--------	------

papposus Coult.	Eur. aust.	4 D.
-----------------	------------	------

plumosus Coult.	Oriens	4 D.
-----------------	--------	------

Sibthorpianus Bert.	Dalm. Graec.	4 D.
---------------------	--------------	------

Pteroneuron DeC. (*Cruciferae*)

graecum DeC.	Eur. aust.-or.	4 D.
--------------	----------------	------

Pteropogon DeC. (*Synanthereae*)

Pteropogon			
chilensis F. et M.	Chili	⊙ CD.	
Pterospermum Schreb.	(<i>Dombeyaceae</i>)		
diversifolium Blum.	Ind. or.	‡ C.	
Pterostegia F. et M.	(<i>Polygoniceae</i>)		
drymarioides F. et M.	Nov. Californ.	⊙ D.	
Pterotheca Cass.	(<i>Synanthereae</i>)		
bifida F. et M.	Caucasia	⊙ D.	
nemausensis Cass.	Eur. aust.	⊙ D.	
Ptilomeris Nutt.	(<i>Synanthereae</i>)		
aristata Nutt.	California	⊙ D.	
Ptychotis Koch	(<i>Umbelliferae</i>)		
ammioides Koch	Eur. aust.	⊙ D.	
coptica DeC.	Aegyptus	⊙ CD.	
heterophylla Koch	Eur. aust.	⊙ D.	
Pulegium Mill.	(<i>Labiatae</i>)		
vulgare Mill.	Europa	‡ D.	
Pulicaria Gaertn.	(<i>Synanthereae</i>)		
arabica Cass.	Oriens	⊙ CD.	
dysenterica Gaertn.	Eur. med. aus.	‡ DF.	
odora Rehb.	Eur. aust.	‡ DF.	
viscosa Cass.	"	‡ DF.	
vulgaris Gaertn.	Europa	⊙ D.	
Pulmonaria Tourn.	(<i>Borragineae</i>)		
angustifolia L.	Europa	‡ D.	
mollis Wolf	"	‡ D.	
officinalis L.	"	‡ D.	
saccharata Mill.	"	‡ D.	
(vide: Hypoglossum).			
Pulsatilla Tourn.	(<i>Ranunculineae</i>)		
albana Spr.	Cau. Sib. au.	‡ D. J.	
" β. ambigua Turcz.			
alpina Delarb.	Alp. Subalp.	‡ D. J.	
Burseriana Rehb.	Alpes	‡ D. J.	
Hackelii Pohl	Germ. or. aust.	‡ D.	
montana Hoppe	Germ. aust.	‡ D.	
patens Mill.	Eur. or. Sibir.	‡ D.	
pratensis Mill.	Eur. med.	‡ D.	
vernalis Mill.	Europa	‡ D. J.	
vulgaris Mill.	"	‡ D.	
Pulteneya Sm.	(<i>Papilionaceae</i>)		
biloba R. Br.	Nov. Holl.	‡ T.	
candida Lodd.	" "	‡ T.	
echinula Sieb.	" "	‡ T.	
linophylla Sm.	" "	‡ T.	
retusa Sm.	" "	‡ T.	
stricta Sims	Tasmania	‡ T.	
subumbellata Hook.	"	‡ T.	
tenuifolia R. Br.	Nov. Holl.	‡ T.	
Punica Tourn.	(<i>Granatineae</i>)		
Granatum L. et var.	Eur. aust. Or.	5 F.	
Pupalia Mart.	(<i>Amarantaceae</i>)		
prostrata Mart.	Ind. or.	‡ C.	
Puschkinia Adans.	(<i>Liliaceae</i>)		
scilloides Adans.	Caucasus	‡ D.	
Pycnanthemum Mchx.	(<i>Labiatae</i>)		
lanceolatum Pursh	Am. bor. aust.	‡ D.	
linifolium Pursh	" "	‡ DF.	
pilosum Nutt.	" "	‡ DF.	
Pyrethrum Hall.	(<i>Synanthereae</i>)		
Pyrethrum			
Achilleae DeC.	Eur. aust.	‡ D.	
alpinum W.	Alpes	‡ D. J.	
carneum M. B.	Caucasus	‡ D.	
caucasicum W.	"	‡ D.	
ceratophylloides Ten.	Eur. aust.	‡ DF.	
cinerariaefolium Trev.	Dalmatia	‡ FD.	
Clusii Tsch.	Germ. aust.	‡ D.	
corymbosum W.	Europa	‡ D.	
" β. tenuifolium W.			
decipiens F. et M.	Pers. bor.	⊙ DF.	
discoideum Led.	Sibir. aust.	⊙ D.	
Halleri W.	Alpes	‡ D. J.	
maritimum Sm.	Angl. Gall.	‡ D.	
millefoliatum W.	Ruth. aust.	‡ D.	
Myconis Mnch.	Eur. aust.	⊙ D.	
niveum Lag.	Cauc. Armen.	‡ D.	
parthenifolium W.	" "	‡ D.	
Parthenium Sm.	Europa	‡ D.	
" β. flosculosum DeC. — γ. fl. pleno.			
segetum Mnch.	Eur. occ.	⊙ D.	
serotinum W.	Amer. bor.	‡ D.	
sinense Sab. et var.	Japonia	‡ F.	
uliginosum W. et K.	Hungaria	‡ D.	
uniflorum F. et M.	Persia	‡ FD.	
(vide: Argyranthemum — Balsamita — Gymnocline — Matricaria — Phalacrodiscus).			
Pyrgosea Haw.	(<i>Crassulaceae</i>)		
corymbulosa Loud.	Cap. b. sp.	‡ T.	
Pyrola Tourn.	(<i>Pyrolaceae</i>)		
minor L.	Europa	‡ D. J.	
rotundifolia L.	"	‡ D. J.	
secunda L.	"	‡ D. J.	
uniflora L.	"	‡ D. J.	
Pyrus Tourn.	(<i>Pomaceae</i>)		
acerba DeC.	Europa	5 D.	
amygdaliformis Vill.	Gallia	5 D.	
baccata L.	Asia bor.	5 D.	
Bollwylleriana DeC.	Hybr.	5 D.	
canescens Spach	?	5 D.	
cerasifera Tsch.	Asia bor.	5 D.	
ceratocarpa Wendr.	?	5 D.	
communis L.	Europa	5 D.	
" β. Achras	Gaertn. — γ. to-		
mentosa Koch			
coronaria L.	Amer. bor.	5 D.	
euneifolia Guss.	Sicilia	‡ FD.	
dasyphylla Borkh.	Transylvia	5 D.	
elaeagnifolia Pall.	Taur. Cauc.	5 D.	
floribunda Lindl.	Amer. bor.	5 D.	
horizontalis Endl.	" "	5 D.	
Malus L.	Europa	5 D.	
Michauxii Bosc	Amer. bor.	5 D.	
nivalis Jacq.	Eur. aust. ?	5 D.	
odorata Wendr.	?	5 D.	
praecox Pall.	Ruth. aust.	5 D.	
prunifolia W. et var.	Asia bor.	5 D.	
pumila H. Cels.	?	‡ D.	

Pyrus

salicifolia L.	Asia bor.	5 D.
spectabilis Ait.	China	5 D.
" β. fl. pl.	?	‡ D.
sphaerocarpa Wendr.	Aronia — Chae-	
(vide: Amelanchier — Cydonia — Sorbus).		
Quamoclit Tourn.	(Convolvulineae)	
coccinea Don	Ind.oc.Am.b. ⊙ CD.	
leucantha Don	Ind. occ. ⊙ CD.	
luteola Don	" " ⊙ CD.	
vulgaris Chois.	Ind. or. ⊙ C.	
Queltia Salish.	(Amaryllideae)	
incomparabilis Haw.	Eur. aust.	‡ D.
odora K.	" "	‡ DF.
orientalis K.	Oriens	‡ DF.
triandra K.	Pyrenaei	‡ DF.
triloba K.	Gall. Hisp.	‡ DF.
Quercus Tourn.	(Cupuliferae)	
alba L.	Amer. bor.	5 D.
ambigua Mchx.	" "	5 D.
Banisteri Mchx.	" "	5 D.
bicolor W.	" "	5 D.
Castanea W.	" "	5 D.
Cerris L.	Eur. aust.	5 D.
cinerea Mchx.	Amer. bor.	5 D.
coccinea Wgh.	" "	5 D.
discolor W.	" "	5 D.
fastigiata Lam.	Gallia	5 D.
Ilex L.	Eur. aust.	‡ F.
macrocarpa Mchx.	Amer. bor.	5 D.
montana W.	Am.bor.aust.	5 DF.
olivaeformis Mchx.	Amer. bor.	5 D.
pedunculata W.	Europa	5 D.
" β. variegata — γ. aspleni-		
folia.		
Robur W.	Europa	5 D.
rubra L.	Amer. bor.	5 D.
sericea W.	Carol.Florid.	5 DF.
Suber L.	Eur. aust.	5 F.
tinctoria W.	Amer. bor.	5 D.
Quisqualis Rumph	(Combretineae)	
indica L.	Java Moluce.	‡ C.
Radiusia Rchb.	(Papilionaceae)	
alopecurioides Rchb.	Sibir.aust.Cau.	‡ D.
" β. soongarica.		
flavescens Endl.	Sibir. aust.	‡ D.
Ramondia Rich.	(Scrophulariaceae)	
Myconi Rchb.	Pyrenaei	‡ D. A.
Ranunculus Tourn.	(Ranunculineae)	
abortivus L.	Am.bor.aust.	‡ D.
aconitifolius L.	Alp., Sudeti	‡ D. A.
" β. fl. pleno.		
acris L.	Europa	‡ D.
" β. sylvaticus Thuil. — γ. fl. pleno.		
affinis R. Br.	Am. bor. Sib.	‡ D.
alpestris L.	Alpes	‡ D. A.
altaicus Lxm.	Sibir. aust.	‡ D. A.
amplexicaulis L.	Pyren.Apen.	‡ D. A.
angulatus Prsl.	Sicilia	② FD.

Ranunculus

arvensis L.	Europa	⊙ D.
" β. tuberculatus Kit.		
asiaticus L. et var.	Graec. Asia	‡ FD.
auricomus L.	Europa	‡ D.
brutius Ten.	Neapolis	‡ D.
bulbosus L.	Europa	‡ D.
cassubicus L.	Eur. or.	‡ D.
caucasicus M. B.	Caucasus	‡ D.
chaerophyllus L.	Eur. aust.	‡ DF.
constantinopolitanus D'	Urv.Rumelia	‡ DF.
cortusaefolius W.	Canariae	‡ F.
Cymbalaria Pursh	Asia, Am.bo.	‡ D. A.
Flammula L.	Europa	‡ D. √
fumariaefolius Desf.	Eur. aust.	‡ D.
garganicus Ten.	Neapolis	‡ DF.
gramineus L.	Eur. aust-occ.	‡ D.
illyricus L.	Eur.med.aust.	‡ D.
lacerus Bell.	Alpes	‡ D. A.
lacinatus Baumg.	Eur. or-aust.	⊙ D.
lanuginosus L.	Europa	‡ D.
Lingua L.	"	‡ D. √
lomatacarpus F. et M.	Oriens	⊙ D.
longicaulis C. A. Mey.	Sibir. aust.	‡ D. A.
millefoliatus Vahl	Graec. Sicil.	‡ FD.
montanum W.	Alp., Subalp.	‡ D. A.
muricatus L.	Eur. aust.	⊙ D.
nemorosus DeC.	Europa	‡ D.
nodiflorus L.	Eur. aust.	⊙ D.
parnassifolius L.	Alpes	‡ D. A.
parviflorus L.	Europa	⊙ D.
pedatus W. et K.	Eur. or-aust.	‡ D.
pensylvanicus L.	Amer. bor.	⊙ D.
Philonotis Retz.	Europa	⊙ D.
plantaginifolius Murr.	Sibir. aust.	‡ D. A.
plantanifolius L.	Alp., Subalp.	‡ D. A.
polyanthemos L.	Eur. media	‡ D.
procerus Mor.	Sardinia	‡ DF.
propinquus C. A. Mey.	Sibir. aust.	‡ D.
pyrenaeus L.	Alpes	‡ D. A.
repens L.	Europa	‡ D.
" β. fl. pleno.		
sceleratus L.	"	⊙ D. √
Schraderianus F. et M.	" ?	⊙ D.
Stevenii Bess.	Eur. or.	‡ D.
Thomasii Ten.	Neapolis	‡ DF.
trachycarpus F. et M.	Tauria	⊙ D.
trilobus Desf.	Eur. aust.	⊙ D.
tuberosus Lap.	Pyrenaei	‡ D.
velutinus Ten.	Neapolis	‡ DF.
verrucosus Prsl.	Eur. aust.	⊙ D.
Villarsii DeC.	Alp. occ.	‡ D. A.
(vide: Callianthemum — Ficaria).		
Raphanistrum Tourn.	(Cruciferae)	
Gayanum F. et M.	Eur. aust.	⊙ D.
Landra Rchb.	" "	⊙ D.
maritimum Rchb.	" "	⊙ D.
rostratum F. et M.	Persia bor.	⊙ D.
segetum Baumg.	Europa	⊙ D.
Raphanus Tourn.	(Cruciferae)	

- Raphanus** Tourn.
 sativus L. et var. Asia med. ♂ D.
 (Cruciferae)
- Rapistrum** Boerh.
 orientale DeC. Oriens ♂ D.
 perenne Berg. Eur. med. aust. ♀ D.
 rugosum Berg. Eur. aust. ♂ D.
 (Pomaceae)
- Raphiolepis** Lindl.
 indica Lindl. Ind. or. China ♀ T.
 (Apocynaceae)
- Rauwolfia** Plum.
 spinosa Cav. Peruvia ♀ C.
 (Scrophulariaceae)
- Rehmannia** Lib.
 chinensis Fisch. China bor. ♀ DF.
- Reimaria** Flüg.
 purpurascens Lk. ? ♂ C.
 (Gramineae)
- Remusatia** Schott
 vivipara Schott Ind. or. ♀ C.
 (Orchideae)
- Renanthera** Lour.
 coccinea Lour. China ♀ C.
- Renealmia**, vide: *Alpinia* — *Libertia*.
- Reseda** Tourn.
 crystallina W. et B. Canariae ② FD.
 inodora Rchb. Eur. aust. ♂ D.
 " β. macrocarpa F. et M.
 glauca L. Hisp. Aegypt. ♂ CD.
 lutea L. Europa ♀ D.
 " β. persica.
 macrosperma Rchb. Lusitania ♂ D.
 odorata L. Afr. bor. ♂ D.
 Phyteuma L. Eur. aust. ♂ D.
 truncata F. et M. Oriens ② ♀ DF.
 (vide: *Eresda* — *Luteola* — *Oligomeris*).
- Retama** Boiss. (Papilionaceae)
 monosperma Boiss. Eur. aust. ♀ F.
 sphaerocarpa Boiss. " ♀ F.
- Rhagadiolus** Tourn. (Synanthereae)
 stellatus W. Eur. aust. ♂ D.
 " β. edulis Gaertn.
 (vide: *Kölpinia*).
- Rhagodia** R. Br. (Chenopodiaceae)
 hastata R. Br. Nov. Holl. ♀ F.
 nutans R. Br. Tasmania ♀ F.
- Rhamnus** Tourn. (Rhamnaceae)
 Alaternus L. Eur. aust. ♀ F.
 " β. variegatus.
 alpina L. Alpes, Subalp. ♀ D.
 cathartica L. Europa ♀ 5 D.
 Clusii W. Eur. aust. ♀ F.
 dahurica Pall. Sibir. aust. ♀ D.
 Erythroxylon Pall. Sibiria ♀ D.
 Frangula L. Europa ♀ 5 D.
 infectoria L. Eur. aust. ♀ D.
 longifolia Dum. C. ? ♀ F.
 Pallasii F. et M. Caucasia ♀ DF.
 prinoides L'Her. Cap. b. sp. ♀ T.
 pumila L. Alpes ♀ D.
 pusilla Ten. " ♀ D.
 saxatilis L. Eur. med. aust. ♀ D.
 tinctoria W. et K. Eur. aust.-or. ♀ DF.
 Wicklii Schrad. ? ♀ D.
- Rhapis** L. fil. (Palmae)
 flabelliformis Ait. China, Japon. 5 F.
 (vide: *Sabal*).
- Rhaponiticum** Cass. (Synanthereae)
 doronicæfolium Fisch. Sibiria ♀ D.
 pulchrum F. et M. Caucasus ♀ D.
 scariosum Lam. Alpes occ. ♀ D.
 (vide: *Stemmacantha*).
- Rheum** L. (Polygonaceae)
 australe Don Nepalia ♀ DF.
 caspicum W. Caspia ♀ D.
 compactum L. Asia med. ♀ D.
 crassinervium H. Vind. " ♀ D.
 crispum Andr. Asia med. ♀ D.
 " β. glaucum Mart.
 hybridum Murr. Asia med. ♀ D.
 " β. lobatum Wdr.
 palmatum L. Asia med. ♀ D.
 Rhaponiticum L. Asia bor. ♀ D.
 sibiricum Pall. " ♀ D.
 tataricum L. fil. " Asia med. ♀ D.
 tetragonopus Mart. " " ♀ D.
 undulatum L. " " ♀ D.
- Rhinacanthus** N. E. (Acanthaceae)
 communis N. E. Ind. or. ♀ C.
- Rhipsalis** Gaertn. (Cactaceae)
 Cassytha Gaertn. Ind. occ. ♀ C.
 crispata Pfeif. ? ♀ C.
 fasciculata Haw. Ind. occ. ♀ C.
 funalis Salm-D. Amer. aust. ♀ C.
 mesembryanthemoides Haw. Am. aust. ♀ C.
 pachyptera Pfeif. Ind. occ. ♀ C.
 pentaptera Pfeif. Brasilia ♀ C.
 platycarpa Pfeif. " ♀ C.
 ramulosa Pfeif. ? ♀ C.
 rhombea Pfeif. ? ♀ C.
 trigona Pfeif. Brasilia ♀ C.
 Swartziana Pfeif. Ind. occ. ♀ C.
 (vide: *Hariota*).
- Rhodanthe** Lindl. (Synanthereae)
 Manglesii Lindl. Nov. Holl. ♂ F.
- Rhodax** Spach (Cistaceae)
 alpestris K. Subalpes ♀ D.
 canus K. Eur. aust. ♀ DF.
 italicus K. " ♀ DF.
 oelandicus K. Eur. bor. ♀ D. A.
 vinealis K. Eur. med. ♀ D.
- Rhodiola** L. (Crassulaceae)
 elongata F. et M. Sibir. aust. ♀ D. A.
 rosea L. Alp. Subalp. ♀ D. A.
- Rhodochiton** Zucc. (Scrophulariaceae)
 volubile Zucc. Mexico ♀ FD.
- Rhodocistus** Spach (Cistaceae)
 Berthelotianus Spach Canariae ♀ F.
 candidissimus K. " ♀ F.
- Rhododendron** L. (Ericaceae)
 arboreum Sm. et var. Nepalia 5 F.
 azaleoides Desf. ? ♀ FD.
 catawbiense Mchx. Virg., Carol. ♀ DF.
 caucasicum Pall. Caucasus ♀ DF.

Rhododendron L.		
cinnamomeum Wall.	Nepalia	† F.
dahuricum L.	Sibir. aust.	† DF.
ferrugineum L.	Alpes	† D. A.
hirsutum L.	"	† D. A.
indicum Swt.	China, Java	† T.
intermedium Wend.	Alpes	† D. A.
ledifolium DeC.	China	† T.
maximum L. et var.	Amer. bor.	† DF.
ponticum L. et var.	Oriens	† DF.
punctatum Andr.	Carolina	† DF.
Rhodomyrtus DeC.	(Myrtineae)	
tomentosa Hask.	Ind. or. China	† C.
Rhodora L.	(Ericaceae)	
canadensis L.	Amer. bor.	† DF.
Rhus Tourn.	(Anacardiaceae)	
Cotinus L.	Eur. aust.	† D.
crenata Thb.	Cap. b. sp.	† T.
elegans Ait.	Amer. bor.	† D.
elongata Jacq.	Cap. b. sp.	† T.
glabra L.	Amer. bor.	† 5D.
glauca Desf.	Cap. b. sp.	† T.
laevigata L.	"	† T.
lancea L. fil.	"	† T.
longispina E. et Z.	"	† T.
lucida L.	"	† T.
nervosa Poir.	"	† T.
pallens E. et Z.	"	† T.
pubescens Thb.	"	† T.
radicans L.	Amer. bor.	† D.
serraeifolia Burch.	Cap. b. sp.	† T.
tomentosa L.	"	5 T.
Toxicodendron L.	Amer. bor.	† D.
Typhina L.	"	5 D.
venenata DeC.	"	† 5D.
villosa L. fil.	Cap. b. sp.	† 5T.
viminalis Vahl	"	† T.
viridiflora Poir.	Amer. bor.	† 5D.
zizyphina Ten.	Sicilia	† F.
Rhynchosidium DeC.	(Synanthereae)	
lateriflorum DeC.	Cap. b. sp.	⊙ CD.
sessiliflorum DeC.	"	⊙ CD.
Rhynchosia Lour.	(Papilionaceae)	
caribaea DeC.	Ind. occ.	† C.
difformis DeC.	Carolina	† FD.
precatória DeC.	Amer. aust.	† C.
secunda E. et Z.	Cap. b. sp.	† T.
Rhynchostylis Tsch.	(Umbelliferae)	
hirsuta Tsch.	Montes Eur.	† D. A.
Ribes Tourn.	(Grossulariaceae)	
aciculare Sm.	Asia bor.	† D.
alpinum L.	Europa	† D.
altaicum Lodd.	Sibir. aust.	† D.
angustum Dougl.	Am. bor-occ.	† DF.
Cynosbati L.	Amer. bor.	† D.
Diacantha L. fil.	Asia bor.	† D.
Dikuscha Fisch.	"	† D.
divaricatum Dougl.	Am. bor-occ.	† D.
floridum L'Her.	Amer. bor.	† D.
glutinosum Benth.	Am. bor-occ.	† DF.
Ribes		
Grossularia L.	Europa	† D.
β. uva crispa — γ. recur-		
vatum L.		
heterotrichum C.A.Mey.	Sibir. aust.	† D.
lacustre Poir.	Amer. bor.	† D.
malvaceum Sm.	California	† FD.
multiflorum Kit.	Croatia	† D.
nigrum L.	Eur. aust.	† D.
opulifolium Host.	Austr.	† D.
oxyacanthoides L.	Amer. bor.	† D.
petraeum Wulf.	Alp. Sudeti	† D.
prostratum L'Her.	Amer. bor.	† D.
recurvatum Mchx.	"	† D.
rubrum L.	Europa	† D.
sanguineum Pursh.	Am. bor-occ.	† DF.
saxatile Pall.	Sibiria	† D.
spicatum Robs.	Anglia	† D.
triste Pall.	Sibiria	† D.
viscosissimum Pursh	Amer. bor.	† DF.
(vide: Chrysobotrya — Robsonia).		
Richardia Kth.	(Ariaceae)	
aethiopica Kth.	Africa	† T.
β. minor.		
Richardsonia Kth.	(Rubiaceae)	
scabra L.	Amer. aust.	⊙ CF.
stellaris Ch. et S.	Brasilia	⊙ CF.
Ricinus Tourn.	(Euphorbiaceae)	
communis L.	Ind. or.	⊙ CD.
glaucus Hffg.	"	⊙ CD.
inermis Jacq.	"	⊙ CD.
Krappa H. Ber.	"	⊙ CD.
lividus Jacq.	Afr. aust.	⊙ CD.
paniculatus H. Ber.	?	⊙ CD.
rutilans H. Ber.	?	⊙ CD.
scaber Mor.	?	⊙ CD.
tunisensis H. Par.	Afr. bor.	⊙ CD.
undulatus H. Ber.	?	⊙ CD.
viridis W.	Ind. or.	⊙ CD.
Ricotia L.	(Cruciferae)	
Lunaria L.	Oriens	⊙ CD.
Rivinia Plum.	(Riviniaceae)	
brasiliensis Nocca	Brasilia	† C.
canescens Don	Ind. occ.	† C.
humilis L.	"	† C.
laevis L.	"	† C.
octandra L.	"	† C.
purpurascens Schrad.	"	† C.
tetrandra Desf.	?	† C.
Robinia L.	(Papilionaceae)	
dubia Fouc.	Amer. bor.	5D.
hispida L.	Amer. bor-aust.	† D.
macrophylla Schrad.	"	† D.
Pseudo-Acacia L.	Amer. bor.	5D.
β. microphylla Lodd. —		
γ. procera Hort. — δ. sophoraefolia		
Lodd. — ε. spectabilis Dum-C. —		
ζ. tortuosa DeC. — η. umbraculifera		
DeC.		
viscosa Vent.	Am. bor-aust.	5D.

Robinia			
viscosa β . horrida.	(vide: Caragana -- Halimodendron).		
Robsonia Berl.	(Grossulariaceae)		
speciosa Spach	Mexico	$\frac{1}{2}$ F.	
Rochea DeC.	(Crassulaceae)		
coccinea DeC.	Cap. b. sp.	$\frac{1}{2}$ T.	
falcata DeC.	" "	$\frac{1}{2}$ T.	
perfoliata Haw.	" "	$\frac{1}{2}$ T.	
versicolor DeC.	" "	$\frac{1}{2}$ T.	
Rochelia Rchb.	(Borragineae)		
stellulata Rchb.	Asia bor.	$\odot$ D.	
Rodigia Spr.	(Synanthereae)		
commutata Spr.	Graecia	$\odot$ D.	
Rodriguezia R. et P.	(Orchideae)		
Barkeri Hook.	Brasilia	$\frac{1}{2}$ C.	
Roella L.	(Campanulaceae)		
ciliata L.	Cap. b. sp.	$\frac{1}{2}$ T.	
Roemeria Med.	(Papaverineae)		
hybrida DeC.	Eur. aust.	$\odot$ D.	
Roeslinia Mnch.	(Gentianaceae)		
baccifera Mnch.	Cap. b. sp.	$\frac{1}{2}$ T.	
Rohdea Roth	(Aspidistraceae)		
japonica Roth	Japonia	$\frac{1}{2}$ FD. ∇	
Romulea S. et M.	(Iridaceae)		
Bulbocodium S. et M.	Eur. aust.	$\frac{1}{2}$ DF.	
" β . purpurea.			
Columnae S. et M.	Italia	$\frac{1}{2}$ F.	
cruciata Eckl.	Cap. b. sp.	$\frac{1}{2}$ T.	
purpurascens Ten.	Neap. Sard.	$\frac{1}{2}$ F.	
ramiflora Ten.	Neapolis	$\frac{1}{2}$ F.	
rosea Eckl.	Cap. b. sp.	$\frac{1}{2}$ T.	
Rondeletia Plum.	(Rubiaceae)		
americana L.	Amer. aust.	$\frac{1}{2}$ C.	
odorata Jacq.	Ind. occ.	$\frac{1}{2}$ C.	
Roripa Scop.	(Cruciferae)		
amphibia Bess.	Europa	$\frac{1}{2}$ D.	
austriaca Rchb.	Eur. or-aust.	$\frac{1}{2}$ D.	
Camelinae Spach	China bor.	$\odot$ DF.	
globosa K.	Siberia	$\odot$ D.	
pyrenaica Spach	Eur. med-au.	$\frac{1}{2}$ D. $\wedge$	
Reichenbachii K.	Bohemia	$\frac{1}{2}$ D.	
sylvestris Rchb.	Europa	$\frac{1}{2}$ D.	
Rosa Tourn.	(Rhodophoraceae)		
affinis Rau	Europa	$\frac{1}{2}$ D.	
agrestis Sav.	Eur. aust.	$\frac{1}{2}$ D.	
alba L.	Eur. aust. Cauc.	$\frac{1}{2}$ D.	
" β . carnea Dum.C.			
alpina L.	Alp. Subalp.	$\frac{1}{2}$ D.	
" β . corymbosa.			
altaica W.	Sibir. aust.	$\frac{1}{2}$ D.	
andegavensis Bast.	Europa	$\frac{1}{2}$ D.	
arvensis Huds.		$\frac{1}{2}$ D.	
baicalensis Fisch.	Sibir. aust.	$\frac{1}{2}$ D.	
Banksii R. Br.	China	$\frac{1}{2}$ FD.	
" β . lutea.			
Biebersteinii Tratt.	Ruth. aust.	$\frac{1}{2}$ D.	
blanda Ait.	Amer. bor.	$\frac{1}{2}$ D.	
bracteata Wendl.	China	$\frac{1}{2}$ FD.	
caesia Sm.	Anglia	$\frac{1}{2}$ D.	
Rosa			
canina L.	Europa	$\frac{1}{2}$ D.	
" β . nitens Merat.			
capreolata Nois.	Hybr.	$\frac{1}{2}$ DF.	
carolina L.	Am. bor-aust.	$\frac{1}{2}$ D.	
" β . fl. pleno.			
caucasica Pall.	Caucasus	$\frac{1}{2}$ D.	
centifolia L.	Oriens	$\frac{1}{2}$ D.	
" β . muscosa Ait. et al. var.			
cinnamomea L.	Europa	$\frac{1}{2}$ D.	
" β . foecundissima Du Roi.			
cuspidata M. B.	Tauria	$\frac{1}{2}$ D.	
damascena Mill.	Oriens	$\frac{1}{2}$ D.	
" β . menstrualis Andr. et al.			
var.			
dahurica Pall.	Sibir. aust.	$\frac{1}{2}$ D.	
decora K.	Asia bor. ?	$\frac{1}{2}$ D.	
dimorpha Bess.	Europa	$\frac{1}{2}$ D.	
Doniana Woods.	Anglia	$\frac{1}{2}$ D.	
Eglanteria L.	Eur. aust.	$\frac{1}{2}$ D.	
" β . bicolor Jacq.			
farinosa Bechst.	Europa	$\frac{1}{2}$ D.	
fastuosa Trat.	Gallia	$\frac{1}{2}$ D.	
ferox Lour.	Asia bor.	$\frac{1}{2}$ D.	
Fischeriana Bess.	Ruthenia	$\frac{1}{2}$ D.	
fissispina Wierzb.	Banatus	$\frac{1}{2}$ D.	
flexuosa Raf.	Amer. bor.	$\frac{1}{2}$ D.	
floribunda Bess.	Eur. or.	$\frac{1}{2}$ D.	
formosa K.	?	$\frac{1}{2}$ D.	
fraxinifolia Borkh.	Amer. bor.	$\frac{1}{2}$ D.	
frondosa Stev.	Ruth. aust.	$\frac{1}{2}$ D.	
frutetorum Bess.	Eur. or.	$\frac{1}{2}$ D.	
gallica L. et pl. var.	Eur. med. aust.	$\frac{1}{2}$ D.	
gemella W.	?	$\frac{1}{2}$ D.	
geminata Rau	Europa	$\frac{1}{2}$ D.	
guttensteinensis Jacq. f.	Austria	$\frac{1}{2}$ D.	
indica L.	China	$\frac{1}{2}$ DF.	
Jundzilliana Bess.	Eur. aust.	$\frac{1}{2}$ D.	
Kluckii Bess.	"	$\frac{1}{2}$ D.	
lagenaria Vill.	Delphinatus	$\frac{1}{2}$ D.	
laxa Retz.	Siberia	$\frac{1}{2}$ D.	
leucantha M. B.	Iberia	$\frac{1}{2}$ D.	
lucida Ehrh.	Amer. bor.	$\frac{1}{2}$ D.	
Lyoni Pursh	"	$\frac{1}{2}$ D.	
macrocarpa Rochl.	Hungaria	$\frac{1}{2}$ D.	
melanocarpa Lk.	Eur. or-aust.	$\frac{1}{2}$ D.	
micrantha Sm.	Europa	$\frac{1}{2}$ D.	
mitissima Gmel.	"	$\frac{1}{2}$ D.	
moschata Mill.	Asia med.	$\frac{1}{2}$ FD.	
mosquensis Jacq. f.	Ruthenia	$\frac{1}{2}$ D.	
multiflora Thb.	Japon. China	$\frac{1}{2}$ DF.	
myriacantha DeC.	Eur. occ.	$\frac{1}{2}$ D.	
nitida W.	Amer. bor.	$\frac{1}{2}$ D.	
Noisettiana Red. et pl. var.	China	$\frac{1}{2}$ DF.	
ochroleuca Sw.	Asia bor.	$\frac{1}{2}$ D.	
parviflora Ehrh.	Amer. bor.	$\frac{1}{2}$ D.	
parvifolia Ehrh.	Gall. aust.	$\frac{1}{2}$ DF.	
pendulina Ait.	Alpes aust.	$\frac{1}{2}$ D.	
persica Lodd.	Persia	$\frac{1}{2}$ DF.	
pimpinellaefolia L. et pl. var.	Europa	$\frac{1}{2}$ D.	

Rosa

<i>pomifera</i> Herm.	Europa	‡ D.
<i>poterifolia</i> Bess.	Sibiria ?	‡ D.
<i>pruinosa</i> Lindl.	Sibiria	‡ D.
<i>pulverulenta</i> M. B.	Caucasus	‡ D.
<i>pumila</i> L. fil.	Europa	‡ D.
<i>pygmaea</i> M. B.	Tauria	‡ D.
<i>pyrenaica</i> Gou.	Alp. Subalp.	‡ D.
<i>Rapa</i> Rosc.	Amer. bor.	‡ D.
<i>rubifolia</i> R. Br.	"	‡ D.
<i>rubiginosa</i> L.	Europa	‡ D.
<i>rubrifolia</i> Vill.	Alp. Subalp.	‡ D.
<i>sarmentacea</i> Woods	Europa	‡ D.
<i>scabriuscula</i> Sm.	"	‡ D.
<i>sempervirens</i> Curt. et pl.	var. China	‡ DF.
<i>sempervirens</i> L.	Eur. aust.	‡ DF.
<i>setigera</i> Mchx.	Amer. bor.	‡ D.
<i>solstitialis</i> Bess.	Europa	‡ D.
<i>spinosissima</i> L.	"	‡ D.
<i>stipularis</i> Merat	Eur. aust.	‡ D.
<i>stylosa</i> Desv.	Europa	‡ D.
<i>suaveolens</i> Pursh	Amer. bor.	‡ D.
<i>suavis</i> W.	?	‡ D.
<i>sulphurea</i> Ait.	Oriens	‡ D.
<i>surculosa</i> Woods	Europa	‡ D.
<i>taurica</i> M. B.	Ruth. aust.	‡ D.
<i>terebinthinacea</i> Bess.	Europa	‡ D.
<i>tomentosa</i> Sm.	"	‡ D.
<i>trachyphylla</i> Rau	"	‡ D.
<i>turbinata</i> Ait.	Eur. aust.	‡ D.
<i>umbellata</i> Leers	" or "	‡ D.
<i>uncinella</i> Bess.	Eur. or.	‡ D.
<i>urceolata</i> K.	?	‡ D.
<i>venusta</i> Waitz	?	‡ D.
<i>Woodsii</i> Lindl.	Amer. bor.	‡ D.
(vide: <i>Hulthemia</i>).		
<i>Roscyna</i> Spach	(Hypericineae)	
<i>americana</i> Spach	Amer. bor.	‡ D.
<i>Gebleri</i> Spach	Sibir. aust.	‡ DF.
<i>Gmelini</i> Spach	" "	‡ DF.
<i>Rosmarinus</i> Tourn.	(Labiateae)	
<i>officinalis</i> L.	Eur. aust.	‡ F.
<i>Roubieua</i> M. T.	(Chenopodiineae)	
<i>multifida</i> M. T.	Chili	‡ F.
<i>Roulinia</i> Brogn.	(Liliineae)	
<i>Karwinskiana</i> Brogn.	Mexico	‡ T.
<i>Royena</i> L.	(Ebenaceae)	
<i>angustifolia</i> W.	Cap. b. sp.	‡ T.
<i>lucida</i> L.	" "	‡ T.
<i>microphylla</i> Eckl.	" "	‡ T.
<i>villosa</i> L.	" "	‡ T.
<i>Rubia</i> Tourn.	(Rubiaceae)	
<i>Bocconii</i> Petagn.	Neap. Sicil.	‡ F.
<i>cordifolia</i> L.	Sibir. aust.	‡ DF.
<i>peregrina</i> L.	Eur. aust.	‡ DF.
<i>Olivieri</i> Rich.	Eur. aust-or.	‡ DF.
<i>tinctorum</i> L.	Eur. aust.	‡ D.
<i>Rubus</i> Tourn.	(Dryadineae)	
<i>americanus</i> Pers.	Amer. bor.	‡ D.
<i>arcticus</i> L.	Eu. Asia. bor.	‡ D. J.

Rubus

<i>armenius</i> Fisch.	Armenia	‡ DF.
<i>caesius</i> L.	Europa	‡ D.
<i>canadensis</i> L.	Amer. bor.	‡ D.
<i>foliosus</i> Don	Nepalia	‡ FD.
<i>fruticosus</i> L.	Europa	‡ D.
<i>hirtus</i> W. et K.	Eur. or-aust.	‡ D.
<i>Idaeus</i> L.	Europa	‡ D.
<i>inermis</i> W.	Amer. bor.	‡ D.
<i>laciniatus</i> W.	?	‡ D.
<i>nepalensis</i> Trev.	Nepalia	‡ FD.
<i>nitidus</i> Whe.	Europa	‡ D.
<i>nutcanus</i> Moc.	Am. bor. occ.	‡ D.
<i>odoratus</i> L.	Amer. bor.	‡ D.
<i>occidentalis</i> L.	" "	‡ D.
<i>parvifolius</i> L.	Ind. or., China	‡ F.
<i>plicatus</i> Whe.	Europa	‡ D.
<i>reflexus</i> Ker	China	‡ F.
<i>rosaefolius</i> Sm.	Mascarenhas	‡ T.
<i>Rudbeckia</i> L.	(Synanthereae)	
<i>asperrima</i> Horn.	Am. bor-aust.	‡ D.
<i>digitata</i> Mill.	" "	‡ D.
<i>discolor</i> Pursh	" "	‡ DF.
<i>fulgida</i> Ait.	" "	‡ DF.
<i>grandiflora</i> Gmel.	" "	‡ DF.
<i>hirta</i> L.	" "	‡ D.
<i>hybrida</i> Hort.	" "	‡ D.
<i>intermedia</i> H. Ber.	?	‡ D.
<i>laciniata</i> L.	Amer. bor.	‡ D.
<i>Neumanni</i> Loud.	Am. bor-aust.	‡ DF.
<i>speciosa</i> Wendr.	" "	‡ DF.
<i>triloba</i> L.	" "	‡ DF.
(vide: <i>Dracopis</i> — <i>Echinacea</i> — <i>Obeliscaria</i>).		
<i>Ruellia</i> Plum.	(Acanthineae)	
<i>coccinea</i> Vahl	Ind. or.	‡ C.
<i>formosa</i> Andr.	Brasilia	‡ C.
<i>grandiflora</i> Poir.	Ind. occ.	‡ C.
<i>pallida</i> Vahl	Arabia	‡ C.
<i>paniculata</i> L.	Ind. occ.	‡ C.
(vide: <i>Aphelandra</i> — <i>Cryphiacanthus</i> — <i>Dipteracanthus</i> — <i>Dizygandra</i> — <i>Dyschoriste</i> — <i>Eranthemum</i> — <i>Goldfussia</i> — <i>Stroilanthes</i>).		
<i>Rulingia</i> R. Br.	(Büttneriaceae)	
<i>corylifolia</i> Grah.	Nov. Holl.	‡ T.
(vide: <i>Büttneria</i>).		
<i>Rumex</i> L.	(Polygoniceae)	
<i>abyssinicus</i> Jacq.	Afr. med-or.	‡ F.
<i>Acetosa</i> L.	Europa	‡ D.
<i>Acetosella</i> L.	"	‡ D.
<i>aegyptiacus</i> L.	Eur. aust. Aeg.	‡ D.
<i>alpinus</i> L.	Alp. Subalp.	‡ D.
<i>aquaticus</i> L.	Europa	‡ D. ∇
<i>arifolius</i> L. fil.	Africa	‡ T.
<i>brasiliensis</i> Lk.	Brasilia	‡ CD.
<i>Britanica</i> L.	Amer. bor.	‡ D.
<i>Brownii</i> Spr.	Nov. Holl.	‡ F.
<i>bucephalophorus</i> L.	Eur. aust.	‡ D.
<i>Candollei</i> Lag.	?	‡ D.

Rumex

<i>chrysocarpus</i> Mor.	Chili	♀ FD.
<i>condyloides</i> M. B.	Taur. Cauc.	♀ D.
<i>confertus</i> W.	Eur. or. Sibir.	♀ D.
<i>cordifolius</i> Horn.	Alpes	♀ D.
<i>crispus</i> L.	Europa	♀ D.
<i>dentatus</i> Murr.	Aegyptus	⊙ D.
<i>domesticus</i> Hartm.	Eur. bor.	♀ D.
<i>Fischeri</i> Rehb.	Asia bor.	♀ D.
<i>Gmelini</i> Turcz.	"	♀ D.
<i>hamatus</i> Trev.	Nepalia	♀ DF.
<i>hortensis</i> Vis.	?	♀ D.
<i>Hydrolapathum</i> Huds.	Europa	♀ D. ∇
<i>intermedius</i> DeC.	"	♀ D.
<i>Kunthianus</i> Campd.	Amer. aust.	♀ DF.
<i>laevigatus</i> W.	?	♀ D.
<i>lanceolatus</i> Thb.	Cap. b. sp.	♀ F.
<i>Lunaria</i> L.	Canariae	♂ T.
<i>maritimus</i> L.	Europa	⊙ D.
<i>Marschallianus</i> Rehb.	Tauria	⊙ D.
<i>maximus</i> Schreb.	Europa	♀ D.
<i>montanus</i> Desf.	Alp. Subalp.	♀ D. ∇
<i>montevidensis</i> Spr.	La Plata	♀ FD.
<i>Nemolapathum</i> L.	Europa	♀ D.
<i>obtusifolius</i> L.	"	♀ D.
<i>orientalis</i> Bhd.	Oriens	♀ D.
<i>palustris</i> Sm.	Europa	⊙ D. ∇
<i>Patientia</i> L.	Eur. aust.	♀ D.
<i>persicarioides</i> L.	Amer. bor.	⊙ D.
<i>polygonifolius</i> Jacq. f.	"	♀ D.
<i>pratensis</i> M. et K.	Europa	♀ D.
<i>pulcher</i> L.	Eur. aust.	♀ DF.
<i>purpureus</i> Poir.	Europa	♀ D.
<i>salicifolius</i> Weinm.	California	♀ DF.
<i>sanguineus</i> L.	Europa	♀ D.
"	β. viridis.	
<i>scutatus</i> L.	Alp. et mon. Eu.	♀ D.
"	β. hastaefolius M. B. — γ. glaucus Jacq.	
<i>soongaricus</i> Schrenk	Soongaria	⊙ D.
<i>Steudelii</i> Hochst.	Abyssinia	♀ FD.
<i>strictus</i> Lk.	Aegyptus	♀ FD.
<i>ucrainicus</i> Fisch.	Eur. or.	♀ D.
<i>verticillatus</i> L.	Amer. bor.	♀ D.
<i>vesicarius</i> L.	Africa, Amer.	⊙ D.
(vide: Emex).		
<i>Rumia</i> Hoffm.	(Umbelliferae)	
<i>Leiogona</i> C. A. Mey.	Caucasus	⊙ DF.
<i>Ruscus</i> Tourn.	(Smilacineae)	
<i>aculeatus</i> L.	Eur. aust.	♀ FD.
<i>Hypoglossum</i> L.	"	♀ FD.
<i>Hypophyllum</i> L.	"	♀ FD.
<i>Russelia</i> Jacq.	(Scrophulariaceae)	
<i>juncea</i> Zucc.	Mexico	♂ C.
<i>multiflora</i> Sims	"	♂ C.
<i>Ruta</i> Tourn.	(Rutaceae)	
<i>angustifolia</i> Pers.	Eur. aust.	♀ F.
<i>bracteosa</i> DeC.	"	♀ DF.
<i>divaricata</i> Ten.	"	♀ DF.
<i>graveolens</i> L.	"	♀ D.

Ruta

<i>intermedia</i> Stev.	Eur. aust.	♀ D.
<i>montana</i> L.	"	♀ DF.
<i>macrophylla</i> Sol.	Afr. bor.	♀ F.
<i>Rytidophyllum</i> Mart.	(Gesneraceae)	
<i>grande</i> Mart.	Ind. occ.	♀ C.
<i>prasinaum</i> Mart.	Brasilia	♀ C.
<i>tomentosum</i> Mart.	Ind. occ.	♀ C.
<i>Sabal</i> Adans.	(Palmae)	
<i>Adansonii</i> Guerns.	Am. bor. aust.	5 F.
<i>Palmetto</i> Lodd.	"	5 F.
<i>umbraculifera</i> Lodd.	Amer. aust.	5 C.
<i>Saccharum</i> L.	(Gramineae)	
<i>officinatum</i> L.	Ind. or.	♂ C.
(vide: Erianthus — Imperata).		
<i>Sagina</i> L.	(Alsinaceae)	
<i>apetala</i> L.	Europa	⊙ D.
<i>maritima</i> Don	Anglia	⊙ D.
<i>procumbens</i> L.	Europa	♀ D.
<i>Sagittaria</i> L.	(Alismaceae)	
<i>lancifolia</i> L.	Ind. occ.	♀ C. ∇
<i>sagittaeifolia</i> L.	Europa	♀ D. ∇
<i>Sagraea</i> DeC.	(Melastomaceae)	
<i>hirsuta</i> DeC.	Ind. occ.	♀ C.
<i>Sairanthus</i> G. Don	(Solanaceae)	
<i>glutinosus</i> G. Don	Amer. aust.	⊙ CD.
<i>Salaxis</i> Salisb.	(Ericaceae)	
<i>inconspicua</i> Tsch.	Cap. b. sp.	♀ T.
<i>Salicornia</i> Tourn.	(Chenopodiaceae)	
<i>herbacea</i> L.	Europa	⊙ D.
<i>Salisburia</i> Sm.	(Taxineae)	
<i>adanthifolia</i> Sm.	Japonia	5 DF.
<i>Salix</i> Tourn.	(Salicineae)	
<i>acuminata</i> Hoffm.	Europa	♀ D.
<i>acutifolia</i> W.	Caspia	♀ D.
<i>alba</i> L.	Europa	5 D.
"	β. vitellina L.	
<i>amygdalina</i> L.	"	5 D.
<i>arenaria</i> L.	Alpes	♀ D. ∇
<i>aurita</i> L.	Europa	♀ D.
<i>babylonica</i> L.	Asia med. occ.	5 D.
"	β. annularis.	
<i>bicolor</i> Ehrh.	Eur. med.	♀ D.
<i>caesia</i> Vill.	Gall. Helv.	♀ D.
<i>candida</i> W.	Amer. bor.	♀ D.
<i>caprea</i> L.	Europa	5 D.
<i>cinerea</i> L.	"	♀ D.
<i>cordata</i> Wgh.	Amer. bor.	♀ D.
<i>discolor</i> Mhlbg.	"	♀ D.
<i>fragilis</i> L.	Europa	5 D.
<i>Helix</i> L.	"	5 D.
<i>hippophaefolia</i> Thuil.	"	♀ 5 D.
<i>lucida</i> Mhlbg.	Amer. bor.	♀ D.
<i>mollissima</i> Ehrh.	Europa	♀ D.
<i>moschata</i> Hort.	?	♀ D.
<i>nigricans</i> Sm.	Alpes	♀ D.
<i>pentandra</i> L.	Europa	5 D.
<i>phylicaeifolia</i> L.	Alp. Subalp.	♀ 5 D.
<i>pomeranica</i> W.	Germ. bor.	5 D.
<i>Pontederana</i> W.	Alp. aust.	♀ D.

Salix

prunifolia Sm.	Alpes	‡ D.
purpurea L.	Europa	‡ D.
repens L.	"	‡ D.
reticulata L.	Alpes	‡ D. A.
retusa L.	"	‡ D. A.
riparia W.	Europa	‡ D.
rubra Huds.	"	‡ 5 D.
Russeliana Sm.	"	5 D.
salviaefolia Lk.	Eur. aust.	‡ D.
sericans Tsch.	?	5 D.
triandra L.	Europa	5 D.
tenuifolia Sm.	Anglia	‡ D.
undulata Ehrh.	Europa	5 D.
viminalis L.	"	‡ D.
Weigeliana W.	Silesia	‡ D.
Salmea DeC.	(<i>Synantherae</i>)	
scandens DeC.	Ind. occ.	‡ C.
Salpiglossis R. et P.	(<i>Scrophulariaceae</i>)	
atropurpurea Grah.	Chili	⊙ 2 FD.
sinuata R. et P.	"	⊙ 2 FD.
straminea Hook.	"	⊙ 2 FD.
Salsola L.	(<i>Chenopodiaceae</i>)	
collina Pall.	Asia med.	⊙ D.
" β. erubescens Schrad.	"	
crassa M. B.	Caspia	⊙ D.
Kali L.	Europa	⊙ D.
" β. Tragus L. —	γ. rosacea Aut.	
Soda L.	Eur. aust.	⊙ D.
vermiculata L.	Asia med.	‡ DF.
(vide: Cochliospermum — Cycloloma —		
Echinopsilon — Kochia — Schoberia —		
Suaeda).		
Salvia Tourn.	(<i>Labiatae</i>)	
abyssinica Jacq.	Africa	‡ FD.
aegyptiaca L.	Afr. bor.	⊙ CD.
Aethiops L.	Eur. aust.	⊙ 2 D.
africana L.	Cap. b. sp.	‡ T.
amarissima Ort.	Mexico	‡ FD.
angustifolia Cav.	"	‡ TD.
austriaca L.	Eur. or-aust.	‡ D.
bicolor Desf.	Afr. bor.	‡ F.
biflora R. et P.	Peruvia	‡ TD.
caesia W.	Amer. aust.	‡ TD.
calycina S. et Sm.	Graecia	‡ F.
campestris M. B.	Tauria	‡ D.
canariensis L.	Canariae	‡ F.
ceratophylla L.	Afr. bor. Or.	⊙ 2 FD.
ceratophylloides L.	Eur. aust.	‡ DF.
clandestina L.	"	‡ DF.
coccinea L.	Florida	‡ TD.
confertiflora Pohl	Brasilia	‡ CT.
confusa Benth.	Eur. aust.	‡ FD.
controversa Ten.	Eur. aust.	‡ FD.
corymbosa Wall.	Ind. bor.	⊙ ‡ FD.
crispa Riv.	Graec. Afr. bor.	‡ F.
cyaniflora O. et D.	Mexico	‡ TD.
disermas L.	Oriens	‡ F.
dumetorum Andrz.	Eur. or. Sibir.	‡ D.
elegans Vahl	Mexico	‡ TC.

Salvia

erosa Desf.	Eur. aust.	‡ FD.
filamentosa Tsch.	Amer. aust.	‡ TD.
foetida Lam.	Afr. bor.	‡ T.
fulgens Cav.	Mexico	‡ TD.
garganica Ten.	Neapolis	‡ DF.
glutinosa L.	Eur. med. aust.	‡ D.
Grahami Benth.	Mexico	‡ TD.
grandidentata Ten.	?	‡ DF.
grandiflora Ettl.	Tauria	‡ DF.
Hablitziana Pall.	Taur. aust.	‡ DF.
haematodes L.	Eur. aust.	‡ DF.
Halleri Fisch.	" "	‡ DF.
hirsuta Jacq.	Mexico	⊙ D.
hispanica L.	Eur. aust-occ	⊙ D.
Horminum L.	Eur. aust.	⊙ D.
indica L.	Ind. or. ?	‡ T.
interrupta Schousb.	Afr. bor.	‡ F.
involuta Cav.	Mexico	‡ TD.
Karwinskii Benth.	"	‡ TD.
Kotschyana Endl.	Syria	‡ F.
lacinata W.	Eur. aust.	‡ FD.
lamiifolia Jacq.	Ind. occ.	‡ C.
lanata Roxb.	Ind. or.	‡ T.
lanceolata Brouss.	Mexico	⊙ D.
latifolia Vahl.	Afr. bor.	‡ T.
leonoroides Glox.	Peruvia	‡ T.
leucantha Cav.	Mexico	‡ TD.
limbata C. A. Mey.	Caucasus	‡ DF.
linarioides Paxt.	Amer. aust.	‡ TD.
lyrata L.	Am. bor. aust.	‡ FD.
mexicana L.	Mexico	‡ FD.
multifida S. et Sm.	Eur. or-aust.	‡ FD.
multiflora Vis.	?	‡ F.
nemorosa L.	Europa	‡ D.
nepetoides Kth.	Mexico	⊙ D.
nilotica Jacq.	Aegyptus	‡ FD.
nivea Thb.	Cap. b. sp.	‡ T.
nutans W. et K.	Eur. aust-or.	‡ DF.
oblongata Vahl	Eur. aust.	‡ DF.
odorata W.	Oriens	‡ F.
obtusata Thb.	Cap. b. sp.	‡ T.
officinalis L.	Eur. aust.	‡ D.
" β. aurita Schult. — γ. varie-		
gata Hort. — δ. alba.		
paniculata L.	Cap. b. sp.	‡ T.
patens Cav.	Mexico	‡ TD.
patula Desf.	Eur. aust. Afr.	⊙ 2 DF.
pendula Vahl.	Eur. aust-or.	‡ DF.
pinnata L.	Creta, Or.	⊙ 2 FD.
pomifera L.	Graecia, Or.	‡ F.
pratensis L.	Europa	‡ D.
prunelloides Kth.	Mexico	‡ TD.
Pseudo-coccinea Jacq.	Columbia	‡ TD.
pulchella DeC.	Amer. aust.	‡ TD.
rectiflora Vis.	Mexico	‡ TD.
regla Cav.	"	‡ TD.
rubra Spr.	?	‡ FD.
runcinata Thb.	Cap. b. sp.	‡ T.
Sclarea L.	Eur. aust.	⊙ D.

Salvia				Saponaria L.			
scrophulariaefolia Hort.	?	† TC.		calabrica Guss.	Neap. Sicil.	⊙ D.	(Sileneae)
spinosa L.	Aegyptus	‡ T.		cerastoides C. A. Mey.	Armen. Pers.	⊙ D.	
splendens Ker	Brasilia	† FD.		glutinosa M. B.	Taur. Cauc.	⊙ DF.	
syvestris L.	Europa	‡ D.		ocimoides L.	Eur. aust.	‡ DF.	
β fl. albo.				officinalis L. et var.	Europa	‡ D.	
sylicola Burch.	Cap. b. sp.	‡ T.		orientalis L.	Eur. aust. or.	⊙ D.	
Tenorii Spr.	Italia	‡ DF.		persica Lk.	Oriens	⊙ D.	
tenuifolia Burch.	Cap. b. sp.	† T.		(vide: Hagenia — Vaccaria).			
tiberina Mauri	Italia	‡ DF.		Sarcanthus Lindl.	(Orchideae)		
tiliaefolia Vahl.	Mexico	⊙ CF.		rostratus Lindl.	China	‡ C.	
triloba L.	Graecia, Or.	‡ F.		Sarcogonum Swt.	(Polygeniceae)		
utilis A. Braun	Abyssinia	‡ T.		complexum Kze.	Nov. Zeeland.	‡ T.	
variegata W. et K.	Hungaria	‡ D.		Sarcostemma R. Br.	(Asclepiadaceae)		
Verbenaca L.	Eur. aust.	‡ DF.		viminale R. Br.	Ind. or. Afr.	† C.	
verbenacoides Brot.	Lusit. Hisp.	‡ FD.		Sarothamnus W. et Gr.	(Papilionaceae)		
verticillata L.	Europa	‡ D.		patens Webb.	Lusitania	‡ F.	
virgata Ait.	Eur. aust.	‡ D.		scoparius W. et Gr.	Europa	‡ D.	
viridis L.	Eur. aust.	⊙ D.		Sarrachar. et P.	(Solanaceae)		
viscosa Jacq.	"	‡ FD.		allogona Schlecht.	Mexico	⊙ CD.	
Sambucus Tourn.	(Sambucineae)			contorta R. et P.	Peruvia	⊙ CD.	
canadensis L.	Amer. trop.	‡ D.		Jaltomata Schlecht.	Mexico	⊙ CD.	
Ebulus L.	Europa	‡ D.		procumbens R. et P.	Peruvia	⊙ CD.	
nigra L.	"	‡ D.		umbellata DeC.	"	⊙ CD.	
β. laciniata Mill.				viscosa Schrad.	Mexico	† C.	
pubens Mchx.	Amer. bor.	‡ D.		Sassafras N. E.	(Laurineae)		
racemosa L.	Europa	‡ D.		officinale N. E.	Amer. bor.	† DF.	
Samolus L.	(Primulaceae)			Satureja Tourn.	(Labiatae)		
Valerandi L.	Europa	⊙ D. ∇		affinis Host.	Illyr.	† DF.	
Sanguinaria Dillen.	(Papaverineae)			cuneifolia Ten.	Neapolis	† DF.	
canadensis L.	Amer. bor.	‡ D. ‡		hortensis L.	Eur. aust.	⊙ D.	
Sanguisorba L.	(Sanguisorbaceae)			mutica F. et M.	Caucasus	† DF.	
alpina L.	Sibir. aust.	‡ D.		Thymbra L.	Graecia, Or.	‡ F.	
auriculata Scop.	Europa	‡ D.		Tragoriganum Tsch.	"	‡ F.	
bracteosa Bess.	Eur. or.	‡ D.		virgata Vis.	Dalmatia	† F.	
canadensis L.	Amer. bor.	‡ D.		(vide: Cuspidocarpus — Micromeria —			
carnea Fisch.	Asia bor.	‡ D.		Thymus).			
dodecandra Moret.	Italia	‡ D.		Sauromatum Schott	(Arineae)		
media L.	Amer. bor.	‡ D.		pedatum Schott	Amer. aust.	‡ C.	
officinalis L.	Europa	‡ D.		Saussurea DeC.	(Synanthraceae)		
tenuifolia Fisch.	Sibir. aust.	‡ D.		alpina DeC.	Alpes	‡ D. ‡	
β. leucantha.				discolor DeC.	"	‡ D. ‡	
Sanicula Tourn.	(Umbelliferae)			elongata DeC.	Sibiria	‡ DF.	
europaea L.	Europa	‡ D. ‡		β. polyodiifolia DeC.	"		
marylandica L.	Amer. bor.	‡ D. ‡		glomerata Poir.	Sibiria	‡ DF.	
Sansevieria Thb.	(Liliineae)			pulchella Fisch.	Sibir. aust.	‡ DF.	
carnea Andr.	China	‡ DF.		salicifolia DeC.	"	‡ DF.	
fulvocincta Haw.	Brasilia	‡ C.		Saxifraga Tourn.	(Saxifragaceae)		
guineensis W.	Afr. trop.	‡ C.		aizoides Sm.	Alpes	‡ D. ‡	
thyrsiflora Thb.	Cap. b. sp.	‡ T.		Aizoon Jacq.	Montes Eur.	‡ D. ‡	
zeylanica W.	Ind. or.	‡ C.		ajugaefolia L.	Pyrenaei	‡ D. ‡	
Santolina Tourn.	(Synanthereae)			androsacea L.	Alpes	‡ D. ‡	
Chamaecyparissus L.	Eur. aust.	‡ F.		aspera L.	"	‡ D. ‡	
pinnata Viv.	"	‡ F.		bulbifera L.	Eur. aust.	‡ D. F.	
rosmarinifolia L.	"	‡ F.		Burseriana L.	Alpes	‡ D. ‡	
squarrosa W.	Gall. aust.	‡ F.		caesia L.	"	‡ D. ‡	
tomentosa	Pers. Eur. aust.	‡ F.		cernua L.	"	‡ D. ‡	
viridis W.	"	‡ F.		controversa Sternb.	"	⊙ D. ‡	
Sanvitalia Gualt.	(Synanthereae)			Cotyledon L.	"	‡ D. ‡	
procumbens Lam.	Mexico	⊙ CD.		crustata Vest.	"	‡ D. ‡	

Saxifraga

decipiens Ehrh.	Eur. med.	⊕ D. J.
elator M. et K.	Alp. aust.	⊕ D. J.
exarata Vill.	Alp. occ.	⊕ D. J.
geranioides L.	Pyrenaei	⊕ D. J.
granulata L.	Europa	⊕ D.
" β. fl. pleno.		
hypnoides L.	Alpes	⊕ D. J.
intacta W.	"	⊕ D. J.
irrigua M. B.	Caucasus	⊕ D. J.
leptophylla Pers.	Cambria	⊕ D. J.
multiflora Led.	Sibiria	⊕ D. J.
muscoides Wulf.	Alpes	⊕ D. J.
mutata L.	"	⊕ D. J.
oppositifolia L.	Alp. Sudet.	⊕ D. J.
orientalis L.	Oriens	⊕ D. J.
pedatifida Ehrh.	Scot. Pyren.	⊕ D. J.
Schraderi Sternb.	?	⊕ D. J.
sedoides L.	Alpes	⊕ D. J.
sibirica L.	Asia bor.	⊕ D. J.
sponhemica Gmel.	Germ. occ.	⊕ D. J.
Steinmanni Tsch.	Bohemia	⊕ D. J.
Sternbergii W.	Germ. occ.	⊕ D. J.
tenella Wulf.	Alpes	⊕ D. J.
trifurcata Schrad.	Hispania	⊕ D. J.
villosa W.	Anglia	⊕ D. J.
(vide: Arabidia — Bergenia — Derma-		
sea — Hydatia — Micropetalum).		

Scabiosa Tourn.

africana L.	Cap. b. sp.	⊕ F.
agrestis W. et K.	Eur. or-aust.	⊕ D.
altissima Jacq.	Cap. b. sp.	⊕ F.
amoena Jacq. f.	Ruth.	⊕ D.
banatica W. et K.	Hungaria	⊕ D.
Columbaria L.	Europa	⊕ D.
Columnae Ten.	Neapolis	⊕ DF.
daucoides Desf.	Afr. bor.	⊕ FD.
dichotoma Ucr.	Sicil. Afr. bor.	⊕ D.
gramuntia L.	Eur. aust.	⊕ DF.
Hladnikiana Host.	Carn. Illyr.	⊕ D.
holosericea Bert.	Eur. aust.	⊕ DF.
ochroleuca L.	Europa	⊕ D.
pauciseta DeC.	Italia	⊕ DF.
pyrenaica All.	Eur. aust.	⊕ DF.
Scopolii Lk.	"	⊕ DF.
suaveolens Desf.	Eur. med.	⊕ D.
(vide: Asterocephalus — Cephalaria —		
Cryptostema — Trichera — Succisa).		

Scaevola L.

microcarpa Cav.	Nov. Holl.	⊕ T.
suaveolens R. Br.	"	⊕ T.
Scandix Tourn.	(Umbelliferae)	
australis L.	Eur. aust.	⊕ D.
brachycarpa Guss.	Neap. Sicil.	⊕ D.
grandiflora L.	Eur. aust. or.	⊕ D.
iberica M. B.	Armen. Pers.	⊕ D.
macrorhyncha F. et M.	?	⊕ D.
Pecten Veneris L.	Europa	⊕ D.
persica Mart.	Persia	⊕ D.
pinnatifida Vent.	Oriens	⊕ D.

Schaueria N. E.

calycotricha N. E.	Brasilia	⊕ C.
Schelhameria Mneh.	(Cyperaceae)	
cyperoides Rehb.	Europa	⊕ D. V.
Scheppertia Neck.	(Capparidaceae)	
junceae DeC.	Cap. b. sp.	⊕ T.
Schinus L.	(Anacardiaceae)	
Molle L.	Brasil., Peru.	5 ♂ T.
Schismus P. B.	(Gramineae)	
marginatus P. B.	Eur. aust.	⊕ D.
Schistanthe Kze.	(Scrophulariaceae)	
peduncularis Kze.	Cap.	⊕ T.
Schistocarpia Less.	(Synanthereae)	
bicolor Less.	Mexico	⊕ T.
Schiwereckia Andrz.	(Cruciferae)	
podolica Andrz.	Eur. or-aust.	⊕ D. J.
Schizanthus R. et P.	(Scrophulariaceae)	
Grahami Hook.	Chili	⊕ FD.
Hookeri Gill.	"	⊕ FD.
pinnatus R. et P.	"	⊕ D.
" β. humilis Ldl. — γ. obtusifolius		
Hort.		
porrigens Hook.	Chili	⊕ D.
" β. - Priestii	H. Angl.	
retusus Hook.	Chili	⊕ FD.
Schizonatus Lindl.	(Spiraeaceae)	
sorbifolius Lindl.	Asia bor.	⊕ D.
Schizopetalum Sims	(Cruciferae)	
Walkerii Sims	Chili	⊕ FD.
Schkuhria Roth.	(Synanthereae)	
abrotanoides Roth.	Peruvia	⊕ D.
Schmidtia Mneh.	(Synanthereae)	
ambigua Cass.	Eur. aust.	⊕ D.
anethifolia Rehb.	Madera	⊕ F.
fruticosa Mneh.	"	⊕ F.
coronopifolia K.	Canariae	⊕ D.
grandiflora K.	Neap. Sicil.	⊕ FD.
parviflora Schultz	Abyssinia	⊕ D.
Schoberia C. A. Mey.	(Chenopodiaceae)	
corniculata C. A. Mey.	Sibir. aust.	⊕ D.
(vide: Cochliospermum — Suaeda)		
Schoenus L.	(Cyperaceae)	
mucronatus L.	Eur. aust.	⊕ F.
Schotia Jacq.	(Caesalpinaceae)	
latifolia Jacq.	Cap. b. sp.	⊕ T.
Schrankia W.	(Mimosaceae)	
uncinata W.	Amer. bor-aust	⊕ F.
Schufia Spach	(Onagraceae)	
arborescens Spach	Mexico	⊕ F.
Scilla L.	(Liliaceae)	
amoena L.	Eur. med. aust.	⊕ D.
amoenula Horn.	Ruth. aust.	⊕ D.
autumnalis L.	Eu. oc. et aust.	⊕ DF.
bifolia L.	Eur. med. aust.	⊕ D.
Clusiana Endl.	Hisp. Lusit.	⊕ DF.
" β. alba.		
Cupaniana Guss.	Sicilia	⊕ DF.
Hughii Guss.	"	⊕ DF.
hyacinthoides L.	Eur. aust.	⊕ DF.
italica L.	"	⊕ DF.

Scutellaria

<i>peregrina</i> L.	Eur. aust.	4.D.
<i>polybotrya</i> Bhd.	Amer. bor.	4.D.
<i>scordifolia</i> Fisch.	Sibir. aust.	4.DF.
<i>Tournefortii</i> Benth.	Cauc. Pers.	4.DF.
<i>variegata</i> Spr.	Asia bor.	4.D.
<i>viscida</i> Spr. f.		4.D.
<i>versicolor</i> Nutt.	Amer. bor.	4.D.
Scutia - Commers.	(<i>Rhamnaceae</i>)	
capensis E. et Z.	Cap. b. sp.	4.T.
Seytalis E. Mey.	(<i>Papilionaceae</i>)	
Catjang E. Mey.	Ind. or.	⊙ CD.
leucomelaena K.	?	⊙ CD.
melanophthalma K.	Amer. aust.	⊙ C.
monachalis K.	Ind. or.	⊙ C.
sesquipedalis K.	Amer. trop.	⊙ C.
tranquebarica K.	Ind. or.	⊙ C.
umbellata K.	Japonia	⊙ CD.
unguiculata K.	Ind. oce.	⊙ C.
Secale L.	(<i>Gramineae</i>)	
cereale L.	Asia med. ?	⊙ 2.D.
dalmaticum Vis.	Dalmatia	4.DF.
fragile M. B.	Ruth. aust.	2.D.
montanum Guss.	Sicilia	4.DF.
Sedum Tourn.	(<i>Crassulaceae</i>)	
acre L.	Europa	4.D.
aizoides Salm-D.	?	4.D.
Aizoon L.	Asia bor.	4.D.
albescens Haw.	Angl., Dania	4.D.
album L.	Europa	4.D.
altissimum Poir.	Eur. aust.	4.DF.
Anacampteros L.	"	4.D.
andegavense DeC.	Gallia "	⊙ D.
annuum L.	Alp. Subalp.	⊙ D. 4.
anopetalum DeC.	Gall. aust.	4.DF.
atratum L.	Alpes	⊙ 2.D. 4.
caespitosum DeC.	Eur. aust.	⊙ D.
calabrum Ten.	Neapolis	⊙ 2.FD.
Cepaea L.	Eur. aus-or	⊙ 2.FD.
coeruleum Vahl	Afr. bor.	⊙ D.
cristatum Schrad.	Anglia	4.D.
cruciatum Desf.	Eur. aust.	4.DF.
dasyphyllum L.	Alp. Subalp.	4.D. 4.
elegans Lej.	Belgia	4.D.
Eversii Led.	Sibir. aust.	4.D.
Fabaria Koch	Eur. or.	4.D.
Forsterianum Sm.	Anglia	4.D.
galioides Lat.	Eur. aust.	⊙ 2.FD.
glaucum W. et K.	Eur. aust.	⊙ 2.D.
globulifolium Mor.	?	⊙ D.
hispanicum L.	Alpes	⊙ 2.D.
hybridum L.	Asia bor.	4.D.
involutum M. B.	Caucasus	4.D.
kamtschaticum Fisch.	Kamtschatk.	4.D. 4.
lividum Bhd.	?	4.D.
maximum Hoffm.	Europa	4.D.
oppositifolium Sims.	Caucasus	4.D.
pallidum M. B.	Tauria	⊙ D.
populifolium L.	Sibir. aust.	4.D.
pulchellum Mchx.	Amer. bor.	4.D.

Sedum

<i>repens</i> Schlei.	Alp. Subalp.	4.D. 4.
<i>reflexum</i> L.	Europa	4.D.
<i>roseum</i> Stev.	Caucasus	4.D.
<i>rupestre</i> L.	Europa	4.D.
<i>sempervivoides</i> Fisch.	Arm. Georg.	2.FD.
<i>sexangulare</i> L.	Europa	4.D.
<i>sexfidum</i> M. B.	Caucasus	2.D. 4.
<i>Sieboldii</i> Mack.	Japonia	4.FD.
<i>spurium</i> M. B.	Caucasus	4.D.
<i>stellatum</i> L.	Eur. aust.	⊙ D.
<i>telephioides</i> Mchx.	Amer. bor.	4.D.
<i>Telephium</i> L.	Europa	4.D.
" <i>β. purpureum</i> .		
<i>tenellum</i> M. B.	Caucasus	4.D. 4.
(vide: <i>Rhodiola</i>).		
Sequiera Loeffl.	(<i>Petiveriaceae</i>)	
americana L.	Amer. aust.	4.C.
Selaginella P. B.	(<i>Lycopodiaceae</i>)	
cuspidata Lk.	Mexico	4.C.
denticulata Lk.	Eur. aust.	4.F.
Dillenii K.	Europa	4.D. 4.
stellata Spr.	Brasilia	4.C.
Selago L.	(<i>Selaginaceae</i>)	
capitata L.	Cap. b. sp.	4.T.
corymbosa L.	"	4.T.
fasciculata L.	"	4.T.
myrtifolia Rehb.	"	4.T.
polystachya L.	"	4.T.
Selinum L.	(<i>Umbelliferae</i>)	
Carvifolia L.	Europa	4.D.
(vide: <i>Conioselinum</i> — <i>Imperatoria</i> — <i>Ligusticum</i> — <i>Melanoselinum</i> — <i>Palimbia</i> — <i>Peucedanum</i>).		
Sempervivum L.	(<i>Crassulaceae</i>)	
arachnoideum L.	Alpes	4.D. 4.
flagelliforme Fisch.	Asia bor.	4.D.
globiferum L.	Ruthenia	4.D.
hirtum L.	Europa	4.D.
pauciflorum Koch	"	4.D.
soboliferum Sims	"	4.D.
tectorum L.	"	4.D.
(vide: <i>Aeonium</i> — <i>Aichryson</i> — <i>Orostachys</i>).		
Senebiera Poir.	(<i>Cruciferae</i>)	
Coronopus Poir.	Europa	⊙ D.
linoides DeC.	Cap. b. sp.	⊙ CD.
pinnatifida DeC.	Eur. aust.	⊙ D.
Senecio Tourn.	(<i>Synanthereae</i>)	
abrotanifolius L.	Alpes	4.D. 4.
adenotrichius DeC.	Chili	⊙ CD.
aegyptiacus L.	Aegyptus	⊙ D.
ambiguus DeC.	Sicilia	4.F.
ambraceus Turcz.	Mongol. Chin.	4.FD.
aquaticus Huds.	Eur. med.	2.D.
arabicus L.	Arab. Aegypt.	⊙ D.
arachnoideus Sieb.	Alpes	4.D. 4.
artemisiaefolius Pers.	Gall. Hisp.	4.D. 4.
Badaroi Mor.	Sardinia	⊙ D.
barbareaefolius Krok.	Eur. med.	⊙ D.

Senecio

<i>Cacaliaster</i> Lam.	Gallia	4 D. A.
<i>candidus</i> DeC.	Sicilia	1 F.
<i>ceratophyllus</i> K.	"	1 F.
<i>chrysanthemifolius</i> Poir.	Sicilia	2 DF.
<i>Cineraria</i> DeC.	Eur. aust.	1 F.
<i>cordatus</i> Koch	Alpes	4 D. A.
<i>coriaceus</i> Ait.	Oriens	4 DF.
<i>crassifolius</i> W.	Eur. aust.	2 D.
<i>Doria</i> L.	"	4 D.
<i>Doronicum</i> L.	Alp. Subalp.	4 D. A.
<i>dubius</i> Led.	Sibiria	2 D.
<i>erraticus</i> Bert.	Eur. med. aust.	2 D.
<i>erucaefolius</i> Huds.	Europa	4 D.
<i>eudorus</i> DeC.	?	4 D.
<i>foeniculaceus</i> Ten.	Neap. Sicil.	2 D.
<i>Fuchsii</i> Gmel.	Eur. med.	4 D.
<i>gallicus</i> Vill.	Gall. Hisp.	2 D.
<i>gibbosus</i> DeC.	Neap. Sicil.	1 F.
<i>glabratus</i> H. et A.	Chili	1 T.
<i>glastifolius</i> L. f.	Cap. b. sp.	1 T.
<i>grandiflorus</i> Berg.	"	1 T.
<i>halimifolius</i> L.	"	1 T.
<i>ilicifolius</i> Thb.	"	1 T.
<i>inaequidens</i> DeC.	"	1 T.
<i>Jacobaea</i> L.	Europa	2 D.
<i>Jacquinianus</i> Rehb.	Mont. Eur. m.	4 D.
<i>Janceus</i> Ait.	Cap. b. sp.	1 T.
<i>leucanthemifolius</i> Poir.	Eur. aust. Afr.	2 D.
<i>lyratifolius</i> Rehb.	Alpes	4 D. A.
<i>macrophyllus</i> M. B.	Caucasus	4 D.
<i>Morethii</i> DeC.	Italia	4 DF.
<i>napifolius</i> Schrad.	Eur. aust.	4 D.
<i>nemorensis</i> L.	Montes Eur.	4 D.
<i>orientalis</i> W.	Armenia	4 DF.
<i>Othonnae</i> M. B.	Caucas. Iber.	4 DF.
<i>paludosus</i> L.	Eur. med. au.	4 D. V.
<i>Petasites</i> DeC.	Mexico	1 T.
<i>praealtus</i> Bert.	Eur. aust-or.	4 D.
<i>praecox</i> DeC.	Mexico	1 TC.
<i>pseudo-elegans</i> DeC. et pl.	var. C. b. s.	2 CD.
<i>purpureus</i> L.	Cap. b. sp.	4 T.
<i>rapistroides</i> DeC.	Caucasia	2 D.
<i>reclinatus</i> L. fil.	Cap. b. sp.	1 T.
<i>riparius</i> Wall.	Germania	4 D. V.
<i>rupestris</i> W. et K.	Eur. aust.	2 D.
<i>Sadleri</i> Lang	Hungaria	4 D. V.
<i>saracenicus</i> L.	Europa	4 D. V.
<i>scaber</i> W.	Cap. b. sp.	1 T.
<i>sinuatilobus</i> DeC.	Chili	2 CD.
<i>Smithii</i> DeC.	Cap. Horn	4 D. A.
<i>subalpinus</i> Koch	Alpes	4 D. A.
<i>sylvaticus</i> L.	Europa	2 D.
<i>tenuifolius</i> Jacq.	"	4 D.
<i>triflorus</i> L.	Aegyptus	2 D.
<i>umbellatus</i> L.	Cap. b. sp.	1 T.
<i>umbrosus</i> W. et K.	Eur. or-aust.	4 D.
<i>verbenaefolius</i> Jacq.	Aegyptus	2 D.
<i>vernalis</i> W. et K.	Eur. or-aust.	2 D.
<i>viscosus</i> L.	Europa	2 D.

Senecia

<i>vulgaris</i> L.	Europa	2 D.
(vide: <i>Cremonocephalum</i> — <i>Erechtites</i> — <i>Pericallis</i> — <i>Tephrosieris</i>).		
<i>Seriola</i> Gaertn.	(<i>Synanthereae</i>)	
<i>albicans</i> Tin.	Sicilia	4 F.
<i>alliata</i> Biv.	"	4 F.
<i>glauca</i> Tin.	"	4 F.
(vide: <i>Achyrophorus</i> — <i>Metabasis</i> — <i>Rodigia</i>).		
<i>Serissa</i> Commers.	(<i>Rubiaceae</i>)	
<i>foetida</i> Commers.	China, Japon.	1 T.
<i>Serjania</i> Plum.	(<i>Serjania</i>)	
<i>mexicana</i> W.	Mexico	1 C.
<i>Serratula</i> Dillen.	(<i>Synanthereae</i>)	
<i>arguta</i> Fisch.	Eur. or.	4 D.
<i>centauroides</i> L.	Asia bor.	4 D.
<i>coronata</i> L.	"	4 D.
<i>glauca</i> Led.	Sibir. aust.	4 DF.
<i>Gmelini</i> Led.	"	4 DF.
<i>heterophylla</i> Desf.	Delphinatus	4 D.
<i>quinquefolia</i> M. B.	Cauc. Pers.	4 DF.
<i>radiata</i> M. B.	Eur. or. Cauc.	4 D.
<i>tinctoria</i> L.	Europa	4 D.
(vide: <i>Cirsium</i> — <i>Jurinea</i> — <i>Rha-</i> <i>ponticum</i> — <i>Saussurea</i> — <i>Stemna-</i> <i>cantha</i>).		
<i>Sesamum</i> L.	(<i>Sesamiceae</i>)	
<i>occidentale</i> H. et R.	Ind. occ.	2 C.
<i>Sesbania</i> Pers.	(<i>Papilionaceae</i>)	
<i>aculeata</i> Pers.	Ind. or.	2 C.
<i>affinis</i> Schrad.	"	2 C.
<i>cannabina</i> Pers.	"	2 C.
<i>gracilis</i> Schrad.	"	2 C.
<i>occidentalis</i> Pers.	Ind. occ.	1 C.
<i>Seseli</i> Boerh.	(<i>Umbelliferae</i>)	
<i>Bocconi</i> Guss.	Sicil., Cors.	4 FD.
<i>campestre</i> Bess.	Eur. or.	2 D.
<i>coloratum</i> Ehrh.	Eur. med.	2 D.
<i>coronatum</i> Led.	Sibir. altaica	4 DF.
<i>dichotomum</i> M. B.	Tauria	2 D.
<i>glaucum</i> Jacq.	Eur. med.	2 D.
<i>globiferum</i> Vis.	Dalmatia	4 FD.
<i>Gouani</i> Koch	Eur. aust.	2 D.
<i>gracile</i> W. et K.	Hungaria	4 DF.
<i>gummiferum</i> Sm.	Tauria	2 D.
<i>Hippomarathrum</i> L.	Eur. med. Asia	4 D.
"	β. altaicum.	
<i>montanum</i> L.	Eur. aust.	4 D.
<i>Pallasii</i> Bess.	Ruthenia	2 D.
<i>petraeum</i> M. B.	Taur. Cauc.	4 D. A.
<i>peucedanifolium</i> Bess.	Podolia	2 D.
<i>regidum</i> W. et K.	Banatus	4 DF.
<i>tenuifolium</i> Led.	Sibir. aust.	4 DF.
<i>tomentosum</i> Vis.	Dalmatia	4 FD.
<i>tortuosum</i> L.	Gall. aust.	4 FD.
<i>varium</i> Trev.	Eur. or-aust.	2 D.
(vide: <i>Cnidium</i> — <i>Libanotis</i> — <i>Ptycho-</i> <i>tyss</i>).		
<i>Sesleria</i> Ard.	(<i>Gramineae</i>)	

Sesleria

- coerulea* Ard. Europa 4.D.
cylindrica DeC. Eur. aust. 4.DF.
elongata Host. " 4.D.
sphaerocephala Ard. Alpes 4.D.A.
tenuifolia Schrad. Illyr. Dalm. 4.DF.
Sesuvium L. (Portulacaceae)
Portulacastrum L. Ind. occ. 4.C.
Setaria P. B. (Gramineae)
aurea Hochst. Abyssinia 4.D.
glauca P. B. Europa 4.D.
intermedia R. et S. Ind. or. 4.D.
italica P. B. 4.D.
" β . *germanica* R. et S. — γ . *maritima* R. S.
macrochaeta Spr. Ind. or. 4.D.
macrostachya Kth. Amer. trop. 4.D.
pumila Schult. Ind. or. ? 4.D.
scandens Schrad. ? 4.CD.
tenacissima Schrad. Brasilia 4.CD.
verticillata P. B. Europa 4.D.
viridis P. B. 4.D.
" β . *purpurascens* Opiz — γ . *Weinmanni* R. et S.
Shepherdia Nutt. (Elaeagnaceae)
canadensis Nutt. Amer. bor. 4.D.
Sherardia Dillen. (Rubiaceae)
arvensis L. Europa 4.D.
Sibbaldia L. (Dryadineae)
procumbens L. Alpes 4.D.A.
Sicyos L. (Cucurbitaceae)
angulatus L. Amer. bor. 4.D.
Baderoa H. et A. Chili 4.CD.
Sida L. (Malvaceae)
acuta Blum. Ind. or. 4.C.
angustifolia Lam. Mascarenhas 4.C.
Balbisiana DeC. Amer. trop. 4.C.
borbonica Cav. Mascarenhas 4.C.
bracteolata DeC. Amer. trop. 4.C.
carpinifolia L. fil. Canariae 4.T.
chinensis Retz. China 4.C.
cordifolia L. Ind. or. Afr. 4.CD.
cuneifolia Ten. La Plata 4.T.
foetida Cav. Ind. occ. 4.C.
frutescens Cav. Mascarenhas 4.C.
hederaefolia Cav. Ind. occ. 4.C.
herbacea Cav. Ind. or. 4.C.
hispida Pursh Mex. Am. bo. 4.CD.
humilis W. Ind. or. 4.C.
jatrophioides L'Her. Peruvia 4.CD.
javensis Cav. Java 4.C.
pulcherrima H. Bonon. ? 4.C.
repanda Roth. ? 4.C.
rhombifolia L. Ind. occ. 4.C.
rhomboidea Roxb. Ind. or. 4.C.
rotundifolia Cav. Mascarenhas 4.C.
spinosa L. Ind. or. 4.CD.
spiraeaeifolia W. ? 4.C.
triloba Cav. Cap. b. sp. 4.T.
ulmifolia Cav. Ind. occ. 4.C.

Sida

- (vide: Abutilon — Gaya — Nuttalia —
 Periptera — Wissadula).
Sideritis Tourn. (Labiatae)
alpina Vill. Delph. Pyr. 4.D.A.
canariensis L. Canariae 4.F.
" β . *flavescens* K. — γ . *hybrida* K.
candicans Ait. Canariae 4.F.
cretica L. Creta 4.F.
hirsuta L. Eur. aust. 4.F.
mucronata Sieb. Palaestina 4.T.
pallida Thb. Cap. b. sp. 4.T.
perfoliata L. Eur. aust. 4.FD.
pyrenaica L. Pyrenaei 4.D.A.
scordiodoides L. Eur. aust. 4.D.
sicula Ucr. 4.FD.
syriaca L. Creta, Syria 4.F.
taurica M. B. Tauria 4.DF.
 (vide: Burgsdorfia — Hesiodia).
Siegesbeckia L. (Synanthereae)
cordifolia Kth. Amer. aust. 4.D.
flosculosa L'Her. Peruvia 4.D.
iberica W. Cauc. Armen. 4.D.
orientalis L. China, Ind. 4.D.
Sieversia W. (Dryadineae)
montana Spr. Alp. Sudeti 4.D.A.
pyrenaica Rchb. Pyrenaei 4.D.A.
Sifaus Bess. (Umbelliferae)
Besseri DeC. Eur. or-aust. 4.D.
carvifolius C. A. Mey. Caucasus 4.D.
macrocarpus Rchb. ? 4.D.
pratensis Bess. Europa 4.D.
serotinus Rchb. ? 4.D.
 (vide: Cenolophium).
Silene L. (Sileneae)
acaulis L. Alpes 4.D.A.
aegyptiaca L. Aegyptus 4.D.
altaica Pers. Sibir. aust. 4.D.A.
ambigua Schrad. ? 4.D.
amoena L. Tataria 4.D.
anglica L. Eur. occ. 4.D.
annulata Thor. Gallia 4.D.
antirrhina L. Amer. bor. 4.D.
apetala W. Hispania 4.D.
aprica Turcz. Sibir. aust. 4.DF.
Armeria L. Eur. occ-aust. 4.D.
Atocion Murr. Oriens 4.D.
Behen L. Graecia 4.D.
bellidifolia Jacq. ? 4.D.
brachypetala R. et C. Gall. aust. 4.D.
bupleuroides L. Arm. Pers. 4.DF.
catholica Ait. Italia 4.DF.
cerastoides L. Eur. aust. 4.D.
chloraefolia Sm. Cauc. Arm. 4.D.A.
chlorantha Ehrh. Eur. or., Sib. 4.D.
compacta Fisch. Eur. or-aust. 4.DF.
conica L. Eur. aust. 4.D.
conoidea L. " " 4.D.
cretica L. Ital., Graec. 4.D.

Silene

<i>dahurica</i> Fisch.	Sibir. aust. ④ D.F.
<i>depressa</i> M. B.	Sib. au. Cau. ④ D. A.
<i>dichotoma</i> Ehrh.	Eur. or-aust. ① D.
<i>Dilleniana</i> Schott	?
<i>disticha</i> W.	Eur. aust. ① D.
<i>divergens</i> Schrad.	?
<i>echinata</i> Oth.	Italia ① D.
<i>fimbriata</i> Sims	Creta, Or. ④ D.
<i>flavescens</i> W. et K.	Hungaria ④ D.F.
<i>fruticosa</i> L.	Sicil., Hispan. ④ F.
<i>gallica</i> L.	Eur. med. ① D.
<i>gigantea</i> L.	Graec. Afr. b. ② ④ F.
" <i>β. paniculata</i> .	
<i>graeca</i> Boiss.	Graecia ① D.
<i>graminifolia</i> Oth.	Sibir. aust. ④ D. A.
<i>Gypsophila</i> Desf.	Sibir. Caucas. ④ D.
<i>hirsuta</i> Lag.	Hispania ① D.
<i>hispida</i> Desf.	Eur. aust. Afr. ① D.
<i>holopetala</i> Bge.	Sibir. aust. ④ D.F.
<i>inamoena</i> Lindl.	?
<i>inaperta</i> L.	Eur. aust. ① D.
<i>inflata</i> Sm.	Europa ④ D.
" <i>β. angustifolia</i>	Aut. — γ. Pers.
<i>soonii</i> Schott	
<i>infracta</i> W. et K.	Hungaria ④ D.
<i>italica</i> DeC.	Eur. aust. ④ D.
" <i>β. livescens</i> .	
<i>juvenalis</i> DeC.	Gall. aust. ① D.
<i>laciniata</i> Cav.	Mexico ④ F.
<i>laxiflora</i> Brot.	Lusitania ① D.
<i>Lerchenfeldiana</i> Baumg.	Transylvan. ④ D. A.
<i>linicola</i> Gmel.	Eur. med. ① D.
<i>livida</i> W.	Eur. aust. ④ D.
<i>Loefflingiana</i> Bhd.	?
<i>longiflora</i> Ehrh.	Eur. or-aust. ④ D.F.
<i>lusitanica</i> L.	Hisp., Lusit. ① D.
<i>maritima</i> With.	Eur. occ. ④ D.
<i>multicaulis</i> Guss.	Italia ① D.
<i>multiflora</i> Pers.	Eur. or-aust. ④ D.
<i>Muscipula</i> L.	Hisp., Sicil. ① D.
<i>mutabilis</i> L.	Eur. aust. ① D.
<i>nemoralis</i> W. et K.	Eur. or. ④ D.
<i>nicaeensis</i> All.	Italia ① D.
<i>nocturna</i> L.	Eur. aust. ① D.
<i>nutans</i> L.	Europa ④ D.
<i>nyctantha</i> W.	?
<i>obtusifolia</i> W.	Eur. aust. ① D.
<i>ornata</i> Ait.	Cap. b. sp. ② F.
<i>Otites</i> Pers.	Eur., Asia bor. ① D.
<i>pachyphylla</i> H. Berol.	?
<i>paradoxa</i> L.	Eur. aust. ④ D.
<i>parviflora</i> Pers.	Hungaria ④ D.F.
<i>pelidna</i> Rehb.	Eur. aust. ④ D.
<i>pendula</i> L.	① D.
<i>pernoctans</i> Lk.	Lusitania ④ F.
<i>petraea</i> W. et K.	Hungaria ④ D. A.
<i>picta</i> Pers.	Eur. aust. Afr. b. ① D.
<i>pilosa</i> Spr.	Eur. or-aust. ④ D.
<i>polyphylla</i> L.	Eur. occ-aust. ① D.

Silene

<i>portensis</i> L.	Lusitania ① D.
<i>Pseudo-Atocion</i> Desf.	Afr. bor. ① D.
<i>Pseudo-Otites</i> Bess.	Eur. or-aust. ② D.
<i>Pumilio</i> Wulf.	Alpes ④ D. A.
<i>pygmaea</i> Lk.	Chili ① D.
<i>pyrifomis</i> H. Par.	?
<i>quinquevulnera</i> L.	Eur. aust. ① D.
<i>regia</i> Sims	Am. bor-aust. ④ D.F.
<i>repens</i> Patr.	Ruth., Asia bor. ④ D.
<i>rubella</i> L.	Eur. aust. Or. ① D.
<i>rupestris</i> L.	Alpes ④ D. A.
<i>sabuletorum</i> Lk.	Hisp. Lusit. ① D.
<i>Salzmanni</i> Oth.	Corsica ④ D.F.
<i>saponariaefolia</i> Schott	Eur. or-aust. ② D.
<i>saxatilis</i> M. B.	Caucasus ④ D. A.
<i>Saxifraga</i> L.	Alpes ④ D. A.
<i>Schafta</i> Gmel. j.	Caucasus ④ D. A.
<i>sericea</i> All.	Eur. aust. ① D.
<i>stellata</i> Ait.	Amer. bor. ④ D.F.
<i>stricta</i> L.	Hispania ① D.
<i>stylosa</i> Bge.	Sibir. aust. ④ D. A.
<i>suavis</i> Schrad.	?
<i>supina</i> M. B.	Caucasus ④ D. A.
<i>tatarica</i> Pers.	Ruth. Asia bor. ④ D.
<i>tenuiflora</i> Guss.	Neap. Sicil. ① D.
<i>tenuis</i> W.	Sibir. aust. ④ D. A.
<i>tridentata</i> Desf.	Hisp. Afr. bor. ① D.
<i>trinervia</i> S. et Sm.	Italia ① D.
<i>undulatifolia</i> Mor.	Sardinia ① D.
<i>vallesia</i> L.	Alpes ④ D. A.
" <i>β. caucasica</i> .	
<i>vespertina</i> Retz.	Eur. aust. ① D.
<i>virginica</i> L.	Am. bor-aust. ④ D.F.
<i>viridiflora</i> L.	Eur. aust. ④ D.
<i>viscosa</i> Pers.	Eur. med. Asia ② D.
<i>wolgensis</i> Spr.	Astracania ④ D.
<i>Zawadskii</i> Herbieh	Carpati ④ D. A.
(vide: <i>Elisanthe</i> — <i>Heliosperma</i>).	
<i>Siler</i> Scop.	(<i>Umbelliferae</i>)
<i>trilobum</i> Scop.	Eur. med. aust. ② D.
<i>Siliquaria</i> Forsk.	(<i>Capparidaceae</i>)
<i>Dilleniana</i> K.	Oriens ④ F.D.
<i>violacea</i> Spach	Lusitania ④ F.D.
<i>Silphium</i> L.	(<i>Synanthereae</i>)
<i>Asteriscus</i> L.	Am. bor-aust. ④ D.F.
<i>atropurpureum</i> Retz.	" " ④ D.F.
<i>conjunctum</i> W.	Amer. bor. ④ D.
<i>connatum</i> L.	" " ④ D.
<i>erythrocaulon</i> Bhd.	" " ④ D.
<i>gummiferum</i> Ell.	Am. bor-aust. ④ D.F.
<i>Hornemannii</i> Schrad.	Amer. bor. ④ D.
<i>integrifolium</i> Mchx.	" " ④ D.
<i>laciniatum</i> L.	Am. bor-aust. ④ D.F.
<i>perfoliatum</i> L.	Amer. bor. ④ D.
<i>terebinthinaceum</i> L.	Am. bor-aust. ④ D.F.
<i>ternatum</i> Retz.	Amer. bor. ④ D.
<i>trifoliatum</i> L.	" " ④ D.
<i>Silybum</i> Vaill.	(<i>Synanthereae</i>)
<i>marianum</i> Gaertn.	Eur. aust. ① D.

Silybum			
marianum <i>β. virescens.</i>			
Simisia Pers.	(<i>Synanthereae</i>)		
cordata Cass.	Mexico	⊙ CD.	
Sinapis Tourn.	(<i>Cruciferae</i>)		
alba L.	Eur. med.-aust.	⊙ D.	
dissecta Lag.	Hispania	⊙ D.	
foliosa W.	Oriens	⊙ D.	
hispidula Schousb.	Afr. bor.	⊙ D.	
(vide: Brassica — Erucastrum — Sinapistrum).			
Sinapistrum Rchb.	(<i>Cruciferae</i>)		
Allionii K.	Aegyptus	⊙ D.	
arvense Spach	Europa	⊙ D.	
Cheiranthus K.	Eur. occ.	⊙ D.	
orientale K.	Eur. or.-aust.	⊙ D.	
pubescens K.	Sicil. Hisp.	⊙ F.	
turgidum K.	Aegyptus	⊙ D.	
Sinningia N. E.	(<i>Gesneraceae</i>)		
guttata Lindl.	Brasilia	⊙ C.	
Helleri N. E.	"	⊙ C.	
Lindleyi Schau.	"	⊙ C.	
velutina Lindl.	"	⊙ C.	
villosa Lindl.	"	⊙ C.	
Siphocampylus Pohl	(<i>Lobeliaceae</i>)		
biserratus DeC. f.	Peruvia	⊙ TD.	
glandulosus Lemer.	Mexico	⊙ TD.	
(vide: Centropogon — Lobelia).			
Sison L.	(<i>Umbelliferae</i>)		
Amomum L.	Eur. aust.	⊙ D.	
Sisymbrium Tourn.	(<i>Cruciferae</i>)		
acutangulum DeC.	Eur. aust.	⊙ D.	
austriacum Jacq.	"	⊙ D.	
brachypetalum F. et M.	"Mongol." Pers.	⊙ D.	
gallicum W.	Eur. occ.	⊙ D.	
hirsutum Lag.	Hispania	⊙ D.	
Irio L.	Eur. occ.-aust.	⊙ D.	
junceum M. B.	Eur. or.-aust.	⊙ D.	
Loeselii L.	Europa	⊙ D.	
montanum E. Mey.	Cap. b. sp.	⊙ FD.	
multisiliquosum Hoffm.	Eur. med.-aust.	⊙ D.	
polyceratum L.	Eur. aust.	⊙ D.	
rigidum M. B.	Ruth. aust.	⊙ D.	
strictissimum L.	Eur. med.	⊙ D.	
(vide: Alliaria — Chamaeplium — Descuraea — Diplotaxis — Erucastrum — Tonguea).			
Sisyrinchium L.	(<i>Iridaeae</i>)		
anceps Lam.	Am. bor.-aust.	⊙ DF.	
Bermudiana L.	Bermud. Cap.	⊙ T.	
californicum Spr.	California	⊙ FD.	
chilense Hook.	Chili	⊙ T.	
convolutum Nocc.	Cap. b. sp.	⊙ T.	
dubium H. Berol.	?	⊙ T.	
elegans W.	Cap. b. sp.	⊙ T.	
gladiatum Spr.	"	⊙ T.	
graminifolium Lindl.	Chili	⊙ T.	
grandiflorum Cav.	Peruvia	⊙ T.	
iridifolium Kth.	Amer. aust.	⊙ T.	
laxum Lk.	"	⊙ T.	
Sisyrinchium			
luteum Fisch.	Mexico	⊙ T.	
micranthum Cav.	Peruvia	⊙ T.	
striatum Sm.	Mexico	⊙ T.	
tenuifolium W.	"	⊙ T.	
Sium Tourn.	(<i>Umbelliferae</i>)		
lancifolium M. B.	Tauria	⊙ D.	
latifolium L.	Europa	⊙ D. ∇	
lineare Mchx.	Amer. bor.	⊙ D.	
podolicum Bess.	Eur. or., Asia	⊙ D.	
Sisarium L.	Asia med.	⊙ D.	
(vide: Berula — Kundmannia).			
Skinera Forst.	(<i>Onagraceae</i>)		
excorticata Forst.	Nov. Zeel.	⊙ F.	
Smilacina Desf.	(<i>Smilacinaeae</i>)		
racemosa Desf.	Amer. bor.	⊙ D.	
stellata Desf.	"	⊙ D.	
Smilax Tourn.	(<i>Smilacinaeae</i>)		
aspera L.	Eur. aust.	⊙ DF.	
China L.	Asia orient.	⊙ FD.	
excelsa L.	Asia, med. occ.	⊙ FD.	
hastata W.	Am. bor.-aust.	⊙ FD.	
rotundifolia L.	"	⊙ FD.	
Pseudosarsa Vis.	Am. aust. tp.	⊙ F.	
Smyrniolum Tourn.	(<i>Umbelliferae</i>)		
Olusatum L.	Eur. aust.	⊙ DF.	
perfoliatum Mill.	"	⊙ DF.	
(vide: Physospermum — Zizia).			
Sogalagina Cass.	(<i>Synanthereae</i>)		
dentata Lilj.	Mexico	⊙ CD.	
trilobata Cass.	"	⊙ CD.	
Soja Mch.	(<i>Papilionaceae</i>)		
hispidula Mch.	Ind. or.	⊙ CD.	
Solandra Sw.	(<i>Solaniceae</i>)		
grandiflora L. fil.	Ind. occ.	⊙ C.	
nitida Zuccg.	Ind. or.	⊙ C.	
Solanum Tourn.	(<i>Solaniceae</i>)		
aculeatissimum Jacq.	Amer. trop.	⊙ C.	
aethiopicum L.	Afr. et Asia tr.	⊙ CD.	
aggregatum Jacq.	Cap. b. sp.	⊙ T.	
argenteum Dun.	Brasilia	⊙ C.	
astroides Jacq. f.	Chili	⊙ T.	
atropurpureum Schrk.	Brasilia	⊙ C.	
auriculatum Ait.	Mascarenhas	⊙ C.	
Balbisii Dun.	Peruvia	⊙ TD.	
Berterii H. Par.	Chili	⊙ D.	
betaceum Cav.	Mexico	⊙ C.	
bonariense L.	La Plata	⊙ FD.	
campechiense L.	Amer. med.	⊙ C.	
canariense Hort.	Canariae	⊙ T.	
capense Thb.	Cap. b. sp.	⊙ T.	
Capicastrum Otto	La Plata	⊙ F.	
ciliatum Lam.	Brasilia	⊙ C.	
coccineum Jacq.	Ind. occ.	⊙ C.	
corymbosum Lam.	Peruvia	⊙ C.	
crispum R. et P.	Chili	⊙ FD.	
Deppii Lk. et O.	Mexico	⊙ D.	
diphyllum L.	Amer. cal.	⊙ C.	
Dulcamara L.	Europa	⊙ D.	
elaegnifolium Cav.	Chili	⊙ T.	

Solanum

rescensum Dun.	Ind. or.	⊙ CD.
retuberosum Lindl.	Chili	4 FD.
fastigiatum W.	Mexico	4 T.
ferrugineum Jacq.	Amer. trop.	4 C.
formosum Dun.	Amer. aust.	4 C.
giganteum Jacq.	Cap. b. sp.	4 T.
Gilo Raddi	Brasilia	4 C.
glaberrimum Dun.	I. Timor.	4 C.
glaucophyllum Desf.	?	4 C.
glutinosum Dun.	Ind. or.	4 C.
gracile Lk.	?	4 TD.
graciliflorum Dun.	Java	4 C.
guineense Lam.	Guinea	⊙ D.
humile Bhd.	Eur. aust.	⊙ D.
Jacquini W.	Ind. or.	⊙ CD.
jasminiflorum Hort.	?	4 C.
judaicum Schult.	Eur. or.	⊙ D.
laciniatum Ait.	Nov. Holl.	4 F.
lanceolatum Cav.	Mexico	4 F.
Lichtensteinii W.	Cap. b. sp.	4 T.
lividum Lk.	Madagascaria	4 C.
lycioides W.	Peruvia	4 C.
macrocarpum L.	"	4 C.
marginatum L.	Afr. aust.	4 F.
miniaturum Bhd.	Europa	⊙ D.
monodynamum Vis.	Mexico	4 T.
moschatum Prsl.	Sicil. Neap.	⊙ D.
nigrum L.	Europa	⊙ D.
oleraceum Rich.	Amer. aust.	⊙ D.
oporinum W.	Mexico	4 T.
ovigerum Dun.	Ind. or.	⊙ CD.
persicum W.	Rumel. Or.	4 D.
Pseudo-Capsicum L.	Madera	4 F.
pteroaulon Dun.	Amer. aust.	⊙ D.
purpureum H. Par.	?	4 C.
pyracanthum Lam.	Madagascaria	4 C.
radicans L.	Peruvia	4 FD.
rigescens Jacq.	Cap. b. sp.	4 T.
rubrum Mill.	Europa	⊙ D.
sanctum L.	Palaestina	4 T.
serpentinum Desf.	?	⊙ C.
sisymbriifolium Lam.	Peruvia	4 TD.
sodomaeum L.	Afr. bor. Orien.	4 T.
stellatum Jacq.	Amer. trop.	4 C.
stoloniferum Schlcht.	Mexico	4 FD.
stramonifolium Jacq.	Ind. or.	4 C.
Thonningianum Jacq. f.	Amer. aust.	4 C.
tomentosum L.	"	4 C.
triquetrum Cav.	Mexico	4 C.
tuberosum L.	Amer. aust.	4 FD.
undatum Lam.	Mascarenhas	4 C.
verbascifolium L.	Ind. or.	4 C.
villosum Lam.	Europa	⊙ D.
(vide: Nycterium —	Sarracha).	

Soldanella Tourn.

alpina L.	Alpes	4 D. A.
minima Hopp.	"	4 D. A.
montana W.	Eur. med.	4 D. A.
pusilla Baumg.	Alpes	4 D. A.

Solenanthus Led.

circinatus Led.	Sibir. aust.	4 DF.
Solidago L.	(Synantheraceae)	
alpestris W. et K.	Subalpes	4 D.
altissima L.	Amer. bor.	4 D.
ambigua Ait.	"	4 D.
angustifolia K.	"	4 D.
arcuata Tsch.	"	4 D.
arguta Ait.	"	4 D.
" β. macrocephala.		
arenaria Horn.	Hungaria	4 D.
aspera Ait.	Amer. bor.	4 D.
bicolor L.	"	4 D.
caesia L.	"	4 D.
canadensis L.	"	4 D.
carpathica Schrad.	"	4 D.
carinata Schrad.	Carpati	4 D.
ciliaris Mhlbg.	Amer. bor.	4 D.
confertiflora DeC.	Am. bor. occ.	4 DF.
convexa K.	Amer. bor.	4 D.
densifolia K.	"	4 D.
elliptica Ait.	"	4 D.
flabellata Schrad.	"	4 D.
flabelliformis Wendl.	"	4 D.
flexicaulis L.	"	4 D.
foliosa K.	"	4 D.
fragrans W.	"	4 D.
fuscata Desf.	"	4 D.
gigantea Ait.	"	4 D.
glabra Desf.	"	4 D.
gracilis Poir.	"	4 D.
grandiflora Desf.	"	4 D.
hirsuta K.	"	4 D.
hirta W.	"	4 D.
humilis Desf.	"	4 D.
integrifolia Desf.	"	4 D.
laevigata Ait.	"	4 D.
latifolia L.	"	4 D.
laxa K.	"	4 D.
leucanthemifolia H. Ber.	"	4 D.
limonifolia Pers.	Am. bor. aust.	4 DF.
lithospermifolia W.	Amer. bor.	4 D.
litoralis Savi	Eur. aust.	4 D.
livida W.	Amer. bor.	4 D.
longifolia Schrad.	"	4 D.
macroctada K.	"	4 D.
macrophylla Pursh	"	4 D.
maculata K.	"	4 D.
microcephala K.	"	4 D.
minuta L.	Pyrenaei	4 D. A.
mollis Bartl.	Amer. bor.	4 D.
mucronata K.	"	4 D.
multiflora Desf.	"	4 D.
multiradiata Ait.	"	4 D.
memoralis Ait.	"	4 D.
nutans Desf.	"	4 D.
odora Ait.	"	4 D.
patula Mhlbg.	"	4 D.
petiolaris Ait.	"	4 D.
pilosa Mill.	"	4 D.

(Primulaceae)

Solidago

praecox Mch.	Amer. bor.	4 D.
praelonga Schrad.	" "	4 D.
procera Ait.	" "	4 D.
pygnantha K.	" "	4 D.
pyramidata Pursh.	" "	4 D.
recurvata W.	" "	4 D.
reflexa Ait.	" "	4 D.
retrorsa Mch.	" "	4 D.
Riddellii Frank	" "	4 D.
rigida L.	" "	4 D.
ripidophylla K.	" "	4 D.
rigidula Rose.	" "	4 D.
rubricaulis K.	" "	4 D.
scabra Mhlbg.	" "	4 D.
sempervirens L.	" "	4 D.
serotina Ait.	" "	4 D.
serrata K.	" "	4 D.
stricta Ait.	" "	4 D.
ulmifolia Mhlbg.	" "	4 D.
undulata K.	" "	4 D.
verrucosa Schrad.	" "	4 D.
villosa Pursh	" "	4 D.
Virgaurea L.	Europa	4 D.
(vide: Euthamia).		

Soliva R. et P.

anthemidifolia R. Br.	Brasilia	⊙ C.D.
Barclayana DeC.	Amer. aust.	⊙ C.D.
pterosperma Less.	La Plata	⊙ C.D.

Sollia Lindl.

angustifolia Lindl.	Nov. Holl.	4 T.
heterophylla Lindl.	Tasmania	4 T.
latifolia K.	Nov. Holl.	4 T.

Sonchus Vaill.

arvensis L.	Europa	4 D.
asper Vill.	"	⊙ D.
congestus W.	Canariae	4 F.
elongatus Kze.	?	⊙ 4 D.
Jacquini DeC.	Canariae	4 F.
lacerus W.	Eur. aust.	⊙ D.
laevigatus W.	Canariae	4 F.
leptocephalus Cass.	"	⊙ C.D.
longifolius Trev.	"	⊙ C.D.
lyratus W.	Canariae	4 F.
maritimus L.	Eur. aust.	4 F.D.
oleraceus L.	Europa	⊙ D.
palustris L.	"	4 D. ∇
pinnatus Ait.	Madera	4 F.
Royleanus DeC.	Ind. or.	⊙ D.
squarrosus DeC.	Madera	4 F.
tenerimus L.	Eur. aust.	⊙ D.
uliginosus M. B.	Eur. or-aust.	4 D.
(vide: Crepis — Mulgedium — Picridium).		

Sophora L.

tomentosa L.	Ind. or.	4 C.
(vide: Baptisia — Rhus — Styphnolobium — Thermopsis).		

Sorbus Tourn.

alpina K.	?	5 D.
-----------	---	------

Sorbus

americana Pursh	Amer. bor.	5 D.
Aria Crtz.	Europa	5 D.
Aucuparia L.	"	5 D.
" β. lanuginosa Kit.		
domestica L.	Eur. aust.	5 D.
edulis K.	Eur. occ.	5 D.
graeca Lodd.	Eur. aust-or.	4 D.
heterophylla Rehb.	Hybrida	4 D.
Hostii K.	Aust. Styr.	4 D.
hybrida L.	Eur. bor.	5 D.
latifolia Pers.	Eur. occ.	5 D.

" β. glabra.		
nepalensis Wall.	Nepalia	4 DF.
scandica Fries	Eur. bor.	4 D.
torminalis Crtz.	Europa	5 D.

Sorghum Pers.

bicolor W.	Ind. or.	⊙ C.D.
californicum P. B.	Afr. aust.	⊙ C.D.
cernuum W.	Ind. or.	⊙ C.D.
halepense Pers.	Eur. aust.	4 DF.
nigrum R. et S.	Ind. or.	⊙ C.D.
rubens W.	" "	⊙ C.D.
saccharatum Mch.	" "	⊙ C.D.
vulgare Pers.	" "	⊙ C.D.

Soulangea Brogn.

buxifolia Brogn.	Cap. b. sp.	T.
myrtifolia Dietr.	" "	4 T.
paniculata Brogn.	" "	4 T.
rubra Lindl.	" "	4 T.
Willdenowiana Dietr.	" "	4 T.

Spananthe Jacq.

paniculata Jacq.	Amer. aust.	⊙ C.
------------------	-------------	------

Sparaxis Ker

bulbifera Ker	Cap. b. sp.	4 T.
grandiflora Ker	" "	4 T.
Jouberti Lodd.	" "	4 T.
pendula Ker	" "	4 T.
tricolor Ker	" "	4 T.

Sparganium Tourn.

ramosum Huds.	Europa	4 D. ∇
---------------	--------	--------

Sparmannia Thb.

africana L. fil.	Cap. b. sp.	4 T.
(vide: Entelea).		

Spartina Schreb.

cynosuroides W.	Amer. bor.	4 D.
-----------------	------------	------

Spartium L.

juncum L.	Eur. aust.	4 FD.
(vide: Cytisus — Genista — Retama — Sarothamnus).		

Specularia Heist.

biflora F. et M.	Chili	⊙ D.
falcata DeC. f.	Eur. aust.	⊙ D.
hybrida DeC. f.	" "	⊙ D.
pentagonia DeC. f.	Oriens	⊙ D.
perfoliata DeC. f.	Amer. trop.	⊙ D.
Speculum DeC. f.	Eur. med. aust.	⊙ D.
" β. hirsuta Don et al. var.		

Spergella Rehb.

pilifera Rehb.	Corsica	4 F.
----------------	---------	------

<i>Spergella</i>				<i>Spigelia</i>			
<i>saginoidea</i> Rehb.	Alp. Subalp.	4 D. 1		<i>marylandica</i> L.	Amer. bor. au.	4 DF.	
<i>subulata</i> Rehb.	Eur. med. bor.	4 D.		<i>Spilanthes</i> Jacq.	(<i>Synanthereae</i>)		
<i>Spergula</i> L.				<i>Acemella</i> L.	Ind. or.	CD.	
<i>arvensis</i> L.	Europa	CD.		<i>leucocephala</i> H. Ber.	Columbia	CD.	
<i>maxima</i> Whe.	"	CD.		<i>mauritanica</i> DeC.	Mascarenhas	C.	
<i>vulgaris</i> Böngh.	Europa	CD.		<i>oleracea</i> L.	Ind. or.	CD.	
<i>Spergularia</i> Pers.				" <i>β. fusca</i> Desf.			
<i>canadensis</i> K.	Amer. bor.	CD.		<i>repens</i> Mchx.	Carolina	FD.	
<i>capensis</i> K.	Cap. b. sp.	4 FD.		<i>Spinacia</i> Tourn.	(<i>Chenopodiaceae</i>)		
<i>glandulosa</i> K.	"	CD.		<i>inermis</i> Mchx.	Asia med.	CD.	
<i>macrotheca</i> K.	Chili, Calif.	4 FD.		<i>oleracea</i> L.	"	CD.	
<i>marina</i> Gris.	Europa	CD.		<i>tetrandra</i> Stev.	"	CD.	
<i>rubra</i> Prsl.	"	CD.		<i>Spiraea</i> Tourn.	(<i>Spiraeaceae</i>)		
<i>segetalis</i> Gris.	"	CD.		<i>acutifolia</i> W.	Taur., Cauc.	4 D.	
<i>villosa</i> K.	Asia bor.	CD.		<i>alba</i> Ehrh.	Amer. bor. ?	4 D.	
<i>Spermacoe</i> Dillen.				<i>alpina</i> Pall.	Sibir. aust.	4 D.	
<i>articularis</i> L. fil.	Ind. or.	CF.		<i>ariaefolia</i> Sm.	Amer. bor.	4 D.	
<i>stricta</i> L. fil.	"	CF.		<i>bella</i> Sims.	Nepalia	4 DF.	
<i>tenuior</i> L.	Amer. trop.	CF.		<i>betulaefolia</i> Pall.	Sibir. Amer.	4 D.	
(vide: <i>Borreria</i> — <i>Crusea</i>).				<i>cana</i> W. et K.	Croatia	4 D.	
<i>Spermatocyon</i> Roxb.				<i>chamaedryfolia</i> L.	Eur. or., Asia	4 D.	
<i>azureum</i> Lindl.	Nepalia	4 F.		<i>corymbosa</i> Raf.	Am. bor. aust.	4 D.	
<i>Sphaecela</i> Benth.				<i>crenata</i> L.	Eur. or. aust.	4 DF.	
<i>Lindleyi</i> Benth.	Chili	4 T.		<i>cuneifolia</i> Wall.	Nepalia	4 DF.	
<i>Sphaeralcea</i> St. Hil.				<i>decumbens</i> Koch.	Illyria	4 DF.	
<i>abutiloides</i> G. Don	1. Bahama	4 T.		<i>hypericifolia</i> L.	Eur. or. au. Asia	4 D.	
<i>angustifolia</i> G. Don	Mexico	4 T.		<i>laevigata</i> L.	Sibir. aust.	4 D.	
<i>cisplatina</i> St. Hill.	Brasil. aust.	4 T.		<i>lanceaefolia</i> H.	Angl. ?	4 D.	
<i>lactea</i> Spach.	Mexico	4 T.		<i>media</i> Pursh.	Amer. bor.	4 D.	
<i>miniata</i> Spach	?	4 T.		<i>Nicoudietii</i> H. Cels.	?	4 DF.	
<i>rosea</i> G. Don	Mexico	4 T.		<i>nutans</i> Royle	Nepalia	4 DF.	
<i>umbellata</i> G. Don	"	4 T.		<i>oblongifolia</i> W. et K.	Eur. or. aust.	4 D.	
<i>Sphaeranthus</i> L.				<i>obovata</i> W. et K.	"	4 D.	
<i>microcephalus</i> W.	Ind. or.	4 C.		<i>salicifolia</i> L. et var.	Eur. or. Asia	4 D.	
<i>Sphaeritis</i> E. et Z.				<i>thalioides</i> Pall.	Sibir. aust.	4 DF.	
<i>tomentosa</i> E. et Z.	Cap. b. sp.	4 T.		<i>tomentosa</i> L.	Amer. bor.	4 D.	
<i>Sphaeroclinium</i> DeC.				<i>trilobata</i> L.	Sibir. aust.	4 D.	
<i>nigellaefolium</i> K.	Cap. b. sp.	4 FD.		<i>ulmifolia</i> Scop.	Eur. aust. or.	4 D.	
<i>Sphaerolobium</i> Sm.				(vide: <i>Aruncus</i> — <i>Hoteia</i> — <i>Physocarpus</i> — <i>Schizonotus</i> — <i>Ulmaria</i>).			
<i>vimineum</i> Sm.	Nov. Holl.	4 T.		<i>Spironema</i> Lindl.	(<i>Commelinaceae</i>)		
<i>Sphaerophysa</i> DeC.				<i>fragrans</i> Lindl.	Mexico	4 C.	
<i>salsula</i> DeC.	Sibir. aust.	4 DF.		<i>Spiranthes</i> Rich.	(<i>Orchideae</i>)		
<i>Sphaerostigma</i> Ser.				<i>picta</i> Lindl.	Ind. occ.	4 C.	
<i>chamissonis</i> F. et M. Chili	CD.			<i>Spitzelia</i> Schultz.	(<i>Synanthereae</i>)		
<i>cheiranthifolium</i> F. et M. "	CD.			<i>altissima</i> K.	Aegyptus	CD.	
<i>hirtum</i> F. et M. California	CD.			<i>Sporobolus</i> R. Br.	(<i>Gramineae</i>)		
<i>minutiflorum</i> F. et M. Chili	CD.			<i>minutiflorus</i> Lk.	Brasilia	CD.	
<i>strigosum</i> F. et M. California	CD.			<i>tenacissimus</i> P. B.	Amer. aust.	4 CD.	
<i>Sphallerocarpus</i> Bess.				<i>Sprekelia</i> Heist.	(<i>Amargyllideae</i>)		
<i>Cyminum</i> Bess.	Eur. or. aust.	4 D.		<i>formosissima</i> Herb.	Amer. aust.	4 TD.	
<i>Sphenandra</i> Benth.				<i>Karwinskii</i> Zucc.	Mexico	4 TD.	
<i>viscosa</i> Benth.	Cap. b. sp.	4 T.		<i>Sprengelia</i> Sm.	(<i>Epacrideae</i>)		
<i>Sphenogyne</i> R. Br.				<i>incarnata</i> Sm.	Nov. Holl.	4 T.	
<i>anthemoides</i> R. Br.	Cap. b. sp.	CD.		<i>Squilla</i> Steinh.	(<i>Liliaceae</i>)		
<i>microcephala</i> DeC.	"	CD.		<i>maritima</i> Steinh.	Eur. aust.	4 F.	
<i>versicolor</i> DeC.	"	CD.		<i>Stachys</i> Tourn.	(<i>Labiatae</i>)		
<i>Spielmannia</i> Med.				<i>alpina</i> L.	Alpes, Subalp.	4 D.	
<i>africana</i> W.	Cap. b. sp.	4 T.		<i>angustifolia</i> M. B.	Tauria	4 D.	
<i>Spigelia</i> L.							

Stachys

annua L.	Europa	⊙ D.
arabica Horn.	Arabia	⊙ D.
arenaria Vahl	Eur. aust.	⊙ D.
arvensis L.	Europa	⊙ D.
Balbisii Lk.	Eur. aust.	⊙ D.F.
Bridgesii Benth.	Chili	⊙ F.T.
biennis Roth	Eur. med. aust.	⊙ D.
circinata L'Her.	Hisp. Afr. bor.	⊙ F.
coccinea Jacq.	Mexico	⊙ F.T.
cretica L.	Graecia	⊙ F.D.
dasyantha Raf.	Sicilia	⊙ F.D.
decumbens W.	Eur. aust.	⊙ F.D.
excelsa H. Par.	?	⊙ D.
germanica L.	Europa	⊙ D.
grandidentata Lindl.	Chili	⊙ T.
heraclea All.	Eur. aust.	⊙ F.D.
hirta L.	Eur. aust.	⊙ F.D.
intermedia Ait.	Sibiria	⊙ D.
italica Mill.	Eur. aust.	⊙ F.D.
juvenalis DeC.	?	⊙ F.D.
lanata Jacq.	Eur. aust. or.	⊙ D.
maritima L.	Eur. aust.	⊙ F.D.
menthaefolia Vis.	Dalmatia	⊙ F.D.
mollissima W.	Hispania	⊙ F.
palustris L.	Europa	⊙ D.
Pourretii Ten.	Neapolis	⊙ F.D.
persica Gmel. j.	Asia med.	⊙ F.D.
polystachya Ten.	Italia	⊙ F.D.
pubescens Ten.	"	⊙ F.D.
recta L.	Europa	⊙ D.
salviaefolia Ten.	Neapolis	⊙ F.D.
setifera C. A. Mey.	Caucasia	⊙ D.
sibirica Lk.	Asia bor.	⊙ D.
spinosa L.	Creta	⊙ F.
subcrenata Vis.	Dalmatia	⊙ F.D.
sylvatica L.	Europa	⊙ D.
velutina W.	Afr. bor.	⊙ F.
(vide: Betonica — Gardoquia — Spha-cele).		

Stachytarpheta Vahl.

(Verbenaceae)

angustifolia Vahl.	Amer. aust.	⊙ C.
aristata Vahl.	" "	⊙ C.
cayennensis Vahl.	" "	⊙ C.
ciliata Kze.	Java	⊙ C.
gibberosa Rehb.	Amer. aust.	⊙ C.
Jamaicensis Vahl.	" "	⊙ C.
mutabilis Vahl	" "	⊙ C.
prismatica Vahl	" "	⊙ C.
urticaefolia Sims	" "	⊙ C.

Stanhopea Hook

(Orchideae)

eburnea Lindl.	Brasilia	⊙ C.
grandiflora Lindl.	Ind. occ.	⊙ C.
insignis Hook	Brasilia	⊙ C.
oculata Lindl.	Mexico	⊙ C.

Stapelia L.

(Asclepiadineae)

brevirostris W.	Afr. aust.	⊙ C.
grandiflora Mass.	" "	⊙ C.
hirsuta L.	" "	⊙ C.
patula W.	" "	⊙ C.

Stapelia

reflexa Haw. Afr. aust. ⊙ C.
(vide: Apteranthes — Caralluma — Du-
valia — Huernia — Orbea — Podan-
thes — Tridentea — Tromatricha).

Staphylea L.

(Staphyleaceae)

pinnata L. Eur. aust. ⊙ 5 D.
trifoliata L. Amer. bor. ⊙ 5 D.

Statice Tourn.

(Plumbagineae)

alata W. Aegyptus ⊙ F.T.
auriculaefolia Vahl Eur. aust. occ. ⊙ F.

bellidifolia S. et Sm. " " ⊙ F.D.
cordata L. Eur. aust. ⊙ F.D.

cuneata Sm. ? ⊙ F.
echioides L. Graecia, Or. ⊙ F.D.

Echinus L. Sibiria " ⊙ D.
elata Fisch. Songaria ⊙ F.D.

eximia Schrenk Eur. aust. Afr. ⊙ F.
Gmelini W. Taur. Caucas. ⊙ D.

incana L. Taur., Sibir. ⊙ F.D.
lanceolata H. et L. Lusitania ⊙ F.

latifolia Sm. Caucasica ⊙ D.
Limonium L. Eur. aust. ⊙ D.

mucronata L. Afr. bor. ⊙ F.
oleaeifolia Pourr. Eur. aust. ⊙ F.D.

pubescens DeC. " ⊙ F.
purpurata L. Cap. b. sp. ⊙ T.

scopoliana Pall. Sib. aust. Caucas. ⊙ D.
Scopoliana Bert. Eur. aust. ⊙ F.D.

sinuata L. Sicilia, Graec. ⊙ F.
Smithii Ten. Sicilia, Neap. ⊙ F.

spathulata Desf. Afr. bor. ⊙ F.
speciosa L. Sibir. aust. ⊙ F.D.

suffruticosa L. Taur., Astrac. ⊙ F.D.
tatarica L. Taur., Asia ⊙ D.

Thouini Desf. Aegyptus ⊙ F.D.
vineacea Schrad. ? ⊙ F.D.

virgata W. Hisp., Lusit. ⊙ F.
Willdenowiana Poir. Eur. aust. ⊙ F.

(vide: Armeria — Limoniastrum).

Stegania R. Br.

(Polypodiaceae)

Patersonii R. Br. Australia ⊙ C.

Steffensia Kth.

(Piperineae)

tuberculata Kth. Amer. trop. ⊙ C.

Stegia Mnch.

(Malvaceae)

Lavatera DeC. Eur. aust. ⊙ D.

Stellaria L.

(Alsineae)

Holostea L. Europa ⊙ D.
Pallasiana Ser. Asia bor. ⊙ D.

scapigera W. Anglia ⊙ D.J.
(vide: Dichodon — Larbrea — Pen-
taple).

Stellera L.

(Thymelaeaceae)

Passerina L. Eur. med. aust. ⊙ D.

Stemmacantha Cass.

(Synanthereae)

atriplicifolia F. et M. Sibir. aust. ⊙ D.F.
cynaroides Cass. Pyrenaei ⊙ D.J.

ficifolia K. Sibir. aust. ⊙ D.F.
Stemodia L. (Scrophulariaceae)

Stemodia					
arenaria Kth.	Columbia	♀ C.			
chilensis Benth.	Chili	♀ T.			
Ehrenbergii Schl.	Mexico	♂ C.			
lobelioides Benth.	Chili	♀ T.			
parviflora R. Br.	Amer. aust.	♂ CF.			
suffruticosa Kth.	Columbia	♂ C.			
Stenactis Cass.		(<i>Synantheraceae</i>)			
glabella Spach	Amer. bor.	♀ D.			
glauca N. E.	La Plata	♀ FD.			
speciosa Lindl.	California	♀ D.			
Stenanthera R. Br.		(<i>Epacridaceae</i>)			
pinifolia R. Br.	Nov. Holl.	♂ T.			
Stenocarpus R. Br.		(<i>Proteaceae</i>)			
salignus R. Br.	Nov. Holl.	♂ T.			
Stenochilus R. Br.		(<i>Myoporineae</i>)			
glaber R. Br.	Nov. Holl.	♂ T.			
maculatus Ker	"	♂ T.			
viscosus Grah.	"	♂ T.			
Stephanocarpus Spach		(<i>Cistineae</i>)			
florentinus K.	Eur. aust.	♂ F.			
" <i>β. cymosus</i> .					
monspeliensis Spach	"	♂ F.			
Stephanotis P. Th.		(<i>Asclepiadineae</i>)			
floribunda Brogn.	Madagascar	♂ C.			
Sternbergia W. et K.		(<i>Amaryllideae</i>)			
colchiciflora W. et K.	Hung. Trans.	♀ DF.			
lutea Ker	Eur. aust.	♀ DF.			
Stevia Cav.		(<i>Synantheraceae</i>)			
canescens Kth.	Mexico	♀ FD.			
conferta DeC.	"	♀ FD.			
Eupatoria W.	"	♀ FD.			
glandulifera Schlecht.	"	♀ FD.			
jaeifolia W.	"	♀ FD.			
janceolata Lag.	"	♀ FD.			
laxiflora DeC.	"	♀ FD.			
lucida Lag.	"	♂ FD.			
mollis Schrad.	"	♀ FD.			
monardaefolia Kth.	"	♀ FD.			
ovata Lag.	"	♀ FD.			
paniculata Lag.	"	♀ FD.			
pubescens Lag.	"	♀ FD.			
rhombifolia Kth.	"	♀ FD.			
salicifolia Cav.	"	♂ FD.			
serrata Cav.	"	♀ FD.			
suaveolens Lag.	"	♀ FD.			
viscida Kth.	"	♀ FD.			
Stewartia Cav.		(<i>Gordoniaceae</i>)			
virginica Cav.	Am. bor.-aust.	♀ FD.			
Stipa L.		(<i>Gramineae</i>)			
erecta Lag.	?	♀ D.			
capillata L.	Europa	♀ D.			
junceae L.	Eur. aust.	♀ D.			
pennata L.	Europa	♀ D.			
Richardsonii Lk.	Am. bor.-occ.	♀ DF.			
ortilis Desf.	Eur. aust.	♂ D.			
(vide: Aristella —	Lasiagrostis).				
Stobaea Less.		(<i>Synantheraceae</i>)			
heterophylla Thb.	Cap. b. sp.	♀ T.			
Stranvaesia Lindl.		(<i>Pomaceae</i>)			
Stranvaesia					
glaucescens Lindl.	Nepalia	♂ 5 F.			
Strelitzia Banks.		(<i>Musaceae</i>)			
farinosa Dry.	Afr. aust.	♀ C.			
humilis Lk.	"	♀ C.			
Streptocarpus Lindl.		(<i>Cyrtandraceae</i>)			
Rhexii Lindl.	Afr. aust.	♀ T.			
Streptopus Mchx.		(<i>Smilacineae</i>)			
amplexifolius DeC.	Alp. Subalp.	♀ D. ♀			
Strobilanthes Blum.		(<i>Acanthineae</i>)			
Sabiniana N. E.	Ind. or.	♂ C.			
Strophanthus DeC.		(<i>Apocyniaceae</i>)			
dichotomus DeC.	Ind. or.	♂ C.			
Strophostoma Turcz.		(<i>Borragineae</i>)			
sparsiflorum Turcz.	Eur. Asia bor.	♂ D.			
Strumaria Jacq.		(<i>Amaryllideae</i>)			
crispa Ker	Cap. b. sp.	♀ T.			
filifolia Jacq.	"	♀ T.			
Struthiopteris W.		(<i>Polypodiaceae</i>)			
germanica W.	Eur. med.	♀ D. ♀			
Struthiola L.		(<i>Thymelaeaceae</i>)			
glabra L.	Cap. b. sp.	♂ F.			
Stylidium Sw.		(<i>Stylidiaceae</i>)			
adnatum R. Br.	Nov. Holl.	♀ T.			
fasciculatum R. Br.	"	♀ T.			
fruticosum R. Br.	"	♀ T.			
graminifolium Sw.	"	♀ T.			
Styphnolobium Schott		(<i>Papilionaceae</i>)			
japonicum Schott	Japonia	5 D.			
pubescens K.	"	5 D.			
Styrax Tourn.		(<i>Styracineae</i>)			
officinalis L.	Eur. aust. Or.	♂ F.			
Suaeda Forsk.		(<i>Chenopodiaceae</i>)			
baccifera Pall.	Ruth. or-aust.	♂ D.			
maritima M. T.	Eur. med-aust.	♂ D.			
salsa Pall.	Astracania	♂ D.			
(vide: Cochlospermum).					
Succisa Coult.		(<i>Dipsacineae</i>)			
australis Rchb.	Eur. aust.	♀ D.			
pratensis Mch.	Europa	♀ D.			
" <i>β. glabrata</i> Schott.					
Suckowia Med.		(<i>Cruciferae</i>)			
balearica Med.	Sicil., Balear.	♂ D.			
Sutherlandia R. Br.		(<i>Papilionaceae</i>)			
frutescens R. Br.	Cap. b. sp.	♂ TD.			
Swainfonia Salisb.		(<i>Papilionaceae</i>)			
coronillaefolia Sol.	Nov. Holl.	♂ TD.			
galegaefolia R. Br.	"	♂ TD.			
Swertia L.		(<i>Gentianaceae</i>)			
perennis L.	Alp. Sudeti	♀ D. ♀			
Symphoricarpos Dillen.		(<i>Caprifoliaceae</i>)			
montanus Kth.	Mexico	♂ DF.			
racemosus Mchx.	Amer. bor.	♂ D.			
vulgaris Mchx.	"	♂ D.			
Symphandra DeC. f.		(<i>Campanulaceae</i>)			
pendula DeC. f.	Caucasus	♀ DF.			
Symphytum Tourn.		(<i>Borragineae</i>)			
aspernum M. B.	Taur., Caucas.	♀ D.			
" <i>β. echinatum</i> Led.					
bulbosum Schimp.	Eur. med-aust.	♀ D.			

Symphytum				Tamarindus			
bullatum Jacq.	Caucasus	2 D.		indica L.	Ind. or.	5 C.	
caucasicum M. B.	"	2 D.		Tamarix L.	(<i>Tamaricineae</i>)		
cordatum W. et K.	Eur. or-aust.	2 DF.		gallica L.	Eur. aust.	2 DF.	
officinale L. et var.	Europa	2 D.		(vide: Myricaria).			
orientale L.	Tauria, Or.	2 DF.		Tamus L. (Tourn).	(<i>Dioscoreaceae</i>)		
tauricum W.	Tauria	2 D.		communis L.	Eur. aust.	2 DF.	
tuberosum L.	Eur. med. aust.	2 D.		Tanacetum Tourn.	(<i>Synanthereae</i>)		
Symplocarpus Salisb.	(<i>Arineae</i>)			boreale Fisch.	Asia bor.	2 D.	
foetidus Nutt.	Am. bor. aust.	2 DF.		sibiricum L.	Sibir. aust.	2 D.	
Syncarpia Ten.	(<i>Myrtineae</i>)			subfruticosum W.	Cap. b. sp.	2 T.	
laurifolia Ten.	Nov. Holl.	2 T.		vulgare L.	Europa	2 D.	
Synecephalanthia Bartl.	(<i>Synanthereae</i>)			β. crispum.			
decipiens Bartl.	Mexico	2 CD.		(vide: Balsamita —	Cenocline — Go-		
Syndesmon Hoffg.	(<i>Ranunculineae</i>)			nosperrum).	(<i>Gesneriaceae</i>)		
thalictroides Hoffg.	Amer. bor.	2 D. 2 A.		Tapeinotes DeC.	Brasilica	2 C.	
Synedrella Gaertn.	(<i>Synanthereae</i>)			barbata DeC.	(<i>Synanthereae</i>)		
nodiflora Gaertn.	Mexico	2 CD.		Taraxacum Hall.	Sudetia	2 D. 2 A.	
Syrenia Andr.	(<i>Cruciferae</i>)			alpestre DeC.	Armenia	2 DF.	
angustifolia Rchb.	Eur. or-aust.	2 D.		armenium H. Par.	Sibir. aust.	2 DF.	
Perowskiana Lilj.	Alganistan.	2 D.		bicolor DeC.	Sib. aust. Cauc.	2 D.	
sessiliflora K.	Tauria, Sibir.	2 D.		caucasicum DeC.	Sibir. or.	2 D.	
siliculosa Andr.	Tauria	2 D.		ceratophorum DeC.	Eur. or-aust.	2 DF.	
Syringa L.	(<i>Oleaceae</i>)			corniculatum DeC.	Europa	2 D.	
chinensis W.	Hybrida	2 D.		Dens Leonis Desf.	Eur. or.	2 D.	
" β. purpurea.	Transylvia	2 D.		erythrospermum Andr.	Asia med.	2 DF.	
Josikaea Jacq.	Persia bor.	2 D.		glaucescens Rchb.	Eur. med. aust.	2 D.	
persica L.				laevigatum DeC.	Caucasus	2 D. 2 A.	
" β. alba.				montanum DeC.	Alpes	2 D. 2 A.	
vulgaris L.	Eur. or-aus. Or.	2 D.		nigricans Rchb.	Eur. aust.	2 FD.	
" β. violacea	— γ. alba — δ. ru-			obovatum DeC.	Ind. or.	2 F.	
bra — ε. marlyensis.	(<i>Apocyniae</i>)			Wallichii DeC.	(<i>Synanthereae</i>)		
Tabernaemontana L.	Ind. occ.	2 C.		Tarchonanthus L.	Cap. b. sp.	5 T.	
citrifolia L.	Ind. or.	2 C.		camphoratus L.	(<i>Cruciferae</i>)		
coronaria R. Br.	"	2 C.		Tauscheria Fisch.	Sibir. aust.	2 D.	
salicifolia Wall.	"	2 C.		lasiocarpa Fisch.	(<i>Cupressineae</i>)		
Tacsonia Guss.	(<i>Passifloraceae</i>)			Taxodium Rich.	Am. bor-aust.	5 DF.	
longiflora Pers.	Amer. aust.	2 C.		distichum Rich.	(<i>Taxineae</i>)		
Taeniostema Spach	(<i>Cistineae</i>)			Taxus Tourn.	Europa	5 D.	
glomeratum K.	Mexico	2 T.		baccata L.	Amer. bor.	5 D.	
Tagetes Tourn.	(<i>Synanthereae</i>)			canadensis W.	(<i>Bignoniaceae</i>)		
coronopifolia W.	Mexico	2 D.		Tecoma Juss.	Nov. Holl.	2 T.	
daucoides Schrad.	"	2 CD.		australis R. Br.	Cap. b. sp.	2 T.	
erecta L. et var.	"	2 D.		capensis Lindl.	China	2 FD.	
foetidissima Swt.	"	2 CD.		grandiflora Swt.	Am. bor-aust.	2 DF.	
glandulifera Schrk.	"	2 CD.		radicans Juss.	Amer. aust.	2 C.	
lucida Cav.	"	2 T.		stans Juss.	(<i>Polypodiaceae</i>)		
micrantha L.	"	2 CD.		Tectaria Cav.	Amer. aust.	2 C.	
patula L. et var.	"	2 D.		coriacea Lk.	(<i>Scrophulariaceae</i>)		
signata Bartl.	"	2 CD.		Teedia Rud.	Cap. b. sp.	2 T.	
Talauma Juss.	(<i>Magnoliaceae</i>)			lucida Rud.	(<i>Cruciferae</i>)		
pumila Blum.	Java, China	2 C.		Teesdalia R. Br.	Eur. med. aust.	2 D.	
Talinum Adans.	(<i>Crassulaceae</i>)			nudicaulis R. Br.	(<i>Synanthereae</i>)		
crassifolium W.	Ind. occ.	2 C.		Telekia Baumg.	Eur. aust-or.	2 D.	
cuneifolium W.	Arabia	2 C.		cordifolia DeC.	(<i>Paronychiaceae</i>)		
Moritzianum Kze.	Amer. aust.	2 CD.		Telephium Tourn.	Eur. aust. Or.	2 DF.	
patens W.	"	2 CD.		Imperati L.	(<i>Saxifragaceae</i>)		
teretifolium Pursh.	Am. bor-aust.	2 F.		Tellima R. Br.	Amer. bor.	2 D.	
triangulare W.	Ind. occ.	2 C.		grandiflora Lindl.	(<i>Chenopodiaceae</i>)		
Tamarindus Tourn.	(<i>Caesalpinaceae</i>)			Teloxis M. T.			

Teloxis			
aristata M. T.	Sibiria	⊙ D.	
Templetonia R. Br.	(<i>Papilionaceae</i>)		
glauca Sims	Nov. Holl.	† T.	
retusa R. Br.	"	† T.	
Tephrosieris Rehb.	(<i>Synanthereae</i>)		
crispa K.	Alp. Sudeti	‡ D. A.	
flammea K.	Sibir. aust.	‡ DF.	
glabrata K.	"	‡ DF.	
papposa K.	Alp. Sudeti	‡ D. A.	
Tephrosia Pers.	(<i>Papilionaceae</i>)		
capensis Pers.	Cap. b. sp.	† T.	
stricta Pers.	"	† T.	
Testudinaria Burch.	(<i>Dioscoreaceae</i>)		
Elephantopus Burch.	Cap. b. sp.	† T.	
Tetragonia L.	(<i>Portulacaceae</i>)		
crystallina L'Her.	Peruvia	⊙ CD.	
decumbens Mill.	Cap. b. sp.	† T.	
echinata Ait.	"	⊙ CD.	
expansa Ait.	Nov. Zeel.	⊙ CD.	
fruticosa L.	Cap. b. sp.	† T.	
Tetragonolobus Riv.	(<i>Papilionaceae</i>)		
biflorus Ser.	Sicil. Afr. bor.	⊙ D.	
conjugatus Lk.	Eur. aust.	⊙ D.	
purpureus Mnch.	"	⊙ D.	
maritimus Roth	Europa	‡ D.	
Requienii F. et M.	Sardinia	⊙ D.	
siliquosus Roth	Europa	‡ D.	
Tetraphyle E. et Z.	(<i>Grassulaceae</i>)		
lycopodioides E. et Z.	Cap. b. sp.	† T.	
Tetrapoma Turcz.	(<i>Cruciferae</i>)		
barbareaefolium Turcz.	Sibir. aust.	⊙ DF.	
Teucrium Tourn.	(<i>Labiatae</i>)		
abutitoides L'Her.	Madera	† T.	
Botrys L.	Europa	⊙ D.	
campanulatum L.	Eur. aust.	‡ F.	
canariense Lam.	Canariae	† T.	
canum F. et M.	Caucasus	† DF.	
Chamaedrys L.	Europa	‡ ‡ D.	
"	β. chamaedryoides Wdr.		
cubense L.	Ind. occ.	‡ T.	
flavum L.	Eur. aust.	† F.	
fruticans L.	"	† F.	
"	β. latifolium.	"	
laevigatum Vahl	La Plata	⊙ ‡ F.	
Libanotis Schreb.	Hispania	‡ F.	
lucidum L.	Eur. aust.	‡ ‡ F.	
Marum L.	"	† F.	
montanum L.	Eur. med.-aust.	† DF.	
multiflorum L.	Hispania	† F.	
orientale L.	Oriens	‡ D.	
Polium L.	Eur. aust.	† F.	
Pseudo-Hyssopus Schrb.	"	† F.	
regium Schrb.	Hispan. Syr.	† ‡ F.	
scordioides Schreb.	Eur. aust.	‡ DF.	
Scordium L.	Europa	‡ D.	
Sieberi Bhd.	Creta	† F.	
spinousum L.	Eur. aust.	⊙ CD.	
(vide: Phleboanthe	— Scorodonia).		
Thalictrum Tourn.	(<i>Ranunculineae</i>)		
Thalictrum			
acuminatum Spr.	Asia bor.	‡ D.	
acutilobum DeC.	"	‡ D.	
alpinum L.	Alpes	‡ D. A.	
ambiguum H. Ber.	?	‡ D.	
amoenum Schrad.	?	‡ D.	
angustifolium Jacq.	Europa	‡ D.	
apiculatum Tsch.	?	‡ D.	
"	β. cinereum.		
appendiculatum C.A.Mey.	Sibir. aust.	‡ D.	
baicalense Turcz.	Sibir. aust.	‡ D.	
calabricum Spr.	Neapolis	‡ D.	
callistemon Wdr.	?	‡ D.	
Capellii K.	Eur. aust.	‡ D.	
carolinianum Bosc.	Am. bor.-aust.	‡ DF.	
cinereum Desf.	?	‡ D.	
concinnum W.	?	‡ D.	
corynellum DeC.	Amer. bor.	‡ D.	
crenatum Desf.	?	‡ D.	
cuspidatum K.	?	‡ D.	
dasycarpum F. et L.	Amer. bor.	‡ D.	
dichotomum Ten.	Neapolis	‡ D.	
diffusum Schrad.	?	‡ D.	
dioicum L.	Amer. bor.	‡ D.	
divaricatum W.	?	‡ D.	
dubium Spr.	?	‡ D.	
elatum Jacq.	Eur. or.-aust.	‡ D.	
expansum Tsch.	?	‡ D.	
falcatum K.	?	‡ D.	
firmum Spr.	Asia bor.	‡ D.	
Fischeri K.	"	‡ D.	
flavum L.	Europa	‡ D.	
flexuosum Bhd.	"	‡ D.	
floribundum Schrad.	"	‡ D.	
foetidum L.	Montes Eur.	‡ D.	
galioides Nestl.	Europa	‡ D.	
glaucescens DeC.	Eur. or.	‡ D.	
glaucifolium Wendr.	?	‡ D.	
glaucophyllum Wendr.	?	‡ D.	
glaucum Desf.	Eur. aust.	‡ D.	
laserpitifolium W.	"	‡ D.	
lucidum L.	"	‡ D.	
majus Jacq.	Europa	‡ D.	
medium Jacq.	Eur. or.-aust.	‡ D.	
microcarpum C.A.Mey.	Caucasus	‡ D.	
minus L.	Europa	‡ D.	
nigricans Jacq.	"	‡ D.	
nutans Desf.	Sabaudia	‡ D.	
obtusilobum Tsch.	?	‡ D.	
oligospermum Fisch.	Asia bor.	‡ D.	
ovatum Lk.	Mexico	‡ DF.	
pallidum Tsch.	?	‡ D.	
persicum Spr.	Persia	‡ D.	
petaloideum L.	Sibir. aust.	‡ DF.	
polygamum Mhbg.	Amer. bor.	‡ D.	
porrigens Schrad.	?	‡ D.	
pubescens Schlei.	Eur. occ.	‡ D.	
pyramidale Tsch.	?	‡ D.	
refractum K.	?	‡ D.	
repens C. A. Mey.	Sibir. aust.	‡ D.	

Thalictrum

▲ revolutum DeC.	Amer. bor.	4 D.
▲ rigidum Fisch.	Asia bor.	4 D.
▲ rubens Tsch.	?	4 D.
▲ rugosum Ait.	Amer. bor.	4 D.
▲ ruthenicum Schrad.	Ruthenia	4 D.
▲ saxatile Schlei.	Europa	4 D.
▲ Schweiggeri Spr.	?	4 D.
▲ sibiricum L.	Asia bor.	4 D.
▲ simplex L.	Europa	4 D.
▲ sparsiflorum Turcz.	Sibir. aust.	4 D.
▲ squarrosum Steph.	Asia bor.	4 D.
▲ strictum Led.	Sibir. aust.	4 D.
▲ trigynum Fisch.	"	4 D.
(vide: Syndesmon — Tripterium).	(Umbelliferae)	
Thaspium Nutt.	Amer. bor.	4 DF.
barbinode Nutt.	(Urticaceae)	
Thaumuria Gaudich	Eur. aust.	4 F.
cretica Gaudich	Amer. bor.	4 FD.
pensylvanica Gaudich	(Camelliaceae)	
Thea L.	China	4 T.
Bohea L.	"	4 T.
viridis L.	(Cynocrambeae)	
Thelygonum L.	Eur. aust.	4 CD.
Cynocrambe L.	(Papilionaceae)	
Thermopsis R. Br.	Camtschatka	4 D.
fabacea DeC.	Sibiria	4 D.
lanceolata R. Br.	(Santalinaeae)	
Thesium L.	Alp., Subalp.	4 D., 4 A.
alpinum L.	Europa	4 D.
Linophyllum L.	(Crassulaceae)	
Thisantha E. et Z.	Cap. b. sp.	4 CD.
glomerata E. et Z.	(Cruciferae)	
Thlaspi Dillen.	Eur. med. aust.	4 D.
alliaceum L.	Mont. Subal.	4 D., 4 A.
alpestre L.	Europa	4 D.
arvense L.	Aspes	4 D., 4 A.
cepeaeifolium Koch	Sibiria	4 D.
ceratocarpum L. fil.	Pyrenaei	4 D., 4 A.
heterophyllum DeC.	Cauc. Casp.	4 D., 4 A.
macrophyllum Hoffm.	Europa	4 D., 4 A.
montanum L.	"	4 D.
perfoliatum L.	Illyria	4 D., 4 A.
praecox Wulf	Persia	4 D.
umbellatum Gmel. j.	(vide: Aethionema — Lepia).	4 D.
(vide: Aethionema — Lepia).	(Büttneriacae)	
Thomasia Gay	Nov. Holl.	4 T.
dumosa Cungh.	"	4 T.
macrocarpa Hügl	"	4 T.
purpurea Gay	"	4 T.
solanacea Gay	"	4 T.
Thrinicia Roth	(Synantheraceae)	
hirta DeC.	Europa	4 D.
hispida Roth	"	4 D.
Leysseri Wallr.	"	4 D.
maroccana Pers.	Afr. bor.	4 D.
tuberosa DeC.	Eur. aust.	4 F.
Thuja Tourn.	(Cupressineae)	
australis Bosc.	?	5 F.
occidentalis L.	Amer. bor.	5 D.

Thuja

orientalis L.	China, Japon.	5 D.
plicata Lamb.	Nutca	5 D.
pyramidalis Ten.	?	5 D.
Warreana H. Angl.	?	5 D.
(vide: Chamaecyparis — Widdringtonia).	(Acanthineae)	
Thunbergia L.	Afr. or.	4 C.
alata Hook	Hook — γ. Backe-	
ri — δ. leucantha.		
angulata Hook	Madagascar	4 T.
capensis Retz.	Cap. b. sp.	4 T.
fragrans Roxb.	Ind. or.	4 C.
grandiflora Roxb.	"	4 C.
vulubilis Juss.	"	4 C.
(vide: Hexacentris).	(Labiatae)	
Thymbra L.	Eur. aust.	4 F.
spicata L.	(Thymeleaceae)	
Thymelina Hoffg.	Cap. b. sp.	4 T.
sericea Hffg.	(Labiatae)	
Thymus Tourn.	acicularis W. et K.	Eur. aust. 4 DF.
ascendens Bhd.	Eur. aust. occ.	4 DF.
angustifolius Schreb.	Europa	4 D.
bonariensis Ten.	La Plata	4 F.
bracteosus Vis.	Dalmatia	4 DF.
capitatus H. et Lk.	Eur. aust.	4 F.
Chamaedrys Fr.	Europa	4 D.
collinus M. B.	Ruth. aust.	4 D.
hirsutus M. B.	Graec. Taur.	4 DF.
lanuginosus W.	Europa	4 D.
Marschallanus W.	Eur. aust.	4 D.
micranthus Wierzb.	Hungaria	4 D.
montanus W. et K.	Eur. med. au.	4 D., 4 A.
nummularius M. B.	Eur. or-aust.	4 D.
pannonicus All.	Eur. aust.	4 D.
Serpyllum L.	Europa	4 D.
vulgaris L.	Eur. aust-occ.	4 DF.
(vide: Acynos — Calamintha — Micro-		
meria).	(Umbelliferae)	
Thysselinum Rivin.	Europa	4 D., 4 V.
palustre Hoffm.	"	4 D.
sylvestre Rechb.	?	4 FD.
virens Bess.	(Saxifragaceae)	
Tiarella L.	Asia, Am. bor.	4 D.
cordifolia L.	(Ehretiaceae)	
Tiaridium Lehm.	Ind. or.	4 CD.
indicum Lehm.	(Iridineae)	
Tigridia Juss.	Mex., Peruv.	4 TD.
Pavonia Juss.	(Tiliaceae)	
Tilia Tourn.	Hungaria	5 D.
argentea Desf.	" β. oblonga.	
" β. oblonga.	Amer. bor.	5 D.
glabra Vent.	Europa	5 D.
grandifolia Ehrh.	" β. aurea — γ. asplen-	
folia.	Amer. bor.	5 D.
heterophylla Vent.	Amer. bor.	5 D.
laxiflora Mchx.		

- Tilia**
 neglecta Spach Amer. bor. 5D.
 parvifolia Ehrh. Europa 5D.
 pubescens Ait. Amer. bor. 5D.
 rubra DeC. Eur. or-aust. 5D.
 (Crassulaceae)
Tillaea Mich.
 muscosa L. Eur. aust. ⑤ D.
 rubescens Kth. Amer. aust. ⑤ CD.
 (Bromeliaceae)
Tillandsia L.
 acaulis Lindl. Brasilia ④ C.
 humilis Prsl. Chili ④ C.
 (vide: Billbergia).
Tinus Tourn. (Sambucineae)
 laurifolius Borkh. Eur. aust. ④ F.
 lucidus K. " ④ F.
 rugosus Spach Canariæ ④ F.
 (Synanthereae)
Tithonia Desf. Mexico ⑤ CD.
 tubaeformis Cass. (Xanthozylineae)
 (Xanthozylineae)
Toddalia Juss. Ind. or. ④ C.
 aculeata Pers. (Veratrineae)
 (Veratrineae)
Tofieldia Huds. Alpes ④ D. A.
 borealis Wahlbg. Europa ④ D.
 calyculata Wahlbg. (Saxifragaceae)
 (Saxifragaceae)
Tolmiea T. et G. Amer. bor. ④ DF.
 Menziesii T. et G.
Tolpis Adans. (Synanthereae)
 barbata Gaertn. Eur. aust. ⑤ D.
 umbellata Bertol. " " ⑤ D.
 virgata Biv. " " ⑤ D.
 (vide: Schmidtia).
 (Umbelliferae)
Tommassinia Bertol. Eur. aust. ④ D.
 verticillaris Bertol. (Cruciferae)
 (Cruciferae)
Tonguea Endl. Sicilia ⑤ D.
 bursaeifolia K. Eur. med-aust. ⑤ D.
 Columnae K. Hisp. Afr. bor. ⑤ D.
 erysimoides K. Eur. aust. ⑤ D.
 pannonica K.
Tordylium Tourn. (Umbelliferae)
 (Umbelliferae)
 maximum L. Eur. m. aust. ⑤ D.
 syriacum L. Graecia, Or. ⑤ D.
 (vide: Condyllocarpus — Hasselquistia — Zozimia).
 (Umbelliferae)
Torilis Adans. Europa ⑤ D.
 Anthriscus Gmel. Eur. aust. ⑤ D.
 infesta Hoffm. " " ⑤ D.
 heterophylla Guss. " " ⑤ D.
 helvetica Gmel. " " ⑤ D.
Tormentilla Tourn. (Dryadineae)
 erecta L. Europa ④ D.
 (Ehretiaceae)
Tournefortia L. Taur. Sib. aus. ④ DF.
 Arguzia R. Br. Ind. occ. ④ C.
 cymosa L. Canariæ ④ T.
 fruticosa B. Br. La Plata ④ FD.
 heliotropioides Hook Java ④ C.
 multabilis Vent. (Campanulaceae)
 (Campanulaceae)
Trachelium L. Eur. aust. ④ FD.
 coeruleum L. (Borragineae)
 (Borragineae)
Trachystemon G. Don Rumel. Or. ④ DF.
 orientalis Don (Commelinaceae)
 (Comelinaceae)
Tradescantia
 congesta Penn. Am. bor. aust. ④ DF.
 crassifolia Cav. Mexico ④ T.
 crassula Lk. et O. Bras. aust. ④ T.
 discolor L'Her. Amer. aust. ④ C.
 erecta Jacq. Mexico ⑤ CD.
 fuscata Lodd. Brasilia ④ C.
 Lyonii H. Angl. Am. bor. aust. ④ DF.
 rosea Mchx. " " ④ DF.
 subaspera Ker " " ④ DF.
 undata Kth. Amer. med. ⑤ CD.
 virginica L. Amer. bor. ④ D.
 " " β. coerulea — γ. rubra —
 δ. alba.
 Zonalis Hort. Mexico ④ C.
 (vide: Campelia — Cyanotis).
Tragopogon Tourn. (Synanthereae)
 (Synanthereae)
 brevirostris DeC. Caucasia ② D.
 campestris Bess. Eur. or. ② D.
 collinus DeC. Caucasia ② D.
 coloratus C. A. Mey. " ② D.
 crocifolius L. Eur. aust. ② D.
 Cupani Guss. Sicilia ② DF.
 eriospermus Ten. Neapolis ② D.
 floccosus W. et K. Eur. aust-or. ② D.
 livescens Bess. Eur. or. ② D.
 major Jacq. Europa ② D.
 mutabilis Jacq. Astracania ② D.
 orientalis L. Eur. med. ② D.
 parviflorus Horn. Eur. aust. ② D.
 porrifolius L. " " ② D.
 pratensis L. Europa ② D.
 undulatus Jacq. Eur. or. ② D.
Tragopyrum M. B. (Polygoniceae)
 lanceolatum M. B. Sibiria ④ D.
Trevirana, vide: Achimenes.
Triadenia Spach (Hypericineae)
 (Hypericineae)
 microphylla Spach Aegypt., Or. ④ F.
Triadenodendron Endl. (Caesalpiniaceae)
 (Caesalpiniaceae)
 caspicum Endl. Caspia 5 DF.
Trianthema Sauv. (Portulacaceae)
 (Portulacaceae)
 monogynum L. Ind. occ. ⑤ CD.
Tribulus Tourn. (Zygophyllineae)
 (Zygophyllineae)
 terrestris L. Eur. aust. ⑤ D.
 " " β. albidus Friv.
Trichasma, vide: Argyrolobium.
Trichera Schrad. (Dipsacineae)
 (Dipsacineae)
 arvensis Schrad. Europa ④ D.
 ciliata R. et S. Eur. or-aust. ④ D.
 hybrida R. et S. Eur. aust. ⑤ D.
 longifolia R. et S. Alpes ④ D. A.
 pubescens Schrad. Hungaria ④ D.
 sylvatica Schrad. Montes Eur. ④ D.
Trichocladus Pers. (Hamamelideae)
 (Hamamelideae)
 erinitus Pers. Cap. b. sp. ④ T.
Trichodesma R. Br. (Borragineae)
 (Borragineae)
 africanum R. Br. Cap. b. sp. ⑤ CD.
 indicum R. Br. Ind. or. ⑤ CF.
Trichogyne Less. (Synanthereae)
 (Synanthereae)
 verticillata Less. Cap. b. sp. ⑤ CD.

Tricholaena Schrad.	(Gramineae)	Trifolium	
rosea N. E.	Cap. b. sp. 2 T.	ochroleucum L.	Europa 2 D.
tonsa N. E.	" 2 T.	pallidum W. et K.	Eur. or. aus. 2 D.
Trichonema, vide: Romulea.		pannonicum L.	" " 2 D.
Trichosanthes L.	(Cucurbitaceae)	parviflorum Ehrh.	" " 2 D.
anguina L.	China aust. 2 C.	patens Schrb.	Europa 2 D.
Tridax L.	(Synanthereae)	phleoides Pourr.	Eur. aust. 2 D.
procumbens L.	Ind. occ. 2 C.	physanthum H. et A.	Chili 2 F.
Tridentea Haw.	(Asclepiadineae)	pictum Roth	Eur. aust. 2 D.
paniculata Haw.	Afr. aust. 2 C.	pratense L.	Europa 2 D.
vetula Haw.	" 2 C.	procumbens L.	" 2 D.
Trientalis L.	(Primulaceae)	repens L.	" 2 D.
europaea L.	Montes Eur. 2 D. 2 A.	" β . pictum.	Eur. aust. 2 D.
Trifolium Tourn.	(Papilionaceae)	resupinatum L.	Europa 2 D.
agrarium L.	Europa 2 D.	rubens L.	" 2 D.
alatum Biv.	Sicilia 2 D.	scabrum L.	" 2 D.
albidum Retz.	Eur. aust. 2 D.	Sebastianii Sav.	Italia 2 D.
alexandrinum L.	Aegyptus 2 D.	speciosum W.	Sicil., Graec. 2 D.
alpestre L.	Europa 2 D.	spumosum L.	Eur. aust. 2 D.
alpinum L.	Alpes 2 D. 2 A.	squarrosus L.	Eur. occ. aust. 2 D.
angustifolium L.	Eur. aust. 2 D.	stellatum L.	Eur. aust. 2 D.
armenium W.	Oriens 2 DF.	striatum L.	Europa 2 D.
arvense L.	Europa 2 D.	strictum L.	Eur. aust. 2 D.
" β . gracile Thuil.		suaveolens W.	Caspia, Pers. 2 D.
badium Schreb.	Alpes 2 D. 2 A.	subterraneum L.	Eur. aust. 2 D.
Balbisanum Ser.	Eur. aust. 2 DF.	succinctum Vis.	Dalmatia 2 D.
Bocconi Sav.	" 2 D.	suffocatum L.	Eur. aust. 2 D.
caespitosum Reyn.	Alpes " 2 D. 2 A.	supinum Sav.	" 2 D.
Cherleri L.	Eur. aust. 2 D.	tenuiflorum Ten.	Neapolis 2 D.
cinctum DeC.	" 2 D.	tomentosum L.	Eur. aust. 2 D.
circumdatum Kze.	Chili 2 D.	vesiculosum Sav.	" 2 D.
clypeatum L.	Oriens 2 D.	Wormskioldii Lehm.	Groenlandia 2 D.
conicum Pers.	? 2 D.		(Alismaceae)
dalmaticum Vis.	Dalmatia 2 D.	Triglochin L.	
diffusum Ehrh.	Eur. aust. 2 D.	Barrelieri Loisl.	Eur. aust. 2 F.
echinatum M. B.	Caucasia 2 D.	bulbosum L.	Cap. b. sp. 2 F.
elegans Sav.	Europa 2 D.	laxiflorum Guss.	Sicilia, Cors. 2 F.
erinaceum M. B.	Caucasia 2 D.	maritimum L.	Europa 2 DF.
expansum W. et K.	Eur. or. aust. 2 D.	montevidense Spr.	La Plata 2 F.
fragiferum L.	Europa 2 D.	palustre L.	Europa 2 D. 2 V.
globosum L.	Eur. aust. 2 D.		(Papilionaceae)
glomeratum L.	" " 2 D.	Trigonella L.	
hirtum All.	" " 2 D.	arcuata C. A. Mey.	Cauc. Casp. 2 D.
hybridum Sav.	Europa 2 D.	corniculata L.	Eur. aust. 2 D.
incarnatum L.	Eur. aust. 2 D.	Fischeriana Ser.	Caucasia 2 D.
intermedium Guss.	Italia 2 D.	flexuosa DeC.	Aegyptus 2 D.
Lagopus Pourr.	Hispania 2 D.	hamosa L.	" 2 D.
lappaceum L.	Eur. aust. 2 D.	hybrida Pourr.	Gallia 2 DF.
latinum S. et M.	Italia 2 D.	laciniata L.	Aegyptus 2 D.
leucanthum M. B.	Tauria 2 D.	monantha C. A. Mey.	Caucasia 2 D.
libanoticum Ehrbg.	Syria 2 D.	monspeliaca L.	Eur. aust. 2 D.
ligusticum Balb.	Eur. aust. 2 D.	ornithopodioides DeC.	" " 2 D.
maritimum Huds.	Eur. occ. aust. 2 D.	orthoceras K. et K.	Sibir. aust. 2 D.
medium L.	Europa 2 D.	pinnatifida Cav.	Hispania 2 D.
Michelianum Sav.	Eur. aust. 2 D.	platycarpa L.	Sibiria 2 D.
micranthum Viv.	Afr. bor. 2 D.	polyserata L.	Eur. aust. 2 D.
montanum L.	Europa 2 D.	spinosa L.	Graecia 2 D.
nigrescens Viv.	Eur. aust. 2 DF.	stellata Forsk.	Arab. Aegypt. 2 D.
nidificum Gris.	Rumelia 2 D.	striata L. fil.	Abyssinia 2 D.
obscurem Sav.	Eur. aust. 2 D.	(vide: Foenumgraecum — Grammocar-	
		pus).	(Tiliaceae)
		Trilix L.	

- Trilix**
lutea L. Cuba $\frac{1}{2}$ C.
Trinia Hoffm. (*Umbelliferae*)
Hennigii Hoffm. Eur. med.-aust. ② D.
Hoffmanni M. B. Eur. or. ② D.
Kitaibellii M. B. Eur. or-aust. ② D.
Triplachne L. (*Gramineae*)
nitens Lk. Sicilia ② D.
Triplaris L. (*Polygoniceae*)
americana L. Amer. aust. 5 C.
Tripodion Med. (*Papilionaceae*)
Jotoides Med. Eur. aust. ② D.
Tripolium N. E. (*Synanthereae*)
pannonicum N. E. Eur. or-aust. ② D.
vulgare N. E. Eur. mar. sal. ② D.
Tripsacum L. (*Gramineae*)
dactyloides L. Am. bor.-aust. ④ D.F.
Tripterium DeC. (*Ranunculineae*)
aquilegiaefolium Spach Mont. Eur. Asia ④ D.
" β . *aethiopicum* Ehrh. —
atropurpureum K. Mont. Eur. Asia ④ D.
Trisetum Pers. (*Gramineae*)
aureum Ten. Neapolis ② D.
carpathicum R. et S. Hungaria ④ D.
condensatum Prsl. Eur. aust. ② D.
distichophyllum P. B. Alpes ④ D. A.
flavescens P. B. Europa ④ D.
" β . *ibericum*. —
longifolium N. E. Cap. b. sp. ② CD.
myrianthum K. Italia ② D.
panicum Pers. Eur. aust. ② D.
pumilum Kth. Afr. bor. ② D.
rigidum R. et S. Caucasus ④ D.
splendens Prsl. Sicilia ④ D.F.
subspicatum P. B. Alpes ④ D. A.
Tristania R. Br. (*Myrtineae*)
laurina R. Br. Nov. Holl. $\frac{1}{2}$ T.
nerifolia R. Br. " $\frac{1}{2}$ T.
Triticum Tourn. (*Gramineae*)
amyleum Ser. ? ② D.
" β . *triccoccum* Schübl. —
γ. *atratum* Host. —
durum Desf. ? ② D.
" β . *villosum* Host. — *γ*. *fastuosum* Lag. — *δ*. *hordeiforme* Host. —
ε. *cochleare* Lag. —
monococcum L. Asia med. ② D.
polonicum L. ? ② D.
" β . *Cevallos* Lag. ?
Spelta L. ? ② D.
" β . *muticum* — *γ*. *nigrum*. —
turgidum L. ? ② D.
" β . *compositum* L. —
vulgare Vill. Asia med. ② D.
" β . *compactum* Host. — *γ*. *velutinum* Schübl.
(vide: *Agropyrum* — *Brachypodium* — *Crithodium* — *Crithopyrum*).
Tritoma, vide: *Kniphofia*.
Tritonia, vide: *Montbretia*.
- Triumfetta** Plum. (*Tiliaceae*)
annua L. Java ② C.
oblongata Lk. Nepalia ② C.F.
rhomboidea Jacq. Ind. occ. $\frac{1}{2}$ C.
tomentosa Telf. J. Zanzibaria $\frac{1}{2}$ C.
trichoclada Lk. Nepalia ② C.F.
trilocularis Roxb. Ind. or. $\frac{1}{2}$ C.
velutina Vahl Mascarenhas $\frac{1}{2}$ C.
Trollius L. (*Ranunculineae*)
altaicus C. A. Mey. Sibir. aust. ④ D. A.
altissimus Wendr. Europa ④ D.
americanus Mhlbg. Amer. bor. ④ D. A.
asiaticus L. Asia bor. ④ D. A.
calthaeoides Schrad. ? ④ D. A.
caucasicus Stev. Caucasus ④ D. A.
europaeus L. Europa ④ D.
hybridus Wendr. ? ④ D.
intermedius Wendr. ? ④ D.
Ledebourii Spr. Sibir. aust. ④ D. A.
medius Wendr. ? ④ D.
patulus Salish. Sibir. Cauc. ④ D. A.
tauricus Hort. Eur. or-aust. ④ D.
Tromotriche Haw. (*Asclepiadineae*)
glauca Haw. Afr. aust. $\frac{1}{2}$ C.
revoluta Haw. " $\frac{1}{2}$ C.
Tropaeolum L. (*Tropaeolineae*)
aduncum Sm. Peruvia ② CD.
majus L. ② D.
" β . *atrosanguineum* — *γ*. *quinquevulnerum* — *δ*. fl. pleno.
minus L. Peruvia ② CD.
" β . fl. pleno.
Moritzianum Klzsch. Columbia ② CD.
tuberosum R. et P. Peruvia ④ FD.
(vide: *Chymocarpus*).
Troximon Gaertn. (*Synanthereae*)
glaucom Nutt. Louisiana ④ FD.
Tuberaria Dun. (*Cistineae*)
annua Spach Eur. occ. aust. ② D.
perennis Spach Eur. aust. ④ F.
Tulbaghia L. (*Liliineae*)
alliacea L. Cap. b. sp. ④ T.
Tulipa Tourn. (*Liliineae*)
altaica Pall. Sibir. aust. ④ D.F.
Celsiana Red. Eur. aust. ④ D.
cuspidata K. ④ D.
Gesneriana L. Rumelia, Or. ④ D.F.
Oculus Solis St. Am. Eur. aust. ④ D.
pulchella Jacq. f. ? ④ D.F.
suaveolens Roth Eur. aust. ④ D.F.
sylvestris L. Europa ④ D.
tricolor Fisch. Sibiria ④ D.F.
Tunica Scop. (*Sileneae*)
Saxifraga Scop. Eur. med.-aust. ④ D.
stricta F. et M. Altai, Cauc. ② FD.
(vide: *Kohlrauschia*).
Tupa G. Don. (*Lobeliaceae*)
blanda Lindl. Chili ④ T.
Feuillei G. Don " ④ T.
Turgenia Hoffm. (*Umbelliferae*)

<i>Turgenia</i>				<i>Umbilicus</i> DeC.	(<i>Crassulaceae</i>)
<i>latifolia</i> Hoffm.	Eur. med. aus. Ⓞ D.			<i>erectus</i> DeC.	Eur. occ. aust. 4 F.
<i>Turnera</i> Plum.	(<i>Turneraceae</i>)			<i>pendulinus</i> DeC.	Mexico " 4 F.
<i>elegans</i> Otto	Brasilia 1 C.			<i>strictus</i> Schlecht.	Mexico " 1 T.
<i>racemosa</i> Jacq.	I. Hayti Ⓞ C.			(vide: <i>Orostachys</i>).	
<i>ulmifolia</i> L.	Amer. aust. 1 C.			<i>Uniola</i> L.	(<i>Gramineae</i>)
<i>Turpith</i> Tsch.	(<i>Umbelliferae</i>)			<i>latifolia</i> Mchx.	Am. bor. aust. 4 DF.
Matthioli Tsch.	Alpes 4 D. 1 A.			<i>Uraria</i> Desv.	(<i>Papilionaceae</i>)
<i>Turritis</i> Dillen.	(<i>Cruciferae</i>)			<i>hamosa</i> Wall.	Ind. or. 1 C.
<i>glabra</i> L.	Europa Ⓞ D.			<i>Urena</i> L.	(<i>Malvaceae</i>)
<i>Grahami</i> Lehm.	Amer. bor. Ⓞ D. 1 A.			<i>lobata</i> L.	China 1 C.
<i>retrofracta</i> Hook	" Ⓞ D. 1 A.			<i>sinuata</i> L.	Ind. or. 1 C.
<i>Tussilago</i> Tourn.	(<i>Synanthereae</i>)			<i>Urginea</i> Steinh.	(<i>Liliaceae</i>)
<i>Farfara</i> L.	Europa 4 D.			<i>undulata</i> Steinh.	Eur. aust. 4 FD.
(vide: <i>Anandria</i> — <i>Homogyne</i> — <i>Nardosmia</i> — <i>Petasites</i>).				<i>Uropetalum</i> Ker	(<i>Liliaceae</i>)
<i>Tweedia</i> H. et A.	(<i>Asclepiadineae</i>)			<i>glaucum</i> Burch.	Cap. b. sp. 4 T.
<i>coerulea</i> G. Don	La Plata 1 FD.			<i>serotinum</i> Ker	Eur. aust. 4 DF.
<i>Tyllanthus</i> Reiss.	(<i>Rhamnieae</i>)			<i>Urospermum</i> Scop.	(<i>Synanthereae</i>)
<i>acerosus</i> Reiss.	Cap. b. sp. 1 T.			<i>Dalechampi</i> Desf.	Eur. aust. 4 F.
<i>ericoides</i> Reiss.	" " 1 T.			<i>picroides</i> Desf.	" Ⓞ D.
<i>lanceolatus</i> Reiss.	" " 1 T.			<i>Urtica</i> Tourn.	(<i>Urticaceae</i>)
<i>parviflorus</i> Reiss.	" " 1 T.			<i>aestuas</i> L.	Amer. aust. Ⓞ C.
<i>Typha</i> Tourn.	(<i>Typhaceae</i>)			<i>atrovirens</i> Recq.	Gall. aust. 4 DF.
<i>angustifolia</i> L.	Europa 4 D. 1 A.			<i>baccifera</i> L.	Columbia 1 C.
<i>latifolia</i> L.	" 4 D. 1 A.			<i>balearica</i> L.	Baleares Ⓞ D.
<i>Typhonium</i> Schott	(<i>Arineae</i>)			<i>biloba</i> H. Belg.	? 1 T.
<i>divaricatum</i> Decais	Ind. or. 4 C.			<i>canadensis</i> L.	Amer. bor. 4 D.
<i>Tyrimnus</i> Cass.	(<i>Synanthereae</i>)			<i>cannabina</i> L.	Asia bor. 4 D.
<i>leucographus</i> Cass.	Eur. aust. Ⓞ D.			<i>chamaedryoides</i> Pursh	Georg., Carol. Ⓞ D.
<i>Ulex</i> L.	(<i>Papilionaceae</i>)			<i>convexa</i> Horn.	? Ⓞ D.
<i>europaeus</i> L.	Eur. occ. 1 DF.			<i>dioica</i> L.	Europa 4 D.
<i>Ulmaria</i> Tourn.	(<i>Spiraeaceae</i>)			<i>distachya</i> Spr.	La Plata Ⓞ CD.
<i>digitata</i> K.	Asia bor. 4 DF.			<i>Dodartii</i> L.	Eur. aust. Ⓞ D.
<i>Filipendula</i> K.	Europa 4 D.			<i>grandidentata</i> Mor.	Sardinia 4 DF.
<i>β. fl. pleno.</i>				<i>heterophylla</i> Wall	Ind. or. 1 C.
<i>lobata</i> K.	Amer. bor. 4 DF.			<i>horrida</i> Kth.	Columbia 1 C.
<i>palustris</i> Mchx.	Europa 4 D.			<i>membranacea</i> Poir.	Eur. aust. Ⓞ D.
<i>β. denudata</i> — <i>γ. fl. pleno.</i>				<i>mexicana</i> H. Ber.	Mexico Ⓞ CD.
<i>Ulmus</i> Tourn.	(<i>Ulmineae</i>)			<i>nivea</i> L.	China, Ind. or. 1 T.
<i>alata</i> Mchx.	Amer. bor. 5 D.			<i>pilulifera</i> L.	Eur. aust. Ⓞ D.
<i>americana</i> L.	" " 5 D.			<i>pumila</i> L.	Amer. bor. Ⓞ D.
<i>betuloides</i> Lodd.	" ? 5 D.			<i>scabrella</i> Roxb.	Ind. or. 1 C.
<i>campestris</i> L.	Europa 5 D.			<i>urens</i> L.	Europa Ⓞ D.
<i>β. variegata.</i>				<i>Utrervia</i> Bertol.	(<i>Capparidinae</i>)
<i>ciliata</i> Ehrh.	" 5 D.			<i>frondosa</i> Bertol.	Amer. trop. 1 C.
<i>crispa</i> W.	Amer. bor. 5 D.			<i>saligna</i> K.	Ind. occ. 1 C.
<i>fastigiata</i> Hort.	? 5 D.			<i>Uvularia</i> , vide: <i>Disporum</i> — <i>Streptopus</i> .	
<i>fulva</i> Mchx.	Amer. bor. 5 D.			<i>Vaccaria</i> Med.	(<i>Sileneae</i>)
<i>glabra</i> Mill.	Europa 5 D.			<i>pyramidata</i> Med.	Europa Ⓞ D.
<i>microphylla</i> Pers.	Asia bor. 1 D.			<i>Vaccinium</i> L.	(<i>Vaccinieae</i>)
<i>montana</i> Sm.	Europa 5 D.			<i>amoenum</i> Ait.	Am. bor. aust. 1 DF.
<i>nigra</i> Lodd.	? 5 D.			<i>fuscatum</i> Ait.	" " 1 DF.
<i>rugosa</i> Lodd.	? 5 D.			<i>lucidum</i> H. Angl.	" " 1 DF.
<i>sibirica</i> Hort.	Asia bor. 5 D.			<i>Myrtillus</i> L.	Europa 1 D.
<i>suberosa</i> Ehrh.	Europa 5 D.			<i>pensylvanicum</i> Lam.	Amer. bor. 1 DF.
<i>tiliaefolia</i> Host.	Bohem. aust. 5 D.			<i>stamineum</i> L.	Am. bor. aust. 1 DF.
<i>tortuosa</i> Host.	Hungaria 5 D.			<i>uliginosum</i> L.	Europa 1 D.
<i>viscosa</i> Lodd.	? 5 D.			<i>Vitis idaea</i> L.	" 1 D.
(vide: <i>Microptelea</i> — <i>Zelkova</i>).				<i>Vachellia</i> W. et A.	(<i>Mimosaceae</i>)
				<i>Farnesiana</i> W. et A.	Ind. or. 5 C.

- Vaillantia* Tourn. (*Rubiaceae*)
hispidula L. Eur. aust. ♂ D.
muralis L. " " ♂ D.
(vide: *Galium*).
Valeriana Tourn. (*Valerianaceae*)
alliarifolia Vahl. Caucasus 4 D. A.
dioica L. Europa 4 D.
dubia Bge. Sibir. aust. 4 DF.
exaltata Mlk. Europa 4 D.
officinalis L. 4 D.
" *β. integrifolia*. "
montana L. Alpes 4 D. A.
Phu L. Eur. aust. 4 D.
pyrenaica L. Pyrenaei 4 D. A.
sambucifolia Mik. Eur. or. 4 D.
supina L. Alpes 4 D. A.
tripteris L. Alp. Subalp. 4 D. A.
Valerianella Tourn. (*Valerianaceae*)
Auricula DeC. Europa ♂ D.
brachystephana Ten. Eur. aust. ♂ D.
carinata Loisl. Eur. med. aust. ♂ D.
coronata DeC. Eur. aust. ♂ D.
cymbaearca C. A. Mey. Caucasia ♂ D.
dentata Poll. Europa ♂ D.
discoidea Loisl. Eur. aust. ♂ D.
echinata DeC. " " ♂ D.
eriocarpa Desv. " " ♂ D.
gibbosa DeC. Sicilia " ♂ D.
gracilis F. et M. ? ♂ D.
hamata Bast. Eur. aust. ♂ D.
hirsutissima Lk. Graecia ♂ D.
mixta Dufr. Europa ♂ D.
olitoria Poll. ♂ D.
oxyrhyncha F. et M. Armenia ♂ D.
pumila DeC. Eur. aust. ♂ D.
sclerocarpa F. et M. Caucasia ♂ D.
Szowitsiana F. et M. Persia ♂ D.
tridentata Lk. Eur. aust. ♂ D.
truncata DeC. Eur. aust.-or. ♂ D.
vesicaria Mnch. Eur. aust. ♂ D.
Vallesia R. et P. (*Apocynaceae*)
dichotoma R. et P. Peruvia 4 C.
Vallisneria Mich. (*Hydrocharitaceae*)
Jacquini Sav. Eur. aust. 4 F. ▽
Vanilla Sw. (*Orchideae*)
aromatica Sw. Amer. trop. 4 C.
planifolia Andr. " " 4 C.
Velezia L. (*Sileneae*)
rigida L. Eur. aus. Af. b. 2 FD.
Vella L. (*Cruciferae*)
Pseudo-Cytisus L. Hispania 4 F.
(vide: *Carrichtera*).
Veltheimia Gled. (*Liliaceae*)
viridifolia Jacq. Cap. b. sp. 4 T.
(vide: *Kniphofia*).
Venidium Less. (*Synantheraceae*)
Schraderi DeC. Cap. b. sp. 4 T.
Veratrum Tourn. (*Veratrineae*)
album L. Alpes 4 D. A.
Lobelianum Bhd. Alp. Sudeti 4 D. A.
Veratrum
nigrum L. Alpes aust. 4 D.
officinale Schlecht. Mexico 4 T.
Verbascum Tourn. (*Scrophulariaceae*)
aethiopicum Ehrh. Africa 2 DF.
angustifolium Ten. Neapolis 2 DF.
australe Schrad. Eur. aust. 2 D.
austriacum Schott. Eur. or-aust. 4 D.
banaticum Schrad. Banatus 2 D.
bicolor Bad. Gallia aust. 2 D.
Blattaria L. Europa 2 D.
Chaixi Vill. Delph. Pedem. 2 D.
compactum M. B. Tauria, Cauc. 2 D.
cuspidatum Schrad. Europa 2 D.
densiflorum Bertol. Italia 2 D.
floccosum W. et K. Eur. aust. 2 D.
gnaphalioides M. B. Tauria 2 D.
graciliflorum H. Par. ? 2 D.
Hohenackeri F. et M. Caucasus 2 DF.
Hornemanni Bess. Eur. or. ♂ D.
Lagurus F. et M. Rumelia 2 DF.
lanatum Schrad. Eur. aust. 2 D.
Lychnitis L. Europa 2 D.
" *β. album* Mnch.
micranthum Mozet. Italia 2 D.
montanum Schrad. Eur. med-aust. 2 D.
nigrum L. Europa 4 D.
niveum Ten. Neapolis 2 DF.
orientale M. B. Eur. or-aust. 2 D.
phlomisoides L. Europa 2 D.
phoeniceum L. Eur. or-aust. 4 D.
pulverulentum Vill. Eur. occ. 2 D.
pyramidatum M. B. Eur. or-aust. 4 D.
repandum W. ? 2 D.
rotundifolium Ten. Sicil. Neap. 2 DF.
sinuatum L. Eur. aust. 2 D.
thapsiforme Schrad. Europa 2 D.
Thapsus L. 2 D.
thyrsoides Host. Illyria 4 D.
Weldenii Braun Eur. aust. 2 D.
Verbena Tourn. (*Verbenaceae*)
alata Cham. Brasil. aust. 4 T.
angustifolia Mchx. Am. bor-aust. 4 DF.
bonariensis L. La Plata 2 FD.
bracteosa Mchx. Amer. bor. 4 DF.
canescens H. et B. Mexico 4 FD.
caroliniana L. Am. bor-aust. 4 DF.
chamaedryfolia Juss. Amer. aust. 4 TD.
cordata Hort. America ? 4 T.
glandulosa Mor. Chili 4 FD.
hastata L. Amer. bor. 4 D.
incisa Hook. Amer. aust. 4 TD.
laciniosa Schrad. ? 4 D.
Jasiotachys Lk. California 4 DF.
litoralis H. et B. Peruvia 4 CD.
officinalis L. Europa 4 D.
paniculata L. Amer. bor. 4 D.
prostrata R. Br. " " 4 DF.
scabra Vahl Mexico 4 F.
spuria L. Amer. bor. 4 DF.

Verbena

<i>stricta</i> Vent.	Carolina	2.DF.
<i>supina</i> L.	Eur. aust.	⊙ D.
<i>teucrioides</i> G. et H.	Chili	† TD.
<i>Tweediana</i> Hook	Bras. aust.	† TD.
<i>urticaefolia</i> L.	Amer. bor.	2.D.
<i>venosa</i> G. et H.	Chili	2.FD.
et plures hybr. formae. (vide: Glandularia).		

Verbesina L.

(Synantheraceae)

<i>alata</i> L.	Amer. trop.	† C.
<i>buphthalmoides</i> Lk. et O.	La Plata	2.T.
<i>crocata</i> Less.	Mexico	† C.
<i>serrata</i> Cav.	"	† C.
<i>triplinervia</i> Vis.	"	† C.
(vide: Blainvillea — Eclipta — Phaë- tusa — Spilanthes — Synedrella)		

Vernonia Schreb.

(Vernoniaceae)

<i>altissima</i> Nutt.	Amer. bor.	2.DF.
<i>anthelmintica</i> W.	Ind. or.	⊙ CD.
<i>axilliflora</i> Mart.	Brasilia	† C.
<i>centriflora</i> Lk. et O.	"	† C.
<i>novaeboracensis</i> W.	Amer. bor.	2.DF.
<i>praealta</i> W.	Am. bor.-aust.	2.DF.
<i>scaberrima</i> Nutt.	" "	2.DF.
<i>tomentosa</i> N. E.	Ind. or.	† C.

Veronica Tourn.

(Scrophulariaceae)

<i>acuta</i> Mart.	Europa	2.D.
<i>adscendens</i> Tsch.	Bohemia	2.D.
<i>affinis</i> Jan.	Italia	2.D.
<i>agrestis</i> L.	Europa	⊙ D.
<i>albicaulis</i> DeC.	Gallia	2.D.
<i>alpina</i> L.	Alp. Sudeti	2.D. A.
<i>ambigua</i> Mart.	?	2.D.
<i>americana</i> Tsch.	Amer. bor.	2.D.
<i>Anagallis</i> L.	Europa	⊙ D. V
" <i>β. anagalloides</i> Guss.		
<i>angusta</i> K.	Eur. aust.	2.D.
<i>arcuata</i> Tsch.	?	2.D.
<i>arguta</i> Schrad.	Eur. aust.	2.D.
<i>arvensis</i> L.	Europa	⊙ D.
<i>auriculata</i> Tsch.	?	2.D.
<i>australis</i> Schrad.	Eur. aust.	2.D.
<i>austriaca</i> L.	Eur. or-aust.	2.D.
<i>azurea</i> Schott	?	2.D.
<i>Bachofenii</i> Heuff.	Hungaria	2.D.
<i>Beccabunga</i> L.	Europa	2.D. V
<i>bellidioides</i> L.	Alp. Sudeti	2.D. A.
<i>biloba</i> Vahl.	Asia med.	⊙ D.
<i>brachyphylla</i> R. et S.	?	2.D.
<i>bractescens</i> Tsch.	?	2.D.
<i>Buxbaumii</i> Ten.	Eur. med. aust.	⊙ D.
<i>calostachya</i> Tsch.	Bohemia	2.D.
<i>calycina</i> R. Br.	Nov. Holl.	2.T.
<i>canaliculata</i> Tsch.	Bohemia	2.D.
<i>canescens</i> Schrad.	Eur. aust-or.	2.D.
<i>caucasica</i> M. B.	Cauc. Armen.	2.D.
<i>ceratocarpa</i> C. A. Mey.	Caucasia	⊙ D.
<i>Chamaedrys</i> L.	Europa	2.D.
<i>cinerea</i> Tsch.	?	2.D.

Veronica

<i>Clusii</i> Schott	Eur. aust.	2.D.
<i>comosa</i> Tsch.	?	2.D.
<i>compacta</i> Tsch.	?	2.D.
<i>complicata</i> Hoffm.	Eur. aust.	2.D.
<i>crassifolia</i> Wierzb.	Hungaria	2.DF.
<i>crenulata</i> Hoffm.	?	2.D.
<i>cuneata</i> Tsch.	?	2.D.
<i>Cymbalaria</i> Bertol.	Eur. aust.	⊙ D.
<i>decussata</i> Ait.	Patagonia	† F.
<i>densifolia</i> K.	?	2.D.
<i>digitata</i> Vahl	Eur. aust. occ.	⊙ D.
<i>elata</i> Host.	Austria	2.D.
<i>elator</i> Ehrh.	Eur. aust.	2.D.
<i>elegans</i> DeC.	Eur. occ.	2.D.
<i>elongata</i> Tsch.	?	2.D.
<i>eminens</i> K.	?	2.D.
<i>Erythrocarya</i> Jan.	Italia	2.D.
<i>excelsa</i> H. Par.	?	2.D.
<i>falcata</i> Mart.	?	2.D.
<i>foliosa</i> W. et K.	Eur. or-aust.	2.D.
<i>formosa</i> R. Br.	Tasmania	† F.
<i>fruticulosa</i> L.	Alpes	† D. A.
<i>gentianoides</i> Vahl.	Taur. Caucas.	2.D.
<i>glabra</i> Ehrh.	Eur. aust.	2.D.
<i>glabrata</i> Wendr.	?	2.D.
<i>grandis</i> Fisch.	Asia bor.	2.D.
<i>hederaefolia</i> L.	Europa	⊙ D.
<i>Hostii</i> Moret.	Italia	2.D.
<i>humilis</i> Tsch.	?	2.D.
<i>hybrida</i> L.	Europa	2.D.
<i>Jacquini</i> Baumg.	Eur. or-aust.	2.D.
<i>incana</i> L.	Eur. aust-bor.	2.D.
<i>incisa</i> Ait.	Asia bor.	2.D.
<i>insignis</i> Spr.	?	2.D.
<i>lacinata</i> Ait.	Asia bor.	2.D.
<i>latifolia</i> L.	Europa	2.D.
" <i>β. caucasica</i> — <i>γ. florida</i> Schm.		
" <i>δ. crispa</i> .		
<i>laxiflora</i> Tsch.	?	2.D.
<i>leucanthera</i> Wendr.	?	2.D.
<i>longebracteata</i> Lk.	?	2.D.
<i>longiflora</i> R. et S.	?	2.D.
<i>longifolia</i> L.	Europa	2.D.
<i>maritima</i> L.	Europa	2.D.
<i>media</i> Schrad.	Eur. med-aust.	2.D.
<i>melissaefolia</i> Poir.	?	2.D.
<i>menthaefolia</i> Schott	Eur. or-aust.	2.D.
<i>mierantha</i> H. et L.	Lusitania	2.DF.
<i>mollissima</i> Tsch.	?	2.D.
<i>montana</i> L.	Europa	2.D.
<i>multicaulis</i> Tsch.	?	2.D.
<i>neglecta</i> Vahl	Hung., Sibir.	2.D.
<i>nitens</i> Host	Illyria	2.D.
<i>nitida</i> Lk.	?	2.D.
<i>obscura</i> Tsch.	?	2.D.
<i>officinalis</i> L.	Europa	2.D.
<i>opaca</i> Fr.	"	⊙ D.
<i>orchidea</i> Crtz.	Eur. aust-or.	2.DF.
<i>orientalis</i> Ait.	Cauc. Armen.	2.D.

Veronica

<i>oxyphylla</i> Stev.	Ruthenia	‡ D.
<i>pallens</i> Host	Hungaria	‡ D.
<i>pallescens</i> Tsch.	?	‡ D.
<i>pallida</i> Horn.	Oriens	‡ DF.
<i>paludosa</i> Lej.	Belgia	‡ D.
<i>panormitana</i> Tin.	Sicilia	⊙ D.
<i>peregrina</i> L.	Eur. aust.	⊙ D.
<i>persicaefolia</i> Schott	?	‡ D.
<i>pinnata</i> L.	Sibir. aust.	‡ DF.
<i>polita</i> Fr.	Europa	⊙ D.
<i>polycarpa</i> H. Ber.	Amer. bor.	‡ D.
<i>Ponae</i> Gou.	Pyren. Cors.	‡ D. ‡.
<i>praecox</i> All.	Europa	⊙ D.
<i>prostrata</i> L.	"	‡ D.
<i>pulverulenta</i> Tsch.	?	‡ D.
<i>repens</i> Clar.	Corsica	‡ DF.
<i>rigens</i> Mart.	?	‡ D.
<i>rugosa</i> Tsch.	?	‡ D.
<i>ruthenica</i> Fisch.	Eur. or.	‡ D.
<i>saxatilis</i> L.	Alpes	‡ D. ‡.
<i>Schmidtii</i> R. et S.	Eur. or-aust.	‡ D.
<i>scolopendrya</i> Tsch.	?	‡ D.
<i>scutellata</i> L.	Europa	‡ D.
<i>serotina</i> K.	?	‡ D.
<i>serpyllifolia</i> L.	Europa	‡ D.
" <i>β. tenella</i> All.	?	‡ D.
<i>serrata</i> K.	?	‡ D.
<i>simplex</i> Tsch.	?	‡ D.
<i>speciosa</i> Tsch.	?	‡ D.
<i>spicata</i> L.	Europa	‡ D.
<i>spuria</i> L.	Eur. aust.	‡ D.
<i>stricta</i> K.	?	‡ D.
<i>tarpheja</i> Jan	Italia	‡ D.
<i>taurica</i> W.	Tauria	‡ D.
<i>tenuifolia</i> Stev.	Caucasus	‡ DF.
<i>Teucrium</i> L.	Europa	‡ D.
<i>ticinensis</i> Pollin.	Italia	‡ D.
<i>triphyllos</i> L.	Europa	⊙ D.
<i>urticaefolia</i> L.	Alp., Subalp.	‡ D. ‡.
<i>villosa</i> Schrad.	?	‡ D.
<i>Waldsteiniana</i> Schott	Hungaria	‡ D.
(vide: <i>Diplophyllum</i> — <i>Leptandra</i>).		
Vesicaria Lam.	(<i>Cruciferae</i>)	
<i>corymbosa</i> Griseb.	Rumelia	‡ FD.
<i>cretica</i> Poir.	Graec., Creta	‡ FD.
<i>gracilis</i> Hook	Texas	⊙ D.
<i>grandiflora</i> Hook	Texas, Mex.	⊙ D.
<i>sinuata</i> Poir.	Eur. aust.	⊙ FD.
(vide: <i>Aurinia</i> — <i>Cistocarpium</i>).		
Viburnum Tourn.	(<i>Sambucineae</i>)	
<i>dentatum</i> L.	Amer. bor.	‡ D.
" <i>β. longifolium</i> .		
<i>laevigatum</i> W.	Am. bor-aust.	‡ DF.
<i>Lantana</i> L.	Europa	‡ D.
<i>lantanoides</i> Mchx.	Amer. bor.	‡ D.
<i>Lentago</i> L.	"	‡ D.
" <i>β. microphyllum</i> .	"	
<i>nudum</i> L.	Amer. bor.	‡ D.
<i>odoratissimum</i> Ker	China	‡ F.

Viburnum

<i>prunifolium</i> L.	Amer. bor.	‡ D.
<i>pyrifolium</i> Poir.	Amer. bor.	‡ D.
(vide: <i>Opulus</i> — <i>Tinus</i>).		
Vicia Tourn.	(<i>Papilionaceae</i>)	
<i>acutangula</i> Led.	Eur. aust. ?	‡ D.
<i>albo-rosea</i> Wendr.	?	⊙ D.
<i>amoena</i> Fisch.	Asia bor.	‡ D.
<i>angustifolia</i> Roth	Europa	⊙ D.
<i>atropurpurea</i> Desf.	Afr. bor.	⊙ D.
<i>Bacila</i> Mnch.	?	⊙ D.
<i>bicolor</i> Bhd.	?	⊙ D.
<i>biennis</i> L.	Ruth. or. Sib.	⊙ D.
<i>bithynica</i> L.	Eur. aust., Or.	⊙ D.
<i>Bobartii</i> Forst.	Eur. occ.	⊙ D.
<i>calcarata</i> Desf.	Afr. bor.	⊙ D.
<i>cassubica</i> L.	Europa	‡ D.
<i>consentina</i> Spr.	Sicil. Neap.	⊙ D.
<i>cordata</i> Wulf.	Europa	⊙ D.
<i>costata</i> Led.	Sibir. aust.	‡ DF.
<i>Cracca</i> L.	Europa	‡ D.
<i>disperma</i> DeC.	Eur. aust.	⊙ D.
<i>dumetorum</i> L.	Europa	‡ D.
<i>galloprovincialis</i> Poir.	Gall. aust.	‡ DF.
<i>globosa</i> Retz.	?	⊙ D.
<i>grandiflora</i> Scop.	Eur. aust.	⊙ D.
<i>heterophylla</i> Rchb.	"	⊙ D.
<i>hirta</i> Balb.	"	⊙ D.
<i>hybrida</i> L.	"	⊙ D.
<i>hyrcanica</i> F. et M.	Caucasia	⊙ D.
<i>intermedia</i> Viv.	Afr. bor.	⊙ D.
<i>laeta</i> Ces.	Graecia	⊙ D.
<i>lathyroides</i> L.	Eur. med. aust.	⊙ D.
<i>leucosperma</i> Mnch.	?	⊙ D.
<i>lutea</i> L.	Eur. aust.	⊙ D.
<i>macrocarpa</i> Mor.	Sardinia	⊙ D.
<i>megalotropis</i> Led.	Sibir. aust.	⊙ DF.
<i>Michauxii</i> Spr.	Asia med.	⊙ D.
<i>narbonensis</i> L.	Eur. aust.	⊙ D.
<i>Nissolia</i> L.	Oriens	⊙ D.
<i>ochroleuca</i> Ten.	Italia	‡ DF.
<i>onobrychioides</i> L.	Eur. aust.	⊙ D.
<i>oroboides</i> Wulf.	Illyria, Croat.	‡ D.
<i>Osobus</i> DeC.	Eur. occ-aust.	‡ D.
<i>pannonica</i> Jacq.	Eur. or-aust.	⊙ D.
<i>peregrina</i> L.	Eur. aust.	⊙ D.
<i>picta</i> F. et M.	Armenia	⊙ D.
<i>pilosa</i> M. B.	Eur. or. Cauc.	⊙ D.
<i>pisiformis</i> L.	Europa	‡ D.
<i>platycarpus</i> Roth.	?	⊙ D.
<i>Pseudo-Cracca</i> Bert.	Ital., Aegypt.	⊙ D.
<i>Pseudo-Orobos</i> F. et M.	Sibir. aust.	‡ DF.
<i>rosea</i> Müll.	Eur. aust.	⊙ D.
<i>sardoa</i> Mor.	Sardinia	⊙ D.
<i>sativa</i> L. et pl. var.	Europa	⊙ D.
<i>segetalis</i> Thuil.	"	⊙ D.
<i>sepium</i> L.	"	‡ D.
<i>serratifolia</i> Jacq.	Eur. aust.	⊙ D.
<i>sordida</i> W. et K.	Hungaria	⊙ D.
<i>striata</i> M. B.	Tauria	⊙ D.

Vicia

sylvatica L.	Europa	q.D.
syriaca Weinm.	Oriens	⊙ D.
tenuifolia Roth	Europa	q.D.
tenuissima Lk.	Oriens	⊙ D.
tetragona Desf.	?	q.D.
tricolor S. et M.	Italia	⊙ D.
varia Host	German.aust.	⊙ D.
villosa Roth	Eur. med.	⊙ D.
Vicusseuxia La R.	(Iridineae)	
glaucoptis DeC.	Cap. b. sp.	q.T.
Pavonia DeC.	" "	q.T.
" β. major.		
(vide: Dietes — Moraea).		
Vigna Sav.	(Papilionaceae)	
glabra Sav.	Ind. occ.	⊙ CD.
villosa Sav.	Chili	⊙ CD.
(vide: Scytalis).		
Vilmorinia DeC.	(Papilionaceae)	
multiflora DeC.	Ind. occ.	h.C.
Viminaria Sm.	(Papilionaceae)	
denudata Sm.	Nov. Holl.	h.T.
Vinca L.	(Apocyniaceae)	
herbacea W. et K.	Hungaria	q.D.
intermedia Tsch.	Europa	q.D.
minor L.	" "	q.D.
" β. variegata	γ. fl. pleno.	
major L.	Eur. aust.	h.FD.
(vide: Lochnera).		
Vincetoxicum Mnch.	(Asclepiadineae)	
fuscatum K.	Eur. aust.	q.D.
nigrum Mnch.	" "	q.D.
officinale Mnch.	" "	q.D.
Viola Tourn.	(Violaceae)	
amoena Tsch.	Bohemia	q.D.
arenaria DeC.	Eur.med.aust.	q.D.
arborescens L.	Eur.aust.Afr.b.	h.F.
blanda Nutt.	Amer. bor.	q.D.
campestris M. B.	Tauria	q.D.
canina L.	Europa	q.D.
" β. lucorum.		
collina Bess.	" "	q.D.
cucullata Ait.	Amer. bor.	q.D.
dactyloides R. et S.	Sibir. aust.	q.D.
debilis Pursh	Amer. bor.	q.D.
dissecta Led.	Sibir. aust.	q.D.
hirta L.	Europa	q.D.
lactea Sm.	Eur. occ.	q.D.
lanceolata L.	Amer. bor.	q.D.
livida W. et K.	Eur. or.	q.D.
mirabilis L.	Europa	q.D.
multifida W.	Sibir. aust.	q.D.
nummulariaefolia All.	Delph. Ped.	q.D.
obliqua Ait.	Amer. bor.	q.D.
odorata L.	Europa	q.D.
" β. semperflorens et aliae var.		
Opizii Knaf	Bohemia	q.D.
palmata L.	Amer. bor.	q.D.
pedata L.	" "	q.D.
Patrinii DeC.	Sibir. aust.	q.D.

Viola

persicaefolia Schk.	Europa	q.D.
pinnata L.	Alpes	q.D.
prionantha Bge.	China bor.	q.D.
Riviniiana Rchb.	Europa	q.D.
Ruppii All.	Eur. aust.	q.D.
stricta Horn.	Germania	q.D.
suavis M. B.	Tauria	q.D.
sylvestris Lam.	Europa	q.D.
uliginosa Schrad.	" "	q.D.
(vide: Chryson —	Erpetion —	Mne-
mion).		
Virgilia Lam.	(Papilionaceae)	
capensis Lam.	Cap. b. sp.	h.T.
(vide: Calpurnia).		
Viscaria Röhl.	(Sileneae)	
alpina L.	Alpes	q.D.
" β. lapponica.		
vulgaris Röhl.	Europa	q.D.
" β. fl. pl.		
Visnea L. fil.	(Ternstroemiaceae)	
Mocanera L.	Canariae	h.T.
Vitex Tourn.	(Verbenaceae)	
Agnus castus L.	Eur. aust.	h.DF.
incisa Lam.	China	h.DF.
Viticella Dillen.	(Ranunculineae)	
campaniflora Spach	Lusitania	h.DF.
coerulea K.	Japonia	h.DF.
crispa Spach	Amer. bor.	h.DF.
deltoides Mnch.	Eur. aust.	h.D.
" β. fl. rubro.		
florida Spach	Amer. bor.	h.DF.
" β. Sieboldii.		
parviflora K.	?	h.DF.
Vitis Tourn.	(Ampelideae)	
cordifolia Mchx.	Amer. bor.	h.D.
incisa Jacq.	" "	h.D.
Labrusca L.	" "	h.D.
laciniata L.	?	h.DF.
palmata Vahl	Virginia	h.DF.
vinifera L.	Asia med.	h.DF.
virginiana H. Par.	Amer. bor.	h.DF.
vulpina L.	" "	h.D.
Volkameria L.	(Verbenaceae)	
coccinea Hort.	?	h.C.
(vide: Clerodendron).		
Vulpia Gmel.	(Gramineae)	
alopecuroides Lk.	Eur. aust.	⊙ D.
bromoides Gmel.	Europa	⊙ D.
ciliata Lk.	Eur. aust.	⊙ D.
delicatula Lk.	Hispania	⊙ D.
geniculata Lk.	Eur. aust.	⊙ D.
ligustica Rchb.	" "	⊙ D.
Myurus Gmel.	Europa	⊙ D.
Wachendorfia Burm.	(Haemadorineae)	
thyrsiflora L.	Cap. b. sp.	q.T.
Waitzia, vide: Montbretia.		
Wahlenbergia Schrad.	(Campanulaceae)	
capensis DeC. f.	Cap. b. sp.	⊙ CD.
dichotoma DeC. f.	" "	⊙ CD.

<i>Wahlenbergia</i>			
exilis DeC. f.	Cap. b. sp. ⊙ CD.		
gracilis DeC. f.	Nov. Holl. ‡ T.		
" β. stricta Don.			
hispidula DeC. f.	Cap. b. sp. ⊙ CD.		
lobelioides DeC. f.	Canar. Mader. ⊙ D.		
<i>Waldsteinia</i> W.	(<i>Dryadineae</i>)		
aeoides W.	Hungaria ‡ D.		
<i>Watsonia</i> Mill.	(<i>Iridineae</i>)		
alefroides Ker	Cap. b. sp. ‡ T.		
iridifolia Ker	" " ‡ T.		
Meriana Mill.	" " ‡ T.		
rosea Eckl.	" " ‡ T.		
(vide: Beilia).			
<i>Webbia</i> Spach	(<i>Hypericineae</i>)		
bonariensis Spach	La Plata ‡ T.		
canariensis W. et B.	Canariae ‡ T.		
floribunda Spach	" " ‡ T.		
<i>Widdringtonia</i> Endl.	(<i>Cupressineae</i>)		
cupressoides Endl.	Cap. b. sp. 5 T.		
juniperoides K.	" 5 T.		
<i>Westringia</i> Sm.	(<i>Labiatae</i>)		
rosmariniformis Sm.	Nov. Holl. ‡ T.		
triphylla Ait.	" " ‡ T.		
<i>Wiedemannia</i> F. et M.	(<i>Labiatae</i>)		
orientalis F. et M.	Oriens ⊙ D.		
<i>Willemia</i> Neck.	(<i>Synanthereae</i>)		
apargioides Less.	Alpes ‡ D. J.		
<i>Wissadula</i> Medic.	(<i>Malvaceae</i>)		
periplocifolia K.	Ind. or. ‡ C.		
<i>Wistaria</i> Nutt.	(<i>Papilionaceae</i>)		
chinensis DeC.	China ‡ DF.		
frutescens DeC.	Am. bor.-aust. ‡ DF.		
<i>Wigandia</i> Kth.	(<i>Hydroleaceae</i>)		
urens G. Don	Peruvia ‡ C.		
<i>Withania</i> Pauq.	(<i>Solaniceae</i>)		
aristata Pauq.	Canariae ‡ T.		
suberosa Pauq.	Hispania ‡ F.		
<i>Witsenia</i> Thb.	(<i>Iridineae</i>)		
corymbosa Sm.	Cap. b. sp. ‡ T.		
<i>Woodsia</i> R. Br.	(<i>Polypodiaceae</i>)		
ilvensis R. Br.	Montes Eur. ‡ D. J.		
<i>Woodwardia</i> Sm.	(<i>Polypodiaceae</i>)		
radicans Sm.	Lusit. Canar. ‡ F.		
<i>Wulfenia</i> Jacq.	(<i>Scrophulariaceae</i>)		
carinthiaca Jacq.	Carinthia ‡ D. J.		
<i>Wydleria</i> DeC.	(<i>Umbelliferae</i>)		
chilensis F. et Fr.	Chili ‡ T.		
<i>Xanthium</i> Tourn.	(<i>Synanthereae</i>)		
canadense Mill.	Amer. bor. ⊙ D.		
echinatum Murr.	Eur. aust. ⊙ D.		
indicum Roxb.	Ind. or. ⊙ D.		
macrocarpum DeC.	Eur. aust. ⊙ D.		
spinosum L.	" ⊙ D.		
Strumarium L.	Europa ⊙ D.		
<i>Xanthogalum</i> Lall.	(<i>Umbelliferae</i>)		
purpurascens Lall.	Caucasus ‡ DF.		
<i>Xanthorrhiza</i> Marsch.	(<i>Paeoniaceae</i>)		
apiifolia L'Her.	Virginia ‡ DF.		
<i>Xanthosia</i> Rudge	(<i>Umbelliferae</i>)		
<i>Xanthosia</i>			
rotundifolia DeC.	Nov. Holl. ‡ T.		
<i>Xanthosoma</i> Schott	(<i>Arineae</i>)		
discolor K.	Amer. trop. ‡ C.		
Jacquinii Schott	" " ‡ C.		
lividum K.	" " ‡ C.		
sagittaeifolium Schott	Ind. occ. ‡ C.		
<i>Xanthoxylum</i> Sm.	(<i>Xanthoxylineae</i>)		
fraxineum W.	Amer. bor. ‡ D.		
<i>Xenopoma</i> W.	(<i>Labiatae</i>)		
obovatum W.	Chili ‡ T.		
<i>Xeranthemum</i> Tourn.	(<i>Synanthereae</i>)		
cylindraceum Sm.	Eur. aust. ⊙ D.		
erectum Prsl.	" " ⊙ D.		
radiatum Lam.	Eur. or.-aust. ⊙ D.		
<i>Xerotes</i> R. Br.	(<i>Xerotideae</i>)		
latifolia H. Erl.	Nov. Holl. ‡ T.		
longifolia R. Br.	" ‡ T.		
<i>Ximenesia</i> Cav.	(<i>Synanthereae</i>)		
encelioides Cav.	Mexico ⊙ D.		
<i>Xylophylla</i> L.	(<i>Euphorbiaceae</i>)		
Arbuscula W.	Ind. occ. ‡ C.		
falcata Ait.	I. Bahama ‡ C.		
latifolia L.	Ind. occ. ‡ C.		
(vide: Geblera).			
<i>Xylopleurum</i> Spach	(<i>Onagraceae</i>)		
Nuttalii Spach	Am. bor.-aust. ‡ DF.		
<i>Xylosteum</i> Tourn.	(<i>Caprifoliaceae</i>)		
coeruleum Spach	Eur. aust. ‡ D.		
microphyllum K.	Asia bor. ‡ D.		
Pallasii K.	" ‡ D.		
pyrenaicum K.	Pyrenaei ‡ D.		
villosum Mchx.	Amer. bor. ‡ D.		
<i>Yucca</i> L.	(<i>Liliaceae</i>)		
aloefolia L.	Am. med. et b. 5 FD.		
angustifolia Pursh	Missouri ‡ DF.		
Draconis L.	Carol. aust. 5 FD.		
" β. variegata.			
filamentosa L.	Am. bor.-aust. ‡ DF.		
flaccida Haw.	" " ‡ DF.		
glauca Nois.	" " ‡ DF.		
gloriosa L.	" 5 DF.		
recurvifolia Salisb.	Georgia ‡ FD.		
<i>Zacintha</i> Tourn.	(<i>Synanthereae</i>)		
verrucosa Gaertn.	Eur. aust. ⊙ D.		
<i>Žaluzania</i> Pers.	(<i>Synanthereae</i>)		
triloba Pers.	Mexico ‡ T.		
<i>Žaluzanskya</i> Schm.	(<i>Scrophulariaceae</i>)		
Lychnidea K.	Cap. b. sp. ‡ T.		
<i>Zamia</i> L.	(<i>Cycadeae</i>)		
integrifolia Ait.	Ind. occ. 5 C.		
<i>Zelkova</i> Spach	(<i>Ulmaceae</i>)		
crenata Spach	Caucasia 5 DF.		
<i>Zea</i> L.	(<i>Gramineae</i>)		
Curugua Mol.	Chili ⊙ D.		
Mays L. et pl. var.	Amer. aust. ⊙ D.		
<i>Zenobia</i> D. Don	(<i>Ericaceae</i>)		
pulverulenta K.	Am. bor.-aust. ‡ DF.		
speciosa Don	" " ‡ DF.		
<i>Zephyranthes</i> Herb.	(<i>Amoryllideae</i>)		

Zephyranthes				Ziziphora L.	(<i>Labiatae</i>)
Atamasco Herb.	Am. bor.-aust. & FD.			capitata L.	Eur. aust. ⊙ D.
" <i>β. minor.</i>				clinopodioides Lam.	Cauc. Armen. & DF.
candida Herb.	La Plata	⊙ T.		" <i>β. songarica.</i>	
chloroleuca Herb.	Cap. b. sp.	⊙ T.		dasyantha M. B.	Cauc. Armen. & DF.
grandiflora Lindl.	Mexico	⊙ T.		hispanica L.	Hispania ⊙ D.
rosea Lindl.	Cuba	⊙ T.		media Lk.	Sibir. aust. & DF.
tubispatha Herb.	La Plata	⊙ T.		" <i>β. patens.</i>	
Zichya Hüg.	(<i>Papilionaceae</i>)			serpyllacea M. B.	Cauc. Armen. & DF.
coccinea Hüg.	Nov. Holl.	⊙ T.		tenuior L.	Eur. aust. ⊙ D.
glabrata Benth.	" "	⊙ T.		Zizyphus Tourn.	(<i>Rhamnaceae</i>)
Molly Hüg.	" "	⊙ T.		mucronata W.	Cap. b. sp. ⊙ T.
Zieria Sm.	(<i>Diosmaceae</i>)			Spina Christi W.	Afr. bor. ⊙ T.
lanceolata R. Br.	Nov. Holl.	⊙ T.		Zoëgea L.	(<i>Synanthereae</i>)
Zigadenus Mchx.	(<i>Veratrineae</i>)			Leptaurea L.	Oriens ⊙ D.
glaberrimus Mchx.	Am. bor.-aust. & DF.			Zozimia Hoffm.	(<i>Umbelliferae</i>)
Zingiber Gaertn.	(<i>Zingiberineae</i>)			absinthifolia DeC.	Oriens ⊙ DF.
officinale Rosc.	Ind. or.	⊙ C.		" <i>β. viridiflora.</i>	
Zerumbet Rosc.	" "	⊙ C.		Zygopetalum Hook	(<i>Orchideae</i>)
Zinnia L.	(<i>Synanthereae</i>)			Makayi Hook	Brasilia ⊙ C.
ambigua Lk.	Mexico	⊙ D.		Maxillaria Lindl.	" ⊙ C.
elegans Jacq. et pl. var.	"	⊙ D.		Zygophyllum L.	(<i>Zygophyllineae</i>)
hybrida Sims	"	⊙ D.		Fabago L.	Tauria, Oriens & D.
multiflora L.	"	⊙ D.		foetidum S. et W.	Cap. b. sp. ⊙ T.
pauciflora L.	Peruvia	⊙ D.		Lichtensteinianum Cham.	" " ⊙ T.
tenuiflora Jacq.	Mexico	⊙ D.		Morgsana L.	" " ⊙ T.
verticillata Andr.	"	⊙ D.			

