

BOTANISCHES MUSEUM
der k.k. Universität.

J. N^o 12663

B

C 141/8

CHER


WEGWEISER

IN

WR.-NEUSTADT'S UMGEBUNGEN

VON

DR. FR. LORENZ.



WIEN 1879.

WILHELM BRAUMÜLLER

k. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler.

Im Verlage von
Wilhelm Braumüller, k. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler in Wien
sind erschienen:

Bayer, Joh. N. Botanisches Excursionsbuch für das
Erzherzogthum Oesterreich ob und unter der
Enns. Eine Darstellung der in diesem Erzherzogthume
wildwachsenden Gefässpflanzen nach ihren auffallendsten
Merkmalen. 8. 1869. 2 fl. 50 kr. — 5 M.

— — **Prater-Flora.** Beschreibung der im k. k. Prater
und in der Brigittenau ausserhalb der Gärten wild-
wachsenden und angebauten Pflanzen. 8. 1869.
1 fl. — 2 M.

Ettingshausen, Dr. Const. Ritter v., Professor der Natur-
geschichte an der k. k. Josefs - Akademie in Wien.
Photographisches Album d. Flora Oesterreichs.
Zugleich ein Handbuch zum Selbstunterrichte in der
Pflanzenkunde. Mit 173 Tafeln, enth. eine Sammlung
gedruckter Photographien v. charakteristischen Pflanzen
der einheimischen Flora. gr. 8. 1864. 5 fl. — 10 M.

Fitzinger, Dr. Leop. Jos., em. erster Custos-Adjunct des
k. k. zoologischen Hof-Cabinetes. **Die kais. Menagerie
zu Schönbrunn.** Eine populäre Darstellung sämt-
licher Thiere derselben. 12. 1875. 80 kr. — 1 M. 60 Pf.

**Führer durch das k. k. zoologische Cabinet in
Wien.** Zusammengestellt von den Custoden dieses
Institutes. 12. 1873. cart. 50 kr. — 1 M.

Glasl, C., em. Professor an der k. k. Realschule am
Schottenfelde in Wien. **Excursionsbuch,** oder An-
leitung alle Körper der drei Naturreiche zu sammeln,
zuzubereiten, in Sammlungen aufzustellen und zu er-
halten, nebst einer systematischen Uebersicht der drei
Naturreiche, als Hilfsbuch für Lehrer und Lernende.
8. 1863. 1 fl. — 2 M.

BOTANISCHER

WEGWEISER

IN

WR.-NEUSTADT'S UMGEBUNGEN

VON

DR. FR. LORENZ.



WIEN 1879.

WILHELM BRAUMÜLLER

k. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler.

„Floribus amoenis
Diebus qui studet serenis,
In pratis, ad fontes,
Sub rupe, per montes
Gaudia mille,
Sine poenitentia,
Hauriet ille
Ex amabili scientia,
Croeso rege ditior,
Croeso beatior.“

VORWORT.

A. Neilreichs Flora von Niederösterreich, des k. Generalmajors K. v. Sonklar, des k. Kreisarztes J. Krzisch und des Verfassers eigenen langjährigen Beobachtungen liegen nebst einzelnen Mittheilungen in den Verhandlungen der k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien diesem Wegweiser zu Grunde, der aber trotzdem weder Vollständigkeit noch allseitige Zuverlässlichkeit beanspruchen darf.

Ersteres nicht, da, um das Büchlein den Studirenden, für die es zunächst bestimmt ist, nicht allzusehr zu vertheuern, die ganz gewöhnlichen Pflanzen ausgeschlossen sind, wobei freilich dies Epitheton immerhin ein schwankendes bleiben wird, weil häufig, selbst in benachbarten Territorien, eine Pflanze da zu den gewöhnlichen, dort zu den selteneren zählt.

Aber auch auf allseitige Verlässlichkeit muss der, der sich dieses Wegweisers bedient, verzichten,

denn viele Pflanzen wechseln als wahre Nomaden fort und fort ihre Standorte, was namentlich von jenen des Steinfeldes gilt, bei welchen noch der Umstand zu beachten bleibt, dass, vom Sturmwinde getragen, bald von den westlichen Kalkhügeln her, bald von Ungarn herauf häufig Samen von Pflanzen angesäet wird, die dann, nachdem sie einige Zeit hier auf Gastrollen debutirt, wieder, wenn ihnen Klima und Boden nicht behagt, zu verschwinden pflegen, wie dies beispielshalber wohl bei dem, hier früher nie beobachteten und nun plötzlich in grosser Menge aufgetauchten *Lepidium latifolium* der Fall sein dürfte.

Eine auffallende Erscheinung, obgleich durch die grössere Nähe hoher Berge und den gegen die Alpen rasch steigenden Boden (trotz der kurzen Entfernung liegt Neustadt um $\frac{2}{3}$ Stephans-thurm-Höhe bereits höher als Wien) zu erklären, ist das Vorkommen von sonst der Bergregion angehörenden Pflanzen hier schon in der Ebene, z. B. *Adonis vernalis*, *Centaurea montana*, *Cirsium Eriophorum*, *Globularia cordifolia* etc. etc.

Der in der That ausserordentliche Reichthum dieses Gebietes an so vielen mitunter seltenen Pflanzen hat auf den ersten Blick etwas Ueber-raschendes, wird aber dem erklärlich, der bedenkt, dass hier nebst Ackerland, Wiesen, Weingeländen und Waldbeständen häufig auch noch Sumpfboden

im grellen Contraste mit dürrer Haide wechselt, vom Urschiefer bis zum Diluvium herauf die verschiedensten Gebirgsformationen mit den ihnen eigenthümlichen Pflanzen zusammengedrängt sich finden, und schliesslich, dass auf diesem Terrain nebst der gewöhnlichen Vegetation der Ebene und der Berge auch noch Anklänge der Voralpen- und selbst der Alpenflora mit den letzten Ausläufern der ungarischen sich mischen.

Die Excursionen sind in diesem Wegweiser auf die Dauer eines Sommertages als maximum berechnet, doch haben zahlreiche Eisenbahnen nach jeder Richtung hin diese Grenze viel weiter als es sonst der Fall gewesen wäre, hinausgerückt; aus diesem Grunde wurde auch das Gebiet von Kirchberg am Wechsel aufgenommen, wohin man mit der bereits im Bau begriffenen Aspanger Bahn in wenigen Stunden gelangen wird.

INHALT.

	Seite
I. Park der Militär-Akademie	1
II. Aecker und Wiesen um Neustadt	2
III. Sumpfwiesen um Neustadt	3
IV. Steinfeld	4
V. Eisenbahndamm	5
VI. Am Canale	6
VII. An der Leitha	6
VIII. Remise bei Katzelsdorf	7
IX. Lichtenwörther Au	7
X. Grosser Föhrenwald	8
XI. Vorberge bei Fischau und Brunn	8
XII. Von Brunn in die neue Welt	11
XIII. Die Wand	12
XIV. Sauerbrunn-Pötsching	12
XV. Rosaliengebirge mit Katzelsdorf und Aich- bichl	13
XVI. Pitten-Sebenstein	15
XVII. Piesting-Gutenstein	15
XVIII. Weikersdorf-Grünbach-Buchberg	16
XIX. Neunkirchen	17

	Seite
XX. Sieding-Stixenstein-Buchberg	19
XXI. Gloggnitz-Payerbach-Reichenau	20
XXII. Gloggnitz-Kranichberg-Ramms	21
XXIII. Tegelsümpfe bei Matzendorf und Hölles	21
XXIV. Pottenstein-Kotingbrunn-Vöslau-Baden	22
XXV. Ebreichsdorf-Münchendorf-Moosbrunn	23
XXVI. Kirchberg-Wechsel	25
XXVII. Einzelne Standorte seltener Pflanzen	28

INHALT.

I. Park der Militär-Kaserne	1
II. Acker und Wiesen am Neustadt	2
III. Stangwiesen am Neustadt	3
IV. Steinfeld	4
V. Kienhofen	5
VI. Am Kanal	6
VII. An der Lichte	6
VIII. Kienhofen bei Ketzelsdorf	7
IX. Lichtenwörther Au	7
X. Grosser Föhrenwald	8
XI. Vorberge bei Fischen und Brunn	8
XII. Von Brunn in die neue Welt	11
XIII. Die Wand	12
XIV. Stangbrunn-Förschlag	12
XV. Rosenbüsch mit Ketzelsdorf und Aich- bühl	13
XVI. Fischen-Sebenstein	16
XVII. Förschlag-Gutenstein	16
XVIII. Weikersdorf-Grubach-Buchberg	16
XIX. Neunkirchen	17

I. Park der Militär-Akademie.

Adoxa moschattellina, *Aquilegia vulgaris*,
Asarum europaeum, *Aster salignus* (verwildert),
Anthericum ramosum im Eichenwäldchen beim
Follenhofe, *Astrantia major* selten in der Remise,
Adonis aestivalis zuweilen unter der Saat, *Bro-*
mus asper, *Cardamine amara* Wassergräben bei
der Schiessstätte, *Carex alba* in den Remisen in
zahlloser Menge, *digitata*, *tomentosa* im Pionnier-
teiche, *ornithopoda* Remisen, *Cephalanthera pallens*,
Convallaria latifolia, *majalis*, *multiflora*, *Polygo-*
natum, *Crepis setosa*, *Cyclamen europaeum*, *Dian-*
thus superbus, *Euphorbia verrucosa*, *Falcaria Ri-*
vinii, *Galeobdolon luteum* besonders schön und
zahlreich in der Remise rechts, *Geranium Phaeum*
selten, *Geum urbanum*, *Hieracium umbellatum*
Remise rechts, *Isopyrum thalictroides* nördlicher
Theil der linken Remise, *Lathraea squammaria*,
Linaria minor bei der Schiessstätte, *Lysimachia*
nummularifolia, *Majanthemum bifolium* Ende der
rechten Remise am Bache, *Melilotus alba*, *Neottia*
Nidus avis linke Remise, *Physalis Alkekengi* Pion-
nierteich, *Platanthera bifolia*, *Potamogeton lu-*

cens Pionnierteich, pusillus Pionnierteich, Primula elatior, officinalis, Prunus Padus, Quercus pubescens Wäldchen beim Follenhofe, Rest des uralten Waldbestandes, Ranunculus divaricatus Pionnierteich, Rhus Cotinus südliches Ende der rechten Remise, Taxus baecata, Typha angustifolia im Wasser unweit des Gärtnerhauses, Torilis Anthriscus, Ulmus campestris Schwanenteich, Ulmus effusa von Gloriette zum Follenhof und von da zur Akademie zurück, Valeriana officinalis, Viola mirabilis und persicifolia selten in den Remisen links.

II. Aecker und Wiesen um Neustadt.

Adenophora lilifolia an der Fische bei Lichtenwörth, Arabis hirsuta, Allium rotundum, Ajuga chamaepitys, Androsace maxima, Adonis aestivalis und flammea unter dem Getreide, Anthemis austriaca, Neilreichii, Bifora radians beim Waldhofe, Cardamine pratensis flore pleno Wiese am Himmelsbach, Carex umbrosa feuchte Au, äussere Zehner, Conium maculatum, Dianthus superbus, Datura Stramonium, nicht häufig, Euphorbia verrucosa, virgata, platyphyllos, Galium tricornis Wiesen, Gentiana Pneumonanthe Wiesen am Himmelsbach, Geranium pratense in der Nähe der Schiessstätte, sanguineum in Gebüsch, Gagea arvensis Aecker gegen Fischau, Hypochaeris radicata Ungarfelder, Isatis tinctoria vereinzelt, Iris sibirica und pseudacorus Wiesen am Himmelsbach, Lathyrus pratensis, tuberosus unter dem Getreide, Marrubium peregrinum der Strasse nach Katzelsdorf beim Follenhofe,

Melampyrum barbatum in den Waldanflügen bei Weikersdorf, *Medicago minima* Brachen, *Muscari comosum* unter dem Getreide, *Neslia paniculata* unter dem Getreide, *Nigella arvensis*, *Papaver Argemone* selten, *Podospermum Jagquinianum* rückwärts des Hobelhofes, *Potentilla argentea*, *Pulicaria vulgaris* Gehweg nach Fischau am Bache daselbst, *Setaria italica* an der Strasse nach Aspang, auch zwischen Neustadt und Neunkirchen, *Serratula tinctoria* Wiesen am Himmelbache, *Sideritis montana* Brachen, *Stachys germanica* ausserhalb des Follenhofes, *Sisymbrium Loeselii* Brachen, *Teucrium Botrys* Brachen, *montanum*, *Specularia Speculum* Brachen, *Thesium humile* Brachen gegen Katzelsdorf, *Vicia pannonica* Ungarwiesen.

III. Sumpfwiesen um Neustadt.

Asperula tinctoria, *Carea flava*, *hirta*, *paludosa*, *panicea*, *stricta*, *tomentosa*, *Oederi*, *vesidaria*, *Cirsium pannonicum*, *Cyperus flavescens*, *fuscus* zwischen Gröhrmühle und Eisenbahn, auch am Himmelsbach unweit der Schiessstätte, *Crepis paludosa* zwischen Gröhrmühle und Eisenbahn und im Wäldchen der äusseren Zehner, *Eriophorum angustifolium* und *latifolium*, *Galium boreale*, *Erythraea pulchella*, *Iris pseudacorus*, *Juncus compressus*, *glaucus*, *obtusifolius*, *Tenageia*, *Lythrum hyssopifolium*, *Ononis repens*, *Parnassia palustris*, *Pedicularis palustris*, *Peucedanum palustre*. *Pinguicula vulgaris*, *Polygonum amphibium* sumpfige Stellen der Fische, *Primula farinosa* am Himmelsbach, *Ranunculus aquatilis* an stagnirenden Stellen

der Fische bei der Gröhrmühle, *Roripa amphibia*, *austriaca*, *palustris*, *silvestris*, *Schoenus nigricans* Sumpfwiese am Himmelsbach unweit der Schiessstätte, *Scirpus holoschoenus*, *setaceus*, *Scorzonera humilis* Sumpfwiese am Himmelsbach unweit der Schiessstätte, *Spiraea ulmaria* bei den Mühlen an der Fische, *Trifolium fragiferum*, *hybridum*, *Triglochin palustre*.

IV. Steinfeld.

Alsine setacea, *Anthemis arvensis*, *austriaca*, *Neilreichii*, *Cotula* alle vier auf Brachen, *Artemisia pontica* häufig auf dem Fusswege nach Fischau, *Artemisia scoparia* häufig auf dem Steinfeld gegen Theresienfeld, *Astragalus austriacus* Fussweg nach Fischau, *Carex stenophylla* Fussweg nach Fischau am linken Ufer der Fische, *Falcaria Rivini*, *Filago germanica*, *montana*, *Galium tri-corne*, *Glaucium corniculatum* Wanderpflanze am ehesten noch um das neue Wirthshaus herum zu finden, *Globularia cordifolia* häufig auf der Haide gegen Wöllnersdorf zu. Alle 3 *Helianthemum*, *Hieracium staticifolium* Weg vom Eisenbahnviaduct nach Fischau am linken Ufer, *Inula britannica* am Bache bei Fischau, *Medicago prostrata*, *Mieropus erectus* neben der Strasse nach Weikersdorf, *Nepeta Cataria* steinige Stellen gegen Fischau, *Polycnemum arvense* von dem Eisenbahnviaduct nach Wöllnersdorf, *Reseda Luteola* Weg nach Katzelsdorf, *Reseda Phyteuma* Gehweg vom nördlichen Eisenbahnviaduct nach Fischau, *Rhamnus catharticus* hie und da, *Rumex obtusifolius* in der

Nähe der Scheueren, *Salsola Kali* Brachen, *Salvia Aethiopis* zwischen Neustadt und Katzelsdorf, vorzüglich um die Thiergartenmauer herum, *Sambucus Ebulus* auf Brachäckern hie und da, *Saponaria Vaccaria*, *Scandix Pecten*, *Scirpus maritimus* am fließenden Wasser zwischen Fischau und Brunn, *Scorzonera purpurea*, *Specularia Speculum*, *Stachys germanica* Strasse nach Katzelsdorf unweit des Follenhofes, *Stipa capillata* und *pennata*, *Thalictrum minus* bei Wöllersdorf, beim Waldhof, *Trinia vulgaris*, *Viola arenaria* beim Waldhofs.

V. Eisenbahndamm.

a) Gegen Theresienfeld.

Epilolium Dodonei in den Schotteraushebungen vor dem kleinen Wäldchen, *Hesperis tristis*, *Hyssopus officinalis* massenhaft an der Eisenbahn unweit des Theresienfelder Bahnhofes, *Linum austriacum*, *Medicago prostata*, *Saxifraga tridactylides* nur in nassen Frühjahren, *Thesium ramosum*, *Seseli hypomarattrum*, *Sisymbrium strictissimum* gleich bei der Krummpöckischen Lederfabrik am Damme, *Thlaspi campestre*, *perfoliatum*.

b) Gegen das neue Wirthshaus.

Campanula sibirica, *Centaurea montana* in der Nähe des neuen Wirthshauses rechts der Eisenbahn, *Crepis foetida* und *tectorum*, *Dianthus prolifer*, *Erysimum canescens* und *odoratum*, *Glau-cium corniculatum* selten, *Linum austriacum*, *Myosotis hispida*, *stricta*, *Orobanche coerulescens*,

Passerina annua zwischen dem neuen Wirthshause und dem St. Aegydnor Bahnhofe, *Rapistrum perenne*, *Xeranthemum annuum*.

VI. Am Canale.

Butomus umbellatus, *Calamagrostis litorea*, *Carex paludosa*, *panniculata*, *riparia*, *Schreberi*, *supina*, *Heliotropium europaeum* Au in der Nähe der Eisenbahnbrücke über den Canal, *Potamogeton crispus*, *densus*, *graminifolius*, *lucens*, *natans*, *perfoliatus*, *Rumex hydrolapathum*, *Scutellaria galericulata*, *Sparganium simplex*, *ramosum*, *Typha angustifolia* unfern des Aquäduces.

VII. An der Leitha.

Arabis arenosa Leithaufer rechts von der Brücke, *Asparagus officinalis* linker Leithadamme, *Equisetum variegatum* Sandplätze an der Leitha zwischen Neudörfel und Katzelsdorf, *Erysimum cheiranthoides* Auen der Leitha, *Evonymus europaeus* am Leithadamme nördlich von der Theerfabrik, *Glyceria distans* im Sande der Leitha, *Herniaria glabra* im Sande der Leitha, *Linaria minor* im Sande der Leitha, *Myricaria germanica* an der Leitha vom Neudörfel abwärts, *Oenothera biennis*, *Orchis ustulata* häufig am Leithadamme, *Rumex conglomeratus*, *Salix amygdalina*, *Saponaria officinalis*, *Scirpus triquetrus*, *Senecio sarracenicus*, *Tanacetum vulgare* linkes Ufer unweit der Brücke.

VIII. Remise bei Katzelsdorf.

Adonis vernalis, *Dictamnus albus* Hauptfundort dieser schönsten Pflanze des Neustädter Terrains in prachtvollen Exemplaren, *Erucastrum obtusangulum* zwischen Follenhof und der Remise, *Euphorbia angulata*, *Hesperis tristis* Strassengraben bevor man zur Remise kommt, *Lavatera thuringiaca*, *Lithospermum purpureo coeruleum*, *Melampyrum arvense*, *Mercurialis ovata*, *Orobanche lucorum*, *Stachys germanica*.

IX. Lichtenwörther Au.

Ajuga genevensis, *Asarum europaeum*, *Carex Micheli*, *Chryso splenium alternifolium*, *Corydalis cava*, *fabacea*, *solida*, *Evonymus europaeus*, *Galanthus nivalis*, *Galeobdolon luteum*, *Geranium Phaeum*, *Isopyrum thalictroides*, *Leucojum vernalis*, *Myosotis sparsiflora* Au rechts von der Canalbrücke, *Omphalodes scorpioides* Au rechts von der Canalbrücke, auch Ebenfurth, *Ophrys apifera*, *coryophora*, *Ornithogalum nutans*, *Oxalis Acetosella*, *Pinquicula vulgaris* Canaldamm der Lichtenwörther Au, *Pulmonaria azurea*, *Ribes nigrum*, *rubrum*, *Selaginella helvetica*, *Senecio campestris*, *Sisymbrium strictissimum*, *Symphytum tuberosum*, *Thalictrum aquilegifolium*, *Thesium ramosum*, *Torilis Anthriscus*.

X. Grosser Föhrenwald.

Anemone sylvestris, *Aquilegia vulgaris*, *Artemisia austriaca*, *Asparagus officinalis*, *Astragalus austriacus*, *Carex alba*, *Micheli*, *ornithopoda*, *mirabilis*, *Cardamine pratensis* (*grandiflora*), *Centaurea montana*, *Cephalanthera rubra*, *Cirsium eriophorum*, *Colutea arborescens*, *Euphorbia verrucosa*, *Evonymus latifolius*, *verrucosus*, *Galeopsis pubescens*, *Galium silvaticum*, *Genista sagittalis* vom Jägerhaus in der Richtung gegen Breitenau, *Hesperis matronalis* bei der Capelie, *Himanthoglossum hircinum* an Waldrändern in der Nähe des Jägerhauses, *Inula Oculus Christi*, *Lavatera thuringiaca*, *Leucojum vernalis*, *aestivum*? *Lonicera nigra*, *Xylosteum*, *Omphalodes verna* vom Waldhofe hinein am Rande der Durchschläge zum Jägerhaus, *Ononis Columnae*, *hircina*, *Quercus Cerris* kleiner Föhrenwald, *Scorzonera purpurea* Grasplätze im grossen Föhrenwalde, *Senecio sarra-cenicus*, *Thalictrum minus* grosser und kleiner Föhrenwald.

XI. Vorberge bei Fischau und Brunn.

Adonis vernalis, *Ajuga pyramidalis* von Fischau zur Zweierwiese, *Allium acutangulum*, *carinatum*, *flavum*, *Alyssum montanum*, *Alsine fasciculata* felsige Stellen gleich oberhalb der Fischauer Kirche, *Alsine setacea* felsige Stellen gleich oberhalb der Fischauer Kirche, *Anemone pratensis*, *Pulsatilla* steinige Stellen, *Anemone sylvestris* im Walde unweit des Steinbruches, *Anthericum ramosum*,

Anthriscus trichosperma Gebüsch gleich oberhalb der Kirche, *Arabis auriculata*, *Arabis petraea* Felsen neben der Zweierwiese, *Arabis turrita*, *Aronia rotundifolia* steinige Abhänge bei Fischau, *Artemisia austriaca*, *Asperula galioides* Zweierwiese, *Asperula odorata* Wälder, *Aster Amellus* im Walde rechts auf dem Wege zur Zweierwiese unweit des Steinbruches, *Astragalus glycyphyllus* im Walde rechts auf dem Wege zur Zweierwiese unweit des Steinbruches, *Atropa Belladonna* auf dem Wege von der Zweierwiese nach Muthmannsdorf, *Calamintha alpina* Gehweg gleich oberhalb der Wasserleitung, *Carex humilis* Gehweg gleich oberhalb der Wasserleitung, *Carex montana* Wälder, *Cephalanthera pallens* Wälder, *rubra* Wälder, *Cerastium brachycephalum*, *Circaea lutetiana*, *Clematis recta*, *Cotoneaster tomentosa*, *vulgaris*, *Crepis praemorsa*, *Cystisus capitatus*, *supinus*, *Daphne Cneorum* und *Mezereum*, *Dentaria bulbifera*, *Dorichium herbaceum*, *Epilobium montanum* Holzschläge, *Epilobium angustifolium* bei den Steinbrüchen, *Erica carnea* Kalkfelsen neben der Zweierwiese, *Euphorbia angulata*, *Gerardiana*, *epithimoides*, *saxatilis*, *Fragraria elatior*, *Galium silvaticum*, *Galanthus nivalis* Gebüsche bei der Zweierwiese, *Genista germanica*, *pilosa* und *tinctoria* Holzschläge, *Gentiana verna* Fischau, *Globularia vulgaris*, *Gnaphalium dioicum* Zweierwiese, *sylvaticum* Wälder, *Gymnadenia conopsea* Zweierwiese, *Hieracium humile* Steinbrüche der Zechleite bei Brunn, *Hieracium saxatile* steinige Abhänge, *Hypericum montanum* Fischau, *Hypochaeris maculata* Wald bevor man zur Zweierwiese gelangt, *Hutchinsia petraea* Felsen nahe bei Fischau, *Inula eusifolia*, *Iris pumila*

Schlucht bei Brunn, *Jurinea mollis* in der Nähe der Wasserleitung, *Latua viminea* häufig im Schutte des Steinbruches bei Brunn, *Laserpitium latifolium* Höhe der Zweierwiese, *Lathyrus latifolius* Höhe der Zweierwiese, *Linaria genistifolia* Brunn, *Linum flavum* Zweierwiese, *hirsutum* Zweierwiese, *tenuifolium* Zweierwiese, *Lithospermum purpureo-coeruleum*, *Mellitis melissophyllum* unterhalb der Zweierwiese beim kleinen Waldanfluge, *Mercurialis ovata*, *Myosotis sylvatica*, *Onosma echinoides* vereinzelt oberhalb Fischau, *Orchis ustulata* Blumberg bei Fischau, *Ornithogalum comosum* Blumberg bei Fischau, *Orobanche cruenta*, *major*, *rubens*, *Orobis vernus*, *Peltaria alliacea* Vorberge bei Winzendorf, *Physalis Alkekengi*, *Phyteuema orbiculare* und *spicatum*, *Pieris hieracioides* Steinbruch oberhalb Brunn in riesigen, 1 Meter hohen Exemplaren, *Poa badensis*, *Polygala chamaebucus* und *major* beide auf dem Wege zur Zweierwiese besonders schön, *Potentilla alba* Zweierwiese, *Potentilla recta*, *Prunus chamae cerasus* unweit der Kirche von Fischau neben dem Wege, *Prunus Mahaleb*, *Prunella grandiflora*, *Ranunculus polyanthemus* Zweierwiese, *Rosa gallica* Zweierwiese, *rubiginosa*, *pimpinellifolia*, *Rubus saxitilis* in der Nähe des grossen Fischauer Steinbruches, *Scabiosa suaveolens* Hügel um Fischau, *Scorzonera austriaca* Blumberg, *hispanica* Zweierwiese, *purpurea* Hügel zwischen Fischau und Brunn, *Sedum thelephium* Fischau, Brunn, *Sempervivum hirtum*, *Senecio erucifolius* Wälder ober Fischau, *Sisymbrium strictissimum*, *Stipa pennata*, *Symphytum tuberosum*, *Taxacum corniculatum*, *Teucrium Scordium* Gebüsche.

bei Fischau, *Thesium linophyllum*, *Trifolium rubens*,
montanum, *Trinia vulgaris*, *Turritis glabra*, *Ver-*
bascum Thapsus, *orientale* Kalkhügel bei Fischau,
Verronica latifolia, *officinalis*.

XII. Von Brunn in die neue Welt.

Allium flavum Felsen vor der Teichmühle,
Antirrhinum majus Felsen bei Emmerberg neben
 der Strasse, auch bei der Ruine selbst, *Arabis*
petraea detto, *Astragalus Cicer* bei der Teich-
 mühle, *Aristolochia Clematidis* von Brunn zu den
 Kalkofen im Gebüsch, *Chaiturus Marrhubiastrum*
 Winzendorf, *Coronilla Emerus* Emmerberg, *Cyti-*
sus capitatus auf dem Wege zur langen Wand,
Dipsacus laciniatus von Weikersdorf in die neue
 Welt vorherrschend, *Hieracium humile* Felsen an
 der Strasse unweit Emmerberg, *Hypericum mon-*
tanum Emmerberg, *Iris pumila* Emmerberg, *Listera*
ovata und *cordata* Wälder um Emmerberg, *Me-*
lampyrum cristatum, *Orchis coriophora* Teichmühle,
Orchis laxiflora Feibering in der neuen Welt,
 auch beim Steinkohlenbau, oberhalb Muthmanns-
 dorf, *Peltaria alliacea* am Fusse der Wand, *Plan-*
tago maritima Netting in der neuen Welt, *Samo-*
lus Valerandi Wiesengräben bei Wittendorf, Strelz-
 hof, neue Welt, *Saxifraga Aizoides* Schattenseite
 der Prosset, *Seseli montanum* neue Welt, *Thesium*
pratense, Muthmannsdorf, *Trollius europaeus*
 Sumpfwiesen der neuen Welt.

XIII. Die Wand.

Arabis ciliata, *Astrantia major*, *Bellidiastrum Micheli* bei der kleinen Kanzel, *Cardamine trifolia*, *Convallaria verticillata*, *Dracocephalum austriacum* angeblich an den Abhängen der Wand gegen Stahremberg, *Echinosperrum deflexum* in der Nähe der Kanzel, *Gentiana acaulis*, *Hypericum montanum*, *Linaria genistifolia*, *Möhringia muscosa*, *Monotropa Hypopitis*, *Orchis pallens*, *Paris quadrifolia*, *Peltaria*, *Plantago maritima*, *Prenanthes purpurea*, *Primula Auricula*, *Prunus Mahaleb*, *Pyrola secunda*, *Salvia glutinosa*, *Sanicula europaea*, *Senecio nemorensis*, *Thlaspi montanum*, *Trifolium alpestre*, *Valeriana montana*, *tripteris*.

XIV. Sauerbrunn-Pötsching.

Anthemis tinctoria, *Anthriscus silvestris*, *Aristolochia Clematitis*, *Astragalus glycyphyllos*, *Centaurea stenolepis* Waldschlag oberhalb Sauerbrunn, *Cirsium eriophorum* Neudörfler Bahnhof, *Cytirus capitatus* oberhalb Sauerbrunn, *Cytisus nigricans*, *Dianthus Armeria* häufig, *Eragrostis poaeoides* Neudörfler Bahnhof, *Euphorbia amygdaloides* schattige Stellen, *Euphorbia epithymoides* Niederung gegen Pötsching, *Geranium palustre*, *Hieracium boreale* Holzkogl, *Hypericum montanum*, *Laserpitium latifolium*, *Libanotis montana*, *Lilium Martagon*, *Nepeta pannonica* gegen Pötsching, *Paris quadrifolia*, *Peucedanum verticillare* Schlucht oberhalb Sauerbrunn, *Peucedanum alsaticum* Wein- gärten bei Sauerbrunn, *Plathantera bifolia* am

Fusse des Holzkogels, *Potentilla alba*, *Potentilla inclinata*, *rupestris* neben dem Wege von Sauerbrunn nach den Wiesen, *Physalis Alkekengi*, *Sambucus Ebulus*, *racemosa*, *Senecio nebrodensis*, *Spiraea Arancus*, *Staphyllaea pinnata* Wälder, *Thalictrum collinum* Waldränder, *Xanthium spinosum* Neudörfler Bahnhof.

XV. Rosaliengebirge mit Katzelsdorf und Aichbichl.

Actaea spicata schattige Orte, nicht häufig, *Anchusa arvensis* Hochwolkersdorf, *Anemone pratensis* um Katzelsdorf, *Anthrinum* *Orontium* Weingärten bei Katzelsdorf, *Apera Spica venti* hochgelegene Wiesen, *Arenaria rubra* Forchtenstein, *Aristolochia Clematidis* Weingartenränder bei Aichbichl, *Asperula arvensis* Weingartenränder bei Aichbichl, *Asperula galioides* Weingartenränder bei Aichbichl, *Aspidium aculeatum* Wälder, *Atropa Belladonna* Wälder, *Avena caryophyllaea* Rosalienkapelle, *Campanula bononiensis* Aichbichl, *Carex Michellii*, *pendula* Gebirgsschlucht bei Aichbichl, *Carex silvatica* Forchtenstein, *Castanea vesca* zahlreich cultivirt an den Ostabhängen des Gebirges, *Cerastium silvaticum* oberhalb Katzelsdorf, *Cineraria alpestris* Waldschlag zwischen Kapelle und Jägerhaus, *Cyclamen europaeum*, *Dianthus deltoideus* bei Wismath, *Digitalis lanata* an Weingartenrändern zwischen Katzelsdorf und Aichbichl? *Erythraea Centaureum*, *Euphorbia amygdaloides* Wälder, *virgata* grasige Stellen an der Ostseite des Gebirges, *Fragaria collina* Holzkogel, *Galeopsis*

pubescens Rosalia, versicolor Rosalia, Galium rotundifolium Rosalia, Genista germanica, pilosa, tinctoria Holzschläge, Gentiana crudiata Aichbichl, Gnaphalium luteo - album Aichbichl, Gypsophila muralis, Hieracium sabaudum Holzkogel, Hierochloa borealis Wälder um Katzelsdorf, Ilex aquifolium Kaltenberg, Lichteneck, Luzula Forsteri Grasplätze des Rosaliengebirges, Lychnis viscaria Grasplätze des Rosaliengebirges, Nasturtium austriacum Wiesen bei Wismath, häufig, Ornithogalum nutans Aichbichl, Orobis vernus Rosalin, Oxalis Acetosella und rubra nahe bei der Rosalienkapelle, Peucedanum Cervaria, Oveoselinum Grasplätze der Rosalia, Peucedanum verticillare Schlucht bei Aichbichl, Phleum Boehmeri, Michellii grasige Orte der Rosalia, Polypodium vulgare Wälder, Potentilla opaca Waldschlag ober Katzelsdorf, Pulicaria dysenterica Katzelsdorf, Rosa cinamomea, gallica, tomentosa, Salix aurita Aichbichl, Salvia glutinosa Aichbichl, Sanicula europaea Rosalia, Sarothamnus vulgaris, Saxifraga bulbifera massenhaft im Obstgärten von Forchtenstein, auch bei Walpersbach, Senecio nemorensis, Spergularia rubra Forchtenau, Spiraea Aruncus Wälder, Staphylea pinnata Thernberger Schlossberg, Taxus baccata Thernberg, Tilia parvifolia Kaiserwald, Trifolium agrarium, medium, procumbens, Veronica orchidea, Valerianella dentata bei Forchtenstein, Vicia pisiiformis Waldschläge, Vicia sepium Wiesen bei Forchtenstein.

XVI. Pitten-Sebenstein.

Atropa Belladonna Sebensteiner Wald, *Campanula bononiensis* Pittner Schlossberg, *Cephalanthera ensifolia* Wälder um Sebenstein, *Cephalanthera rubra* beim Türkensturz, *Chenopodium urbicum* Schotterbänke der Pitten, *Dictamnus albus* auf dem Weissjakl bei Pitten, der älteste Epheustamm der Gegend steht im Schlosse von Sebenstein, *Kernera saxatilis* Türkensturz, *Lavatera thuringiaca*, *Linaria genistifolia* Ruine Sebenstein, Türkensturz, *Orobis vernus* Sebenstein, *Platanthera bifolia* Sebenstein, *Potentilla inclinata* Sebenstein, *Ranunculus lanuginosus* Wälder, *Senecio alpestris* Türkensturz, *Seseli glaucum* Felsen bei Pitten, Sebenstein, *Stachys silvatica*, *Toffieldia calyculata*, *Trifolium arvense*.

XVII. Piesting-Gutenstein.

Achillea Clavennae steigt von den Felswänden bei Waldegg mit dem Gerölle zuweilen bis an die Strasse herab, *Allium sphaerocephalum*, *ursinum* Schlucht von Oberpiesting gegen Stahremberg rechts im Kalkschutte. *Allyssum montanum* Felsen im Piestingertale, auch an der Strasse von Piesting nach Hörnstein, *Anacamptis pyramidalis* Mariahilfer Berg bei Gutenstein, *Aronia rotundifolia* Berge um Wöllersdorf, *Asperula adorata* Berge um Wöllersdorf, *Astrantia major* Oed, *Athamanthe cretensis*, *Carex alpestris* Gutenstein, *Cineraria aurantiaca* Wiesen auf dem Berge zwischen Ond und Waldegg, *Cineraria crispa* Muggen-

dorf, *Crepis alpestris* Ruine Schrattenstein, *Gutenstein*, *Daphne Cneorum* Waldegg, Oed, *Erisimum Cheiranthus* Oed, *Euphorbia amygdaloides* Oed, *Galium boreale* häufig an Waldrändern bei Aigen unweit Piesting, *Gentiana acaulis* Oed, *utriculosa* Waldränder bei Oed, *Geum rivale* Pernitz, *Gutenstein*, *Gladiolus palustris* Pernitz, *Gutenstein*, *Godieria repens* Steinapiesting, *Gymnodenia odoratissima* Dürnbach-Graben, *Helleborus niger* *Gutenstein*, *Hieracium caesium* Muggendorf, *saxatile* Oed, *Gutenstein*, *Mellitis melissophyllum*, *Ophris arachnites* Piesting, *Gutenstein*, *Ophrys apifera* Unterpiesting, *Polygonum Bistorta* *Gutenstein*, *Primula Auricula* Oed, *Gutenstein*, *Ranunculus anemonoides* Schlucht nördlich von Oed, *Ranunculus lanuginosus* Stahremberger Schlucht, *Rosa pomifera* am Gscheid, *Rosa rubiginosa* Marchgraben bei Wöllersdorf, Piesting, *Rosa rubrifolia* vordere Mandling, *Gutenstein*, *Rumex scutatus* steigt bei Waldegg mit dem Kalkschutte bis zur Strasse herab, *Salvia glutinosa*, *Saxifraga Aizoon* *Gutenstein*, *Scilla bifolia* am Bache in dem Thale, welches von Hörnstein nach Grillenburg führt, *Scorzonera austriaca* Felsen bei Piesting, *Swertia perennis* Buchbach bei Muggendorf, *Thalictrum aquilegifolium* Pernitz.

XVIII. Weikersdorf-Grünbach-Buchberg.

Arabis ciliata Bergwiesen bei Grünbach, *Arnica montana* Buchberg, *Galium boreale* Buchberg, *Helleborus niger* Buchberg, *Hieracium humile*, *saxatile* Buchberg, *Petasites albus* Buchberg,

Plantago Cynops Grünbach (nach Bilimeks Angabe), *Primula Auricula* Buchberg, *Primula farinosa* Grünbach, *Pyrola chlorantha* bei Grünbach, *Rhinanthus minor* Pfennigwiese bei Buchberg, *Rosa gallica* Wiesen bei Grünbach, *Salvia glutinosa* Buchberg, *Schoenus nigricans* nasse Wiesen bei Buchberg, *Sorbus Aria* Rothengrub, *Stachys recta*.

XIX. Neunkirchen. *)

Allium sphaerocephalum Föhrenwald, *Calitriche stagnalis* Sumpf im Dachetwalde, *Carex canescens* Sumpf im Dachetwalde, *Chenopodium urbicum* Strassenränder, *Cuscuta monogyna* Auen der Schwarza, *Dianthus Armeria* Waldungen, *Elatine Alsinastrum* in einer kleinen Lache auf dem Wege von Neunkirchen nach Dippolz, *Epilobium parviflorum* Ufer der Schwarza, *tetragonum* feuchte Waldstellen, *Epipactis palustris* Sumpfwiesen bei Blindendorf, *Equisetum inundatum* Sumpfwiesen bei Blindendorf, *ramosum* Sumpfwiesen bei Blindendorf, *Erysimum cheiranthoides* Auen der Schwarza, *Euphorbia verrocusa*, *Festuca gigantea* Auen der Schwarza, *Fragraria collina*, *Galium vernum* Wälder, *Gnaphalium oliginosum* Bach bei Dippolz, *Hermannium Monorchis* Blindendorf, *Hieracium praealtum* Wiesen, *Hierochloa australis* im Peterwalde gemein, *Holcus mollis* Blindendorf, *Hypericum*

*) Dieses Terrain sowie die Thäler der Sierning und Schwarza wurden von Dr. Krzisch, der durch längere Zeit in Neunkirchen domicilirte, und von Dr. K. Richter besonders genau durchforscht.

tetrapterum in Wassergräben und Sümpfen, *Inula salicina* Auen der Schwarza, *Lychnis diurna* Wiesen und Auen, *Linaria Elatine* Brachen, *spuria* Brachen, *Listera ovata* Wiesen bei Blindendorf, *Melandrium silvestre*, *Melilotus alba* gemein in den Auen der Schwarza, *Möhringia trinervia* gemein in den Auen der Schwarza, *Myriophyllum spicatum* gemein in den Auen der Schwarza, *Ononis Columnae* Station St. Egyden, *Ononis repens* Peterwald, *Orchis sambucina* Gadenweit, *ustulata* Blindendorf, *Oxalis Acetosella* Peterwald, *Picris hieracioides* St. Lorenzen, *Pinguicula vulgaris* Blindendorf, *Plantago arenaria* zwischen Neunkirchen und St. Egyden, *Primula farinosa* Blindendorf, *Pulicaria dysenterica* Canäle der Schwarza, *Pyrola rotundifolia* Wälder, *Ranunculus Lingua* Teich von Flatz, *sardous* auf feuchten Aeckern bei Blindendorf, *Polyanthemus* Wiesen, *Rhamnus catharticus* Peterwald, *frangula* Peterwald, *Ribes grossularia* Peterwald, *nigrum* Auen der Schwarza, *Rumex conglomeratus* Ufer der Schwarza, *hydrolapathum* Teich von Flatz, *Sagina nodosa* Sand der Schwarza, bei Blindendorf, *Salix alba*, *amygdalina*, *fragilis*, *incana*, *purpurea* Auen der Schwarza, *Saponaria officinalis* Auen der Schwarza, *Scabiosa succisa* Loipersbach, *Scandix Pecten* Brachen, *Scirpus holoschoenus* Loipersbach, *Scirpus maritimus* Canäle, *pauciflorus* Blindendorf, *setaceus* Blindendorf, *triquetris* Blindendorf, *Scorzonera humilis* Blindendorf, *Scutellaria galericulata* Canäle, *Selaginella helvetica* Peterwald, *Senecio campestris* Peterwald, *saracenicus* Ufer der Schwarza, *Silene pratensis* Blindendorf, *Thalictrum aquilegifolium* Peterwald, *Trifolium procumbens*, *Triglochin palustre* Blinden-

dorf, *Vaccinium Vitis Idea* Wälder, *Valerianella auriculata* Waldränder bei Loipersbach.

XX. Sieding-Stixenstein-Buchberg.

Aconitum Anthora am Fusse des Stixensteiner Schlossberges, *Lycotum* am Fusse des Stixensteiner Schlossberges, *Anthyllis montana* Gösing, gleich oberhalb des Dorfes Sieding, *Asperula galioides* Stixenstein, *odorata* Gösing, *Astrantia major* Stixenstein, *Athamanta cretensis* Gösing, *Cardamine trifolia* Stixenstein, *Carduus defloratus* Stixenstein, *Cineraria aurantiaca* Pfenningwiese bei Buchberg, *Dentaria bulbifera* Stixenstein, *Hieracium humile* Buchberg, *saxatile* Buchberg, *Herminaria hirsuta* Sandplätze der Sierning, *Herminium monorchis* Wiesen bei Stixenstein, *Lamium album* Buchberg, *Leontodon autumnalis* Buchberg, *incanus* Buchberg, *Linaria spuria* Winzendorf, Grünbach, *Listera ovata* Buchberg, *Menyanthes trifoliata* Grünbach, *Nepeta nuda* Grünbach, *Ophrys arachnites* Buchberg, *Orchis globosa* Mamauwiese bei Buchberg, *Peltaria alliacea* neben der Strasse zwischen Stixenstein und Buchberg, *Petasites albus* Buchberg, *Polygonum amphibium* Teich bei Stixenstein, *Primula Auricula* Buchberg, *farinosa* Grünbach, *Pulmonaria angustifolia* Gösing, *Pyrola chlorantha* Grünbach, auf dem Wege zum Bergwerk, *secunda* Gösing, *Ribes grossularia* Stixenstein, *Rosa dumetorum* Buchberg, *gallica* Grünbach, *Rumex arifolius* Stixenstein, *Salvia glutinosa* Stixenstein, *Schoenus nigricans* nasse Wiesen bei Buchberg, *Senecio alpestris* Buchberg, *aquaticus* Gräben

bei Grünbach, *Seseli glaucum* Stixenstein, *Veronica aphylla* Felsen bei Buchberg gegen den Schneeberg zu.

XXI. Gloggnitz-Payerbach-Reichenau.

Alchemilla arvensis Aecker bei Küb, *Anthemis tinctoria* Eisenbahndamm zwischen Gloggnitz und Payerbach, *Arabis brassicaeformis* an der Schwarza zwischen Gloggnitz und Reichenau, *Avena caryophyllaea* Klafferwald bei Pettenbach, *Cardamine hirsuta* Reichenau, *Carex ampullacea* Reichenau, *fulva* Sumpfwiesen bei Heufeld, *Comarum palustre* Hinterleiten bei Reichenau, *Epipactis palustris* Sumpfwiesen zwischen Gloggnitz und Payerbach, *Equisetum ramosum* Damm bei der Brücke zwischen Gloggnitz und Payerbach, *Erythraea pulchella* zwischen Gloggnitz und Payerbach, *Festuca Myurus* Bergbach bei Gloggnitz, *Gnaphalium luteo-album*, *Herminium Monorchis* Gloggnitzer Schlossberg, *Hypericum barbatum* Hirschwang, *Hypericum humifusum* Bergbach bei Gloggnitz, *Hypochaeris radiata* Reichenau, *Inula hirta* Silberberg bei Gloggnitz, *salicina* Silberberg bei Gloggnitz, *Lathyrus silvestris* Waldränder bei Gloggnitz, *Libanotis montana* an der Eisenbahn von Gloggnitz nach Payerbach, *Lunaria rediviva* in der Eng bei Reichenau, *Ononis repens* Sumpfwiese unterhalb Gloggnitz, *Orchis coryophora* zwischen Gloggnitz und Schlögmühl, *incarnata* Weissenbach, *Papaver dubium* Silberberg, *Peucedanum Oreoselinum* Hinterleiten bei Reichenau, *verticillare* Hirschwang, *Platanthera chlorantha* Wartenstein, *Polygonum*

Bistorta Wiesen bei Hirschwang, Quercus pedunculata vereinzelt bei Gloggnitz, Ranunculus Flammula Reichenau, Sedum reflexum Klamm, Wilmetia apargioides Strasse von Gloggnitz nach Schottwien.

XXII. Gloggnitz-Kranichberg-Ramms.

Alnus viridis Kranichberg, Arnica montana Ramms, Campanula barbata Ramms, Gentiana asclepiadea Ramms, cruciata Ramms, Geranium pratense Enzesreit, Hieracium praealtum Kranichberg, Hypericum hirsutum Kranichberg, Jasione montana Ramms, Kerneria saxatilis Strasse nach Kranichberg auf Felsen unweit des grossen Steinbruches, Lamium album Enzesreit, Melampyrum cristatum, nemorosum, pratense und silvaticum alle vier zwischen Kranichberg und Ramms, Salvia glutinosa Kranichberg, Sempervivum Neilreichi zwischen Enzesreit und Kranichberg (auf Kalk), Senecio sarracenicus Kranichberg, umbrosus Kranichberg, Stachys silvatica Kranichberg, Spiraea Aruncus zwischen Kranichberg und Ramms, Struthiopteris germanica zwischen Kranichberg und Ramms, Trifolium alpestre Ramms.

*~ wohl
hört man*

XXIII. Tegelsümpfe bei Matzendorf und Hölles.

Bidens cernua, Campanula Cervicaria, Chaiturus Marrhubiastrum, Cirsium rivulare, Crepis tectorum, Epilobium tetragonum, Erythraea linariafolia, Euphorbia palustris zwischen Felixdorf und Hölles, Gentiana Pneumonanthe, Gladiolus palustris

früher häufig neben der Strasse auf einer Sumpfwiese bei Matzendorf, jetzt daselbst verschwunden, *Glyceria aquatica* Heidemühle bei Matzendorf, *Gymnadenia odoratissima*, *Hypericum tetrapterum*, *Lemna gibba*, *trisolca*, *Linum austriacum*, *Menyanthes trifoliata* zwischen Felixdorf und Hölles, *Nasturtium officinale*, *Orchis laxiflora*, *Orobis pannonicus*, *Pinguicula vulgaris*, *Plantago maritima* zwischen Felixdorf und Hölles, *Salix repens*, *Scabiosa suaveolens*, *Scirpus holoschoenus*, *Thalictrum simplex* zwischen Felixdorf und Hölles, *Utricularia minor* und *vulgaris*.

XXIV. Pottenstein-Kottingbrunn-Vöslau-Baden.

Allium ursinum massenhaft auf dem Nordabhange des Eisernen Thores, *Androsace elongata* massenhaft auf dem Nordabhange des Eisernen Thores und Sooser Lindkogel, *Anthriscus vulgaris* an der Schwechat bei Baden, *Arabis petraea* Weissenbach, *Astragalus austriacus* Kottingbrunn, *Arum maculatum* Helenenthal, *Bifora radians* Kottingbrunn, *Bupleurum Gerardi* Weingärten bei Leobersdorf, Vöslau, *Carex hordistichos* Kottingbrunn, *humilis* trockene Wiesen bei Pottenstein, *pallens* Merkenstein, *Chaiturus Marrhubiastrum* Soos, *Convolvulus cantabrica* Katharinenberg bei Baden, *Coronilla coronata* Kalkberge von Vöslau und Baden, *Emerus* Wälder um Baden, *vaginalis* Katharinenberg bei Baden, *Echinopsis sphaerocephalus* zwischen Krainerhütten und Aland, *Erucastrum Pollichii* Aecker bei Vöslau, *Galium pedemontanum* Rauhenstein, *Geranium dissectum* Vöslau,

Baden auf Brachen, *Hieracium staticefolium* Felsen bei Pottenstein, *Himanthoglossum hircinum* Weingartenränder bei Baden, *Inula germanica* beim Melkerkeller bei Baden, *Iris pumila* auf dem Wege vom Calvarienberge zum Mitterberge bei Baden, *sibirica* feuchte Wiesen zwischen Vöslau und Kotingbrunn, *Jurinea mollis* Calvarienberg, *Lactuca viminea* Weingartenränder bei Baden und Vöslau, *Leersia oryzoides* Canal bei Baden, *Leucjum vernum* Josepfsbrunn bei Pottenstein, *Libanotis montana* Calvarienberg bei Baden, *Lycopus exaltatus* in der Lache zwischen Baden und Soos bei der Schäferei des Baron Doblhof, *Orchis coryophora* Kotingbrunn, *laxiflora* Kotingbrunn, *Ophrys arachnites* Kotingbrunner Remise, *Orobanche arenaria* Calvarienberg, *Papaver Argemone* Baden, *Plantago Cynops* Calvarienberg und Mitterberg bei Baden, *Podospermum laciniatum* Eisenbahndamm zwischen Kotingbrunn und Leobersdorf, *Primula Auricula* Weissenbach, *Pulmonaria azurea* südlicher Abhang des Kirchberges bei Fahrafeld, *Rhus Cotinus* Mitterberg, *Salvia austriaca* Schönau bei Kotingbrunn, *Senebiera Coronopus* Soos, Vöslau, *Turgenia latifolia* Weichselgarten bei Kotingbrunn, *Verbascum speciosum* Helenenthal, *Schraderi* Helenenthal.

XXV. Ebreichsdorf-Münchendorf-Moosbrunn.

Adenophora lilifolia Moosbrunn, *Allium sphaerocephalum* Moosbrunn, *suaveolens* Moosbrunn, *Althaea officinalis* Moosbrunn, *Anthriscus vulgaris* an Hecken bei Ebreichsdorf, *Bromus inermis*

Moosbrunn, *Carex filiformis* Wassergräben bei
 Moosbrunn, *fulva* Wassergräben bei Moosbrunn,
hordeistichos Wassergräben bei Moosbrunn, *para-*
doxa Wassergräben bei Moosbrunn, *Pseudocyperus*
 Wassergräben bei Moosbrunn, *umbrosa* Wasser-
 gräben bei Moosbrunn, *Carduus nutans* Münch-
 endorf, *Carthamus lanatus* Moosbrunn, *Chenopodium*
rubrum Moosbrunn, *Cirsium brachycephalum* Moos-
 brunn, *Cladium Mariscus* zwischen Moosbrunn
 und Ebreichsdorf, *Cochlearia officinalis* Moosbrunn,
Clematis integrifolia Münchendorf, *Crypsis alope-*
cureoides feuchte Grube an der Wienerstrasse von
 Moosbrunn, *Erythraea linarifolia* Ebreichsdorf,
Euphorbia lucida Münchendorf, *palustris* Moosbrunn,
pilosa Moosbrunn, *salicifolia* Moosbrunn, *Gladiolus*
palustris Moosbrunn, *Glyceria aquatica* Ebreichs-
 dorf, *Gratiola officinalis* Münchendorf, Moosbrunn,
Heliotropium europaeum Münchendorf, Moosbrunn,
Helosciadium repens Münchendorf, Moosbrunn,
Herniaria hirsuta Sandplätze bei Moosbrunn, *Hip-*
puris vulgaris Ebreichsdorf, Münchendorf, *Iris*
spuria Moosbrunn, Münchendorf, *Laserpitium pru-*
thenicum Moosbrunn, *Lathyrus palustris* Moosbrunn,
Linum hirsutum Moosbrunn, *Lotus villosus* Mün-
 chendorf, *Matricaria Chamomilla* von Pottendorf
 nach Ebreichsdorf, *Melilotus dentata* Münchendorf,
 Ebreichsdorf, *macrohiza* Münchendorf, Ebreichs-
 dorf, *Myagrum perfoliatum* Moosbrunn unter dem
 Getreide, alle 3 *Oenanthe*-Arten Moosbrunn und
 Münchendorf, *Orchis latifolia* Moosbrunn und Mün-
 chendorf, *laxiflora* Moosbrunn und Münchendorf,
Popaver Argemone Ebreichsdorf, *Poa fertilis* Mün-
 chendorf, *Potamogeton coloratus* Moosbrunn, *pu-*
sillus Moosbrunn, *Ranunculus Flammula* München-

dorf, *Lingua*, *Fischa* bei Moosbrunn, *Schoenus ferrugineus* Moosbrunn, *nigricans* Moosbrunn, *Scorzonera hispanica* Münchendorf, *Scirpus pauciflorus* Moosbrunn, *Scorzonera purviflora* Münchendorf, *Senebiera Coronopus* Münchendorf, *Senecio paludosus* unterhalb Münchendorf an der Triesting, *Senecio umbrosus* bei der Jesuitenmühle, Moosbrunn, *Serratula heterophylla* häufig auf nassen Wiesen bei Münchendorf, *Sonchus palustris* Moosbrunn, *Sturmia Loeselii* Moosbrunn, *Triglochin maritimum* Moosbrunn, *Utricularia minor* Moosbrunn, *vulgaris* Moosbrunn, *Veronica longifolia* Moosbrunn, *scutellata* Ebreichsdorf.

XXVI. Kirchberg-Wechsel.

Agrostis rupestris Wechsel, *Spica venti* um Kirchberg, *Ajuga pyramidalis* Saurücken bei Kirchberg, *Alchemilla vulgaris* Kirchberg, *Alnus viridis* häufig zwischen Kirchberg und Sachsenbrunn, *Althaea officinalis* Otterthal, Trattenbach, *Anchusa arvensis* gegenüber der Wolfgangskirche an der Strasse, *Anthoxanthum odoratum* auf den höchsten Erhebungen des Wechsels das herrschende Gras, *Arabis Thaliana* Aspanger Klause, *Arctostaphylus officinalis*, *Arnica montana* Wechsel, *Asperula arvensis*, *Aspidium septemtrionale*, *Astragalus glycyphyllus*, *Avena cespitosa*, *Blechnum Spicant* Mariensee, auch am Eingange des Molzgraben, *Calluna vulgaris*, *Camelina dentata* Sachsenbrunn, *Campanula cespitosa* unweit der Hermannshöhle, rechts neben der Strasse, *Carduus Personata* unterhalb Kirchberg neben der Strasse rechts im Ge-

büsch, *Carex brizoides* zwischen Kirchberg und Feistritz im linken Strassengraben, *silvatica* Kampstein, *stellulata* an der Strasse von Kirchberg nach Feistritz, *vulgaris* Kampstein, *Centaurea phrygia* Wiese, wo sich die Strasse von Kirchberg in die Aspanger einmündet, vereinzelt auch zwischen Kirchberg und Ramms, *Cerastium glomeratum* häufig um Kirchberg, *silvaticum* Schlucht dem Spitale gegenüber am Saurücken, *Chaerophyllum aromaticum* Kampstein, *aureum* im Thale, *hirsutum* im Thale, *Circea lutetiana* Wälder, *Cirsium erio-phorum* vereinzelt hie und da, *Conium maculatum*, *Cuscuta europaea* (major), *Dianthus Armeria* rückwärts des Klosters, *deltoideus* allenthalben, *Digitalis ambigua*, *Doronicum austriacum* häufig im Graben gleich unterhalb der Kranichberger Schwaig, auch auf dem Kampstein und der Feistritzer Schwaig, *Echinospermum deflexum* vereinzelt, *Epilobium alsinifolium* Kampstein, *palustre* Kampstein, *Equisetum silvaticum* Saurücken, Kampstein, *Erica carnea* allenthalben um Kirchberg, *Eriophorum angustifolium*, *Erythraea Centaureum*, *Euphorbia amygdaloides*, *Festuca heterophylla* Kampstein, *Galium rotundifolium*, *uliginosum* Bärenlake auf dem Kampstein, *Genista sagittalis*, *Gentiana asclepiadea*, *amarella*, *ciliata*, *cruciata*, *pannonica* letztere schon auf der Alpenwiese gleich ober der Kranichberger Schwaig, aber in schöneren Exemplaren am Schöberl, *Geum montanum*, *rivale* Aspanger Klause, *Gnaphalium luteo-album* unweit des Einganges zur Hermannshöhle, rechts neben der Strasse, *Gnaphalium supinum* Steiersberger Schwaig, Umschuss, *Gymnadenia albida* neben dem Fusssteige von der Steiersberger zur Kranichberger

Schwaig, *Herniaria glabra*, *Hieracium alpinum* Wechsel, *aurantiacum* auf dem Wege von der Steiersberger Schwaig zur Kranichberger, *saxatile* auf dem Wege zur Lodenwalch, *Homogyne alpina* Wechsel, *discolor* Wechsel, *Hypericum hirsutum* Rand der Wälder, *humifusum* Brachen bei den Kreuzbauern, und auf dem Gehwege von Feistritz nach Sachsenbrunn, *montanum* auf dem Wege zum Hoferbauer, auf der Ramms, *Hypericum quadrangulare* Kampstein, Saurücken, *Hypochaeris radicata* Feistritz, *Jasione montana*, *Inula Conyza*, *Iuncus filiformis* Bärenlake auf dem Kampstein, Saurücken, *trifidus* Wechsel. Wird massenhaft nach Wien geführt, dort mittels Gummi und Farbe dem Gemshaar täuschend ähnlich gemacht und so zur Erzeugung der falschen Gembärte verwendet, mit welchem Grasbüschel auf dem steirischen Hute manch Börsianer in Reichenau herumstolzirt. *Lamium album*, *Leontodon pyrenaicus* Kampstein, Wechsel, *Libanotis montana* auf dem Wege zur Lodenwalch an Felsen, *Lolium temulentum* Aecker um Kirchberg, Feistritz, *Lonicera nigra* Kampstein, *Luzula pilosa* bei Höllbauer, *Lycopodium annotinum* Kampstein, Saurücken, Feistritzer Schwaig, *clavatum* Raach, Selago Steiersberger und Feistritzer Schwaig, Kampstein, *Lysimachia nemorum* Saurücken, *punctata* in der Ebene, *vulgaris* in der Ebene, *Melampyrum pratense* in der Ebene, *silvaticum* in der Ebene, *Melandrium silvestre* Wiesen, *Melicu ciliata*, *Mulgedium alpinum* häufig und schön bevor man zur Steiersberger Schwaig kommt, *Nardus stricta* (vom Volke Bürstling genannt) Wechsel, *Orchis militaris* Wechsel, *sambucina* Kampstein, *Oxalis Acetosella*, *Parnassia palustris*,

Peucedanum Ostrutium dicht an der Kranichberger
 Schwaig, auch auf dem Kampstein, *Polypodium*
Dryopteris Saurücken, Kampstein, Wechsel, vul-
 gare Aspanger Klause, *Prenanthes purpurea*, *Pyrola*
rotundifolia, *secunda*, *Ranunculus aconitifolius* vor
 der Steiersberger Schwaig, *Rhododendron ferru-*
gineum Wechsel gegen den Pfaffen, *Ribes alpinum*
 Wechsel, *petraeum* Saurücken gegen Trattenbach,
rubrum Steiersberger Schwaig, *Rosa alpina* Wechsel,
Rumex alpinus Wechsel, *Sagina procumbens* um
 Kirchberg, *Saponaria officinalis* um Kirchberg, hie
 und da mit gefüllten Blumen, *Scirpus pauciflorus*
 an feuchten Stellen auf dem Wege nach Sachsen-
 brunn, *Sempervivum Neilreichi* stets nur auf Silur-
 kalk bei der Wolfgang-Kirche, Wolfenkogel, Hofer,
Senecio alpestris auf dem Wege zur Lodenwalch,
nemorensis, *sarracenicus*, *Soldanella alpina* Otter-
 thal, Trattenbach, *Spergula arvensis*, *Spergularia*
rubra, häufig um Kirchberg gegen Sachsenbrunn,
Spiraea Aruncus Wälder, *Spiranthes autumnalis*
 Sumpersbach, *Stellaria nemorum* am Fusse des
 Saurückens, *Streptopus amplexifolius* bei der Steiers-
 berger Schwaig und auf dem Wege von Tratten-
 bach zum Wechsel, *Trifolium agrarium* sehr schön
 und häufig, *montanum* Wolfenkogel, *Vicia tetra-*
sperma an der Strasse nach Feistritz beim nassen
 Hammer.

XXVII. Einzelne Standorte seltener Pflanzen.

Anchusa arvensis Hochwolkersdorf, *Aconitum*
Anthora am Fusse des Stixensteiner Schlossberges,
Adenophora lilifolia an der Fische bei Lichten-

wörth, Anthirpiruem majus Schloss Emmerberg, Orontium Brachäcker zwischen Neunkirchen und Peisching, Arnica montana schon auf der Ramms, häufig auf dem Wechsel, Centaurea stenolepis Sauerbrunn, Cardamine amara kleine Wassergräben in den Zehnern, Cyperus longus an der Schwechat bei Baden, Dictamnus albus Remise zwischen Neustadt und Katzelsdorf, Vorberge zwischen Fischau Wöllersdorf, Echinops sphaerocephalus zwischen Fischau und Prossset, Elatine Alsinastrum Lache auf dem Wege von Neunkirchen nach Dieppolz, Epipactis palustris Blindendorf bei Neunkirchen, Euclidium syriacum feuchte Wiese beim Stege über die Fische zu den Vereinshäusern, Galega officinalis Heiligenkreuz, Gentiana acaulis Oed, utriculosa Oed, Glaucium corniculatum in der Nähe des neuen Wirthshauses, Glyceria spectabilis Gröhrmühle, Helosciadium repens Moosbrunn, Hieracium amplexicaule Schloss Thernberg, Himanthoglossum hircinum Föhrenwald, Jurinea mollis Fischau, Baden, Kerneria saxatilis Türkensturz, Laserpitium latifolium Zweierwiese bei Fischau, Lathyrus latifolius Zweierwiese bei Fischau, Lepidium latifolium neue Parkanlagen, Lilium martagon Sauerbrunn, Vorberge bei Winzendorf, Linosyris vulgaris Fischau, Linum hirsutum Fischau, Listera cordata Emmerberg, Loranthus europaeus auf Eichen an der Eisenbahn bei Leobersdorf, auch um Eggen- dorf, Ebenfurth, Leucojum vernum in der Wörflacher Klause und massenhaft im Kuhwalde oberhalb Schleinz, Marrhubium peregrinum unweit des Follenhofes an der Strasse nach Katzelsdorf, Medicago prostrata an der Eisenbahn zwischen Neustadt und Theresienfeld, auch um Fischau und Emmerberg,

Micropus erectus Heide zwischen Neustadt und Weickersdorf, *Monotropa hypopitys* Wand, *Myrica germanica* am Leithadamme von Neudörf abwärts, *Nasturtium officinale* Gröhrmühle, *Omphalodes scorpioides* Eingangs der Lichtenwörther Au rechts von der Canalbrücke, *Onosma arenarium* Waldhof, *echioides* Fischau, *Ophrys apifera* Lichtenwörther Au, *Orchis laxiflora* Hölles, *Ornithogalum narbonense* Gramat-Neusiedl, *nutans* Lichtenwörther Au, *Passerina annua* zwischen dem neuen Wirthshause und dem Egydier Bahnhof, *Peltaria alliacea* am Fusse der Wand, zwischen Stixenstein und Buchberg neben der Strasse, *Peucedanum verticillare* Waldschluchten bei Aichbichl und Sauerbrunn, *Plantago Cynops* Calvarienberg bei Baden, *maritima* feuchte Wiese bei der Wienermauth, *Rosa gallica* Zweierwiese, *rubrifolia* Gutenstein, *Schoenus ferrugineus* Moosbrunn, *Scorzonera parviflora* Münchendorf, *Senecio paludosus* Münchendorf, *Serratula heterophylla* Münchendorf, *Sonchus paludosus* Moosbrunn, *Swertia perennis* bei Muggendorf, *Triglochin maritimum* Moosbrunn, *Veronica latifolia* Fischau, *longifolia* Moosbrunn, *Xanthium spinosum* Unter-Eggendorf, Neudörfler Bahnhof, *Zannichellia palustris* Pionnierteich der Militär-Akademie.

Verlag von Photographien von Wiener-Neustadt.

In der Filiale von **Wilhelm Braumüller & Sohn** in
Wiener-Neustadt sind erschienen:

Neueste Aufnahmen.

Panorama von Wiener-Neustadt I.

von der Canalbrücke gesehen.

Panorama von Wiener-Neustadt II.

vom Bahndamme gesehen.

Totalansicht der k. k. Militär- Akademie

vom Burgplatze gesehen.

 Diese neuesten Abbildungen von Wiener-Neustadt, getreu nach der Natur aufgenommen und photographirt, eignen sich besonders zur Erinnerung an unsere Stadt und zwar die Ausgabe 1. in Quer-Folio zum Einrahmen, die Ausgabe 3 in Elisabeth-Format (schwächeres Papier in Couvert zu Briefeinlagen) behufs Versendung, die beiden anderen Ausgaben: 2. Cabinet, 4. Visit-Format, für Albums.

Preise:

Ausgabe 1. (1 fl. 60 kr.) 2. (70 kr.) 3. (50 kr.) 4. (30 kr.)

Verlag von Photographien von Wiener-Neustadt

In der Filiale von Wilhelm Braumüller & Sohn in
Wiener-Neustadt sind erschienen:

Neueste Aufnahmen

Panorama von Wiener-Neustadt I
von der Canalbrücke gesehen.

Panorama von Wiener-Neustadt II
vom Bahndamme gesehen.

Totalansicht der k. k. Militär-
Akademie
vom Burghofse gesehen.

Diese neuesten Abbildungen von Wiener-
Neustadt, getrennt nach der Natur aufgenommen und
photographirt, eignen sich besonders zur Erinnerung an
unsere Stadt und zwar die Ausgabe 1. in Quer-Format
zum Einstecken, die Ausgabe 2. in Hirschhorn-Format
schwereres Papier in Convert zu Bräunungen) behufs
Vervielfältigung, die beiden anderen Ausgaben: 3. Cabinet-
4. Visité-Format, für Albums.

UB WIEN



+AM486645309

Im Verlage von
Wilhelm Braumüller, k. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler in Wien
sind erschienen:

Kukula, Wilh., Director der k. k. deutschen Staats-Real-
schule in Karolinenthal in Prag. **Lehrbuch der**
Botanik für die unteren Classen der Realschulen u.
Gymnasien. Dritte Auflage. Mit 188 Holzschnitten.
gr. 8. 1879. 1 fl. 20 kr. — 2 M. 40 Pf.

Maly, Dr. J. C., in Graz. **Anleitung zur Bestimmung**
der Gattungen der in Deutschland wildwachsen-
den u. allgemein cultivirten phanerorganischen
Pflanzen, nach der sehr leichten und sicheren ana-
lytischen Methode. Zum Gebrauche für die Besitzer
von Koch's Synopsis und Taschenbuch u. von Kittel's
Taschenbuch der deutschen Flora bearbeitet. Zweite
vermehrte Auflage. 8. 1860. 4 fl. — 8 M.


— — **Flora von Deutschland.** Nach der analytischen
Methode bearbeitet. 8. 1858. 1 fl. — 2 M.

— — **Systematische Beschreibung der in Oester-**
reich wildwachsenden u. cultivirten Medicinal-
pflanzen. Für Aerzte und Apotheker. 8. 1863.
1 fl. 20 kr. — 2 M. 40 Pf.

— — **Oekonomisch - technische Pflanzenkunde.**
Systematische Beschreibung der in der Garten- und
Landwirthschaft, in Künsten und Gewerben und im
Forstwesen gebräuchlichen cultivirten und wildwachsen-
den Pflanzen mit Angabe der Benützung. 8. 1864.
1 fl. 50 kr. — 3 M.

— — **Flora von Steiermark.** Systematische Uebersicht
der in Steiermark wildwachsenden und allgemein ge-
bauten blühenden Gewächse und Farne. Mit Angabe
der Standorte, der Blüthezeit und Dauer. 8. 1868.
2 fl. — 4 M.

Murmann, Otto Alexander, **Beiträge zur Pflanzen-**
geographie der Steiermark mit besonderer Berück-
sichtigung der Glumaceen. 8. 1874.
1 fl. 80 kr. — 3 M. 60 Pf.



DRUCK VON
J. C. FISCHER & COMP.
WIEN.