

ATALOGUE

DES

Plantes Nouvelles Rares ou Intéressantes

PHANÉROGAMES, CRYPTOGAMES,

VASCULAIRES ET CELLULAIRES

AINSI QUE DE QUELQUES HYBRIDES REMARQUABLES

DES ENVIRONS DE MONTFORT-L'AMAURY ET DE LA FORÊT DE RAMBOUILLET

(SEINE-ET-OISE)

PAR

MLLE MARGUERITE BELEZE

OFFICIER DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

LAURÉAT DE L'ACADÉMIE INTERNATIONALE DE GÉOGRAPHIE BOTANIQUE

ET DE LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE RAMBOUILLET (S.-ET-O.)

CORRESPONDANT DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE POUR LES TRAVAUX SCIENTIFIQUES

MEMBRE DES SOCIÉTÉS BOTANIQUE ET MYCOLOGIQUE DE FRANCE

DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE DE BOTANIQUE

DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES

DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE RAMBOUILLET (S.-ET-O.), ETC.



LE MANS

IMPRIMERIE VEUVE EDMOND MONNOYER
12, PLACE DES JACOBINS, 12


1905


EN VENTE CHEZ L'AUTEUR :

PRIX: 1 fr. 25 franco

AVEC UNE CARTE BOTANIQUE ET GEOLOGIQUE DE LA RÉGION







CATALOGUE DES PLANTES

DES ENVIRONS DE MONTFORT-L'AMAURY ET DE LA FORÊT DE RAMBOUILLET

BELEZE

CATALOGICE CAMBRY COME CONTROL ANGEDING

CATALOGUE

DES

Plantes Nouvelles Rares ou Intéressantes

PHANÉROGAMES, CRYPTOGAMES, VASCULAIRES ET CELLULAIRES

AINSI QUE DE QUELQUES HYBRIDES REMARQUABLES
DES ENVIRONS DE MONTFORT-L'AMAURY ET DE LA FORÊT DE RAMBOUILLET
(SEINE-ET-OISE)

PAR

MLLE MARGUERITE BELEZE

OFFICIER DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

LAURÉAT DE L'ACADÉMIE INTERNATIONALE DE GÉOGRAPHIE BOTANIQUE

ET DE LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE RAMBOUILLET (S.-ET-O.)

CORRESPONDANT DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE POUR LES TRAVAUX SCIENTIFIQUES

MEMBRE DES SOCIÉTÉS BOTANIQUE ET MYCOLOGIQUE DE FRANCE

DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE DE BOTANIQUE

DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE RAMBOUILLET (S.-ET-O.), ETC.



LE MANS

IMPRIMERIE Veuve Edmond MONNOYER

12, PLACE DES JACOBINS, 12

1905

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR :

PRIX: 1 fr. 25 franco

AVEC UNE CARTE BOTANIQUE ET GÉOLOGIQUE DE LA RÉGION

THE DESIGN AND

esttevuroM sain Kares m lukšnossanka

gangamagan engamban n an amaganganger

RITH HORACH STATE STATE OF A TOTAL CONTROL OF A STATE O

91 % 13

W. Wancermann Phillips

PRIORES CONDUCTED CONTINUES CONTINUE

TANKAR MAKA

THE MAINS

THE PARTITION OF THE PARTY OF T

6001

The Company of the Co

A LA MÉMOIRE

DE MES VÉNÉRÉS MAITRES

ADOLPHE CHATIN

ET

EUGÈNE FOURNIER

Souvenir de reconnaissance

MARGUERITE BELEZE

PRINCESS FOR

HILBERTALL SERVENCES BEINGE HE

MINISTER CHESTON

TH

DESIGN FOR SUBSECTION OF THE S

estimation en en enconne

DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

CATALOGUE DES PLANTES

Depuis une trentaine d'années, j'ai recueilli presque tous les végétaux des environs de Monfort-l'Amaury et de la forêt de Rambouillet (Seine-et-Oise).

J'ai pensé qu'il serait utile de résumer dans le présent catalogue mes observations personnelles concernant cette florule locale qui renferme beaucoup de plantes relativement rares aux environs de Paris, même des nouvelles et aussi une certaine quantité d'hybrides, ainsi que quelques formes qui sont dignes d'intérêt (1).

J'ai cru devoir y joindre les constatations qui ont été faites dans cette région d'abord, par mon vénéré maître le Dr E. Fournier (2) et par L. Gay que la mort est venue trop tôt ravir à la science et par MM. G. Bonnier, E. Boudier, Boulay, G. et F. Camus, A. Chabert, A. Chevalier, G. Delacroix, A. Chatin, E. Griffon, professeur à l'école de Grignon, P. Hariot, Abbé Hue, E. Jeanpert, H. Léveillé, G. Monbeig, professeur au collège de Saint-Germain-en-Layes, Perrot, Pons et Rouy, pour la France; et MM. R. Chodat (Genève), F. Crépin (Belgique), Mygula et Sydow (Berlin) et Von Wellstein, Vienne (Autriche), pour l'étranger, qui m'ont tous plus ou moins aidée dans mes déterminations et mes récoltes et à qui je suis heureuse d'adresser ici mes remerciements.

(2) Voir le Botaniste herborisant, de Verlot.

⁽¹⁾ Ce catalogue est complété par une carte botanique et géologique de la région et par plusieurs listes des herborisations les plus faciles à faire et les plus fructueuses.

Au siècle dernier, plusieurs botanistes de grande valeur, entre autres, Sébastien Vaillant, Tournefort, B. et Ant. de Jussieu et Thuillier, ont aussi parcouru ces mêmes localités et ont trouvé, les premiers, des plantes intéressantes, végétant soit à Saint-Léger, à Gambayseuil, ou bien aux étangs de Plânest, de Saint-Hubert, de Hollande, du Sérisaye, et aussi quelques-unes à Montfort-l'Amaury.

Ils ont donc indiqué dans leurs ouvrages, aux localités citées plus haut: Ranunculus hederaceus, Sagina subulata, Viola palustris, Comarum palustre, Carum verticillatum, Ericavagans, Bidens radiata, Wahlenbergia hederacea, Lobelia urens, Myrica Gale, Salix repens, Juncus pygmæus, Carex canescens et lævigata, Rhynchospora alba, Deschampsia discolor, Lycopodium inundatum.

J'ai établi cette liste, d'après l'ordre des familles adopté par Cosson et G. de Saint-Pierre, dans leur « Flore des environs de Paris ».

Nota. — Mt. et F. de R. sont les abréviations de Montfort l'Amaury et de Forêt de Rambouillet; centres principaux auxquels correspondent les autres localités.

Marguerite Beleze, Montfort-l'Amaury, 25 février 1905.

Adonis autumnalis. L. — Moissons. Vicq. Boissy et Villiersle-Mayeux, près M^t. (Assez rare).

My osurus minimus. L. — Champs humides. Plaine de M^t. Gaudigny et route de la ferme de Maison-Rouge, près M^t. Gambayseuil et Saint-Léger. (F. de R.) Assez rare.

(1). Ranunculus hederaceus. L. — Ruisseau du lavoir du Colombier, à Méré (1.) et mare de Bazoches, près M^t. Rivière de la Vesgres, au Maupas et rigoles dans la cour de la ferme Larcher (Saint-Léger). F. de R. Rare à Méré et à Bazoches. Commun dans les autres localités.

Ranunculus diversifolius. Gilib. - Var: truncatus. Koch, -

^(1.) Les échantillons de Méré, sont beaucoup plus petits dans toutes leurs parties que ceux de la vallée de la Vesgres et presque identique avec R. Lenormandi. Sch.

Petite mare, à côté de l'Etang-Rompu. (F. de R.) Assez commun, mais localisé.

Ranunculus lingua. L. — Endroits vaseux. Bords de l'Etang-Neuf. (Gambayseuil). F. de R. (Très rare).

Ranunculus nemorosus. D. C. — Bords des bois, routes des Deux-Châteaux aux étangs de Hollande; de la Charmoie aux Fontaines-Blanches et autour de la Croix de Villepair. (F. de R.) Peu commun.

- (2). Ranunculus Delacouri. G. et M. Allées de Saint-Laurent, routes des Longues-Mares et de Vitry; bois du carrefour de Saint-Ruffin. (F. de R.) Rare et localisé.
- (3). Ranunculus Questieri Billot. Route des Longues-Mares et autour du Poteau du Chêne-Montavale. (F. de R.) Très rare. Ranunculus Steveni. Andr. Pelouses à M^t. (Rare et localisé). Ranunculus reptabundus. Jord. Routes des Longues-Mares et de Saint-Laurent et route de Blûche aux Ventes-Bizet. (F. de R.) Assez commun.

Helleborus fætidus. L. — Bois de Beynes et vieux murs à Galluis, près M^t. Assez commun à la première localité.

Aquilegia vulgaris. L. — Prairies humides et sylvatiques. Les Auberies (Grosrouvres) près M^t. et Croix-du-Jubilé (Gambayseuil). F. de R. (Assez rare).

- (4). Dianthus delthoides. L. Le Jardinet et au-dessus de la ferme Larcher, près Saint-Léger; Poigny. (F. de R.) Commun à la dernière localité.
- (5). Silene Otites. Sm. Endroits sablonneux entre Saint-Léger et la « Pierre Ardroue ». Ancien dolmen celtique. (F. de R.) Rare.

Gypsophila muralis. L. — Autour de la ferme de Chatelvy, à M^t; bords des étangs de Hollande, de Saint-Hubert et des Morues. (F. de R.) Assez commun.

(6). Spergularia segetalis. Fenzl. — Champs sablonneux à Saint-Léger et à Poigny. (F. de R.) Rare. (Jeanpert!).

Spergula maxima! Bænngh — Champs à Montrôti, près M^t. Assez rare.

(7). Sagina subulata. Wimm. — Bords humides étangs de Hollande et des Morues; bords de la route de Saint-Léger à M^t. (F. de R.) Commun, mais pas tous les ans.

Arenaria serpyllifolia. L. — Var : leptoclados. Guss. — Places et rues herbues, à M^t. Assez rare.

Stellaria uliginosa. Murr. — Rigoles de la tourbière du Maupas et de la cour de la ferme Larcher (Saint-Léger). (F. de R.) Assez commun.

Mænchia erecta. Fl. de Wett. — Allées des bois de la Marechantreuil, près M^t. Bords des étangs de Hollande et route du Grand-Maître. (F. de R.) Plaine de M^t. Assez commun.

(8) Elatine hexandra. D. C. — Bords vaseux des étangs de Hollande et de Saint-Hubert. (F. de R.) Assez commun.

Oxalis acetosella. L. — Bois humides des étangs des Morues et Neuf. (F. de R.) Assez rare.

Linum catharticum. L. — Plaine de M^t. et route de Galluis. Bords des étangs de Hollande. Prés Jaunot à Gambayseuil. (F. de R.) Marechantreuil, prairies du Lieutel et du Moulinet, près M^t. Commun.

Radiola Linoides. Gmel. — Chêne-Rogneux près M^t; routes humides de toute la F. de R. (Très commun).

(9). Geranium sanguineum. L. — Lieux herbeux à la Couarde et à Millemont, près M[‡]. (Rare).

Geranium rotundifolium. L. — Forme à fleurs d'un blanc pur. Berge de l'étang des Bruyères. (F. de R.) Rare.

Malva Alcea. L. — Jeunes taillis au Chêne-Rogneux, près M^t. Assez commun.

Malva moschata. L. — Taillis à Grosrouvres, près M⁴. et au parc d'En-Haut. (F. de R.) Assez rare.

Tilia platyphyllos. Scop. — Ponts-Quentins et Clos-Renard. (F. de R.) Assez rare.

Tilia sylvestris. Desf. — Taillis en facela Croix Saint-Jacques de Saint-Léger. (F. de R.) Assez rare.

(10). Polygala vulgaris. L. — Forme à fleurs gris-de-Lin. Prairies de la ferme de la Vignette, près M^t. Rare.

Polygala depressa. Wender. — Bruyères et Ajoncs; plaine de M¹. Bois de la Marechantreuil; bords des étangs de Hollande et du Serisaye; landes humides au Maupas et prés Jaunot à Gambayseuil. (F. de R.) Assez rare.

(1). Polygala Michaleti. Gren. (Teste Chodat). - Pelouses

arides. Mares-Moussues et la Mormaire, près Mt. Bois de la Marechantreuil; bords des étangs de Hollande. (F. de R.) Rare.

Monotropa hypopytis. L. - Taillis; bois de la Marechantreuil, près Mt; entre le poteau Montavale et le Chêne-Baudet; routes de Blûche et des Sept-Chênes à la Mare-Ronde. (F. de R.) Assez rare. (Les deux formes aussi communes l'une que l'autre).

(12). Androsæmum officinale. All. - Taillis humides et montueux. Route du Bateau à l'étang des Morues (1). (F. de R.) Très rare, deux ou trois pieds, sous Pteris aquilina. L.

Hypericum humifusum. L. - Var. B. Liottardi. D. C. -Routes de la Croix Saint-Jacques à la route Croche; celles des Vaches et du Champ-Mauduit. (F. de R.) Assez rare.

(13). Hypericum microphyllum. Jord. Vieux murs à Méré et à

Mt. (Rare).

(14). Hypericum lineolatum. Jord. - Mêmes localités et près les étangs de Sérisaye et de Coupe-Gorge. (F. de R.) Bord de la route. Rare.

Hypericum quadrangulum. L. - Chemin-Vert, près Mt. et Ponts-Quentins. (F. de R.) Assez rare.

Hypericum tetrapterum. Fries. - Haies humides entre Galluis et Mt. Assez commun.

(200). Hypericum Desetangsii. Lamotte. - Jeunes taillis. Routes des Longues-Mares, du Grand Baliveau, du parc d'En-Haut, de la Croix de Villepair et de Vitry. (F. de R.) Assez commun.

Hypericum hirsutum. L. - Taillis à côté de l'Etang-Neuf (routes des Sangliers aux Glands) et du Grand-Veneur, Croix de Villepair. (F. de R.) Commun.

- (15). Elodes palustris. Spach. Tourbière du Maupas et rígoles de la ferme Larcher, près Saint-Léger; bords vaseux des étangs de Pourras, du Sérisaye, de Coupe-Gorge et du Roi. (F. de R.) Commun.
- (16). Drosera rotundifolia. L. Tourbière du Maupas (Saint-Léger); fossés à Sphagnum, routes du Champ-Mauduit à l'Étang-Neuf, de la Creuse-Vallée au Pont à la Dame. Prés Jaunot; (Gambayseuil); route Croche à Condé, de la Chesnaye

⁽¹⁾ Appelé aussi étang de la Porte-Baudet.

à la Charmoie (Carrefour du Pacage). Etang du Sérisaye. (F. de R.) Assez rare.

(17). Drosera intermedia. Hayne. - Mêmes localités. Très

commun.

(18). × Drosera Beleziana. G. Cam. (1). — (rotundifolia + intermedia. G. C.) Tourbière du Maupas (Saint-Léger). (F. de R.)

Une forme de D. intermedia. Hayne. — A feuilles plus rondes, à pétioles courts, hampes légèrement coudées à la base, aussi plus courtes; bords de l'étang du Roi (Poigny). F. de R. Très rare (19).

Parnassia palustris. L. — Prairies spongieuses et tourbeuses. Prés Jaunot à Gambayseuil et au Maupas (Saint-Léger). F. de R. (Assez rare).

(20). Pyrola rotundifolia. L. - Bois de la Marechantreuil et

de Thoiry, près Mt. (Rare).

(21). Pyrola minor. L. Bois au bord de la route de Galluis à Grosrouvres, au-dessus de la « Hutte du Cercelier », près M^t. (Rare et peu constant).

Papaver dubium. L. — Talus sablonneux entre Galluis et Mt.

(Assez rare).

Fumaria capreolata. L. — Lieux incultes et cultivés à M^t. (Rare).

— Var. pallidiflora. Jord. — Mêmes endroits et observation. (23). Cardamine pratensis. L. — Var: udicola. Jord. — Tourbières; Chêne-Rogneux, près M^t. Le Maupas (Saint-Léger). (F. de R.) Commun.

Nasturtium palustre. R. Br. — Bords des étangs des Morues, de Hollande et de Saint-Hubert. (F. de R.) Assez rare.

Teesdalia nudicaulis. R. Br. — Pelouses siliceuses aux « Rochers-Marquants » (Houjarré), près M^t. Autour du Dolmen dit de la « Pierre-Ardroue »; au croisement de la route aux Vaches, avec celle de Bazoches; routes du Grand-Maître et de la « Joutte-aux-Cerfs ». (F. de R.) Assez commun.

⁽¹⁾ Voy. Journal de Botanique. 5e année (1891), page 1980 (Actuellement on ne connaît que deux échantillons de ce rarissime hybride, un dans l'herbier Camus et l'autre dans l'herbier Rouy. (Ayant donné les deux seuls que j'ai pu trouver!)

(24). Capsella rubella.? Reut. - Bords de la route à Condé-

sur-Vesgres. (F. de R.) Rare.

(25). Helianthenum guttatum. Mill. - Sables chauds et arides du chemin de la « Pierre-Ardroue » au Jardinet (Saint-Léger); berges des étangs des Bruyères (Gambays) et du Roi, (Poigny). Route de Mt. à Rambouillet, près le Sérisaye. (F. de R.) Assez commun.

Viola canina. L. - Lieux arides aux Mares-Moussues, plaine de Mt. Routes des Fonds aux Mesnuls, de Saint-Léger à Mt., près le parc d'En-Haut et carrefour du Monnereau. (F. de R.) Assez commun.

(26). Viola palustris. L. - Bords des fossés tourbeux au Maupas et rigoles de la ferme Larcher (Saint-Léger). (F. de R.).

Ulex nanus. Sm. - Mares-Moussues (Plaine de Mt.) et Chêne-Rogneux; Croix-Patère, Butte-Rouge, Haut-Cornu; routes Belsédène et des Essartons. (F. de R.) Assez commun.

Genista anglica. L. — Mêmes localités et observation.

(203). G. pilosa. L. — Bruyères, près l'Étang-Neuf. (F. de R.) Très rare.

Lotus tenuis. Kit. - Lieux humides; bords des étangs, des Morues et de Hollande; prairie tourbeuse du Maupas (Saint-Léger). F. de R. (Assez rare).

Tetraganolobus siliquosus. Roth. — Bords des fossés argileux

à Garancières, près Mt. (Rare).

× Medicago media. Pers. (M. falcato + sativa Reich.). Talus arides; Montrôti et chemin des Graviers (entre Méré et Mareil),

près Mt. (Rare).

(20). Trifolium micranthum. Viv. - Allées herbeuses. Plaine de Mt. à l'entrée de la route Belsédène; talus herbeux entre Galluis et la Marechantreuil; entrée des prés Jaunot à Gambayseuil ; carrefour du poteau de la Rotonde; routes des Quatre-Piliers à la Butte-Rouge, près les Haysettes, du bois de « Bon-Repos » à Bourdonné et à Condé-sur-Vesgres ; bords de l'étang des Bruyères. (F. de R.) Assez commun.

Trifolium Pariense. D. C. — Prairies humides entre Galluis

et Mt. (Rare).

Trifolium medium. L.— Petit bois à Bauregard, près M^t. (Rare).

Trifolium ochroleucum. L. — Lieux herbeux. Route des
Graviers à Mareil, près M^t. Prés-aux-Princes. (F. de R.) Rare.

Trifolium repens. L. — Forme à fleurs transformées en feuilles composées de trois folioles, par suite de chloranthie. — Lieux herbeux: chemins de la Guinande et à Méré, près M^t. Poteau de la Rotonde. (F. de R.) Assez rare.

Coronilla varia L. — Haies, bords des chemins entre la Mare et Beynes, près M^t. (Assez commun).

Vicia Bobarti. Koch. — Bords du chemin du Colombier à

la route de Bretagne, près Mt. (Assez rare).

(29). Vicia lutea. L. — Talus herbeux et champs entre Galluis et la Marechantreuil. Vicq et la Mare, près M^t. (Très rare).

(30). Vicia hybrida. L. — Mêmes localités et observations. Vicia lathyroides. — Talus à Clairefontaine. (F. de R.) Assez commun.

Vicia cracca. L. var. villosa (V. villosa. Roth.) — Moissons, route des Prés-Prèsles à Méré (dite aussi de la « Table de Marbre »), près M¹. (Assez commun).

Ervum gracile. D. C. — Moissons et prairies. Maison-Rouge, Marcchantreuil, la « Cruche », (Saint-Nicolas), Méré, Mareil et ancien étang de Haute-Bruyère, près M^t. Champs aux Haysettes et au carrefour du Débuché. (F. de R.) Assez rare.

Lathyrus sylvestris. L. — Taillis de la Mare-Ronde et du carrefour de Saint-Ruffin. (F. de R.) Rare.

(204). Lathrrus tuberosus. L. — Faux chemin entre les Graviers et la route de Bretagne, près M^t. (Moissons). Assez rare.

Ornithopus perpusillus. L. — (Forme naine). — Endroits secs des prés Jaunot et étang des Bruyères. « Chemin de Sable » à Poigny. (F. de R.) Assez rare.

(32). Lythrum Hyssopifolia. L. — Sables humides; bords des étangs des Morues, de Hollande et de Saint-Hubert. (F. de R.) Assez commun certaines années.

Montia fontana. L. — Mares-Moussues, plaine de M^t. Routes aux Vaches vers celles de Bazoches. Des prés Jaunot aux étangs de Hollande et bords de ces derniers; étang des Morues. (F. de R.) Assez commun.

Corrigiola littoralis. L. — Bords des étangs de Hollande et autour du Dolmen dit de la « Pierre Ardroue » (Saint-Léger); champs à Poigny. (F. de R.) Assez rare.

(33). Illecebrum verticillatum L. — Sables plus ou moins humides: Croix-Patère et poteau de Pecqueuse; étangs des Morues et de Hollande; route aux Vaches près le carrefour de Bois-à-Clocher, et en allant vers les prés Jaunot. (Gambay-seuil). F. de R. (Très commun).

Scleranthus perennis. L. — Champs à Montrôti, près M.

(Rare).

Tillœa muscosa. L. — Endroits sablonneux. Chêne Rogneux.

près M^t. Prés Jaunot, (Gambayseuil). Routes aux Vaches et de
la « Joutte-aux-Cerfs » au « Chemin de Sable. » (Poigny). F. de
R. (Assez commun).

(34). Sedum alegans. Lej. — Talus herbeux. Montrôti, Saint-Nicolas et Méré, près M^t. Saint-Léger; routes des Basses-Masures, près le carrefour du Débuché. (F. de R.) Assez commun.

Sedum cepæa. L. — Talus ombragés. Saint-Nicolas, Méré, Notre-Dame-du-Chêne, la « Buttes à Boutry », la Pannerie (Les Mesnuls) et Carrefour des Chiens, près M^t. La Noue, (la Mormaire). Saint-Léger et Gambayseuil. (F. de R.) Commun.

Crassula rubens. L. — Commun à Mt., et dans toute la région.

Sempervivum tectorum. L. — Vieux murs et toits en chaume. Le « Petit-Moulin » à Mareil. Le Buisson (Grosrouvres) près M¹. Saint-Léger et Poigny. (F. de R.) Commun dans les environs, mais ne fleurissant qu'aux endroits indiqués.) — Forme à fleurs de couleur pâle et plante bien plus blanche dans toutes ses parties, rappelant un peu le Monotropa Hypopitys. L. — Vieux murs du faubourg de la Brosse, à M¹. (Très rare).

Prunus fruticans. Weihe. — Buissons. Mares - Moussues et haies de la « Folie ». (Plaine de M^t.) Rare.

Rubus Idæus. L. — Taillis. Mares-Moussues, plaine de M^t. parc d'En-Haut; route de la Croix-Patère au carrefour du Monnereau. Allées de Saint-Laurent et autour des Etangs-Neuf et de Hollande. (F. de R.) Commun.

Rubus rudis W. et N. — Talus et haies à Gambayseuil. (F. de R.) Rare.

Rubus tomentosus. Borkh. — Haies à Galluis, près M^t. (Assez commun).

Rubus Linkianus Ser. — Fleurs doubles ressemblant à un rameau de Rosier de Banks. — M. Boulay, de Lille, qui a bien voulu le déterminer, ainsi que le suivant, le suppose être une hybride des R. tomentosus. Borkh. — et thyrsoideus. Wimm. — Haies d'un talus: vieux chemin du Chêne-Rogneux à la route de Montfort à Gambayseuil. (Rare). G. Monbeig!

Rubus cuspidiferus. Mull. et Lej, — Mêmes habitats et localités. (Très rare).

Rubus dumetorum. W. et N.— Haies, routes de la Guinande, de Galluis et des Mesnuls, près M¹. (Assez commun).

(36). Comarum palustre. L. — Tourbières; Mares-Moussues, plaine de M^t. Etangs des Essartons (près N.D. du Chêne) et de Guypéreux (près Poigny). F. de R. (Très commun).

Potentilla mixta. Nolte. — Berges herbeuses; Galluis, près M¹. Routes du Champ-Mauduit à l'Etang-Neuf et aux Vaches; bords des étangs de Coupe-Gorge et du Gruyer. (F. de R.) Assez rare.

(37). Potentilla supina. L. — Sables humides; bords des étangs de Hollande et de Saint-Hubert. (F. de R.) Commun certaines années.

Rosa tomentosa Sm. — Ce Rosa, d'après M. Pons, rappelle beaucoup les R. cinarescens. Dumort — et micans. Déségl. — Haies à Saint-Léger, près la Vesgres. (F. de R.). Il a une grande disposition à devenir double ou semi-double et l'onglet des pétales est taché de jaune soufre. Fleurs blanches. (Rare) (1).

(38). Rosa rubiginosa. L. — Forme déterminée par M. Pons, « caractérisée surtout par une plus grande quantité de glandes noirâtres à la face inférieure des feuilles, et aussi par un duvet tomenteux qui couvre surtout les pétioles ». — (Fleurs rouge vif). Petit taillis, route Croche à Condé, près le carrefour de

⁽¹⁾ D'après le savant botaniste G. Rouy, ce Rosier appartient à la section subtomentosa; var: Belioniana. Desp. var. Y.

l'Entonnoir, en descendant vers les Fontaines-Blanches. (F. de R.) Très rare.

Rosa dumalis. Bachst. — Haies à Galluis et à Méré, près M^f. (Rare).

Rosa andegavensis. Bastard. — Haies à Saint-Léger et à Gambayseuil. (F. de R.) Assez rare.

Rosa malmundariensis. Lej. — Haies, près le « Moulin », à

Mt. (Rare).

(39). Rosa micrantha Sm. — Bois à l'entrée de la route du Champ-Mauduit (Gambayseuil). (F. de R.) Très rare.

(40). Agrimonia odorata. Mill. — Bords des taillis. Routes de Vitry et de Saint-Léger à M^t.; de la Rotonde au poteau de Hollande; autour de l'étang des Bruyères. (F. de R.) Très commun.

Mespilus germanica. L. — Taillis, chemin du Poteau (Mares-Moussues), plaine de M^t., bords des bois; Grosrouvres, près M^t. Parc d'En-Haut; routes de la Rotonde au poteau du Chêne-Montavale, des Mares-Gauthiers et carrefour de la Judith (deuxième chaussée des étangs de Hollande. (F. de R.) Assez commun.

Cratagus Oxyacanthoides. Thuill. — Haies à Boursoufle, à Saint-Nicolas et sur la plaine de M^t. (Assez rare).

Malus acerba. Mérat. — Layon entre les Auberies et la Surie, (Grosrouvres) près M^t. Parc d'En-Haut, Pont-Quentin et Gambayseuil. (F. de R.) Assez rare.

(42.) Sorbus aucuparia L. — Bois du Lieutel et de Gros-rouvres, près M^t. Route Belsédène, près l'étang des Morues; Ponts-Quentins (Etang-Rompu); poteaux des Mares-Gauthiers, du Grand-Baliveau et du Grand-Bouleau (Champ-Mauduit) F. de R. (Commun).

Sorbus terminalis Crantz.— Bois, taillis, les Pleins-Vaux. Malbranche, près le poteau des Ivelines. (F. de R.) Rare et localisé.

(43). Epilobium spicatum. Lmk. — Routes des Fonds aux Mesnuls, de Vitry aux Prés-aux-Princes; carrefour du Grand-Baliveau, poteau des Mares-Gauthiers, et maison du Garde, entre Saint-Léger et Poigny. (F. de R.) Rare.

Epilobium montanum. L. — Très commun dans les bois autour de M¹. et dans toute la F. de R.

Epilobium collinum. Gml. — Talus herbeux et ombragés à Galluis et à Méré, près M^t. (Assez rare).

Epilobinm palustre. L. — Etangs des Morues et du Sérisaye. (F. de R.) Rare.

Epilobium Lamyi. Schultz. — Rigoles à Launay-Bertin et à Méré, près M^t. (Assez rare).

Epilobium obscurum. Schreb. — Fossés, près le Maupas (Saint-Léger). F. de R. (Assez rare).

- (44). Epilobium roseum. Schreb. Mares à Méré, à Launay-Bertin et à Galluis, près M^t. Commun surtout à la première localité.
- (45). Epilobium lanceolatum. S. et M. Taillis à Galluis, dans les bois de la Marechantreuil et du Moulin, à M^t. (Assez rare), 28 juin 1873.
- (46). Myriophyllum alterniflorum. D. C. Etangs de la plaine de M¹. et Neuf (Gambayseuil); rigole de l'Etang-Rompu (même endroit) et Mares de Villepair. (F. de R.) Commun, surtout à la dernière localité (23 juillet 1884!).

Myrophyllum verticillatum. D. C. — Etangs de la plaine de M^t. de Hollande et Neuf. Mares de Villepair et rigole de l'Etang-Rompu à Gambayseuil. (F. de R.) Commun.

Saxifraga granulata. L. — Très communs dans les prés sylvatiques et les talus ombragés de toute la région.

Sanicula Europæa. L. — Taillis; parc d'En-Haut, Mare-Ronde; route des Sangliers aux Glands, Etang-Neuf. (F. de R.) Bois clair à Garancières, près M^t. (Assez commun).

Œgopodium Podagraria. L. — Vicq et les Mesnuls, près M^t. Le Maupas (Saint-Léger) et prés Jaunot à Gambayseuil. (F. de R.) Assez rare.

- (48). Carum bulbocastanum. Koch. Moissons entre Bardelle et la gare de Mt. (Très rare).
- (49). Carum verticillatum. Koch. Chemin-Vert, Mare-chantreuil, Mares-Moussues et Chêne-Rogneux, près M^t., et dans presque toute la F. de R. (Très commun).

Helosciadium nodiflorum. Koch. — var. intermedium. C. et G, — Le Maupas (Saint-Léger). F. de R. (Assez commun).

Helosciadium repens. Koch. — Mêmes localités et observation. (50). Pimpinella magna. L. Bords herbeux de la rigole de

Gaudigny, dans le parc de M. P. Yvon, à M^t. et la Queue, près M^t. (Assez commun).

Pimpinella saxifraga. L.—Var: dissecta. C. et G. = Pimpinella pratensis. Thuill. — Bois de la Marechantreuil, près M^t. (Rare).

(50). Enanthe Lachanalii. Gml. — Carrefour du Pacage. (F. de R.) Rare.

Phellandrium aquaticum. L. — Mare de la plaine de M^t. Etangs de Hollande et du Perray. Mares de Villepair. (F. de R.) Assez commun.

Silaüs pratensis. L. — Prairies humides, aux Mesnuls et à Galluis, près M¹. Bois humides autour de l'Etang-Neuf, surtout routes du Champ-Mauduit et de la Vente-aux-Moines. F. de R. (Commun).

Anthriscus sylvestris. Hoffm. - Haies à Gaudigny et à Méré,

près Mt. (Assez commun).

Selinum Carvifolia. L. — Bois humides, Routes du Champ-Mauduit, de Vitry à l'Etang-Neuf et de la Vente-aux-Moines; carrefour du Pacage, Fontaines-Blanches. (F. de R.) Assez commun.

Pastinaca sylvestris. Mill. — Moissons. Méré, les Mesnuls et Galluis, près M^t. Gambayseuil, Saint-Léger et Poigny. (F. de R.) Très commun.

Torilis infesta. Duby. — Haies à Egremont, près M^t. (Assez rare).

(52). Cornus mas. L. — Haies à Méré, près M^t. et à Saint-Léger. (F. de R.) Très rare et tendant à disparaître.

Ribes Uva-crispa. L. — Vieux murs du château des Mesnuls, en allant vers le « Petit-Moulin », près M^t. (Assez rare).

Erica tetralix. L. — Endroits tourbeux. Mares-Moussues; bois de Grosrouvres et Chêne-Rogneux, près M^t. Le Maupas. Etang-Neuf et « Bruyères de Neuville » (Gambayseuil). Croix-Patère, poteau de Pecqueuse, carrefours des Biennouviennes, du Haut-Plânest, des Chevreuils et route de la Vignerie; étangs de Coupe-Gorge et du Sérisaye. Fontaines-Blanches, surtout aux carrefours de la Croix-Gilbon et de l'Entonnoir; routes de la Charmoie et du Haut-Cornu aux Essartons. (F. de R.).

Forma eglandulosa Chevall. — Mêlée avec le type, mais ordinairement plus commune que lui. (F. de R.). Forme à fleurs blanches: Chêne Rogneux et étang du Sérisaye. (Rare).

(54). Erica ciliaris. L. — Croix-Patère. (F. de R.) Type; rare et assez localisée.

Forme beaucoup plus grêle et plus allongée que dans le type; épis très longs, à fleurs largement espacées; corolles plus pâles et plus développées. (Très rare). Revers du fossé de la petite route de Montavale. (F. de R.).

- (55). Ericas vagans. L. Croix-Patère. (F. de R.) Rare.
- (56). Erica scoparia. L. Croix-Patère, entrée de la route des Meuniers à la Boissière. (F. de R.) Très rare.

Erica cinerea. L. — S. v. alba. — Poteau du Chêne-Montavale; routes de la « Hutte du Boquet » au carrefour de la Harasserie; de la Vallée-Noire à l'étang du Sérisaye, carrefour de Six-Pieds. (F. de R.) Assez rare.

(57). Calluna vulgaris. Salisb. — var: pubescens. Bor. — Bruyères de la route aux Vaches. Landes au-dessus du Maupas (Saint-Léger). F. de R. (Assez commun).

Calluna vulgaris. Salisb. — Forme à fleurs blanches. — Routes du Haut-Cornu et de la Rotonde. Etangs du Roi et de Coupe-Gorge. (Poigny). F. de R. (Assez rare).

(58), Calluna Beleziæ! G. Rouy! (1) Petit bois humide à côté de l'étang de Plânest (Saint-Léger). F. de R. (Localité actuellement enclavée dans une propriété particulière).

La diagnose de cette curieuse et nouvelle espèce consiste surtout, d'après M. G. Rouy, dans les caractères suivants: rameaux pubescents; feuilles allongées, pubescentes et ciliées, les supérieures écartées, comme distiques, plus courtes que les entre nœuds, très étalées, les supérieures lâchement subimbriquées sur quatre rangs; corolle blanchâtre; calice scarieux, pétaloïde, coloré. Etamines à anthères appendiculées; stygmate saillant. Fleurs très peu nombreuses plus ou moins étalées. (Très rare).

- (59). Primula eliator. Jacq. Clairières de la Mare-Ronde. Carrefour du Débuché; Guypéreux et Saint-Fort, près Poigny. (F. de R.).
 - (62). Hottonia palustris L. Ruisseau à Poigny (fertile);

⁽¹⁾ Voy. Bull. Soc. bot. de France. T. XXXVII (1891), page 263.

mares de Villepair, sous les ponts de bois ; ordinairement stérile. (F. de R.) Rare.

(63). Lysimachia nummularia L. — var. festiva. E. Fourn! — Forme à pétales et à sépales plus étroits et plus lancéolés; prairies spongieuses, le Maupas (Saint-Léger), Gambayseuil et mares de Villepair. (F. de R.); et entre Galluis et M^t. (Assez rare).

Samolus Valerandi. L. — Mares à Saint-Léger et rigole der-

rière l'Etang-Neuf. (Gambays). F. de R. (Rare).

Centunculus minimus. L. — Endroits herbeux, ombragés. Carrefours des Croix de Villepair et Patère; route Cavalière à la « Fosse-aux-Loups »; prés Jaunot à Gambayseuil et chaussée de l'étang du Roi (Poigny). F. de R. (Assez rare).

(64). Anagallis tenella. L. — Tourbière du Maupas (Saint-Léger); fossés, routes des Quatre-Piliers à l'Etang-Neuf, de la Charmoie aux Fontaines-Blanches. Prés Jaunot à Gambayseuil. Étang du Sérisaye. (F. de R.) Commun.

(65). Littorella lacustris L. — Sables humides. Etangs de Hollande et de Saint-Hubert. (F. de R.) Fleurit et fructifie tous

les ans. Assez commun, certaines années.

Armeria plantaginea. Willd. — Bords des chemins, talus herbeux, endroits sablonneux. (Très commun aux environs de M^t. et dans toute la région).

Plantago lanuginosa. Koch. - Vieux murs à Mt. et à Saint-

Léger. (F. de R.) Assez rare.

(67). Menyanthes trifoliata. L. — Mares-Moussues, plaine de M^t. Etang de Pourras. (Les Bréviaire). (F. de R.) Assez commun.

(66). Lymnanthemum nymphoides. H. et L. — Etang-Neuf,

Gambays. (F. de R.) Assez commun.

Gentiana Pneumonanthe. L. — Bruyères humides, prairies spongieuses et sylvatiques des environs de M^t. et de toute la F. de R. (On trouve souvent des spécimens dont les corolles sont à 6-7-8 lobes ; çà et là avec le type). Assez commun.

(69). Cicendia pusilla. Griseb. — Sables humides; étang de Hollande (1er chaussée). F. de R. (Commun, certaines années).

(68). Cicendia filiformis. Delarb. — Endroits humides. Landes au Chêne-Rogneux, près M^t. Routes Belsédène, du Haut-Cornu « les Brûlins » près M^t., et prés Jaunot à Gambayseuil; bords

des étangs des Morues, de Saint-Hubert, de Hollande et de Coupe-Gorge. (F. de R.) Très commun.

Cuscuta epithymum. Murr. var: Trifolii. Babingt. — (Sur Trifolium pratense L.). — Champs entre Lauray et Launay-Bertin, près M^t. (Assez commun).

Cuscuta Europæa. L. — Sur Sarrothammus scoparius. Koch. Routes entre le Parc d'En-Haut et la plaine de M^t. Launais-Bertin et Mareil, près M^t. Gambayseuil. (F. de R.); sur Achillea millefolium. (Rare).

(70). Myosotis strigulosa. Rchb. — Prairies humides à la Surie (Grosrouvres), près M¹. Bords des étangs des Morues et de Hollande, du Sérisaye et de Coupe-Gorge. (F. de R.) Assez commun.

My osotis lingulata. Lehm. — Assez répandu dans les prairies humides et spongieuses: Galluis et Chemin-Vert, près M¹. Gambayseuil et Saint-Léger. (F. de R.) Plus commun à fleurs bleues que blanches.

Pulmonaria officinalis L. var. P. angustifolia. L. — Talus et bords de la route de Poigny à Guypéreux, surtout autour de la fontaine de Saint-Fort. (F. de R.).

Echium Wierzbickii. Hab. — Autour des étangs des Bruyères et du Sérisaye. (F. de R.).

Cynoglossum officinale L. — Vieux murs à la Moutière (M^t). Et avenue du Chemin-de-Fer. Bords de l'étang du Sérisaye. (F. de R.) Méré, près M^t. (Rare).

Physalis Alkekengi. L. — Vignes, entre Méré et Gueswillers, près M^t. (Assez rare).

(72) Atropa Belladona. L. — Taillis humides. Mares-Moussues, plaine de M^t. Autour des étangs des Morues et Neuf. Rigole entre Villepair et les Mares-Gauthiers.

Lycium Europœum. Duby. — Haies à la Guinande et entre Galluis et M^t. (Rare).

Verbascum nigrum L. — Ferme d'Ithes, entre Pontchartrain et M^t. (Rare).

(72) × Verbascum Wirtgenii. Franch. + (flocosum nigrum) Même localité et observation. (Avec les parents).

Veronica Chamædrys. L. — Forme plus petite que le type, à fleurs petites, bleu foncé, tiges un peu rougeâtres à la base; prés Jaunot à Gambayseuil. (F. de R.) Assez commun.

Veronica Ruxbaumii. Tn. — Voisinage des habitations. La Guinande, Ruelle des Prés (Gaudigny) « Clos Isée »; ferme de Chalelvy, près M^t. (Assez rare).

Veronica triphyllos. L. — Champs sablonneux, arides. Montrôti, Chemin-Vert, Méré et Houjarré, près M^t. Saint-

Léger et Poigny. (F. de R.) Très commun.

Veronica verna. L. Forme à fleurs bleues très pâles; à feuilles petites; à tiges courtes. Lieux sablonneux à M^t. (Assez rare).

Veronica serpyllifolia. L. — Var. tenella. C. et G. — Routes herbeuses de la Croix Saint-Jacques au carrefour du Sycomore. (F. de R.) Rare.

Veronica scutellata. L. — Mares au parc d'En-Haut; bords des étangs de Hollande et rigoles de l'Etang-Neuf. (F. de R.)

Assez rare.

(76.) Veronica parmularia. P. et T. — Sables humides. Etangs des Morues, de Saint-Hubert et de Hollande. (F. de R) Assez commun, certaines années.

Veronica Anagallis. L. - Ruisseau entre le Tremblay et les

Mousseaux, près Mt. (Rare).

(77.) Limosella aquatica. L.— Sables humides. Méré, près M^t. Etangs des Morues et de Hollande. (F. de R.) Assez rare.

(78.) Scrofularia Bablisii, Horn. — (Forma ramosa.) Bords du ruisseau du Colombier à Méré, près M^t. (Rare).

(79.) Scrofularia Ehrharti. — C. A. M. — Bords du ruisseau du Colombier à Méré, près M^t. et chemin des Graviers entre Méré et Mareil. (Assez rare).

(81.) Linaria arvensis. — Moissons à Poigny. (F. de R.) Rare. Pedicularis palustris. L. — Marais du Chêne-Rogneux, près

Mt. (Rare).

Pedicularis slyvatica, L. — Forme à fleurs blanches; Bords des étangs de Hollande, (1re chaussée). F. de R. (Rare et très

localisé.)

(83.) Euphrasia memorosa. Pers. — Forme estivale. Von Wellstein. D'après M. Von Wellstein, cette forme est remarquable: par sa précocité, car je l'ai récoltée, fleurie et fructifiée, le 23 mai! 1897, tandis que l'anthèse du type n'a lieu qu'à la fin de juin: par son habitat: commune dans la partie la plus

tourbeuse des prés Jaunot où elle végète en compagnie de : Linum Catharticum. L., Anagallis tenella. L., Pedicularis sylvatica. L., Eriophorum latifolium, Hoppe, Carex ampullacea, Good., Osmunda regalis. L., etc., elle diffère beaucoup par sa présence dans ces stations spongieuses, du type, qui, lui, préfère, les endroits sensiblement plus secs.

Ses tiges sont toujours simples, légèrement pubescentes, hautes de 5-10 centimètres; à feuilles un peu plus petites que dans le type, oblongues, ordinairement glabres à dents assez courtes, obtuses, non ciliées; fleurs assez grandes, à pétales blancjaunâtre, mélange de violet, naissant une ou deux à l'asseille des feuilles; calices oblongs, glabres. Sauf la nuance des fleurs, cette forme ressemble beaucoup à l'Euphrasia minima! Jacq! quoique de taille un peu plus élevée que j'ai récoltée le 9 août, dans le gazon autour du lac de l'hospice du Grand-Saint-Bernard, en Suisse, pendant la session de la Société botanique de France, à Genève, en 1894. Pour M. A. Chabert, qui a bien voulu classer les Euphrasia de mon herbier, cette plante est E. nemorosa vernalis. A. Chabert! Ce dernier en fait une forme précoce du nemorosa. (Bulletin de l'Herbier, Boissier, p. 275.)

Endroits tourbeux des prés Jaunot à Gambayseuil (F. de R.) Rare et localisée.

Pinguicula vulgaris. L. — Tourbière entre la Colonie et la Chesnaye, près Saint-Léger. (F. de R.) Rare.

- (85). Utricularia minor. L. Mares-Moussues, plaine de M^t., et mares, routes Belsedène. Etang des Bruyères. (F. de R.) Rare et fleurit rarement.
- (84). Utricularia neglecta. Lehm. Etangs Neut et des Bruyères (anthèse superbe en 1898!) Rigole de l'Etang Rompu. (F. de R.) (Presque toujours stérile et rare).
- (86). Utricularia intermedia? Hayne. Mêmes localités, (mais est presque toujours stérile.) Très rare.
- (87). Orobanche cruenta. Bert. Sur Lotus corniculatus. Prairies à Beauregard (Marechantreuil), près M^t. (Rare).
- (88). Mentha sylvetris. L. (an forma légitima?). Route, près l'étang du Bois-Nivert, plaine de M^t. (Subsp.)? Très rare.

Mentha pulegium. L. — (Forme nouvelle). Bords des rigoles de Pourras et des Pleins-Vaux. (F. de R.) Assez rare.

Mentha rotundifolia + arvensis! - Lieux vagues; ferme des Essartons (N. D. du Chêne), près M^t. (Rare).

Thymus chamædrys. Fries. — Mur de la chaussée de l'étang des Bruyères (Gambays,) etétang du Serisaye. (F. de R.) Commun.

(92). Glechoma micranthum. Bænng.— Talus ombragés à Saint-Nicolas, près M^t. (Rare).

Lamium incisum Willd. — Lieux incultes et cultivés; ruelle des Prés (Gaudigny), près M^t. (Assez commun).

Melitis Melissophy-llum. L. — Taillis du Chêne-du-Roi. (F. de R.) Assez rare.

Brunella grandiflora. Jacq. — Prairies entre Galluis et Mt. (Rare).

(94). × Brunella intermedia. (= albo + vulgaris. Timb.) — Routes herbeuses de la Croix Saint-Jacques au carrefour du Sycomore. (F. de R.) Rare.

Galeohdolon luteum Huds. — Lieux herbeux, humides et couverts. Parc de la Commanderie et bois de la Joncée, à M^t Chêne-Rogneux et Brise-Tête (La Noue). Fontaine Saint-Fort, près Poigny. (F. de R.) Assez rare.

(93). Stachys germanica. L. — Talus pierreux et calcaires à Bardelle et à Vicq, près M^t. (Assez rare et localisé).

Leonurus Cardiaca. L. — Haies aux « Rochers Marquants », (Houjarré) et à Launay-Bertin, près M^t. (Rare).

- (95). Scutellaria minor. L. Endroits humides des bois, bords des étangs, ornières; routes aux Vaches et des Longues-Mares; étangs des Morues, de Hollande et Neuf; poteau des Mares-Gauthiers et Croix de Villepair. Etang du Serisaye et de Coupe-Gorge. (F. de R.) Commun.
- Forme à fleurs blanches. Entrée de la route aux Vaches, du côté de l'Etang-Rompu, même forêt. (Rare).
- (96). Vaccinium Myrtillus. L. Taillis, route du Monnereau, près l'ancien poteau des Longues-Mares. (F. de R.) Très rare, deux ou trois pieds qui tendent à disparaître.

Oxycoccos palustris. Pers. — Etang du Sérisaye, près la Croix de Villepair. (F. de R.), où il tend à disparaître, à la suite

de la récolte des Sphagnum, pour cultiver les Orchidées exotiques.

Campanula Rapunculus. L. — (Forma ramosa). — Talus, haies à Gambayseuil. (F. de R.) Assez rare.

Campanula Persicifolia. L. — Bois de la Marechantreuil, près M¹. (Rare).

Campanula glomerata. L. — Prairies et talus herbeux. Ferme de la Vignette, Montrôti, Méré, les Mesnuls et Galluis, près M^t. Saint-Léger et Gambayseuil. (F. de R.) Commun.

Specularia hybrida. A. D. C. — Moissons. Montrôti, Méré, les Mesnuls et Galluis, Vicq et Boissy, près M^t.

(99). Wahlenbergia hederacea. Rchb. — Mousses et gazons humides des allées ombragées. Routes aux Vaches, depuis les étangs de Hollande, jusqu'aux prés Jaunot de Gambayseuil, surtout abondant au carrefour du Grally (même route); de Saint-Léger à M[‡]., particulièrement entre le Clos-Renard et l'Étang-Rompu. Route Belsédène. Carrefours Isoret et Bailly. (F. de R.) Commun.

Lobelia urens. L. — Prairies humides et spongieuses; endroits humides des bois. Galluis, bois du Lieutel, Grosrouvres, Mares-Moussues, près M^t., et dans presque toute la forêt de R., surtout du côté des étangs des Morues, de Plânest, Neuf, des Bruyères, de Hollande et de Saint-Hubert. Extrêmement commun.

Cornus mas. L. - Haies à Méré, près Mt. (Très rare).

Galium uliginosum. L. — Tourbière du Maupas, (Saint-Léger); bords des étangs des Morues et de Hollande. (F. de R.) Assez commun.

Galium Anglicum. Huds. - Mêmes localités. (Rare).

Valeriana dioica L. Prairies spongieuses. « Chemin Vert » près Mt. et prés Jaunot, Gambayseuil. (F. de R.).

Centranthus ruber. D. C. — Vieux murs du xiº siècle et « Impasse des Jardins », à M^t. (Rare).

(101). Valerianella Ameliæ! E. Fourn! — Variété du V. Morisonii. D. C., dont le calice est à cinq dents. — Moissons entre Galluis et la Queue-lèz-Ivelines, près M^t. (Assez commun).

(102). Cephalaria pilosa. C. et G. — Chemins couverts et

humides, bords des eaux. « Clos Isée » et ruelle des Prés (Gaudigny); les Mesnuls et Bardelle, près Mt. (Commun).

(103). Cirsium nemorale. Rechb. — Bois du Lieutel, près M^t. (Rare).

C. Anglicum. Lmk. — (Type). Endroits humides, même tourbeux des prés sylvatiques de M^t. et de la F. de R. (Commun).

(104). Cirsium Anglicum. Lmk. — var. auriculatnm. (G. Cam. in litt.). Cette variété est caractérisée par ses feuilles ampléxicaules auriculées, (d'où le nom), plus ou moins sinuées, par ses capitules un peu ombilliqués. Elle diffère du C. bublosum. D. C. (1), avec lequel, une description trop sommaire peut la faire confondre, par ses feuilles beaucoup moins profondément sinuées et par sa hampe qui est quelquefois munie au sommet de rameaux très courts. Endroits tourbeux, sous Myrica Gale et parmi Erica tetralis. Route de la Creuse-Vallée à la Butte Rouge, en montant vers le poste forestier des Quatre-Piliers. (F. de R.) Assez commun.

(105). Cirsium ambiguum. Rouy. — Forme intéressante, à feuilles radicales, les unes conformes au type, les autres réduites au rachis, brunâtres, mais portant quand même quelques épines; tiges plus courtes, presque toujours monocéphales; calathides non ombelliquées, à fleurons purpurins; fibres radicales renflées, napiformes pour la plupart; plante moins épineuse que le type dans toutes ses parties. Achaines peu nombreux, mais bien conformés. Tourbière du Chêne-Rogneux, près M¹. où le type est assez répandu. (Abondant dans cet endroit). (2).

C. eriophorum. Scop. — (Type et forme à fleurs blanches.) Chemin de culture entre la ferme des Prés et Marcq, près M^t. (Assez commun).

(107). Cirsium arvense. L. — Var: horridum. Koch. — Bois de la Noue (la Mormaire), près M^t. (Rare).

(106). × Cirsium arvense + acaule. Boulay. — (3) Bords de la mare de la ferme de Maison-Rouge, près M^t. (Très rare).

⁽¹⁾ Je n'ai pas encore trouvé cette espèce dans mes environs.

⁽²⁾ Voy. Revue de Botanique systematique (n° 16, 1904, p. 56). (3) Voy. Bull. Soc. Bot. de France, t. XXXVIII (1891), p. 105.

- (108). × Cirsium lanceolatum + arvense! Maison de Seigle à Méré, près M^t. (Très rare).
- (111). × Cirsium Grenieri. G. Rouy. Endroits pierreux et humides aux Mares-Moussues, plaine de M^t. (Très rare).
- (110). × Cirsium spurium. Delast. Endroits tourbeux. Parmi Erica tetralix, L., sous Myrica Gale. L. Route du Grand-Bouleau, près l'Etang Neuf. Bois humides de la Butte-Rouge, près le « Pont-à-la-Dame » (Gambayseuil). Avec les parents, (très rare). (F. de R.).
- (109). × Cirsium palustre + anglicum. Bords humides de la route du Champ-Mauduit, près le « Pont-à-la-Dame ». (F. de R.) avec les parents.
- × C. palustre + lanceolatum. Reichb. f. Var.: α., la var. β se trouve à Jouy-en-Josas (S.-et-Oise). Route de l'Étang de Vitry à l'Étang-Neuf. (F. de R.) Très rare, parmi les parents.
- (112). Silybum Marianum. Gærnt. Route de la Vieille-Croix à Pontchartrain, près M^t. (Rare).
- X? Carduus acanthoides. L. Chemins à Montrôti, à Méré et à Galluis, près M^t. (avec les parents). Rare.

Bidens cernua. L. — Mares de Gaudigny et du Colombier, (Méré), près M^t. Bords des étangs de Hollande et de Saint-Hubert. (F. de R.) Commun.

(114). Bidens radiata. Thuill. — Sables humides. Bords des étangs des Morues, de Hollande, de Pourras et de Saint-Hubert. (F. de R.) Commun.

S.-Var. minima. C. et G. Étangs de Hollande; (même forêt). Assez commun.

Tanecetum vulgare. D. C. — Bords des rigoles à Chatelvy, près M^t. Berges des étangs de Hollande et de Saint-Hubert. (F. de R.) Assez commun.

Achillea Ptarmica. L. — Fossés, bords des eaux et lieux humides. Galluis, près M^t. Gambayseuil et le Maupas (Saint-Léger). Étang du Sérisaye. (F. de R.) Assez commum.

Chrysanthemum segetum. L.— Moissons et champs en friches. Méré et plaine de M^t. Les Haysettes, Saint-Léger, les Basses-Masures et Poigny. (F. de R.) Commun.

Filago germanica. L. — Talus arides à Montrôti et à Méré, près M^t. (Assez rare).

Var: Canescens. Jord. - Les Haysettes, St-Léger et Poigny.

(Assez rare).

Filago minima. B. de L. — Friches aux Haysettes et à Poigny. (F. de R.) Assez commun.

Filago gallica. - Talus à Montrôti et dans les bois de Pont-

chartrain, près Mt. (Commun).

Senecio silvaticus. L. — Mares-Moussues et Marechantreuil, près M^t. Route du Jardinet à Larchet. Croix Saint-Jacques de Saint-Léger, les Basses-Masures, Poigny et étang du Sérisaye. (F. de R.) Assez commun.

(116). Arnoseris minima. Koch. — Moissons, champs sablonneux. Ferme de Maison-Rouge et les Haysettes, près M^t. Saint-Léger, les Basses-Masures et Poigny. (F. de R.) Assez commun.

Hypochæris glabra. L. — Vieux murs entre Méré et la gare de M¹. Lieux herbeux à Montrôti. (Assez commun).

Tragopogon major. Jacq. — Vieux murs, rue de la Brosse et des Tours, à M^t. Saint-Léger et Gambayseuil. (F. de R.) Assez commun.

Prenanthes muralis. D. C. Vieux murs et talus ombragés. Egremont, Groussay, près M^t. La Noue, près la Mormaire et Gambayseuil. (F. de R.) Assez commun.

(118). Taraxacum palustre. D. C. — Lieux pierreux, humides aux Mares-Moussues. (Plaine de Mt.) Assez rare.

Chondrilla juncea. L. — Montrôti, Méré, Chemin-Vert et Mareil, près M^t. Le Jardinet (Saint-Léger); les Basses-Masures et Poigny. (F. de R.) Commun.

(117). Latuca perennis. L. — Talus d'un pont au Parc d'En-Haut. (F. de R.) Bords des chemins de Galluis à Boissy et à Villiers-le-Mayeux, près M^t. (Assez rare).

Lactuca saligna. L. — Lieux pierreux à Méré, près M^t. (Assez rare). Plus commun à Vicq.

Sonchus arvensis. L. — S. var: elatior, C. et G. — Bords vaseux de l'Etang-Neuf, (Gambayseuil). F. de R. (Rare).

(119). Crepis tectorum. L. - Prés secs à Méré; vieux murs

de la Brosse, du parc de Groussay et de l'Avenue du Chemin de fer de M^t. (Assez rare).

Crepis biennis. L. Prairies artificielles. Méré, les Mesnuls et Galluis, près M^t. Saint-Léger, Gambayseuil et Poigny. (F. de R.) Commun.

Hieracium auricula. L. — Mares-Moussues, plaine de M^t. Bas-Plânest. (Saint-Léger). F. de R. (Assez commun).

Hieriacum lævigatum. Willd. — Var: boréale. (H. boréale.) Fries. — Taillis, routes de Vitry, de Montfort et de Blûches, en allant aux Prés-aux-Princes. (F. de R.) Assez commun.

Rumex maritimus. L. — Sables humides; bords des étangs de Hollande, des Morues, (F. de R.) et de la Grange-du-Bois, (les Mesnuls), près M^t. Commun certaines années.

(120). Rumex palustris. Schreb. — Etangs de Hollande et de Saint-Hubert. (F. de R.) Très rare.

(121). Rumex maximus. Schreb. — Rigole à Beauregard, près M¹. Bords de la Vesgres au Maupas et en allant vers le Jardinet. (Saint-Léger). F. de R. (Très rare).

(122). × Rumex acutus! L. = (Crispus + obtusifolius). — Ferme des Essartons, près M^t. (Rare).

(123). Polygonum mite. Schrank. — Ruisseau du Colombier à Méré, près M¹; bords des étangs des Morues et de Hollande. Gambays. (F. de R.) Rare.

Polygonum minus. Huds. — Sables humides. Etangs des Morues, de Hollande et de Saint-Hubert. (F. de R.) — Assez commun.

Polygonum dumetorum. L. — Haies, buissons. La Millières (les Mesnuls) et chemin du Bois-Renou; haies aux Auberies (Grosrouvres) près M^t. Chaussée de l'Etang-Neuf. (F. de R.) Assez commun.

Parietaria erecta. M. et K. — Vieux murs des parcs de Groussay, du Tremblay et d'Autouillet, près M^t. (Assez commun).

Daphne lanceola. L. — Bois de la Couarde et de Beynes, près M^t. (Rare).

Buxus sempervirens. L. — Taillis. Routes Belsédène et Montavale, près Saint-Léger. (F. de R.). Rare.

Quercus pedunculata, Ehrh. - Forme à glands cuculés.

(Hariot). Bois de l'étang de Hollande. (F. de R.) Rare et localisé.

Salix cinerea. L. — (Forma folio-variegato). Taillis. Côtes de Gambayseuil, en allant vers les Haysettes. (F. de R.) Rare.

(127). Salix repens. L. — Rigoles, tourbières et bords des eaux. Route du « Pont-à-la-Dame » et Etang-Neuf (Gambayseuil). Etang du Roi (Poigny). Routes du Champ-Mauduit, de la Vieille-Chaussée, de la Creuse-Vallée, de la Charmoie et de la Chesnaye (Fontaines-Blanches). Le Maupas (Saint-Léger). F. de R. (Commun). Sous-var.: S. microphylla Thuill. — Fontaines-Blanches et Etang-Neuf. (Assez rare).

(209). Salix incana. Schr. — Bords de l'étang de Coupe-Gorge. (F. de R.) Rare.

Salix ruffinervis. D. C. — (Mêmes localités et observations). Salix lanata. Thuill. — Mêmes localités, le type pur se trouvant surtout au Maupas! (F. de R.) Assez commun.

Salix alba + fragilis = S. viridis. Fr. — Ruisseau entre Méré et Vicq, près M^t. (Assez rare).

× Salix viminalis + cinerea = S. Smithiana, var: nitens. G. et G. Fossés à Gambayseuil. (F. de R.) Très rare.

- (128). × Salix ambigua. Ehrh. (aurita + repens). (Le Maupas et Saint-Léger. Route de la Vieille-Chaussée de l'Etang-Neuf. (F. de R.) Assez rare.
- (129). × Salix multinervis. Döll. = (aurita + cinerea). Taillis de l'Etang-Rompu, près la route aux Vaches et Gambayseuil. (F. de R.) Rare.
- (130). Betula alba. D. var: pubescens. Ehrh. Poigny et autour de l'étang du Sérisaye. (Mares-Moussues) P. de M^t. et Gambayseuil (« Pont-à-la-Dame »). (F. de R.) Assez commun.
- (131) × Populus canescens. Sm. Taillis, bois; route de Gambayseuil à l'étang des Bruyères, dite de la « Vente-aux-Moines ». (F. de R.) Assez commun.

Myrica Gale. L. — Endroits humides, tourbeux et ombragés, bords des étangs. Etangs-Neuf, des Bruyères, de Plânest et du Sérisaye. La Germanie, la Cristinière, la Chesnaye et la Colonie, près Saint-Léger. Bois tourbeux de « Bon-Repos », à Bour-

donné. Routes de la Butte-Rouge, de la Borne, de la Creuse-Vallée, des Sangliers aux Glands, du Champ-Mauduit, de Vitry et surtout des Fontaines-Blanches, vers le fond de la Harasserie, particulièrement aux Carrefours de la Croix-Gilbon et de l'Entonnoir. Prés Jaunot et route du « Pont-à-la-Dame » et au delà de la Croix du Jubilé. (Gambayseuil). Poigny et Guypéreux. (F. de R.) Très commun.

(132). Alisma natans. L. — Mares-Moussues, plaine de M⁴. Etang du Rói (Poigny). F. de R. (Très rare).

(133). Alisma Ranunculoides. L. — Bords des étangs de Hollande (2º chaussée); rigoles aux Fontaines-Blanches. Route de la Charmoie et carrefour du Pacage. (F. de R.) Assez commun, surtout à la dernière localité.

(134). Damasonium stellatum. Rch. — Mares au Chêne-Rogneux et aux Haysettes, route des Quatre-Piliers. (F. de R.) Assez rare.

(136). Tulipa sylvestris. L. — Pelouses ombragées. Parc des Capucins à M^t, où il fleurit rarement. (Assez commun).

Ornithogalum Pyrenaicum. L. — Prairies sylvatiques. Ferme de Chatelvy et chemin du Bois-Renou, près M^t. (Rare).

(135). Gagea arvensis. Sch. — Talus secs et herbeux. Méré à l'entrée de la route de M^t. (Saint-Blaise). Très rare.

Alium ursinum. L. — Saint-Léger, vers le Maupas; et bosquets ombragés du parc de Blainvilliers, aux Mesnuls, près M^t. (Commun).

(137). Mayanthemum bifolium. L. — Bois de la Marechantreuil, au-dessus du « Tourniquet », près M^t. Revers d'un fossé entre l'étang des Morues et la Millières. (F. de R.) Assez commun, mais ne fleurissent pas tous les ans.

Paris quadrifolia. L. — Taillis, près l'Etang-Neuf, (Gambays). F. de R. (Très rare).

Ruscus aculeatus. L. — Bois et endroits couverts. La Joncée, Marechantreuil et « Butte-à-Boutry », près M^t. Etangs des Morues et de Hollande. Routes des Longues-Mares, du Grand-Veneur, Belsédène et Montavale; taillis en face l'Étang-Neuf. (F. de R.) Assez commun.

Loroglossum hircinum. Rch. — Prairies naturelles. Plaine de Mt., près le parc d'En-Haut. (Très rare).

(159). Orchis ustulata. L. — Prairies fraîches. Fermes de la Vignette et de Chatelvy. Saint-Blaise (Méré), Galluis, la Surie, (Grosrouvres) et Chevaux-Morts, près M^t. (Commun).

Orchis Morio. L. — Prairies et clairières humides. Très commun aux environs de M^t. et dans la F. de R.

Orchis mascula. L. — Prairies spongieuses ou fraîches. Chemin-Vert, Grosrouvres et plaine de M^t.; (bois de la Joncée). Prairies sylvatiques au parc d'En-Haut. Le Maupas et Gambayseuil. (F. de R.) Très commun.

— forme à fleurs blanches. « Grimpettes » de la ferme de la Vignette, près M^t. (Rare).

Orchis mascula. L. — var : carnea. — Prairies de la Tuilerie, (plaine de M^t.) Rare.

Une autre forme à éperon très obtus et rappelant par ce caractère l'O. *Morio*, mais d'hybridation douteuse. (Mêmes localités et observations).

- (140). Orchis laxiflora. Lamk. Var. carnea. G. C. Mêmes localités et observations.
- (141). × Orchis Boudieri. G. C. Prairies spongieuses. Chemin-Vert, Chêne-Rogneux, entre Launay-Bertin et Gaudigny, la Surie, près M^t. Prairies sylvatiques. Prés Jaunot, Croixdu Jubilé, étang des Bruyères, bois de « Bon-Repos » à Bourdonné. (F. de R.) Assez commun.
- (142). × Orchis ambigua. Kerner. Chemin-Vert, Galluis et les Auberies (Grosrouvres), près M^t. (Rare).
- × Orchis Morio + mascula. G. C. Prairies humides de la Tuilerie, plaine de M¹. (Rare).
- (143). × Orchis alata. Fleury. Bords herbeux de l'étang des Bruyères. (F. de R.) Rare.
- (144). × Orchis conopsea + mascula. Vieille chaussée de l'Etang-Neuf, en allant vers la route du Champ-Mauduit. (F. de R.) Avec les parents. (Très rare).
- (145). Ophry's muscifera. Huds. Prairies ombragées entre le Moulinet et Garancières, près M^t. (Assez rare).

BELEZE

(147). Ophrys arachnites. Hoff. — Mêmes localités et observation.

(146). Ophrys apifera. Huds. — Mêmes localités et observation.

(148). Gynmadenia viridis. Rich. — Prairies humides. Ferme de la Vignette. Entre Launay-Bertin et Gaudigny; Galluis, Chêne-Rogneux et la Surie (Grosrouvres), près M^t. (Assez commun).

(150). Epipaciis palustris. Crantz. — Bords herbeux de l'étang des Bruyères (Gambays). F. de R. (Assez rare).

(149). Epipactis atrorubens. Hoffm. — Bois d'Egremont, à M¹. et autour du Chêne-Baudet. (F. de R.) Rare.

Neottia nidus-avis. Rch. — Taillis humides au Chêne-Baudet et route de Vitry à l'Etang-Neuf. (F. de R.) Assez rare.

(151). Spiranthes autumnalis. Rch. — Bruyères et Ulex des landes sylvatiques. Chemin du Poteau (Mares-Moussues), plaine de M^t. Ferme des Essartons, près N.-D.-du-Chêne. (Assez rare et disparaissant pendant plusieurs années).

Goodyera repens. R. Br. — Sous Pinus sylvestris L. — Carrefour du Sycomore; routes Croche à Condé, du parc Chevallier, des Callèches. (F. de R.) Assez commun et localisé.

(153 bis). Elodea Canadensis. Michx. — Mare de Bazoche, près M¹. (Assez rare).

(153). Potamogeton Polygonifolius. Pour. — Rigoles, tourbières. Le Maupas et rivière de la Vesgres (Saint-Léger); routes des Quatre-Piliers à l'Etang-Neuf, du Grand-Bouleau, de la Vente-aux-Moines, du Champ-Mauduit; de la Charmoie et de la Chesnaye aux carrefours des Fontaines-Blanches et du Pacage. Etang du Sérisaye. (F. de R.) Commun.

Potamogeton gramineus. L.— Etang de Hollande, (11º chaussée). F. de R. (Rare).

Potamogeton trichoïdes Cham. — Mares entre la route des Quatre-Piliers et celle des Haysettes et « Trou-au-Loup », (la Mormaire). F. de R. Assez commun, surtout à la première localité.

Potamogeton densus. L. Canal du parc du Moulinet (Garan-cières), près M^t. (Assez commun).

Wolfia arihiza. C. et G. Mares des Grands-Coins, (Saint-Léger). F. de R. Très rare (M. Jeanpert!).

Sparganium simplex. Huds. — Rigole de l'Etang-Rompu, à Gambayseuil. (F. de R.) Assez commun.

(154). Sparganium neglectum. Beeby. — Fossés de l'Etang-Neuf. (F. de R. Très rare). M. Jeanpert.

(155). Sparganium mininum. Fries. — Mares-Moussues, plaine de Mt. et étang des Bruyères. (F. de R.) Assez rare.

Juncus fluitans. D. C. — Très commun dans les mares et étangs à fond siliceux de toute la région.

Juncus uliginosus. Roth. — Var : aquatilis C. et G. — Mêmes localités et observation.

(156). Juncus pygmœus. Thuill. — Sables tourbeux; bords des étangs de Hollande et de Saint-Hubert. (F. de R.) Commun. Juncus capitatus. Weig. — Mêmes localités et observations.

(157). Juncus squarrosus. L. — Bruyères humides. Tourbière du Maupas. (Saint-Léger); route du « Pont-à-la-Dame » à celle de l'étang de Vitry et étang des Bruyères (Gambayseuil). Citerne de la Muette, près le carrefour du Sycomore; étangs du Sérisaye (F. de R.) et de Puymardière, (Millemont), près Mt. Assez commun.

Juncus Tanageria L. fils. — Sables humides. Tourbière du Chêne-Rogneux, près M^t. Bords des étangs des Morues et de Hollande. (F. de R.) Assez commun.

Luzula campestris. D. C. — Var: congesta. Lej. — Allées couvertes. Mare-Ronde et carrefour des Ventes-Bizet. (F. de R.) Assez rare.

Luzula pallescens. B. A. — Allées herbeuses de la Mare-Ronde au poteau des Deux-châteaux. (F. de R.) Rare.

Carex Davalliana? Sm. — Sables humides; bords des étangs de Hollande. (F. de R.) Très rare.

Carex pulicaris. L. — Clairières tourbeuses, sous Myrica-Gale. L. — Route de Vitry à l'Etang-Neuf. (F. de R.) Assez commun.

Carex remota. L. — Bords de la rigole de Gaudigny, dans le parc de M. Yvon, à M^t. Assez commun.

(159). Carex elongata. L. - Rigole de Gaudigny et Mares-

Moussues, plaine de M^t. Bords de la Vesgres, au Maupas. (F. de R.) Rare.

× Carex Belezii Lév. et Vnt. = C. Fussii. Simonkai (Enumeratio fl., Trans, vasc crit; p. 548). × C. paniculata + elongata. Bords de la Vesgres, au Bas-Plânest. (Saint-Léger). F. de R. (Avec M. E. Fournier), c'est la première fois que ce curieux hybrique a été signalé en France, (Voy: Bulletin de l'Association française de Botanique, n° 50, 1er juillet, page 145, année 1902. (Très rare).

- (160). Carex canescens. L. Mares Moussues, plaine de Mt. Le Maupas (Saint-Léger). F. de R. (Rare).
- (161). Carex Schreberi. Schranck. Dans les Bruyères. Parc d'En-Haut et les « Brûlins ». (F. de R.) Très rare.
- (162). Carex Goodnowii. J Gay = C. vulgaris. Fries. Mares-Moussues, plaine de M^t; marais à Saint-Léger. (F. de R.) Assez commun.
- (163). Carex maxima. Scop. Rigoles à l'étang de Haute-Bruyère (Saint-Rémy-l'Honoré), près M^t.; et à l'Etang-Neuf; Bords de l'étang des Bruyères (Gambayseuil). F. de R. (Assez commun).

Carex lepidocarpa. Tausch. — Marais au Chêne-Rogneux, près M^t. Assez rare.

Carex Œderi. Ehrh. — Mares-Moussues, plaine de M^t. et Chêne-Rogneux. Etangs des Morues, de Hollande et du Sérisaye. (F. de R.) Commun.

Carex lævigata. Sm. — Plaine de M^t. (Mares-Moussues) et prés Jaunot, à Gambayseuil. (F. de R.) Rare.

Carex pseudo-Cyperus. L. — Bords des étangs des Bruyères, du Sérisaye et du Roi. (F. de R.) Assez rare.

Carex fulva. Good. — Bords de l'étang des Morues. (F. de R.) Rare.

Carex paludosa. Good. — Var.: depepaurata. Mares aux prés Jaunot (Gambayseuil). Rare et localisée. (F. de R.).

(165). Carex ampullacea. Good. — Lieux tourbeux. Le Maupas. (Saint-Léger); et prés Jaunot à Gambayseuil. (F. de R.) Assez commun.

Carex Kochiana. DC .- Tourbière de Maupas. (F. de R.) Rare.

Carex filiformis. L. — Bords de la Vesgres au Maupas et étang de Guypéreux, près Poigny. (F. de R.) Rare.

- (166). Rhynchospora alba. Vahl. Tourbières du Maupas; mares de Villepair; fossés, route des Quatre-Piliers à l'Étang-Neuf (carrefour du Grand-Bouleau); étang du Sérisaye. Guypéreux, près Poigny. (F. de R.) Commun.
- (167). Rhychospora fusca. R. de S. Tourbière du Maupas. (F. de R.) Rare.
- (168). Eleocharis uniglumis. R. Br. Mares de Gaudigny, près M^t. Rare.
- (169). Eleocharis multicaulis. Diet. Fossés tourbeux, à Sphagnum; route des Quatre-Piliers à l'Etang-Neuf, bord de l'étang des Bruyères. (F. de R.) Rare.

Eleocharis ovata. R. Br. — Bords des étangs des Morues et de Hollande. (F. de R.) Commun certaines années.

- (170). Scirpus Bæothryon. Ehrh. Marais en allant vers la Croix-du-Jubilé et prés Jaunot, à Gambayseuil; fossés, route de Quatre-Piliers à l'Etang-Neuf. (F. de R.) Assez rare.
- (171). Scirpus cœspitosus. L. Landes tourbeuses, presque complètement composées d'Erica tetralix. Routes du Grand-Bouleau, du Champ-Mauduit, de la « Vente-aux-Moines », des « Bruyères de Neuville » (très abondant et de haute taille, 35 centimètres) et de la Vieille-Chaussée; autour des Etangs-Neuf et des Bruyères; hauteur normale. (F. de R.) Commun.

Scirpus fluitans. L. — Mares-Moussues, plaines de M^t. Etang du Roi (Poigny). F. de R. (Assez commun).

Scirpus supinus L. — Bords des étangs de Hollande, (2º chaussée). F. de R. (Très rare).

- (172). Scirpus compressus. Pers. Bords herbeux de l'étang des Bruyères. (F. de R.) Assez rare.
- (173). Eriophorum vaginatum. L. Mares-Moussues, plaine de Mt. Assez commun.
- (174). Eriophorum gracile. Koch. Mêmes localités et observation.
- (175). Cyperus flavescens L. Endroits tourbeux. Prés Jaunot et dans ce qui reste de l'ancien étang à Gambayseuil. (F. de R.) Très rare et tendant à disparaître.

Cyperus fuscus. L. — Sables humides; bords de l'étang des Morues. (F. de R.) Commun, certaines années.

(176). Nardus stricta. L. — Prairies du Maupas (Saint-Léger). Mares de Pecqueuse, bruyères tourbeuses de la Vignerie, carrefours des Biennouviennes, des Chevreuils et de la Loge-Posée. Route de la Charmoie aux Fontaines-Blanches, surtout au Carrefour du Pacage. Bords des étangs de Hollande. Carrefours Isoret et Bailly, entre celui du Sycomore et la Croix Saint-Jacques de Saint-Léger. (F. de R.) Commun.

Digitaria filiformis. Kœl. — Champs à Montrôti et à M^t. (Assez commun).

(177). Setaria glauca. P. B. — Champs sablonneux incultes à Saint-Blaise, près M¹. (Assez rare).

Echinochloa Crus-galli. P. B. — Ruisseau du chemin du Colombier, à Méré, près M^t. (Assez commun).

Alopecurus fulvus. — Sm. — Mares de Gaudigny près M^t. et de Villepair. (F. de R.) Assez rare.

Agrostis interrupta P. B. — Chemin-Vert, près M^t. (Assez rare).

Agrostis pumilla. L. Mant. — Route humide du Champ-Mauduit à l'Etang-Neuf. (F. de R.) Assez rare, épillets envahis par un *Uredo*, ce qui doit causer son nanisme.

(178). Calamagrostis lanceolata. Roth. — Etang de Guypéreux, près Poigny. (F. de R.) Très rare. (M. Jeanpert!).

Aira multiculmis. Dumt. — Champs sablonneux entre le Chêne-Rogneux et les Haysettes, près M^t. (Commun).

Deschampsia cœspitosa. P. B. — Bords des eaux, fossés, mares de la F. de R. (Commun). — S.-var: parviflora. C. et G. — Fossés, route de Galluis, chemin du Val et de Gaudigny), près M¹. (Assez rare).

(182). Deschampsia discolor. R. et S. — Mares tourbeuses à Sphagnum, route du Haut-Cornu, en descendant vers les Essartons. (Rare). Chêne-Rogneux et petites mares en face le poste forestier des Quatre-Piliers; (les Haysettes). F. de R. (Assez commun).

Gaudinia fragilis. P. B. - Pelouses, vieux château de Mt.

Bords herbeux des chemins, route de Galluis et à la Marechantreuil. (Rare et peu stable).

Avena fatua. L. — Moissons. (Commun à M^t. et dans toute la région).

Avena pratensis. L. - Prairies entre Galluis et Mt. (Assez

Avena pubescens. L. — Prairies fraîches de toute la région, surtout entre Galluis et Mt., Saint-Léger et Gambayseuil. (F. de R.).

Catabrosa aquatica. P. B. — Ruisseau du chemin du Colombier à Méré; canal du parc de Blainvilliers (les Mesnuls). Petites mares au Chêne-Rogneux, près M^t. Rigoles au Maupas (Saint-Léger) et à l'étang du Sérisaye. (F. de R.) Très commun.

(179). Glyceria plicata. Fries. — Ruisseau du chemin du Colombier, des rues Bizard et Grugeon, à Méré. — Mares-Moussues, plaine de M^t. — Bords de la Vesgres au Maupas. (F. de R.) Assez commun.

Poa compressa. L. — Vieux murs et talus secs à Mt. et dans

toute la région. (Commun).

Poa angustifolia. C. et G. — Lieux incultes à M^t. (Assez commun).

Festuca arundinacea. Schreb. — Bords ombragés d'un fossé aux prés Jaunot de Gambayseuil. (F. de R.) Rare.

F. heterphylla Lmk. Prairie du Maupas, près Saint-Léger. (F. de R.) Assez commun.

Hordeum murinum. L. — Forme à arêtes des épis d'un rose vif. Vieux murs du parc du Lieutel, près M^t. (Rare).

- (185). Lomaria spicant. Desv. Bords d'une rigole à l'étang des Morues, en allant vers la route des Fonds. Routes de l'étang de Vitry, du Haut-Baussard, de Saint-Laurent, du Grand-Veneur et Goron, Gambayseuil. (F. de R) Assez rare.
- (186). Scolopendrium officinale. Sm. Puits au Palais, à la « Brèche-des-Champs, » à la Moutière, à la Mormaire et aux Haysettes. Talus humides de la Butte-Noire à M'. et au « Petit-Moulin » des Mesnuls, près M'. Grotte au parc d'En Haut. (F. de R.) Assez rare. (Quelques échantillons présentent des frondes bifides au sommet et munies de leurs sores; plus rares que le type).

(187). — S.-var. Crispum. C. et G. — Vieux murs humides. Parc des Capucins à M^t. (Rare).

Polystichum oreopteris. D. C. — Bords des étangs de Coupe-Gorge, du Roi et de Guypéreux. (F. de R.) Assez rare.

Polystichum cristatum. Roth. Mêmes localités et observations.

Asplenium Adianthum-nigrum. L. — Assez commun dans les bois des environs de M¹. et dans la F. de R.

Asplenium Filix-fæmine. Bernh. — Chemin creux et humides à Gambayseuil; endroits ombragés au Maupas et bords des rigoles; autour de l'Étang-Neuf et dans l'Etang-Rompu. (F. de R.) Assez commun.

Var. acrostichoideum. Bory. — Prés Jaunot à Gambayseuil. (F. de R.) Rare. (2011).

Nephrodium Thelypteris. Stremp. — Bords de l'étang de Coupe Gorge. (F. de R.) Assez rare.

Aspidium aculeatum. Sw. — Bois humides. Le Maupas, vers la route de la Croix-Patère à la «Butte-à-l'Ane». Petite route Montavale, vers le poteau de la Rotonde. (F. de R.) Assez commun.

(188). Aspidium dilatatum. Willd. — Carrefours Isoretet du Grand-Bouleau. (F. de R.) Rare.

(189). Osmunda regalis. L. — Endroits tourbeux des bois et des prairies. Routes de l'étang de Vitry à l'Etang-Neuf, (sous Myrica Gale); du Champ-Mauduit et du Grand-Bouleau. Marais à Gambayseuil; prés Jaunot et près la Croix du Jubilé, en descendant vers les Fontaines-Blanches. — F. de R. (Assez rare). — Forma — Sporanges disposées en groupes interrompus le long du rachis. — Prés Jaunot de Gambayseuil. (Rare).

(190). Ophioglossum vulgatum. L. — Petit bois à Saint-Léger, du côté du ruisseau. (F. de R.) Très rare.

(191). Pilularia globulifera. L. — Mares au Chêne-Rogneux, près M^t. Bords des étangs de Hollande, (11º chaussée). Etangs du Roi, de Guypéreux et des Bruyères. (F. de R.) Assez commun.

(192). Pilularia natans. Mérat. — Etang du Roi. (F. de R.) Rare.

(193). Equisetum hyemale. — Sables humides d'un talus ombragés: chaussée de l'Étang-Neuf, à l'entrée de la route du Champ-Mauduit. (F. de R.) Assez commun, (mais très localisé).

(194). Lycopodium clavatum. L. - Bruyères montueuses

autour de l'étang du Roi (Poigny). F. de R. (Assez commun). (195). — Forma. — Bruyères montueuses des bois de la Talle, entre les Mesnuls et Saint-Remy-l'Honoré, près M^t. (1). Rare. (196). Lycopodium inundatum. L. — Tourbière du Maupas, Saint-Léger et Étang de Guypéreux. (F. de R.) Assez rare.

Cette Florule est remarquable par la quantité de plantes spéciales caractérisant la végétation occidentale. L'abondance de : Ranunculus reptabundus, Hypericum Desetangsii, Barkhausia setosa, Chondrilla juncea, Carum verticillatam, Drosera intermedia, Geranium pyrenaicum, Radiola linoïdes, Epilobium montanum, Saxifraga granulata, Specularia hybrida, Scutellaria minor, Erica tetralix, Myosotis lingulata, Jasione montana, Lobelia urens, Cicendia filiformis, Armeria plantaginea, Salix repens, Myrica Gale, Potamogeton oblongus, Orchis ustulata, Morio, mascula; Gymnadenia viridis, Goodyera repens, Carex Goodnowii, Œderi; Juncus pygmœus, Rhynchospora alba, Catabrosa aquatica, Deschampsia cœspitosa, Aira multiculmis, discolor, Nardus stricta, Osmunda regalis.

Moins répandues sont les suivantes: Gypsophilla muralis, sagina subulata, Cardamine udicola, Hellianthemum guttatum, Ulex nanus, Genista anglica, Viola canina, Illecebrum verticillatum, Sedum cepæa, Crassula rubens, Comarum palustre, Agrimonia odorata, Epilobium roseum, Phellandrium aquaticum, Gentiana Pneumonanthe, Myosotis lingulata, Veronica triphyllos, Pedicularis sylvatica, Campanula glomerata, Cirsium anglicum, Chrysanthemum segetum, Polygonum minus, Sparganium simplex, Juncus Tanageia, Asplenium — Adianthumnigrum, Pilularia globulifera, Nitella translucens.

Cette riche et intéressante florule a beaucoup de rapport avec la Flore de la Normandie et d'une partie de la Bretagne : c'est l'arrière-garde ou l'avant-garde, selon le point de vue où on se place de la flore de l'Ouest de la France.

Les boues glaciaires et les migrations des Oiseaux du Nord au Sud ont importé des plantes de l'Europe septentrionale et même de la Suède et de la Norvège.

⁽¹⁾ Voy. Bull. Soc. bot. de France. T. XI (1893), p. 211.

HERBORISATIONS.

De Paris-Montparnasse à Rambouillet, (ligne de Chartres). Etangs du Sérisaye, de Coupe-Gorge, Poigny et étang du Roi, et retour par l'étang de Guypéreux.

De Paris-Montparnasse à la gare du Perray: mare du Perray, étangs de Saint-Hubert, Pourras, Hollande; mares de Villepair, et retour par Saint-Léger, le Maupas, les Fontaines-Blanches, la Croix-Patère, la route de la Vignerie, les Grands-Coins et le Perray.

De Paris-Montparnasse à Montfort. (ligne de Dreux): Méré, Galluis, Gaudigny, Marechantreuil, Mares-Moussue et plaine de Montfort; routes de Saint-Laurent et des Longues-Mares; carrefour du Sycomore, route aux Vaches, Etang-Rompu, route de Blûche, étang des Morues, etc.

De Paris à Houdan: Ligne de Granville (Montparnasse). Gambays, Bourdonné, étangs des Bruyères et Neuf, Gambayseuil; retour par les Haysettes, le Chêne-Rogneux, Grosrouvres, la Germanie, les Quatre-Piliers, Houdan.



LISTE DES PLANTES ADVENTICES

De Montfort-l'Amaury et de la forêt de Rambouillet (Seine-et-Oise).

Clematis Flammula. L. — Voisinage des habitations à M^t. (Rare). (1).

C. recta. L. - Lieux incultes à Méré, près Mt. (Rare).

Aconitum Napellus. L. — Prairies humides et bords des eaux à Grosrouvres, près M^t. (Très rare).

Mahonia aquifolium. L. — Nutt. — Haies entre la Guinande et le « Stand » de M^t. (Assez rare).

Papaver somniferum. L. — Ça et là, dans toute la région, mais toujours très rare.

(46). Chelidonum laciniatum. Mill. — Vieux murs à M⁵. (Introduit par moi de graines récoltées aux Essarts-le-Roy et données par M. Ad. Chatin, membre de l'Académie des Sciences). Assez commun.

Fumaria Bastardi. Bor. — Parc de la « Commanderie », à M¹. (Assez rare).

Corydalis lutea. D. C. — Vieux remparts de Houdan. (Seineet-Oise). Assez commun.

Barbarea præcox. R. Br. — Chemin creux du Val, à M¹. (Assez rare).

Hesperis matronalis. L. — Luzernes à Galluis et à Vicq, près M^t; lieux vagues à Saint-Léger et à Gambayseuil. (F. de R.) Assez commun.

⁽¹⁾ Mt. et F. de R. sont les abréviations de Montfort-l'Amaury et de orêt de Rambouillet, centres principaux auxquels correspondent es autres localités.

Sinapis Orientalis. Murr. — Talus à Galluis, près M^t. « Clos-Renard » (Saint-Léger). F. de R. (Rare).

Diplotaxis muralis. D. E. — Champs à Méré, près M^t. (Rare et tendant à disparaître).

Alyssum saxatile. L. — Vieux remparts du xiº siècle à M¹. (Assez commun).

Berteroa incana. D. C. — Lieux herbeux à M^t. et à Saint-Léger. (F. de R.) Assez commun, mais inconstant.

(24). Iberis arvatica. Jord. — Lieux incultes à Mt. (Rare).

Lepidium perfoliatum. — Prairies artificielles à M^t. (Très rare et probablement introduit par les semis).

(20). Lepidium Draba. L. — Champs calcaires entre Boissy et Autouillet, entre Méré et Bicherelle, près M^t. (Assez commun).

Lychnis coronaria. Lmk. — Lieux vagues à Méré et à M¹. (Rare).

Linum usitatissimum. L. — Çà et là dans toute la région. (Très rare).

Althœa officinalis. L. — Haies, voisinages des habitations; Méré, Galluis, les Mesnuls, près M^t.; Saint-Léger et Gambayseuil. (F. de R.) Assez rare.

Œsculus Hippocastanum. L. — Bois, près le poteau du Chênedu-Roi. (F. de R.) Rare.

Geranium pyrenaïcum. L. -- Très répandu dans les endroits herbeux de toute la région.

Oxalis corniculata-foliis-atropurpureis. Hort. — Rues herbues à M^t. (Assez commun).

Cytisus Laburnum. L. — Haies à Saint-Nicolas, près M¹. (Rare, mais constant).

Melilotus alba. Lamk. — Moissons, Méré et Launay-Bertin; entre La Queue et Boissy, près M^t. (Assez commun).

(27). Trifolium elegans. Sav. — Lieux herbeux. Entrée du chemin du Colombier, à Méré. Chemins de culture entre Bardelle et Boissy et à Villiers-le-Mahieu, près M¹. (Assez rare et peu constant).

Trifolium Molinieri. Balb. — Çà et là, dans toute la région. Introduit avec la culture. (Assez commun).

Robinia pseudo-Acacia. L. — Bois des environs de M^t. et poteau des Quenouilles. (F. de R.) Commun.

Colutea arborescens. L. — Talus calcaires de la voie du chemin de fer entre M¹. et Villiers-Nauphle, près M¹. (Assez commun).

Pisum arvense. L. — Bords des chemins à M^t., à Saint-Léger et à Gambayseuil. (F. de R.) Rare.

(31). Lathyrus Nissolia. L. — Talus herbeux; bords des routes; instables dans ses stations. « Maison-Rouge », près la route de Galluis; route des Graviers (Mareil) et de Bretagne, au kilomètre 44! Marechantreuil, près M^t. Route Belsédène, près l'étang de la Porte-Baudet. (F. de R.) Toujours assez peu commun.

Cerasus Padus. D. C. - Haies à Mt. (Rare).

Cerasus Mahaleb. Mill. — Même localités et observations.

Sipriæa Salicifolia. L. — Haies à Gambayseuil. (F. de R.) Rare.

(41). Sorbus domestica. L. — Ferme de la « Vignette », près M^t. et parc d'En-Haut. (F. de R.) Très rare.

Pirus communis. L. — Taillis au parc d'En-Haut. (F. de R.) Très rare.

Onothera biennis. L. — Bords des chemins: « Brèche-des-Champs ». Méré, Galluis, Marechantreuil, près M^t. « Clos-Renard », Saint-Léger. (F. de R.) Assez commun.

O. suaveolens. Desf. — Lieux vagues aux environs de M^t. (Rare).

Sedum dasyphyllum. L. — Vieux murs de l'hôpital de Rambouillet (Seine-et-Oise), où depuis plusieurs années je l'ai vainement cherché.

Ribes rubrum. L. — Bords de la rivière à Houjarré et à Vicq, près M^t. (Assez commun).

R. alpinum. — Haies à Saint-Nicolas, près Mt. (Rare).

Petroselinum sativum. Hoff. — Haies, pieds des murs à M^t. (Assez rare).

Fæniculum officinale. All. — Lieux incultes; Méré, Galluis, près M^t., Vicq et Poigny. (F. de R.) Assez commun.

(52). Turgenia latifolia. Hoffm. — Moissons et luzernes. Entre Méré et Mareil; entre La Queue et Boissy. « Sidi-Tam-Tam » près M^t. (Assez commun).

Lonicera Xyolosteum. L. - Haies de la mare de Gaudigny,

près Mt. (Rare).

L. Tatarica. L. — Vieux murs du parc de Groussay, à M^t. (Rare).

Sambucus racemosa. L. — Bois du Lieutel, près M^t. (Assez commun).

Symphoricarpos racemosa. Michx. — Vieux murs du parc de Groussay et haies à Saint-Nicolas, près M^t. (Rare).

Valeriana Phu. L. — Vieux murs du parc de l'école de Grignon (Seine-et-Oise). Rare.

Centranthus ruber. D. E. — Vieux murs: « Impasse des Jardins. » Remparts du x1° siècle. (Lieu dit les : Poulies), à M¹. (Assez commun).

Valerianella coranata. D. C. — Lieux incultes à M^t. (Rare). Dipsacus fullonum. Willd. — Champs entre Autouillet et Villiers-le-Mahieu, près M^t. (Très rare).

(115). Nardosmia fragans. Rchb. — Endroits argileux-humides au « Bout-Crottu ». (Les Mesnuls), près M^t. (Rare).

Solidago Canadensis. L. — Launay-Bertin, près M^t. et route du « Pont-à-la-Dame, (Gambayseuil), au poteau des Quenouilles. (F. de R.) Assez commun.

Antennaria margaritacea. R. Br. — Lieux vagues à Gambayseuil. (F. de R.) Rare.

Artemisia Absinthium. L. — Bord du « Chemin-Vert », à M^t. (Assez rare).

Pyrethrum Parthenium. Sm. — Vieux murs du canal du château du Mesnils-Saint-Denis, près M^t. (Assez commun).

Echinops sphaerocephalus. L. - Lieux incultes à Mt.

Sylibum Marianum. Gærnt. — Décombres ; route de la Vieille-Croix de Sainte-Apolline. (Ponchartrain), près M^t. (Assez rare).

(113). Ce ntaurea solstitialis. L. — Champs et vignes entre Méré et Gueswillers; entre La Queue et Boissy, près M^t. (Assez rare et disparaissant pendant plusieurs années).

Helminthia Echiodes, Gærnt. — Haies entre Méré et la Guinande, près M^t. (Très rare).

Tragapogon major. Jacq. — Vieux murs à M^t., Saint-Léger et Gambayseuil. (F. de R.) Commun.

Barkhausia setosa. D. C. — Très commun dans toute la région, depuis une douzaine d'années dans les luzernes et les sainfoins.

Vaccinum Myrtillus. L. — Taillis, route Monnereau. (F. de R.) Très rare.

Syringa vulgaris. L. — Haies à Saint-Nicolas et à Méré, près M^t. Vieux dolmen dit la « Pierre Ardroue », (Saint-Léger). F. de R. (Assez rare).

Vinca major. L. — Haies d'un fossé, près la Croix du Bel-Air à M'. (Rare et tendant à disparaître).

Borrago officinalis. L. — Ruines du vieux château de M^t, (type et forme à fleurs blanches). Galluis, Méré, les Mesnuls; lieux incultes, (forme à fleurs bleues). Cette dernière assez commune.

Amsinckia angustifolia. Lehm. — Bois de la « Butte-à-Boutry », (les Mesnuls), près M¹. Talus du mur du parc de l'abbaye des Vaulx de Cernay. (Seine-et-Oise). Assez commun.

Datura Stramonium. L. — Avenue du Chemin de fer de M^t. Ferme de la Vignette et entrée du chemin du Val à M^t. (Assez commun, mais peu stable).

- (80). Antirrhinum majus. L. Vieux murs: La Queue, près M^t. Vieux remparts dits des « Poulies », à M^t. (Assez rare).
- (74). Veronica Buxbaumii. Ten. La Guinande, « Ruelle des Prés », Clos-Isée » et ferme de Chatelvy, près M¹. (Assez commun).

V. montana. L. - Lieux incultes à Rambouillet (Seine-et-Oise). Rare.

Sibthorpia Europæa. L. — Bois, Saint-Pierre-d'Yvettes et des Mollières, aux Essarts-le-Roi. (Seine-et-Oise). Rare.

- (89). Mentha piperita. L. Lieux vagues; chemin du Colombier à Méré, près M^t. (Très rare).
- (90). Mentha rubra. Sm. « Mares-Moussues » et étang de la plaine de M^t. (Assez rare).

Melissa officinalis. L. — Pieds des murailles à Saint-Nicolas et à la Mormaire, près M^t. (Rare).

- (60). Primula grandiflora. Lmk. Parc de Blainvilliers aux Mesnuls. Route Belsédène, au-dessus de Saint-Léger. (F. de R.) Assez commun.
- (61). P. variabilis. Goup. Bois du parc anglais des Capucins et de la Marechantreuil à M^t. (Commun, à fleurs plus ou moins claires ou foncées).
- P. elatior. Jacq. Forme à fleurs brunes. Prairies humides à Beauregard, près M^t. (Très rare).
- (138). Galantus nivalis. L. Prairies sylvatiques au Matz et aux Bréviaires. (F. de R.) Assez rare.
- (181). Avena orientalis. Schreb. Champs en friches à Méré, près M^t. (Très rare).

Panicum miliaceum. L. — Décombres et lieux incultes à Méré, près M^t. (Rare).

Setaria Italica. P. B. - Lieux vagues à Mt. (Rare).

Eragostis Pæoides. Steud. — Entre les rails de la voie de la station du chemin de fer de M^t . (Très commun).

Lolium Italicum. A. Braun. — Çà et là, aux environs de M^t. (Assez commun).

Fagopyrum Tataricum. Gærnt. — Lieux incultes; plaine de M^t. (Rare).

- (24). Euphorbia Lathyris. L. Haies à la « Brèche des Champs », près M^t. (Très rare).
- (125). Euphorbia pilosa. L. Endroits tourbeux et ombragés; route du «pont à la Dame » à Gambayseuil. (F. de R.).

Cannabis sativa. L. — Çà et là, dans toute la région. (Assez commun).

X Populus canescens. Sm. — Bois de l'étang des Bruyères. (F. de R.) Commun.

Pinus sylvestris. - Mêmes localités. (Assez rare).

Larix Europæa. — Bois du Lieutel, près M^t, et des Pleins-Vaulx. (F. de R.) Assez rare.

Abies excelsa. D. C. — Bois du « Clos-Renard », et de la Croix-de-Villepair. (F. de R.) Assez commun.

Acorus calamus. L. - Mares des bois Saint-Pierre-d'Yvettes

et des Mollières, près les Essarts-le-Roi. (Seine-et-Oise). Rare.

Iris germanica. L. — Vieux mûrs, toits de chaumes. La Troche, (Grosrouvres), près M^t. Vieille-Eglise. (F. de R.). Assez rare.

1. pumila. L. — (Mêmes localités et observations).



MOUSSES ET HÉPATIQUES

Des environs de Montfort-l'Amaury et de la Forêt de Rambouillet (Seine-et-Oise)

Hypnum aduncum. Hedw. — Tourbière du Maupas (Saint-Léger). F. de R. (Stérile). *

H. piliferum. Schreb. — Troncs d'arbre, parterre, pieds des murs, dans toute la région; fertile, 8 avril 1875. (Assez commun).

H. lutescens. Huds. — Talus herbeux: a Chemin-Creux-de-Blûche », à M^t. Route du Grand-Maître, près de poteau d'Hollande (F. de R.); fertile, 10 mars 1891. (Assez commun).

H. prælongum. B. E. — Talus de l'Ermitage, à M^t., fertile, 26 février, 1874. (Assez commun).

H. illecebrum. Schw. — Talus route de Saint-Léger, à M^t. (F. de R.) Stérile et assez rare *.

H. splendens. Hedw. — Talus à Saint-Nicolas, près Mt, Sté-rile. (Assez rare).

H. triquetrum. L. — Saint-Nicolas, près M^t. Route des Longues-Mares. (F. de R.) Stérile. (Assez commun).

H. polyganum! Schp. — « Mares-Moussues », plaine de M. 17 mai 1891. (Rare). Talus à M. 4 mai 1890; fertile.

H. glareosum. B. E. — Bords de l'étang des Morues. — Fossés, route de Saint-Léger à M^t. (F. de R.) 26 mars 1891 *. (Rare).

H. tenellum. Dicks. — Rochers, rocailles à M^t. 26 février 1874; (fertile et assez commun).

H. riparium. L. — « Saut-de-Loup » de la Mormaire et parois de citernes à ciel ouvert et à moitié vides, aux Quatre-Piliers. (Les Haysettes), près M^t. (Stérile et rare).

Les plantes marquées d'un * ont été trouvées par M. Jeanpert, le savant botanisse de la région parisienne.

H. albicans. Neck.— « Chemin-Creux-de-Blûche » et route de Saint-Léger à M^t. (Stérile et assez rare).

H. stramineum. Dick. — Tourbière du Maupas à Saint-Léger. (F. de R). Stérile et rare.

H. striatum. Schreb. — « Chemin-Creux-de-Blûche » près M^t. 30 mars 1891; fertile. (Assez rare).

H. confertum. B. L. — Sur les pierres ; « Chemin-Creux-de-Blûche », près M^t.; talus, route Belsédène, près les Morues. (F. de R.) Avril 1894 ; (fertile et assez rare).

H. stellarum. (B. E.). Route du Grand-Bouleau à l'Etang-Neuf. (F. de R.) 30 mars 1903. (Rare).

Neckera complanata. B. E. — Ponts, route Monnereau, 25 mars 1894 *, fertile. — Prairies du Maupas. (St-Léger). F. de R. (Rare).

Fontinalis antipyretica. L. — Citernes aux Quatres-Piliers. Fertile, 3 septembre 1889. Rigoles, route des Fonds. (F. de R.) Stérile et assez commun aux deux localités).

Polytrichum piliferum. Schr. — Vieux murs de la « Brêchedes-Champs », à M¹. Février 1874. (Plante de couleur pourpre vif, fraîche. Fertile et rare).

P. commune. L. — Bruyères au Maupas. (F. de R.) 29 mai 1891 (Assez commun).

P. formosum. Hedw. — Sp. Nov. — Talus du carrefour de la Rotonde. (F. de R.) 18 avril 1896 (fertile et rare).

Atrichum angustatum. B. E. — Talus de la route de Saint-Léger à M¹; 25 avril 1894 (fertile et assez commun).

A. undulatum. Hedw. — Bois autour de la Croix de Villepair; route Monnereau. 11 mars 1891. (F. de R.) Marechantreuil près M^t. (Fertile et assez commun).

Diphyscium foliosum. Mohr. — Talus de l'étang des Morues et carrefour du poteau des Deux-Châteaux, 26 mars 1894 et 16 février 1895 (fertile, très rare).

Tetraphis pellucida. Hedw. — Talus; carrefour des Mares-Gauthiers (F. de R.). 24 mars 1896; (fertile et assez commun).

Aulacomnium palustre! Schw. — « Mares-Moussues » plaine de M¹., et tourbières du « Maupas » (Saint-Léger). F. de R. (Stérile et rare). Vente aux Moines (Gambayseuil), 30 mars 1903; (fertile et assez commun).

Bryum capillare. L. — Murs de la vieille porte du château des Mesnuls, près M^t., 13 février 1897; fertile et rare.

. B. argenteum. L. — Vieux murs, Méré et M^t. Février-mai 1874; fertile et assez commun.

B. pseudotriquetrum. Schw.—Tourbières, «Mares-Moussues» plaine de M^t. et Maupas. (F. de R.) Stérile et assez commun.

B. cæspititium. L. — Parc anglais des Capucins à M^t., 11 avril 1899; fertile et assez commun.

B. albicans. Brid. — Route de Saint-Léger à M^t. (F. de R.) 25 mars 1894^{*}.

B. annoticum. Hedw. — Fossés, route du Champs-Mauduit à l'Étang-Neuf. (F. de R.) 7 août 1898. (Assez rare).

B. rubrum. L. — Par terre et vieux murs, Meré, Galluis et M^t. (Stérile et assez commun).

M. hornum. L. — Autour de l'étang des Morues et route Montavale. (F. de R.) 23 février 1897; (fertile et assez commun).

Philonitis fontana. Brid. — Rigoles de la tourbière du Maupas (Saint-Léger) F. de R., 19 mai 1891.

Bartramia pomiformis. Hedw. — Talus herbeux. Bois de la Marechantreuil, près M^t. Autour de l'étang des Morues. (F. de R.) 20 mars 1874; fertile et assez rare.

Splachnum ampullaceum. L. — Sur les bouses de vaches; tourbière du Maupas (Saint-Léger); (F. de R.) 19 mai et 13 juillet 1891; fertile et assez rare.

Orthotrichum Lyellii. H. et T. Troncs d'arbres, à M^t., 20 avril 1894 (Fertile et assez commun).

O. anomalum. Hedw. — Parc anglais des Capucins à M^t., 10 avril 1888; (fertile et assez rare).

O. leiocarpum. B. E. — Sur un arbre, à M^t. (stérile et rare). Encalypta streptocarpa. Edw. — Pierres d'un petit pont, près l'Etang-Neuf. (F. de R.), 30 mars 1905, et Citerne de la Muette (Saint-Léger). F. de R. (Stérile).

Didymodon rubellus. B. E. — Mêmes localités et dates. (Fertile). Enthostodon ericetorum. Schp. — Bruyères, route du Champs-Mauduit à l'Etang-Neuf. (F. de R.) Idem.

Grimmia orbicularis! B. E. — Mortier de chaux du parapet de la première chaussée des étangs de Hollande. (F. de R.) 10 mars 1891! Fertile et rare; (Localité nouvelle).

Barbula ambigua! B. E.— Talus à Gaudigny près M^t., 29 janvier 1896, (fertile et assez rare).

B. muralis. Hedw. — Vieux murs. Méré, Galluis, les Mesnuls et M^t. Parapet des étangs de Hollande. (F. de R.); mars 1891; (fertile et assez commun).

B. lævipila. Brid. — Ecorce de Populus fastigiata Desf; et talus à Gaudigny à M^t., 22 janvier 1876; (fertile et assez commun).

B. convoluta. Hedw. — Talus de Gaudigny à M^t. 22 janvier 1896. — Bois des Morues. (F. de R.) 6 mars 1879; (fertile et assez commun).

B. inermis. Bruch. — Talus sablonneux; bois du Lieutel

près Mt., 24 mars 1897; (fertile et assez rare).

B. vinealis. Brid. — Forme nouvelle. — Vieux murs du chêteau des Mesnuls, près M^t., 13 février 1896 (fertile, rare).

Webera nutans. Hedw. — Tourbières de la « Vente-aux-Moines » (Gambayseuil). (F. de R.) 30 mars 1903 (Assez rare).

Leptotrichum pallidum. Hpe. — Coupes des petits bois à Méré et à M^t., Avril-mai; (fertile et rare).

Dicranum undulatum. B. E. — Carrefours des poteaux de la Rotonde et du Chêne-Montavale. Landes du Maupas.(F. de R.) Stérile et rare.

D. spurium. Hedw. — Bois de Pins des Fontaines-Blanches. (F. de R.) Stérile *

Dicranella heteromalla. Schp. — Route herbeuse de la Verrerie à la plaine de Bullion, près l'étang de la Tour. (F. de R.) 15 décembre 1891; (fertile, assez commun).

Fissidens bryoides. Hedw. — Talus, « Chemin-Creux-de-Bluche, à M^t.; 17 janvier 1896; (fertile, assez commun). Route du Champs-Mauduit à l'Etang-Neuf, 30 mars 1903. (F. de R). Fertile.

F. adianthoides. Hedw. — Marécages; route du Grand-Bouleau à l'Etang-Neuf. (F. de R.) Assez rare, mais fertile, 30 mars 1903.

Pottia cavifolia. Ehrh. — Talus sablonneux; bois du Lieutel, près M^t.; 24 juin 1896 (fertile et rare.)

Phascum muticum. Scred. — Talus à Saint-Léger et à Gambayseuil. (F. de R.) 20 mars 1895. Marechantreuil près M^t. (Assez commun). Fertile.

P. subulatum. L. — Talus humides; carrefour du poteau des Deux-Châteaux. (F. de R.) 5 mars 1896; (fertile et assez rare).

Sphagnum cuspidatum. Ehrh. Var: submersum. Sch. — Gambayseuil, Ventes-aux-Moines. (F. de R.) 30 mars 1903 avec M. F. Camus.

- S. subnitens. R. et N. Gambais, étang des Bruyères; 30 mars 1903, avec M. F. Camus. Prés Jaunot. (F. de R.).
- S. tenellum var: Klingii (F. de R.). Gambayseuil, Vente-aux-Moines. (F. de R.), 30 mars, avec M. F. Camus.
- S. recurvum. P. B. Var mucronatum. Rust. S. et C.— (F. de R.) Gambayseuil, Vente-aux-Moines, 30 mars 1903, avec M. F. Camus.
- S. Gravetii Rusf. (F. de R.), étang des Bruyères. Gambay-seuil, Vente-aux-Moines, 30 mars 1903, avec M. F. Camus. (Ces quatre dernières espèces et variétés sont assez rares et localisées).

HÉPATIQUES

Jungermannia crenulata. Sm. — Talus à Hollande, à Villepair et à Gambayseuil. (F. de R.) 14 mars 1866 (fertile et assez commun).

J. exsecta. Schm. — Talus, près de la route des Barillets, (sous Pinus sylvestris) * (F. de R.) Stérile.

J. incisa. Schrad. — Par terre; route Belsedène près l'étang des Morues. (F. de R.) Stérile et assez rare.

J. inflata. Huds. — Rigoles de la tourbière du Maupas à Saint-Léger. (F. de R.) Stérile; (assez commun).

J. ventricosa. Dict. — Carrefour de l'Entonnoir et à Saint-Léger. (F. de R.) 25 mars 1894; (fertile, assez commun).

J. bicrenata. Lindl. — Talus sablonneux; poteau des Deux-Châteaux. (F. de R.) 5 mai 1896 (fertile et assez commun).

Chiloscy phus poly tanthus. Borda. — Rigoles de la tourbière du Maupas et route de l'Étang-Neuf. (Fertile), 30 mars 1903. (F. de R.) Stérile assez commun.

Fossombronia pusilla. Dum. — Talus du «Chemin-Creux-de-Blûche » à M¹., 6 mars 1887 (fertile et rare).

Fegatella conica Hoffm.— Source du ruisseau du Colombier à Méré, près M^t. (Stérile, rare).

Reboulia hemisphærica. Raddi. — Talus humides, ombragés. « Chemin-creux-de-Blûche », près M^t. 5 mai 1887; (fertile, assez rare).

Pellia épiphylla. Corda. — Vieux murs humides et rigoles

du parc des Capucins à Mt. (Stérile, assez commun).

P. Calycina. Nees. — Rigoles de la tourbière du Maupas. (F. de R.); stérile et assez commun.

Aneura pinguis. Dum. — Talus humides; parc des Capucins à M^t. (Stérile et assez commun).

LICHENS

De la Forêt de Rambouillet et des environs de Montfort-l'Amaury

D'après M. Acloque (1), les Lichens pourraient servir de criterium pour savoir la pureté de l'atmosphère d'une localité, à cause du choix qu'ils sont obligés de faire d'une station réunissant diverses conditions, et la nature de ces conditions, très analogues à celles qui favorisent le mieux l'évolution de l'organisme animal, amène ce résultat que toute localité habitée par des Lichens, est également saine pour nous, et que toute localité où les Lichens ne se rencontrent pas, ou se rencontrent seulement dans un état imparfait, est malsaine pour nous,

La végétation lichénique deviendrait ainsi une sorte de criterium pour reconnaître la pureté de l'air, et pourrait fournir un hygiomètre impeccable. C'est par ce moyen, que M. Nylander, a pu établir le degrès de salubrité du jardin du Luxembourg, à Paris : les marronniers de l'allée de l'Observatoire y sont surtout remarquables par les nombreux Lichens qui couvrent leurs écorces, et ce, en telle abondance, qu'il faut aller en dehors de la Ville pour trouver quelque chose de semblable. Cette circonstance autorise certainement à affirmer que la partie du Luxem-

⁽¹⁾ Bull. de la Soc. Bot. de France, 1866, t. XIII, p. 365.

bourg dont nous parlons est le lieu le plus sain de tout Paris. Ces Lichens corticoles (surtout Borrea et Physcia), sont tellement communs sur les arbres et arbustes, tels que Pommiers, Poiriers, Pruniers, Aubépines et jeunes cépées, autour de Montfort-l'Amaury (S.-et-O.), et dans certaines parties de la forêt de Rambouillet, particulièrement au Chêne-Rogneux et au Parc d'En-Haut, ainsi que dans les taillis autour de la Citerne de la Muette, près Saint-Léger, qu'ils finissent par les faire périr. Si, comme l'affirme M. Nylander, cette abondance est un signe de l'état de pureté de l'air, ces localités doivent être les plus saines des environs de Paris.

Les Pins et Sapins, qui végètent à de hautes altitudes, dans les Alpes et les Pyrénées, sont aussi envahis, par une espèce de Lichen, l'Usnea barbata, qui les font paraître comme couverts de longues franges grisâtres. Ce fait viendrait encore à l'appui de l'affirmation du savant Lichénographe, car, à ces hauteurs, l'air est d'une pureté et d'une limpidité parfaites, par conséquent d'une salubrité presque absolue (1).

Usnea florida (L.). Hoffm. — Sur Cedrus Libani. L. Parc de la Maisonnette à M¹., 23 sept. 1897. (Assez rare).

Bæomyces roseus. (Pers). — Chemin du Poteau, plaine de M^t., routes Belsédène et de Saint-Léger à M^t. (Assez commun), août-septembre.

Ramalina fastigiata. (Pers). Ach. — Sur un pommier à Montrôti et environs de M^t., 8 avril 1875. (Assez commun).

Cladonia sylvatica. (Linn.) (Rabent) — Bruyères de Neuville, par terre. Bois des étangs de Hollande, route des Sept Chênes, (F. de R.), Bois d'Egremont, près M^t. (Assez rare).

⁽¹⁾ M. l'abbé Harmand, le savant Lichénographe a bien voulu déterminer exactement mes échantillons, et je suis heureuse de pouvoir lui adresser ici mes meilleurs remerciements. Comme pour la « Liste des Mousses et des hépatiques », F. de R. et Mt., sont les abréviations de Forêt de Rambouillet et de Montfort-l'Amaury, centres principaux, auxquels correspondent les autres localités.

Cladonia furcata (Huds). - Schrad. - Talus sablonneux, bois d'Egremont, près Mt., 7 avril 1875. (Assez commun).

Cladonia uncialis (Hoffm). - Landes des Bruyères de Neuville (Gambays) F. de R. (Assez rare). on salth and salth and

Cladonia gracilis (L.) (Vild.). - Dans les Sphagnum. Mares de Villepair. (F. de R.), 6 octobre 1879. (Assez rare).

Cladonia bacillaris. (Nyl). - Landes de Bruyères tourbeuses entre l'Etang-Neuf et la Butte-Rouge. (F. de R.) 1er août 1875. (Rare). Section as four above to (1974) assuingues seconds

Ramalina fraxinea (Ach). - Forma luxurians (Del). Sur des arbres de la Pommeraie. (F. de R.) près l'Etang du Serisaye avril 1875. (Admirablement fructifié). Assez commun.

Platysma sæpincola? (Ehrh). - Sur Cedrus Libani; parc de

Groussay, à Mt. (Rare).

Peltygera polydactyla. (Hoffm) (Neck). - Bois; par terre. Egremont et Méré, près M'., 20 mars 1874. (Assez commun). Pelty gera rufescens. (Neck) (Hoffm). - Talus herbeux; bois de la Marechantreuil, près M¹., 10 août 1887. (Rare).

Parmelia pilosella sp. nov. (Hue). - Vieux arbres à Mon-

trôti, près Mt., mars 1874. (Très rare).

Parmelia dubia. (Wulf) (Lehm). - Vieux troncs; layon des Sept-Chênes. (F. de R.) 14 février 1894. (Assez rare).

Parmelia trichotera. sp. nouv. (Hue). - Sur des Pommiers,

Méré, près Mi., 29 mars 1874. (Très rare).

Parmelia sulcata. (Tayl). - Troncs de Pommiers à Montrôti, près Mt. Vieux arbres, route des Sept-Chênes. (F. de R.) 8 avril 1875, 14 février 1894). Assez commun).

Parmelia prolixa. (Ach.). - Vieux toits en ardoises à M1.,

4 juillet 1897. (Rare localisé).

Physcia venusta. (Nyl). - Vieux murs à Mt., 13 février 1874, écorce des Ormes de la plaine de Mt., 6 novembre 1889, sur un tronc d'Abies excelsa DC. Jardin à Mt., 8 avril 1876. (Assez rare).

Physcia tenella. (Scop). (Lehœr). - Vieux arbres. Bois à

Méré, près Mt., 18 février 1874. (Assez commun).

Physcia aipolia. Ehrh.) Nyl. - Sur un arbre. Parc de Groussay à M'. Sur un arbre à Montrôti. Ormes de la plaine de M'., 16 avril 1875. (Assez commun).

Physcia pityrea. (Ach.) (Lam). — Vieux arbres, parc à M^t., 12 mars 1889. (Assez commun).

Physcia stellaris. (L.) (Nyl). — Vieux arbres du parc de Rambouillet. Bois d'Egremont, près M^t., mars 1875. (Assez rare).

Physcia leptalea (Ach). — Sur une table de pierre à M^t. (Assez rare).

Lecanora citrina (Ach). — Vieux murs à M^t., 12 avril 1876. (Assez commun).

Lecanora ferruginea. (Nyl). — Vieux troncs, route des Sept-Chênes. (F. de R.), 17 décembre 1889. (Assez rare).

Lecanora galactina. (Ach). — Vieux murs à M^t. 20 février 1874. (Assez rare).

Lecanora campestris. (Hue). — Vieux murs en mortier de chaux à M^t., 20 février 1874.

Lecanora intumescens (Hue, Reb). — Jardin à M^t., 12 mars 1899. (Assez rare); sur écorce de pommier et de cerisier.

Lecanora abella. Ach. — Vieux arbres; layons des Sept-Chênes. (F. de R.), 14 mars 1888. (Assez commun).

Lecanora angulosa. (Ach). — Vieux arbres; route aux Vaches (F. de R.), 15 avril 1889. (Assez commun).

Lecanora parella. (Ach). — Sur des grès; anciennes bornes fleurdelysées des Routes Royales; (chaussée de l'étang de la Tour, près Vieille-Eglisé). F. de R., 10 novembre 1891. (Assez rare).

Lecanora atra. (Ach). Rochers à M^t., 25 février 1878. (Assez rare).

Urceolaria scruposa (L.) (Ach). — Sur le mortier de chaux. Vieux murs à M^t., 16 février 1874, 20 avril 1875. (Assez rare).

Pertusaria leioplaca (Ach). (Lehaer). — Ecorces de Carpinus Betulus L. Layon des Sept-Chênes. (F. de R.), 10 mars 1888. (Assez commun).

Pertusa ria scutella (Hue). — Ecorce d'un tilleul; cour de l'école des garçons de M^t., 6 février 1889. (Assez commun).

Pertusaria amara (Ach.). — Vieux arbres de la F. de R., avril-mars 1889. (Vieux charmes); route aux Vaches, avril 1889. Vieux chênes, route de Sept-Chênes. (F. de R.), mars 1889. (Assez commun).

Plhyctis agelæa (Ach. Krb.). — Sur les arbres morts; route aux Vaches. (F. de R.), 14 avril 1888. (Assez rare).

Lecidea parasema (Ach.) (Nyl.). — Ecorces de Charmes et de Platanes, à Mt., 6 février 1888. (Assez commun).

Opegrapha Betulina (Sm.). — Sur un Cerasus Padus, parc à M^t., 16 avril 1875. (Assez rare.)

Collema flaccidum (Ach.). — Bords des fossés entre Villepair et les Mares-Gauthier. (F. de R.), 8 août 1888. (Rare).

Collema furvum (Ach.). — Sur une borne en grès à M¹., 4 avril 1876. (Très rare aux environs de Paris). Indigène dans le Dauphiné.

Lepra chlorina (Schaer). — Sur des grès sablonneux; Rochers-Marquants, près M^t., 9 octobre 1893. (Assez commun).

Lepra lactea. D. C.—Vieux troncs d'arbres. Ponts-Quantin. (F. de R.), 18 octobre 1888. (Assez rare).

Lepraloma lanuginosum (Nyl.). — Sur le mortier de chaux et sur les Mousses. Vieux murs à M^t., 12 avril 1876. Talus route de Saint-Léger à M^t., 18 octobre 1888. (Assez rare).



CHAMPIGNONS SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS (1)

De la forêt de Rambouillet et des environs de Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise)

Amanita verna. Fr. — Prairies sylvatiques, parc d'En-Haut. (F. de R.), 6 septembre 1891. (Assez rare.)

A. solitaria. B. — Bois de l'étang des Bruyères. (F. de R.), 1er octobre 1897. (Assez rare).

A. puellaris. Pers. — Bois, près l'étang de la Porte-Baudet ou des Morues, 8 octobre 1900, et autour de l'étang des Bruyères (F. de R.), 3 octobre 1901. (Assez rare et surtout localisé).

A. mappa. Fr. — Var: vetusta. Boud. — Dans l'herbe, route aux Vaches aux étangs de Hollande. (F. de R.), 31 août 1901. (Assez rare).

A. aspera. Fr. — Talus humides, routes des Fonds, près les Morues. (F. de R.), 7 octobre 1901. (Assez rare.)

A. exelsa. Fr. - Id., 9 novembre 1899. (Rare.)

A. spissa. Fr.— Talus sablonneux; bois du Lieutel, près M^t., 30 mai 1901. (Rare).

A. venenosa B. - Parc d'En-Haut. (F. de R.), 3 octobre 1874. (Rare).

A. rubescens Fr. — (Sous trois formes). Bois de l'étang des Bruyères (F. de R.). 15 octobre 1898.

Lepiota illinita Sch. — Pelouses, parc de Groussay, près M^t., 2 octobre 1901; route des Longues-Mares. (F. de R), 26 décembre 1900. (Assez rare).

L. excoriata Sch. — Pelouses, parc de Groussay, près M^t., 2 octobre 1901; bois du Lieutel, près M^t., 7 décembre 1901 (Assezrare).

Lepiota clipeolaria B. — Bois de l'étang des Bruyères. (F. de R.), 15 octobre 1898.

L. rhacodes Vitt. — Dans l'herbe; route de Vitry, en face du parc d'En-Haut. (F. de R.), 26 novembre 1900. (Assez rare).

⁽¹⁾ La florule fongique de cette région a beaucoup d'affinité avec celle de la Sologne, d'après M. E. Boudier, le savant mycologue de Montmorency, dont la science égale l'amabilité, M¹. et F. de R., sont les abréviations de Forêt de Rambouillet et de Montfort-l'Amaury, centres principaux auxquels correspondent les autres localités.

L. cristata Boud. — Bois de l'étang des Bruyères. (F. de R.), 8 octobre 1900. (Assez rare).

L. mastoidea Fr. — (Idem).

L. helveola Bres. — Type et var. amiantina Scop. (Assez rare), 7 octobre 1902 (Idem.).

Tricholoma sulfureum B. - Bois de l'étang des Bruyères sous

Pinus sylvestris L. (F. de R.), 3 octobre 1901. (Rare).

T. equestre L. — (Sous Pinus sylvestris L.). Poteau des Deux-Châteaux. (F. de R.), 9 novembre 1901. (Rare).

T. nudum B. — Planches de Daucus Carota L. Jardin à M^t., 9 octobre 1901; Bois de la Marechantreuil, près M^t, 18 novembre 1901 (Assez commun).

T. albo-brunneum Boud. — Feuilles tombées; dépression de la route du Chêne-Baudet à la Mare-Ronde, 18 octobre 1901. (Rare).

T. portentosum Fr. — Parmi les feuilles tombées. Bois de la Marechantreuil, près M^t., 18 novembre 1904. (Rare).

T. carneum B. — Mares desséchées, route du Chêne-Baudet à la Mare-Ronde. (F. de R.), 18 octobre 1901. (Rare).

T. arcuatum B. — Jardins à Mt., 3 décembre 1900. (Assez rare).

T. humile Fr. - Prairies, près l'étang du Bois-Nivert. (F. de R.)

14 décembre 1900. (Assez rare).

T. terreum Sch. — Bois de l'étang des Bruyères, 3 octobre 1901; route du Chêne-Baudet à la Mare-Ronde. (F. de R.), 8 octobre 1901. (Assez commun).

T. rutilans Sch. - Bois de l'étang des Bruyères. (F. de R.),

1er octobre 1897. (Rare).

T. grammopodium B. - (Idem).

T. leucocephalum Fr. — Route des Fonds aux Mesnuls. (F. de R.). 1er octobre 1897. (Assez rare).

T. cinerascens B. — Route des Fonds aux Mesnuls. (F. de R.), 6 novembre 1899.

T. aggregatum Sch. - (Idem.).

T. amarum. Fr. — Bois de l'étang des Morues (F. de R). 19 septembre 1874 et 5 nov. 1901. (Rare).

T. immundum. Fr. — (Idem) Saint-Léger et Marechantreuil, près M^t. Assez commun. (F. de R.), 9 novembre 1899.

T. ustale. Fr. — Carrefour Bailly (F. de R.), 9 novembre 1899. (Assez rare).

T. subpulverulentum. B. — Bois sablonneux de la Marechantreuil, près M¹., 5 novembre 1901. (Rare).

Collybia butyracea. B. — (Type). Sous Pinus sylvestris. L. Routes de Longues-Mares, 6 novembre 1900; des Fonds, près les Morues, 7 octobre 1901; carrefour du poteau des Deux-Châteaux, 9 novembre 1901; route du Chêne-Baudet à la Mare-Ronde, 18 octobre 1901. (Assez commun).

C. fusipes. B. — Bois autour de l'étang des Morues, 2 octobre, route de l'Etang-Neuf et du Chêne-Baudet, (Gambays). (F. de R.), 3 octobre 1901. (Assez rare).

C. semitalis. Fr. Chemin sablonneux; bois de la Marechantreuil, près M^t, 5 novembre 1901. (Assez rare).

C. dryophila. Fr. — Bois de l'étang des Bruyères. (F. de R.), 13 octobre 1898. (Assez commun).

C. butyracea. B. — Var: Phæopodia. Boud. — Bois de l'étang des Morues. (F. de R.), 22 novembre 1899. (Assezrare).

C. atrata. Fr. — Bois du Carrefour de Sycomore. (F. de R.), 1er octobre 1897. (Assez commun).

C. tuberosa. Fr. — (Sur Ramalina calicaris. Hoffm). Bois du Lieutel, près M^t., 25 août 1899. (Rare).

Laccaria lacata Scop. (forma).— Chapeau aplati, stipe fascié, tordu, et marqué de rides héliçoïdales. — Dans l'herbe. Mare-Ronde. (F. de R.), 24 septembre 1874. (Rare).

L. amethystea. Vaill. — Bois entre les Fonds et la Mare-Ronde. (F. de R.), 7 octobre 1902. (Commun dans cette localité).

L. var. proxima. Boud. — Bois du carrefour Bailly. (F. de R.), 6 novembre 1899; de l'étang des Bruyères, des Pleins-Vaux, etc. (Assez commun).

Clitocy be nebularis. Bastch. — Bois de la Marechantreuil, près M^t., 5 novembre 1901. (Assez commun).

C. odora. B. — Dans les herbes du fossé, entre le Chêne-Baudet et la Mare-Ronde, 18 octobre 1901. Bois de l'étang des Bruyères et du Carrefour de Sycomore. (F. de R.), 5 novembre 1901. (Rare).

C.inversa. Scop. - (Mêmes localités et dates, mais plus commun).

C. gigantea. Sow. — Prairies sylvatiques à Grosrouvres, près M^t., 18 juillet 1894. (Rare).

C. geotropa B. — Prairies de Bluche à Mt., 22 août 1874. (Assez commun).

C. candicans. Pers. — Bois autour de l'étang des Bruyères. (F. de R.), 22 octobre 1902. (Assez rare).

C. Cyathiformis. B. — Dans l'herbe route de Vitry, près le parc d'En-Haut. (F. de R.), 11 décembre 1900. (F. de R.), Assez rare.

C. nelularis. Bastch. — Carrefour Bailly. (F. de R.), 9 novembre 1899. (F. de R.). Assez commun.

C. detrusa. Fr. — (Idem).

C. phyllophila. Fr. — Sur feuilles pourries; « Mares-Moussues », plaine de M¹., 4 juillet 1897. (Assez commun).

Mycena mucor. Batsch. — Dans la mousse; carrefour de la Mare-Ronde. (F. de R.), 12 octobre 1874. (Assez commun).

M. acicula. Sch. — (Mêmes localités, dates et observations).

M. vitilis. Fr. — Dans l'herbe; route de l'étang de Vitry, en face du parc d'En-Haut. (F. de R.), 19 novembre 1900. (Assez commun).

M. Galopus. Fr. — (Mêmes localités et observations), 14 décembre 1900, et aussi sous Pinus sylvestris L. Bois de la Marechantreuil, près M¹., 5 novembre 1901.

M. galericulata. Scop. — Bordures de buis ; jardin à M^t., 24 juillet 1901, dans l'herbe ; bois de la Marechantreuil, près M^t., 5 novembre 1901. Route du Chêne-Baudet à la Mare-Ronde. (F. de R.), 18 octobre 1901. (Assez commun).

Hebeloma sinapizans. Paul. — Dans l'herbe; autour de l'étang des Bruyères. (F. de R.). Assez rare.

H. versipellis. Fries. — (Idem).

H. mesopheus. Fr. — (Idem, plus rare).

H. longicaudum. Pers. - (Idem).

M. pura. Pers. — (Type). Sous Pinus sylvestris L. Carrefour des Deux-Châteaux. (F. de R.), 9 novembre 1901. (Assez commun).

Omphalia pyxidata. B. — Dans l'herbe; berges de l'étang du Bois-Nivert. Plaine de M^t., 1^{er} juillet 1901. (Assez rare).

O. pseudo-androsacea. B. — Mares desséchées. Route du Chêne-Baudet à la Mare-Ronde, 18 octobre 1901. Berges de l'étang des Bruyères. (F. de R.), 3 octobre 1901. (Assez commun).

Pleurotus sapidus. Kalch. — Sur vieilles souches d'Ulmus campestris. L. — Berges de l'étang du Bois-Nivert, près M^t., 1^{er} juillet 1901. (Rare).

Pl. ostreatus. Jacq. — Sur un vieux pommier à M^t., 22 novembre 1874.

Leptonia cærulata. Q. — Talus du faux chemin en face l'étang des Bruyères. (F. de R.), 10 oct. 1904. (Rare et localisée).

Hygrophorus cossus. Sow. — Prairies sylvatiques aux Essartons, près M^t., 8 décembre 1901. (Assez rare).

H. coccineus Sch. — (Mêmes localités, dates et observations).
H. chlorophanus. Fr. — Bois de la Marechantreuil, près M^t.,
5 novembre 1901. (Assez rare).

H. Hypothejus. Fr. — Sous Pinus sylvestris L.; bois de la Marechantreuil, près M^t., 18 novembre 1901, et routes des Fonds. (F. de R.). Rare.

H. mesotephrus. Berck. — Bois à M^t., sur vieilles souches, 19 septembre 1875. (Assez commun).

H. conicus. Scop. — Bois de Pinus sylvestris. L. — Carrefour du Sycomore. (F. de R.), 9 novembre 1899. (Assez commun).

Cantharellus aurantiacus. Wulf. (Type).—Sous Pinus sylvestris L. — Bois de la Marechantreuil, près M^t., et poteau des Deux-Châteaux. (F. de R.), 15 octobre 1898. (Assez rare).

Nyctalis asterophora. Fr. Sur Boletus luteus. L. — Bois du parc d'En-Haut. (F. de R.), 4 août 1899. (Rare).

Lactarius serifluus. Fr. Sous Pinus sylvestris. L. — Poteaux des Deux-Châteaux. (F. de R.), 9 novembre 1901. (Assez rare).

L. torminosus. Sch. — Bois autour du poteau de la Rotonde. (F. de R.), 20 septembre 1874. (Assez commun). — Forme décolorée; bois de l'étang des Bruyères. (F. de R.), 20 octobre 1898. (Rare).

L. subumbonnatus. Boud. — Bois du carrefour du Sycomore. (F. de R.), 9 novembre 1898. (Assez commun).

L. subdulcis. — Bois sablonneux de la Marechantreuil, près M^t., 5 novembre 1901. (Assez commun).

Bois du carretour Bailly. (F. de R.), 6 novembre 1899. (Plus rare).

L. blennius. Fr. — Route du Chêne-Baudet à la Mare-Ronde, 18 octobre 1901. Autour de l'étang des Bruyères. (F. de R.), 3 octobre 1901. (Assez commun).

L. vietus. F. - (Mêmes localités et dates). Assez rare.

L. rufus. Scop. — (Idem).

R. adusta. Pers. — Routes du Chêne-Baudet à la Mare-Ronde, 2 octobre 1901; de l'étang des Bruyères. (F. de R.), 3 octobre 1901. (Assez commun).

R. delica. Fr. — (Mêmes localités, dates et observations).

R. emetica. Sch. — Pieds de Carpinus Betulus. L. Parc de Blûche, à M^t., 4 octobre 1901. (Assez rare).

R. depallens. Pers. — Bois de l'étang des Bruyères. (F. de R.). Assez rare.

R. violacea. Quel. — Mares desséchées, sous feuilles pourries, route du Chêne-Baudet à la Mare-Ronde, 18 octobre 1901. (F. de R.). Taillis du parc de Groussay, près M^t., 2 octobre 1901. (F. de R.). Assez rare.

R. Queletii. Fr. — (Sous Pinus sylvestris. L. (Mêmes localités, dates et observations).

R. serotina. Quel. — Vieux Fagus sylvatica. L. Bois de la Marechantreuil, près M^t., 5 novembre 1901. (Assez rare).

R. punctata. Sch. — Parc de Groussay à M^t., 30 septembre 1897. (Assez rare).

R. integra. L. — Bois du carrefour du Sycomore. (F. de R.), 1er octobre 1897. (Rare).

R. purpurea. G. — (Idem). Rare.

R. sanguinea. B. — (Idem). Assez rare.

R. cyanoxantha. Sch. — (Idem). Assez commun.

R. rubra. Fr. — (Idem). Rare.

R. fragilis. Var: violacea. Q. — Bois de l'étang des Bruyères. F. de R.), 15 octobre 1898. (Assez commun).

R. ochroleuca. Pers. — Mêmes localités, observations et dates.

BELEZE

R. Dryneia. Boud. (Id.).

R. lutea. Huds. — Bois du carrefour du Sycomore. (F. de R.), 1er octobre 1897. (Assez rare).

Marasmius ramealis. B. — Sur branchettes mortes. Bois de la Rotonde. (F. de R.), 30 septembre, 1897. (Rare).

M. épiphyllus. Pers. — Sur feuilles d'Hedera Helix. L. Parc de Blûches, à Mt., 4 décembre 1901. (Assez rare).

Lentinus contortus. Fr. — Marechantreuil, près M^t, 10 novembre 1899. (Assez rare).

L. tigrinus. L. — Parc de Groussay, près M^t., 30 septembre 1897. (Rare).

Volvaria speciosa. Pieds de Tilleuls à M^t., 24 mai 1903. (Assez commun, mais localisé).

Panus violaceo-fulvus. Batsch. — Idem, 8 octobre 1900. (Assez rare).

Pholiota radicosa. B.— Dans une mare desséchée, sous feuilles pourries. Route de la Mare-Ronde au Chêne-Baudet. (F. de R.) Magnifiques échantillons. (Assez commun), 18 octobre 1901.

P. destruens. Brond. — Pieds des arbres. Parc de Groussay, près M^t., 18 novembre 1900. (Assez rare).

P. adiposa. Fr. — Vieux arbres; parc de Groussay à M^t., 30 septembre 1897. (Assez rare).

P. aurivella. Fr. — Entre Gueswiller et Méré, près M^t., 27 octobre 1899. (Assez rare).

P. ægerita. Poit. - Mt. (Idem).

P. marginata. Batsch. — Vieux arbres; parc de Groussay, près M¹., 3 septembre 1897. (Assez commun).

P. mutabilis. Sch. — (Idem et routes des Fonds à la Mare-Ronde). (F. de R.), 7 octobre 1902.

Cortinarius multiformis. F. — Bois de l'étang des Bruyères. (F. de R.), 1° septembre 1897. (Assez rare.)

C. triumphans. F. — Bois du carrefour du Sycomore. (F. de R.), 1er septembre 1897. (Assez commun).

C. prasinus. Sch. — (Idem).

C. imbutus. Sch. — Bois de l'étang des Bruyères. (F. de R.) (Assez commun.), 1er octobre 1897.

C. violaceus L. — Bois de l'étang des Morues. (F. de R.) (Assez rare.), 30 septembre 1897.

C. infractus. Pers. — (Type). Bois de l'Etang des Bruyères. (F. de R.). (Assez commun), 3 octobre 1901.

C. hybridus. Sch. — Route des Fonds aux Mesnuls. (F. de R.), 20 septembre 1874. (Assez commun).

C. anomalus. Fr. — Bois de l'Etang des Bruyères et route des Fonds à la Mare-Ronde. (F. de R.), 1er octobre 1897. (Rare).

C. caninus. Boud. — Route des Fonds à la Mare-Ronde (F. de R.). (Assez rare).

C. bivelus. Fr. — (Idem) (Assez commun).

C. Castaneus. B. — Bois de Pinus sylvestris. L. Carrefour du Sycomore. (F. de R.), 9 novembre 1899. (Assez rare).

C. brunneus. Pers. — (Idem, assez commun).

C. collitinus. Sow. — (Idem, assez commun).

C. turgidus. Fr. — Sous Pinus Sylvestris. Bois de la Marechantreuil, près M¹., 2 octobre 1901. (Assez rare).

C. purpurascens. Fr. — (Mêmes localités, dates et observations).

C. duracinus. Fr. — Routes des Fonds à la Mare-Ronde. (F. de R.). (Assez rare et localisé), 2 octobre 1901.

C. largus. Fr. — Dans l'herbe, route du Chêne-Baudet à la Mare-Ronde. (F. de R.), 18 octobre 1901. (Assez rare).

C. bibulus. Quel. — Sous feuilles en décomposition. Route du Chêne-Baudet à la Mare-Ronde. (F. de R.) (Très rare), 2 octobre 1901.

C. armeniacus. Sch. — Mêmes localités et observations, 7 octobre 1902. (Assez commun).

C. impennis. Fr. — Même substratum, route du Chêne-Baudet à la Mare-Ronde. (F. de R.), 18 octobre 1901, Marchantreuil (bois sablonneux), près M^t., 4 novembre 1901. (Très rare, mais assez répandu dans ces deux localités).

C. hæmatochelis. B. — Sous les feuilles tombées. Bois de la Mare-Ronde, 2 octobre 1901, de l'étang des Bruyères. (F. de R.), 3 octobre 1901 et de la Marechantreuil, près M^t., 18 novembre 1901. (Assez rare).

C. hinnuleus. Sow. — (Mêmes localités, dates et observavations).

C. damascenus. Fr. — Bois du Chêne-Baudet à la Mare-Ronde. (F. de R.), 18 octobre 1901. (Rare).

Inocybe hystrix. Fr. — Bois de l'étang des Morues. (F. de R.), 30 septembre 1897. (Assez commun).

I. geophila. B. — Var. violacea. B. — Dans la mousse. Carrefour de la Mare-Ronde. (F. de R.), 20 octobre 1898. (Assez commun).

I. carpta. Scop. — Bois de l'étang des Bruyères. (F. de R.), 15 octobre 1898. (Assez rare).

I. prætervisa. Quel. — Bois des Morues. (F. de R.), 30 septembre 1897. (Assez commun à cet endroit).

I. rimosa. B.). — Sous feuilles pourries; bois du Chêne-Baudet, 18 octobre 1901. (F. de R.) et de la Marechantreuil, près M¹., 5 novembre 1901. (Assez commun).

Naucauria temulenta. Fr. — Bois de l'étang des Bruyères. (F. de R.), 15 octobre 1898. (Assez commun).

N. pediata. Boud. — Dans l'herbe, prairies sylvatiques aux Essartons, près M^t., 8 décembre 1900. (Assez rare).

Bolbitius hydrophilus. B. — Routes des Fonds à la Mare-Ronde. (F. de R.). (Assez rare), 2 octobre 1901.

Paxillus involutus. Batsch. — Bois des Chênes du carrefour du Sycomore (F. de R.), 9 novembre 1899, var : monstruosus. Boud.

P. atotromentosus. Batsch. — Bois du Chêne-Baudet, 18 octobre et de l'étang des Bruyères. (F. de R.). (Assez rare).

Crepidotus mollis. Sch. — Parc de Groussay à M^t., 18 septembre 1897. (Rare).

Psaliota cretacea. Fr. — Pelouses du parc de Groussay à M^t. (Assez commun). Même date.

P. Vaillantii. — Roze et Rich. — Pelouses du parc de Groussay, à Mⁱ., 30 septembre 1897. (Assez rare).

P. sylvatica. Sch. — Prairies sylvatiques. Groussay, près M^t. (Idem).

P. villatica. Boud.— (Mêmes localités, dates et observations). 4 octobre 1895, carrefour Bailly. (F. de R.), 19 octobre et 6 novembre 1899. (Assez commun).

P. sylvicola. Boud. — Bois du Chêne-Baudet. (F. de R.), 18 octobre 1901. (Assez commun).

Stropharia inuncta. Fr. - Prairies et vignes des environs de

Mt., 30 septembre 1897. (Assez commun).

S. æruginosa Curt. — Bords herbeux des chemins à M^t., 16 septembre 1875. — Bois de *Pinus sylvestris* du carrefour du Sycomore. (F. de R.), 9 novembre 1899. (Assez commun).

Hypholoma dispersum. Fr. - Jardin à Mt., 29 juillet 1889.

(Rare).

H. hydrophilum. B. - Bois du carrefour Bailly (F. de R.),

5 novembre 1899. (Assez rare).

H. epixanthum. Fr. — Bois des étangs de Hollande. (F. de R.), 4 septembre 1898. Var.: Capnoïdes. Fr. — Bois. En face l'étang des Bruyères, 17 octobre 1904. (Très rare et localisée).

H. fasciculare. Huds. — Var.: monstruosum! Boud. — (En forme d'holoturie, de cornes d'abondances et de crêtes de coq). Vieux arbres. Marechantreuil, près M¹., 10 novembre 1899. (Très rare).

H. lacrymabundum. B. — Sous feuilles pourries. Bois du Chêne-Baudet, 18 octobre; et de l'étang des Bruyères. (F. de R.), 3 octobre 1901. (Assez commun).

H. ericia. B.'- Mêmes localité et date. (Rare).

Anellaria separata. L.— Bois du carrefour Bailly. (F. de R.), 6 novembre 1899. (Assez rare).

Paneolus phalenareum. Fr. - Mares Moussues; plaine de

Mt., 1er août 1899. (Assez rare).

P. campanulatus. L. (Forma). — Environs de M^t., 4 octobre 1874. (Rare).

Psatyrella disseminata. Pers. — (Même localité et date).

Plus commun.

Psylocybe spadicea. Fr. — Dans l'herbe, Prés au Prince.

(F. de R.), 14 décembre 1900. (Assez commun).

Coprinus clavatus. — Bolt. — Routes du Chêne-Baudet à la Mare-Ronde et de l'étang des Bruyères. (F. de R.), 18 et 3 octobre; des bois de la Marechantreuil, près M^t., 2 octobre 1901. (Assez rare).

C. radians. Desm. — Bois pourri, vieilles planches couvrant un tonneau plein d'eau; serre à M^t., 16 mars 1876, et 10 avril

1901. (Assez rare).

C. micans. B. — Vieux pieds d'Ulmus campestris. L. — Berges de l'étang du Bois Nivert, près M^t., 28 novembre 1900. (Assez rare).

C. micaceus. B. — M^t. — Chemin herbeux de Chatelvy, près M^t., 28 mars 1878.

Polyporus perennis. L.— Talus sablonneux. Bois du Chêne-Baudet, 18 octobre, de l'étang des Bruyères. (F. de R.), 3 octobre et de la Marechantreuil, près M^t., 2 octobre 1901, bois du Lieutel, 8 octobre 1900, près M^t., 5 novembre 1901. (Rare).

P. sulfureus. B. — Sur un vieux Cerasum avium. Mœnch. Parc de Blûche à Mt.; 5 août 1899. (Rare).

P. adustus Wild. — Vieux arbres. Bois de la Mare-Ronde. (F. de R.), 18 octobre 1901. (Assez commun).

Dædalea quercina. L. — Vieux arbres. Parc de Groussay à M^t., 8 octobre 1900. (Assez rare).

Cerromyces terrestris. B. — Sous les feuilles tombées ; bois du Chêne-Baudet. (F. de R.), 18 octobre 1901. (Assez rare).

Boletus luteus. L. — Bois de l'étang des Morues, 30 octobre 1900; du Chêne-Baudet, 18 octobre; (de l'étang des Bruyères; presque toujours atrophié par un parasite fongique, le Sepedomium Chrysospermum); du Sycomore, 3 octobre. (F. de R.), et de la Marechantreuil, près M^t., 7 novembre 1901. (Assez commun).

B. versicolor. Rostk. — Bords herbeux de l'étang de Guypéreux. (F. de R.), 21 juin 1903 et bois de la Marechantreuil, près M^t., 18 octobre 1901. (Assez rare).

B. felleus. — Bois du Chêne-Baudet, 10 octobre, de l'étang des Bruyères, du Sycomore, 3 octobre; bois de la Marechantreuil, près M^t., 5 novembre 1901. (Assez rare).

B. versipellis. Fr. — (Mêmes localités et dates. Assez commun).

B. cranescens. B. — (Idem. Assez rare).

B. erithropus. — Pers. Bois des Bruyères de Neuville. (F. de R.), 3 octobre; et de la Marechantreuil, près M^t., 3 novembre 1901. (Assez rare).

Boletus variegatus Swartz. — Bois de l'étang des Bruyères. (F. de R.) (Rare).

B. badius Fr. - Mêmes localités, dates, observations.

B. subtomentosus. L. - L. (Etat normal). Pieds de Carpinus Betulus. L. parc de Blûche, à Mt., 4 octobre 1901. (Rare).

- Fascination. Chapeau irrégulier, aplati, allongé, d'un côté, sans tubes à l'endroit tascié. Talus pierreux, ombragés; bois du Lieutel, près Mt., 19 octobre 1893. (Très rare).

- Forme à stipe brusquement coudé, chapeau normal

(Idem).

B. edulis, var. pinicola. Vent. - Bois de la Marechantreuil, près Mt., 20 novembre 1899. (Assez commun).

B. æreus. B. - Bois autour de la croix de Villepair et route du Grand-Bouleau à l'Etang-Neuf. (F. de R.), août-octobre 1899 (Assez commun).

Fistulina hepatica. Huds. - Vieux arbres du parc de Grous-

say, à Mt., 18 septembre 1901. (Rare).

Odontia denticulata. Pers. - Branches mortes; bois des étangs de Hollande (F. de R.), 5 septembre 1888. (Assez com-

Clavaria coralloides. L. - Parc à Galluis, près Mt.,

27 novembre 1888. (Assez commun).

C. ophioglossioides. L. - Bois de la Marechantreuil, près Mt., 12 février 1896. (Assez commun).

- Variété. Parc de Groussay à Mt., 21 avril 1891. (Assez commun).

C. crispa B. — Vieux pieds de Tilia platyphyllos. Scop. — Jardins à Mt., 3 octobre 1901. (Assez commun).

C. cinerea. Bull. - Bois de l'étang des Morues. (F. de R.), 14 septembre 1883. (Assez commun).

C. flava Sch. — Parc de Groussay à Mt., 30 septembre 1877. (Assez commun).

C. pistilaris L. - Bois, gazons, autour de l'étang des Morues. (F. de R.), 27 septembre 1879. (Assez rare).

C. fistulosa Fl. Dan. - Parc de Groussay à Mt., (Assez rare).

C. coriacea. Bull. — (Idem) (Assez rare).

Sparassis crispa. Wulf. - Sous Pinus sylvestris L. Bois montueux de la Marechantreuil, près Mt., 8 octobre 1902. (Assez rare, mais poussant tous les ans).

Telephora palmata. Scop. - Dans le terrier d'un lapin. Talus

sablonneux, route de l'étang des Bruyères. (F. de R.), 3 octobre 1901. (Rare).

Stereum his sutum. Willd. — Vieilles branches, route du Chêne-Baudet à la Mare-Ronde. (F. de R.), 18 octobre. (Assez commun).

Stereum purpureum. Fr.— Sur vieux arbres à M^t., 24 octobre 1902. (Assez commun).

Corticum lividum. Pers. — Vieux troncs d'arbres, à Gros-rouvres, près M^t., 1^{er} mars 1874. (Assez commun).

Phallus impudicus. L.— Petits bois du Moulin, 11 juillet, et de la Marechantreuil, près M^t.; 2 octobre 1901; autour des Mares de Villepair. (F. de R.), 9 septembre 1899. (Assez commun).

Cyathus hirsutus. Sch. — Bois du Chêne-Baudet, 18 octobre 1901. (F. de R.); de la Marechantreuil, près M^t.; 18 octobre 1901. (Rare).

C. vernicosus. D. C. — Talus herbeux et ombragés de la Marechantreuil à M^t., 12 février 1880. (Rare).

Tulostoma brumale. Pers. — Vieux murs à M^t., mars 1874 et chaussée de l'étang de la Tour. (F. de R.), novembre 1891. (Rare).

Scleroderma verrucosum. B. — (Forma!) Bords herbeux de l'étang du Roi, 4 septembre 1894, et « Citerne de la Muette » (F. de R.), 21 août 1890. (Assez commun).

S. vulgare. Fr. — (Idem.) et bois de l'étang des Bruyères, 22 octobre 1902.

Geaster pectinatus. Kuntze. — Parc à Mt., 5 août 1890. (Assez commun).

- G. frimbriatus Fr. Bois de la Marechantreuil à M^t., 7 août 1875. (Assez rare).
- G. Hygrometricus. Pers. Bois de Galluis, près M^t., 19 octobre 1873. (Rare).

G. mammosus. Fr. - (Idem.) (Rare).

Utraria purfuracea B. — Bois de la Marechantreuil, près M^t., 2 octobre 1901. (Assez rare).

Lycoperdon gemmatum. Fl. Dan. — Bois de l'étang des Bruyères et du Chêne-Baudet. (F. de R.), 3 et 18 octobre 1801. (Assez commun).

L. cælatum. B. — Bois-Renou, plaine de Mt., 9 octobre 1897. (Assez commun).

* L. echinatum. Pers. — Bois de l'étang des Bruyères et du carrefour du Sycomore. (F. de R.), 8 octobre 1900. (Rare).

L. exepuliforme. Scop. — Bois de l'étang des Morues et de l'étang des Bruyères. (F. de R.); 2 et 3 octobre 1901. (Assez commun).

L. hyemale. B. — Parc de Groussay, à M^t., 19 octobre 1899. (Assez commun).

L. corrium. B. — Plaine de Mt., et bois de la « Pierre-Ardroue ». (F. de R.), 10 et 27 juillet 1888. (Assez commun).

Bovista gigantea. Bart. — Prairies de Blûche à Mt., 9 septembre 1899. (Assez rare).

B. plumbea. Pers. — Dans l'herbe: faux chemin du Chêne-Rogneux aux Haysettes, près M^t., 20 octobre 1901. (Assez rare). Peziza umbrosa. D. C. — Bois de l'Etang-Rompu. (F. de R.), 7 septembre 1876. (Assez commun).

Peziza cochleata B. — Sur la vase desséchée; bords de l'étang des Morues. (F. de R.), 4 octobre 1900. Assez rare et surtout localisé.

Calocera viscosa. Pers. — Bois de la Marechantreuil, près M'. 5 novembre 1901. (Assez rare).

Tremella frondosa. B. — Arbres morts à l'entrée des bois de la Marechantreuil, près M^t., 17 novembre 1901. (Rare mais représenté sur ces troncs coupés, par de nombreux et superbes échantillons).

Tremella mesantherica. Retz. — Branches mortes; route des Fonds aux Mesnuls. (F. de R.), 4 octobre 1891. (Assez rare). Calvatia paludosa. Lév. — Dans les Sphagnum. Tourbière du Maupas (Saint-Léger). (F. de R.), 30 août 1891. (Rare).

Melanogaster variegatus. With. — Bois autour de l'étang du Roi. (F. de R.), 9 novembre 1897. (Rare).

Exidia glandulosa. B. — Vieux arbres; Bois du carrefour du poteau Montavale. (F. de R.), 8 mars 1897. (Assez commun). Auricularia reflexa. R. — Var. lutea. B — Vieilles souches à Montavale. (F. de R.), 18 mars 1893. (Assez rare).

Auricularia tremelloïdes. Bull. — Sur un tronc d'arbre coupé; cour de la ferme de la Vignette, à M^t., 6 juin 1889. (Assez commun).

Mitrula paludosa Fr. — Sur feuilles pourries de Carex; tourbière du Maupas (Saint-Léger). (F. de R.), 24 avril 1897. (Très rare).

Lycocala miniata. Pers. — Vieux arbres à Grosrouvres, près M^t., 17 mars. (Assez rare).

Peronospora Ficariæ. Tusl. — Sur Ranunculus Steveni. Andr. Pelouses à M^t., 11 mai 1901. (Rare).

Libertella Faginea. Desm. — Sur écorce de Fagus sylvatica. L. Bûches coupées au Parc d'En-Haut. (F. de R.), 11 octobre 1901. (Assez rare).

Cysopus candidus. Lév. — (Sur Capsella-Bursa pastori. Mœnch.). Potager à M^t., 2 décembre 1876. (Assez commun).

C. Portulacæ. D. C. — (Sur Portulaca sativa Haw.). Jardins à M^t., 23 juillet 1897. (Assez commun).

Melanpsora Tremulæ. Tusl. — Sur. Sur Populus tremula. L. — Bois autour de l'étang des Bruyères. (F. de R.), août 1897. (Assez rare).

Puccinia Phramitis. Tul. — Sur Phramites communis Trin. — Rigoles à Gambayseuil. (F. de R.), 14 juillet 1869 et sur Pirus communis. L. à M^t., 2 août 1897. (Assez commun).

P. Epilobii. D. C. — Sur | Epilobium hirsutum L. — Fossés entre Galluis et M^t., 14 août 1897. (Assez commun).

Puccinia Arenariæ. Pers. — Sur Dianthus, surtout D. barbatus L. Jardins à M^t., (Assez rare).

Puccinia Pruni Pers. (Sur Prunus insititia L.) — Parc d'En Haut (Jardin du Garde). (F. de R.), 2 octobre 1896 (Assez rare).

P. Malvacearum Mont. (Sur Athlæa officinalis L. et rosea Cav.). — Jardins à M¹., 24 juillet 1897 (Assez commun).

Puccinia Tanaceti DC. (Sur Artemisea Dracunculus L.). — Jardins à Mt., 20 novembre 1901. (Assez rare).

Urocystis Violæ Rabh. — (Sur feuilles et pétioles de Viola odorata L.) Jardins et environs de Mt. Juin-Juillet 1898 (Assez rare).

Uromyces Geranii Pers. (Sur Geranium Pyrenaicum). — Haies, lieux vagues à M^t., 23 avril 1897 (Rare).

Nectria cinnabarinum Fr. (Vielles branches de Tilia, platyphyllos Scop.). — Jardin à Mt., 9 Février 1899. (Assez Rare). Tubercularia vulgaris. Corda. — Branches mortes de Tilleuls à Mt., 6 Février 1889 (Assez rare).

Dothydella Ulmi = Phyllachora Ulmi, (Sacc.) sur feuilles d'Ulmus suberosus Koch. — Routedu Champ-Mauduit à celle de la Vieille-Chaussée, près l'Etang-Neuf. (F. de R.), 3 avril (Assez commun).

Phramidium violaceum Schultz. (Sur Rubus Corylifolius. Sm. — (F. de R.), 27 juillet 1899 (Assez commun).

Phramidium subcorticium Wint. — Lecithæa rosæ. Lev. — Sur Rosa tomentosa Sm. et sur rosiers hybrides remontants, Agrimonia odorata L., Spiræa Ulmaria L., Fragaria vesca. (Assez commun).

Æcidium Rumicis Schlecht. (Sur Rumex pulcher L.) - Bois

de l'Etang-Neuf. (F. de R.), 9 août 1898. Æ. Tragopogonis. Pers. Sur Scozonera humilis. L. — Prairies du Chemin-Vert, près M^t., 4 mai 1876. (Assez rare).

Æcidium Berberidis. D. C. — Sur Berberis vulgaris Lin. Bosquets à la Barraque à M^t., 15 mai 1904 (Rare).

Restelia cancellata. Rebent. — Première forme de Gymnosporangium clavipes. Cocke et Reck sur Pirus communis, 4 septembre 1903, à M^t. (Commun cette année là).

R. lacerata Mérat. — Deuxième forme de Gymnosporangium Juniperinum. Fries. — Sur Cratægus oxycantha rosea plena et sur C. oxyaxantha L. — Jardins et haies aux environs de M^t., 30 mars et 4 juin 1899. (Assez rare).

Uredo Rubis. (Pers. sur Rubus fruticosus) L. — Et sur Rubus idæus Pers. Haies à Gambayseuil. (F. de R.), 4 juillet 1897. (Assez commun.)

U. Menthoe Pers = Puccinia Menthoe. — Sur Mentha sativa. L. Gardin à M^t., 9 août 1897.

Pseudo-peziza Trifolii = (Bir) (Fuck) = Phacidium medicaginis = Phacidium Trifolii Boud. Sur Trifolium incarnatum L. champs a M¹., 15 juin 1903. (Assez rare).

Exaoscus Pruni Fuck. — Sur fruits de Prunus spinosa. L. — Haies à Méré et à la Guinande, près M^t., 19 juin 1899. (Assez rare).

Microsphæria pennicillata. Vallr .- Lieux humides à Gambay-

seuil. — Sur Alnus glutinosa. Goernt. (F. de R.), 21 août 1897 (Assez rare).

Capnodium Salicinum. Mont. Forme conidienne, sur Erytrhæa centaurium. L. Bords des Étangs de Hollande. (F. de R.), 15 juillet 1902. (Assez rare).

Geoglossum glabrum. Pers. — Bords de l'étang des Morues. (F. de R.), 4 septembre 1894. (Rare).

Geoglossum hirsutum. Pers. — Sur feuilles pourries de Carex, tourbière du Maupas (Saint-Léger). (F. de R.), 15 juillet 1891 (Rare).

Cordyceps ophioglossoides. Erh (Link). — Pelouses sylvatiques, près l'étang des Morues. (F. de R.), 27 septembre 1879. (Rare).

Rythisma Acerinum (Fr.). Sur feuilles d'Acer pseudo-Platanus. L. — M^t. et Saint-Léger. (F. de R.), 16 août 1897. (Assez commun).

Septoria Polygonorum. Desm. — Sur Polygonum Orientale L. — Jardin à M^t., 7 juillet (Rare).

- S. Olleandrina. Sacc. Sur Nerium Oleander. L. Jardin à M^t., 21 juin (Assez rare).
- S. Scabiosicola. Desm. Sur Scabiosa succisa L. Prairies sylvatiques à M^t., 7 juillet. (Assez commun).
- S. Urticoe Desm. et Rob. Sur Urtica dioica. Linné. Environs de M^t., 4 juillet 1902. (Rare).
- S. Convolvuli. Desm. Sur Convolvulus sepium. L. Haies à M^t., avril-octobre. (Assez commun).
- S. Euphorbioe Desm. Sur Euphorbia sylvatica. Linné. Bois de l'Etang-Neuf. (F. de R.). Printemps. (Assez rare).

Sphæropsis Rusci Thum. — Sur Ruscus hypophyllum L. — Jardin à M^t., 21 juin. (Assez rare).

Rahacodium celare Fries. — Forme stérile d'Hyphomycetes. (F. de R.). Cave à M^t., 15 avril 1901. (Assez commun).

Fusidium flarovirens. Dittm. — Sur des feuilles pourries d'Hedera Helix L. — Parc de Blûche à M^t., 4 décembre 1901. (Assez rare).

Phycomyces nitens. Sacc. — Sur des faînes pourries parmi les feuilles tombées; fossés, route de Blûche, entre le Chêne-

Baudet et la Mare-Ronde (F. de R.), 2 octobre 1901. (Rare). Leptostroma Scirpirum. Fries. — Forme imparfaite et spermogonienne de Hypoderma Scirpirum. D. C. — Sur tiges desséchées de Scirpus lacustris. L. — Bords de l'étang de Coupe-Gorge. (F. de R.), 27 juillet 1899. (Assez rare).

Frankia Brunchorsti Moller. — Dans les cellules du bois de la tige et dans les tuberculoïdes radicaux de Myrica Gale L. — Bords de l'étang des Bruyères. (F. de R.), 15 février 1898. Déterminé par M. Auguste Chevallier, attaché au Museum d'histoire naturelle de Paris. (Rare).

Cladosporium herbarum. Lmk. (Sur Zea Maïs. L.). Champs à Méré près M^t., 4 octobre 1902. (Assez commun).

Gleosporium Hedericolum. Delac. Nov. spc. — Sur feuilles florales d'Hedera Helix L. — Jardin à M^t., de mars à octobre. (Rare, localisé).

Marsonia Castagnei Desm. (Sacc). — Sur Populus tremulea L. — Bois de Grosrouvres près M^t., 19 juillet 1897.

Coryneum Beijerinckii. Oud. — Sur feuilles d'Armeniaca vulgaris Lamk —, de Cerasus avium Mænch. et vulgaris Mill. — Samares d'Acer-pseudo-Platanus L. — Environs de M^t., jardin, 21 juin (Assez commun).

Pionnotes (Solani-tuberosi. Sacc. — Sur tubercules de Solanum tuberosum L. — Jardins à Mt., 1er juillet 1898 (Assez commun).

Collectotrichum Lindemuthianum. (Sacc. et Mont.) (Ber.) et (C.). Sur gousses de Phaseolus vulgaris L. et nanus L. — Jardin à M^t., 7 juillet 1900. (Assez commun).

Diatripes disciformis. (Hoffm., Fries). Sur feuilles d'Acerpseudo-Platanus. L. — M^t., et Saint-Léger. (F. de R.), 16 août 1897. (Assez commun).



CHARACÉES

Des environs de Montfort-l'Amaury et de la Forêt de Rambouillet.

Chara fragilis. Desv. — Etangs de Hollande (1º0 chaussée). (F. de R.). Assez commun.

C. fætida. A. Braun. — Canal à la Mormaire, près M^t., et 2° chaussée des étangs de Hollande. (F. de R.). Assez commun.

C. Braunii. Gm. - Etangs de Hollande. (F. de R.). Assez commun.


Nitella syncarpa. Chevall. — Mares de Villepair et étangs de Saint-Hubert, \dagger et Q. (F. de R.). Assez rare.


N. opaca. Ag. — Mares de Villepair et étangs de Hollande. (F. de R.). Assez commun.

N. translucens. A. — Mares-Moussues. (P. de Mt.), Mare de Villepair. Fontaines-Blanches (Charmoie). Mares de la maison du Garde forestier du parc d'En-Haut. (F. de R.). Assez commun, surtout à la première localité.

Tous les végétaux, sans exception, qui sont signalés dans ce Catalogue, ont été ramassés par l'auteur, aux localités indiquées.







Imprimerie veuve Edmond Monnoyer. - 1v-1905



