

BOTANISCHES INSTITUT
der Universität Wien


Bibliothek


J.-Nr. 1694

Sign.

448/25

BOTANISCHES MUSEUM
der k. k. Universität.





ad hoc *ad hoc*
ad hoc *ad hoc*
**PLANTARUM
RARIORUM SICILIÆ**

MINUS COGNITARUM

AUCTORE

VINCENTIO TINÉO



**PANORMI
EX TYPOGRAPH. PH. BARRAVECCHIAE**

1846

~~NUOVA~~ ~~EDIZIONE~~

ALBIONIS SICILIA

Gesù

MENS COGNITARUM

NAPOLI

Estratto dall'Ingrassia Giornale delle scienze mediche
per la Sicilia.

Anno 2, n. 4, 1846.



ALBIONIS
SICILIA
MENS COGNITARUM

1846

CARAMANICA (*)

TIN.

COMPOSITE. L.

SYNGENESIA ÆQUALIS.

Flores semiflosculosci (Tribus Cichoracearum. Dec.)

Anthod. ovatum, multiflorum, polyphyllum, foliolis imbricatis, exterioribus brevioribus, patulis.

Ach. biformia, striata, marginalia compressa, obovato-oblonga, centralia teretiuscula. Papp. uniformis, pilosus, sessilis. Recept. nudum. (Herba

perennis, pilosa: *folia* oblonga, runcinato-pinnatifida, *cmnia radicalia*: *scapi* uniflori, fistulosi, successive-erumpentes: *flores* erecti.)

1. C. TARAXACOIDES. *TIN.*

In collibus apricis montosis, *Militello Val di Noto, a Santa Barbara,*

Octobri, Novembri. 7.

Planta pilosa: *radix* perennis, crassa, fibrosa, transverse striata, nigra: *folia* omnia radicalia, decumbentia, runcinato-pinnatifida, laciinis (parvis) inaequalibus, integris, vel superne tenuissime-dentatis: *scapi* nudi, erecti, inde declinati, et plures ex eadem radice, graciles, superne magis pilosi, 1-3 pollicares, foliis multo longiores, aut subaequales: *flores* sulphurei: *anthodii* foliola omnia glaberrima, sub apice nigro-mucronata, interiora anguste-linearia, 1-3-nervosa, alterna late-scariosa, corollulae aquantia, exteriora ovata, obtusiuscula, uninervia, scariosa, eroso-ciliata: *semiflosculi* lineares, apice denticulatis, externe rubentes: *achenia* (parva) biformia, rufescens, scabriuscula, striata, sub apice explanato, costricta, marginalia obovato-oblonga, centralia teretiuscula: *pappus* uniformis, pilosus, scaber, albidus: *receptaculum* nudum, punctatum.

Obs. *Genus Leontodonti L.*, atque *Taraxaco Hall.* affine, sed differt a primo pappis pilosis, et ses-

silibus, nec plumosis, et in medio stipitatis, ab altero pappis sessilibus omnibus, neque omnibus stipitatis, ab utrisque acheniorum forma.

Clar. Gussonius, cui hanc misi plantam per literas me monuit ex *Graecia* recepisse eandem ab *Heldreic-ko Taraxacum gymnanthum*. *Link* nomine, sed cum matura non essent *Achenia*, eorum characteribus certiore se habere non potuisse. Admittens etiam graecam plantam eandem esse ac siculam, generi *Taraxaco* characteribus adnotatis pertinere non potest, quam sententiam *Clar. Gussonius* sequutus est.

(*) Nel dedicare questo mio novello genere alla memoria del Principe di Caramanico, ho creduto soddisfare ad un sentimento dolcissimo di venerazione, e di riconoscenza per un uomo, a cui la mia patria va debitrice di opere memorabili, che tanto han contribuito a spingerla innanzi nella via del progresso scientifico. Tra queste opere molto eloquenti per tramandare alla più tarda posterità il nome dello illustre Mecenate, che le promosse, mi è caro rigordare il nostro Reale Orto Botanico, oggi alle mie cure affidato.

Il Caramanico Vicerè di Sicilia nell' anno 1789 ottenne da RE FERDINANDO allora regnante, di gloriosa rimembranza i mezzi e l'annua dote di Regio Erario, onde fondarsi e mantenersi questo stabilimento. Opera del celebre architetto francese C. de Fourny, che era venuto in Sicilia per osservare le memorande antichità, innalzossi d'ordine dorico-sicolo il Ginnasio, e del nostro rinomato siciliano V. Marvuglia anche dello stesso ordine i bene architettati edifici, che lo fiancheggiano cioè il Calidario, ed il Tepidario, edifici che per gusto dell'arte seppero all'autore far meritare l'onore di socio dell'Istituto di belle arti di Francia.

Dr. Giuseppe Tineo, e Ragusa da Militello val di Noto , mio diletissimo padre , reduce dei suoi viaggi fatti allo straniero , e ricco di quelle conoscenze all'uopo necessarie , diresse la general fondazione dello stabilimento. Era stato egli sin dal 1781 prescelto a Direttore , e Dimostratore del primo pubblico Orto Botanico sopra il baluardo di porta Carini , fondato appena da due anni , ed in seguito nel 1786 nominato professore di Botanica , la quale veniva divisa dal resto della storia naturale , che in quel tempo dettava l'eloquente Ab. D. Eutichio Barone.

ORCHIDEE

2. ORCHIS MACROSTACHYS. TIN.

O. tuberibus palmatis, foliis oblongis, linearilanceolato-acuminatis, sensim decrescentibus, spica exacte - cylindracea!, laxa!, gracile!, elongata, bracteis anguste-lineari-subulatis, ovarium subaequantibus, inferioribus longioribus, petalis duobus exterioribus linearilanceolatis, patentibus, labello plano, profunde-trifido, lobis lateralibus latiusculis, apice dentato-truncatis, medio lineari, elongato, integerrimo, obtuso, calcare subsaccato, acuto, gracile, cylindraceo, subincurvo, descendente, ovarium subaequante.

In elatioribus sylvaticis montosis. Etna, alla Cerrita.

Junio, Julio. 17.
Caules sub-2-pedales: flores remoti, in spica sub-6-pollicari: petala trinervia: ovarium oblongum, glabrum, hexagonum.

Habitus *O. maculatae*, sed notis indicatis valde differt.

3. ORCHIS SICULA. *TIN.*

O. tuberibus palmatis, foliis fasciculatis, linear-i-lanceolatis, acutiusculis, basi longe-attenuatis, spica cylindracea, laxa, bracteis lanceolatis, acutis, inferioribus germine longioribus, petalis duobus, exterioribus retroflexo-conniventibus, labello trilobo, lobis subaequalibus, integris, lateralibus rotundatis, intermedio longiore, emarginato, calcare cylindraceo, gracili, acutiusculo, arcuato, ovarium breviore.

In pascuis herbosis elatioribus nemorum. *Caronie, boschi sopra la Tassita, Pizzu di l'Ursu.*

Habitus *O. pseudo-sambucinae*; differt radice palmata, foliis fasciculatis, basi longe-attenuatis, et praecipue calcare gracili, arcuato, ovarium breviore!, nec cylindraceo-conico, obtuso, ovarium subexcedente.

4. ORCHIS NATALIS. *TIN.*

O. tuberibus cylindraceis, subintegris, vel bilobatis, caule 4-6-folio, foliis fasciculatis, erectis, anguste-lineari-lanceolatis, acutiusculis, subaequante, spica brevi, laxiuscula, subglobosa pauciflora!, bracteis lineari-lanceolatis, acuminatis, inferioribus ovario duplo longioribus, petalis duabus exterioribus patentibus, labello trilobo, lobis integris, lateralibus duplo latioribus, intermedio longiore,

lanceolato, calcare descendente, cylindraceo-conico, acuto, ovarium non excedente.

In elatioribus montosis apricis. *Etna alture, nella strada per andare al Cratere.*

Aprilis, Majo. ȝ.

Caules 3-4-pollicares, graciles, *folia anguste-linearis lanceolata*, subaequantes: *spica* 4-6-flora!, subpollicaris: *calcar cylindraceo-conicum* (non crassum!), acutum.

Species quoad folia, et habitum ab omnibus affinibus distinctissima.

Memoriae Clar. *Thomæ Natalis* operum insig-
nium auctoris, arctissimis amicitiae vinculis hanc
plantam grati animi ergo.

5. ORCHIS MARKUSII. *TIN.*

O. tuberibus ovato-oblongis, subintegris, vel 2-lobatis, caule 6-12-folio, foliis anguste-lineari-lanceolatis, basi longe-attenuatis, laxis, multo lon-
giore, spica ovato-cylindracea, densiuscula, brac-
teis lanceolatis, inferioribus ovario duplo lon-
gioribus, petalis ovatis, obtusis, duobus exterioribus
reflexis, labello late-trilobo, subcrenulato, lobis
rotundatis, lateralibus concavis, reflexis!, intermedio
paullo latioribus, aequalibusve, calcare subincurvo
adscendente!, obtuso, ovarium subbreviore.

In sylvaticis montosis herbosis. *Palermo a Gi-
bilrossa, nel boschetto de'sugheri presso il Convento.*

Martio, Aprili. *Caulis* 3-6-pollicares, angulati, sulcati: *folia* 6-12, anguste-lineari-lanceolata!, fasciculata!, laxa!, laete-virentia: *spica* 4-½-pollicaris, plus minus densa: *flores* albo-pallentes: *petala* ovata, obtusa, duobus exterioribus reflexis, intermedium et duo interiora fornicato-conniventia: *labellum* (non planum, nec punctatum), dorso pallide-virens, lobis subaequalibus, rotundatis, aliquando integerrimis, lateralibus reflexis!: *calcar* subincurvum, (semper!) adscendens, cylindraceo-conicum.

Proxima *O. Sambucinae*, et *O. pseudo-sambucinae*, sed indicatis notis multum differt.

Doctori *Markusio* medico AUGUSTAE IMPERATRICIS RUSSIARUM, clinico insigni, doctissimorum operum auctori, qui *Panormi* typis gloriam argyrensis *Fortunati Fidelis* medici celeberrimi vindicavit, lubentis animi, dulcissimaeque memoriae, argumento hanc plantam.

6. ORCHIS ENNENSIS. GUSS.

O. foliis inferioribus oblongo-lanceolatis, acutiusculis, spica-obconica, densa, bracteis (pallide-roseis) lanceolatis, acutis, ovario brevioribus, petalis tribus exterioribus conniventibus, acutis, acuminatisque, labello tripartito, lobis lateralibus subintegris, oblique-truncatis, medio duplo latiore ac longiore, obovato, lobulis rotundatis!, sat raro denticulatis, mucrone (non semper) interjecto

calcare dependente, acutiusculo, ovarii sub-dimidiuum aequante. Guss.

O. conica. Guss. syn. vol. 2, p. 44, p. 538,
excl. syn. omnibus.

In herbosis montosis, argillosis. *Castrogiovanni*
Guss. *Villarosa* Tin.

Habitus omnino *O. commutatae*, a qua potissimum
differt labelli-forma, ac divisione Guss.

7. PLATANTHERA BIFOLIA. Rich. orch. cur. adn.
p. 55, (non Todar. orch. sic. p. 63).

P. tuberibus indivis, foliis radicalibus binis ob-
ovatis, oblongisve, basi attenuatis, caulinis bracteae-
formibus, petalis exterioribus lanceolatis, lateralibus
patentibus, intermedio latiore, fornicate-con-
cavo, cum binis interioribus connivente, labello
indiviso, anguste-linearie!, calcare dependente, in-
curvo, longissimo, subulato!.

Ic. Reich. cent. 9, f. 4443. *O. bifolia*. L. sp. pl. p. 4531, Ucr. h. pan. p.
581?

In nemoribus montosis. *Sicilia Bartolotta* herb.
Majo, Junio 7.

A. Platanthera chlorantha Cust., labello anguste-li-
neari, calcare subulato (nec incrassato), incurvo, de-
pendente, (nec orizontaliter porrecto), satis distincta.

8. PLATANTHERA CHLORANTHA. Cust. β quadrifolia
P. foliis radicalibus quaternis, obovatis, oblon-

gisve, caulinis bracteiformibus, petalis exterioribus obtusiusculis, lateralibus patentibus, intermedio duplo latiore, fornicato-concavo cum binis interioribus connivente, labello indiviso, lineari-lanceolato, calcare horizontaliter porrecto, filiformi, clavato, gymnostenio truncato, inferne duplo latiore.

In nemorosis montosis humidis. *Madonie bosco di Montaspro.*

Majo, Junio. ♀.

A specie foliorum numero solummodo differt.

9. *SERAPIAS TODARI. TIN.*

S. bracteis spataceis, acutis, flores subaequantibus, labello pubescente, glandula basilaria laevissime - sulcata, lobis lateralibus rotundatis, erecto-conniventibus, medio elongato, lineari-subulato, retroflexo!, apice mucronato, incurvo!, (ovario non adpresso), petalis aequilongo.

In apricis herbosis montosis elatioribus. *San Fratello a Montesoro, cum Croco siculo, et Carice intricata.*

April, Majo. ♀.

Caulis 3-pollicaris, gracilis, 2-florus: *folia anguste-lineari-lanceolata:* *bracteae* nervosae, sordide-carneo-roseae: *flores* distantes: *labelli* lacinia media elongata, lineari-subulata!, retroflexa!, apice mucronato incurvo!.

Species hujus generis singularis, et ab omnibus
distinctissima.

Jurisprudentiae doctori *Augustino Todaro*, di-
lectissimo discipulo, auctori *Siciliae Orchidearum
Monographiae* existimationis specimine hanc plan-
tam.

10. OPHRYS SICULA. *TIN.*

*O. petalis obtusis, concavis (viridi-luteolis), duo-
bus lateralibus semiellipticis, intermedio elliptico,
binis interioribus anguste-linearibus!, duplo bre-
vioribus, labello petalis subaequante!, obovate-cu-
neato !, in disco convexo, velutino-piloso, cum ma-
cula purpurea, oblonga, glabriuscula, nitida, am-
bitu holosericeo (flavo), trilobo , lobis lateralibus
subretusis, remotiusculis, medio longiore, cuneato,
emarginato , exappendiculato aequale , vel latiu-
sculo, lobulis binis lineolis fuscis notatis, gymna-
stenio obtuso.*

*Ophrys lutea β minor. Guss. l. c. vol. II, p. 41
p. 550 Arachnites lutea b minor Todar. orch. sic.p.97.*

Ic. Todar. l. c. t. 2, f. 9, 10.

In apricis collibus herbosis, in montosis, et in
pascuis sterilibus maritimis. *Palermo, Mihtello val
di Noto; S. Biaggio sotto Cammarata Guss. etc.;
Avola Bianca.*

April, Majo. ♀.

Difserat ab *O. lutea Cav.*, floribus dimidio minori-

bus, *petalis* binis interioribus anguste- (non late) linearibus, exterioribus duplo brevioribus; *labello* obovate-cuneato!, (non late-obovato et ambito ex-planato), lobis remotiusculis (nec approximatis), lateralibus subretusis, (nec ampliatis, rotundatis), lobo medio longiusculo, (parvo), cuneato, emarginato, binis lineolis fuscis notato. Cultura non mutatur.

14. CUSCUTA TINÉI. INSENGA

C. floribus racemosis!, pedunculatis, corollis nudis, laciiniis calycinis, corollinisque duplo majoribus, 3-5-fidis, obtusiusculis, staminibus 3-5, stigmatibusque 2-3, capitatis!, corollam subaequantibus. *Ins.*

In hortis; parasitica *Pelargonii tristis* et *Ocymii Basilici. Ortaggi di Aci-Reale.*

Septembri. Θ.

Caules graciles, elongati, lutei:, *racemi* 3-7-flori, distantes: *bracteae* lanceolatae: *pedunculi* inaequales: *corollae*, *calycesque* pellucidi: *utriculi* (magni) exerti, sobrotundi pervii: *stigmata* 2-3 raro-4 capitata: *semina* bina. (raro terna), ovoidea, punctata, pubes-tula, flava.] Species characteribus adnotatis ab omnibus distinctissima.

Cl. *Vincentio Tineo*, a quo agrarias et botanices disciplinas ab ineunte etate didicit, multaque prome-
ruit magistro usque suo *Joseph Insenga* discipu-
lus, in grati animi argumentum.

*Dabam Panormi die decima quinta
mensis martii 1846.*

Pag. 8. post lin. 14 adde Majo, Junio. ¶.

Pag. 11. post lin. 6 adde Aprili, Majo. ¶.

is associated by authors with the name N. 10
-and is described as a species which has been
-described under the name of *N. 10*.
-The name *N. 10* is derived from the
-name of the author who first described it.

The name *N. 10* is also used in the same
-sense as the name *N. 10*.

The name *N. 10* is also used in the same
-sense as the name *N. 10*.

The name *N. 10* is also used in the same
-sense as the name *N. 10*.

84

oblongum rotundatum, apiculatum, oblongo-
obtuso, petiolatum, sessile, articulatum, obtuso-
obtuso, articulatum, petiolatum, excurrente petiolato
scutellare, apiculatum, excurrente petiolato, articulatum,
petiolatum, excurrente petiolato, articulatum, petiolatum,
excurrente petiolato, articulatum, petiolatum, excurrente petiolato,
articulatum, petiolatum, excurrente petiolato, articulatum, petiolatum,

percurrente petiolato.

IV. ATATRIPHYLLUM L. S.

(3) *ATATRIPHYLLUM* eleagnis al-

. O. foliat. obov.

CASTELLIA

T I N.

TRIANDRIA DIGYNIA

GRAMINEÆ. L.

Triticeae. Link.

Spica basi ramosa. *Spiculae* 6-8-florae, lanceola-
to-ovatae, solitariae, muticae, in rachidis articu-
latae scrobiculis distiche, et alterne insertae, bre-
viter pedicellatae, adpressae, facie angustiore ra-
chidem spectantes. *Calyx* 2-valvis; *valvae* inaequa-

les, glabrae, carinato-concavae, inferior minor, flosculo proximo breviores. *Corolla* 2-valvis; *valvula* exterior concava, 5-nervia, substriata, transverse rugosa, tuberculata, scabra, interior subdenticulato-ciliata. *Caryopsis* corolla inclusa. (*Herba annua*, glabra: *culmus* simplex, erectus: *folia* carinata: *spica* basi ramosa; *rachis* excisa: *spiculae* pedicellatae compressae: *flosculi* fertiles omnes, approximati, acuti.)

12. C. TUBERCULATA. *TIN.*

In arenosis vulcanicis. *Linosa*. (*)

Majo, Junio. Θ.

Radix fibrosa, fibris tenuibus, superne crassiusculis, ramulosis, villosis, albidis: *culmus* simplex, raro basi subdivisus, erectus, teres, substriatus, glaber, fere totus tectus, 6-12-pollicaris: *folia* linearis-subulata, basi latiuscula, auriculata, carinata, striata, glabra; superius vagina sua spathaeformi spicam basi involvens; *vaginae* fortiter striatae, glabrae, laxiusculae; *ligula* brevis, truncato-lacera: *spica* terminalis, disticha, stricta, rigida, 2-4-pollicaris, plerumque basi ramosa; *rachis* gracilis, flexuosa, marginibus tenuissime-ciliolatis; *spiculae* 6-8-florae, lanceolato-ovatae, remotiusculæ, solitariae, muticæ, in rachidis articulatae scrobiculis distiche, et alterne insertae, breviter, et crasse pedicellatae, adpressae, facie angustiore rachidem spectantes:

calyx 2-valvis; *valvae* inaequales, lanceolatae, carinato-concavae, trinerviae, inferior minor, flosculo proximo breviores; *stipitulus* communis flosculorum flexuosus, non secedens, nisi sero: *corolla* 2-valvis; *valvula* exterior lanceolata, acuta, 5-nervia, substriata, transverse rugosa, crebre tuberculata, scabra; interior paululum brevior, apice integerima, nervo denticulate-ciliato, utrinque ad marginem inflexum instructa: *caryopsis* libera, oblonga, convexa, punctulata, rufa.

Obs. *Genus Lolii L.*, *Catapodii Linkii*, atque *Agropyri P. B.* affine, sed differt, a primo calyce semper bivalvi, (nec univalvi,) a secundo rachide alterne excisa, (neque altera facie plana,) a tertio spica inferne ramosa, (non simplici.) spiculis pedicellatis, (nec sessilibus) angustiore facie, (neque latiore) rachidem spectantibus, ab omnibus valvula corollina exteriore, transverse rugosa, crebre tuberculata, scabra.

Novum hoc plantarum genus, observantiae testimonium sacro *Petro Castelli* Botanico, viro egregiae memoriae, qui Botanicum viridarium Messenae fundavit ANNO M. DC. XL.

(*) L'ILLUSTRE Commissione di Pubblica Istruzione ed educazione di Sicilia, dedita sempre a far progredire fra noi le letterarie, e le scientifiche discipline, nel trascorso maggio di questo anno, com-

metteva al Dottor Pietro Calcara Professore Interino di Storia Naturale in questa Regia Università, l'onorevole ed utile incarico d'un viaggio scientifico, diretto ad illustrare e descrivere le isole adjacenti di Lampedusa, Linosa, Pantellaria, e qualche altro punto di Sicilia, che in questa congiuntura avrebbe potuto al medesimo offrire materia di studio, e d'osservazione.

Lietissimo io di questa occasione incaricai il Calcara, mio allievo affezionato, e zelantissimo cultore delle scienze naturali, di occuparsi nei luoghi che andava a percorrere di una corrispondente raccolta botanica; per la qual cosa giudicai opportuno per agevolargliene vie meglio la ricerca, di farlo accompagnare dal mio esperto giardiniere Vincenzo Messina, solito a seguirmi nelle botaniche peregrinazioni.

Reduce dal suo viaggio il Calcara, ha messo al possesso il mio stabilimento d'una bella, e rara collezione botanica, nella quale ho avuto il piacere di rinvenire questa rara Graminacea, che mi offri i caratteri a potere stabilire questo novello genere.

Mi è grato al proposito annunziare, che il Calcara trovasi per pubblicare i risultamenti scientifici del mentovato viaggio, che conterrà pure l'enumerazione dei vegetabili in essi luoghi rinvenuti da lui, e da altri illustri naturalisti che lo han preceduto, e che trovansi nel mio Erbario depositati, onde dare a conoscere lo stato presente botanico di queste contrade per la loro geografica posizione non sempre, ed in tutti i tempi calcate dal piè del naturalista.

13. POA OVALIS. TIN.

P. perennis, panicula aequali, sub anthesi patente, ramis geminatis, levibus, glabris, distantibus, flexuosis, spiculis ovatis, subsexfloris, remotis, flosculis laxiusculis, basi villo connexis, carina, nervisque ad marginem inferne sericeis, foliis margine scabris, ligula oblonga, culmo tereti, compresso, decumbente.

In pascuis montosis, apricis, palustribus. *Contrano al Gуро lo Drago.*

Junio; Julio. ♀.

Radix repens, fibrosa, fibris discendentibus, firmulis, villosulis, fuscis: *culmi* graciles caespitosi, decumbentes, basi radicantes, teretes, subcompresso, glaberrimi, 8-12-pollicares, inferne ramosi, superne longo-vel brevi-tractu nudi, nodis fuscis instructi: *folia* anguste-linearia, acuminata, unumduos pollices longa, striata margine, et carina scabrida, undulata; *vaginae* arctae, striatae, glabrae, superiores internodio breviores; *ligula* oblonga, integra, vel lacera: *panicula* composita, terminalis 2-3-pollicaris, diffusa; *rami* inaequales, tenues, glabri, flexuosi, patentes, distantes, geminati, superiores simplices: *rachis* flexuosa: *spiculae* remotae, ovatae, obtusae, compressae, sub sexflorae albivirides: *valvae calycinae* inaequales, flosculis breviores, oblongae, acutae, glabrae, dorso virides,

margine albo-membranaceae, trinerviae: *flosculi* remotiusculi, basi villo connexi: *valvulae* corollinae subaequales; exteriore oblonga, obtusa, margine membranacea, canaliculato-compressa, carinata, quinquenervi, carina, et nervis inferne villis sericeis, ciliato-barbata; *valvula* interiore angustiore, integra, ciliata: *caryopsis* (parva), lanceolato-ovata, tenuissime striata, punctulata, rufa.

Proxima *P. annuae*; differt praeceps radice perenni!, *panicula* lata, patente, aequali, *ramis* distantibus, *spiculis* remotis triplo majoribus, *flosculis* villo connexis.

14. VULPIA AETNENSIS. TIN.

V. *panicula* spiciformi, subaequali, contracta, continua, simplici!, *spiculis* terciusculis 3-4-floris, *valva calycina* superiore *flosculis* multo breviore, altera minima, *valvula* corollina exteriore glabra, scabriuscula!, margine laxe-ciliata!, aristata, arista illam 3-4-plo excedente!, *valvula* corollina interiore multo minore, ciliolata, foliis setaceis, convolutis.

In montosis apricis. *Etna alli Cassini.* Aprili, Majo. ♂.
Radix fibrosa, fibris tenuissimis: *culmi* 1-3 ex eadem radice, 2-5-pollicares: *folia* setacea, glabra, inferiora brevissima; superius *vagina* sua spathaeformi, striata, paniculam basi involvens: *ligula*

exigua, truncata: *panicula* spiciformis 1-1 $\frac{1}{2}$, pollicaris, simplex, aliquando inferne ramulosa: *pedunculi*, et *rachis* scabri: *spiculae* (parvae) 3-4-florae, teretiusculae, tenues: *calycis valvae* acutae; superius 3-nervia; nervis lateralibus obsoletis: *stipitulus* communis flosculorum demum in articulis secendens cum flosculis: *valvula corollina* exterior obsolete 5-nervia; interior acuta, ad nervos crebre ciliata.

Proxima *V. ciliatae*, sed indicatis notis satis distincta.

15. VULPIA SIGULA LINK. β. LAXA. TIN.

V. *panicula* laxa, erecta, subaequali, raro secunda, spiculis sub-4-floris, compressis, distantibus, glabris, leviusculis, valva calycina superiore flosculis subbreviore, inferiorem duplo superante, valva corollina inferiore obsolete-5-nervi, aristata, arista flosculis breviore, valva corollina superiore, inferiorem subaequante, apice bidentata, foliis anguste-linearibus, convolutis.

In elatioribus montosis. *Alle Madonie sopra il vallone reale.*

Junio, Julio. ♀.

A specie *panicula* subaequali, laxa, spiculis distantibus, solummodo differt.

16 AGROPYRUM SCIRPEUM PRESL β. GRACILE TIN.

A. *spica* gracili, erecta, rachide ad margines acu-

leato-scabra, spiculis remotis, linear-lanceolatis,
4-6-floris, muticis, valvis calycinis multinerviis,
truncatis, valvula carollina exteriore obtusa, 9-nervia,
nervis lateralibus per paria approximatis, foliis
angustissimis, involutis, radice subrepente!

In argillosis salsis humidiusculis. *Palermo a Mondello.*

Junio, Septembri. 7.

Species pro locorum natura variabilis: culmi 1-4-pedales, plus minusve graciles: *folia latiuscula*, vel angustissima, demum semper involuta; *spica* 1-9-pollicaris: *spiculae* 4-10-florae, obcuneatae, ovato-lanceolatae, vel linear-lanceolatae.

47. RUBUS PANORMITANUS. TIN.

R. subtereti, gracile, decumbente, glabro pedunculis, petiolisque villosso-tomentosis, aculeatis, aculeis rectis, reflexisque, raro incurvis, basi dilatatis, foliis ternatis, foliolis (parvis) ovalibus biseratis, ciliatis, lateralibus subsessilibus, supra pilosis, obscure-virentibus, subtus villoso-tomentosis, albidis, aculeatis, panicula simplici, brevi, lacinii calycinis ovatis, acutis, demum reflexis.

Rubus trifolius, repens, molliculo folio piloso, fructu caesio majori Cup. H: Cath. p. 193?

In sterilibus demissis apricis, saxosis. *Palermo*, nelle pianure sotto la scala di *Maseddu*, nel piano di *Gregoli*.

Majo, Junio. 5.

Caules subteretes, elongati, graciles, ramosissimi, decumbentes, glabri, valide-aculeati, 4-6-pedales: *folia* ternata, foliola ovalia, vel obovate-cuneata, inaequaliter argute-biserrata, dentibus nigro-mucronulatis, basi subintegra, subtus ad rachidem aculeata, media brevi-petiolata, vix pollicaria, lateralia subsessilia, semi-pollicaria, aliquando 1-lobata, floralia simplicia, vel trilobata: *panicula* 1½-1-pollicaris, simplicissima, 2-7-flora: *bracteae* linear-lanceolatae, acuminatae, pedunculis longiores, integrae, vel trifidae: *calyces* sub anthesi globosi, ac canescentes; *lacinii* ovatis, concavis, acutis: *petala* suborbiculata, patentissima, emarginata, extus villosa, calyce majora: *aculei* elongati, compressi, basi dilatati, ibique rubentes, in caulis, et pedunculis recti, horizontales, vel subreflexi, in petiolis, ac rachide graciles, adunci, vel recti.

Habitus *R. saneti*, a quo potissimum aculeorum forma, et directione differt.

18. GERANIUM MINÄAE. TIN.

G. perenne, gracile, villosum, caule ramoso, declinato, foliis reniformibus, radicalibus, caulinisque inferioribus 5-(raro-7) lobatis, lobis brevibus, cuneatis, plerumque 3-dentatis, supremis tripartitis, laciiniis linear-lanceolatis, integerrimis, incisisve, pe-talis emarginato-bilobis, calyce duplo longioribus, carpellis non rugosis, adpresse-sericeo-villosis.

$\beta.$ carpellis subglabris.

In elatioribus montosis, apricis, lapidosis; var. $\alpha.$
*Isnello alla Costa dell'oro; al Ferro Minà; $\beta.$ Monte
di Cammarata.*

Majo, Junio. $\gamma.$

Radix crassa, fusiformis, ramosa: caules 3-6-pol-
licares!, declinati, gracillimi!, ramosi: *folia* (parva!)
reniformia, virentia, 5-(raro-7)-loba; *lobis*, cuneatis,
plerumque tridentatis!, 4-4- $\frac{1}{2}$ -unguicularia!, ra-
dicalia longe-petiolata; *petiolis* 2-3-pollicaribus, cau-
lina ascendendo demum sessilia; *floralia* tripartita,
basi truncata; *laciniis* integerrimis, incisive: *stipu-*
lae lineari-subulatae, angustissimae!: *sepala* oblonga,
obtusiuscula, glandula nigra, rotundata, terminata:
petala intense-coerulca, calyce duplo longiora; *un-*
guibus barbatis: *carpella* non rugosa, adpresse-
sericeo-villosa, in $\beta.$ subglabra; *aristis* hirsutis: *pe-*
dicelli unguiculares: *semina* oblonga, glabra, levia:
pubescencia inaequalia, in caule, petiolis, et pedun-
culis patens, in foliis adpressa.

A *Geranio pyrenaico* L. mant. characteribus ad-
notatis satis distinctum.

Francisco Minà Castrobonensi medicinae et Chi-
rurgiae laurea donato, naturalium scientiarum cul-
tori, qui egregias plantas nebrodenses quamplu-
rimas mihi donavit, discipulo meo dilectissimo
hanc plantam.

19. LOTUS VERSICOLOR. *TIN.*

L. pilosus, glauco-virens, caulis gracilibus, abbreviatis, procumbentibus, foliolis foliorum inferiorum subrotundo-cuneatis, saepe emarginatis, (parvissimis), superiorum, stipulisque obovatis, acutis, pedunculis (non elongatis) 1-3-(raro-4)-floris, bracteis 1-3-phyllis, ovatis, vel anguste-lanceolatis, calycinis dentibus aequalibus, tubo subaequantibus, corolla multo brevioribus, leguminibus teretibus, rectis, patentibus.

In apricis, montosis. *San fratello, falde di Montesoro per andare a Randazzo.*

Junio, Julio. 7.

Radix crassa, elongata: caules caespitosi annotini, procumbentes, plures ex eadem radice, fere filiformes, 1-3-pollicares, flaccidi, albidi: foliola carnosula, superiora aliquando cuneata: stipulae subsessiles, petiolo brevi, dilatato, longiores; bracteae calyce multo breviores: pedunculi 1/2-1 pollicares: calycis dentes linearis-subulati, basi latiusculi, corolla triplo breviores: corollae (majusculae) luteae, exiccatione virescentes, vel rubentes; legumina tereta, gracilia, glabra, fere uncialia.

Pili elongati, remotiusculi, patentes, albidi.

20. HELICHRYSUM ERRERAEE. *TIN.*

H. undique cinereo-tomentosum, caulis caespitosis, ramosissimis, ascendentibus, erectisque,

elongatis, foliis margine revolutis, inferioribus confertis, oblongo-spatulatis, basi attenuatis, superioribus angustissime-linearibus, obtusiusculis, corymbo composito, laxo, anthodii (aureo-citrini) globoso-ovati, foliolis obtusissimis, exterioribus, pedunculisque dense-tomentosis, interioribus glaberrimis, discum subaequantibus.

In rupibus vulcanicis. *Pantellaria a Zinedi dentro l'isola, nelle rupi presso il mare. Errera.*

Majo, Junio. ♂.

Caules 1-1/2,-2-pedales, ramosissimi; ramis virgato-elongatis, paniculato-corymbosis: folia subtus albidula, inferiora 1-1/2,-2, superiora 1/2-pollicaria, erecta: corymbus laxus, compositus, aliquando decompositus: anthodia pedicellata, majuscula, sub anthesi fere globosa, primum aureo-citrina, deum stramineo-pallida; foliolis obtusissimis, inferioribus arcte imbricatis, denseque tomentosis: flosculi anthodium subaequantes: pappus subplumosus. Odor gratus.]

Species ab omnibus affinibus, indicatis notis distin-
ctissima.

Medicinae et chirurgiae doctori *Alphonso Errera Cossyrensi*, naturalium scientiarum cultori, qui hunc siculum herbarium multis plantis e patria allatis ditavit, discipulo meo dilectissimo hanc plantam.

21 ORCHIS PARLATORIS. TIN.

O. tuberibus indivisis, foliis inferioribus oblongo-lanceolatis, acutis, spica obovata, laxiuscula, brevi, bracteis lanceolato-subulatis ovarium subaequantibus, petalis basi connatis, exterioribus acuminatis, lateralibus apice reflexis, intermedio cum binis interioribus fornicato-conniventibus, labello planiusculo ovarii dimidium aequante, profunde-trifido, laciniis lateralibus anguste-linearis-subulatis, basi latiusculis, media sublongiore, obconica, denticulata, emarginato-biloba, cum mucrone interjecto, lobulis rotundatis, calcare dependente ovarium breviore.

In apricis herbosis, submontosis, nemorosis. *Palermo sopra le vallate dietro Monte Gallo dalla parte del mare.*

April, Majo. ♀.

Caules 4-6-pollicares: folia inferiora plana, caulinia spathaeformia, lanceolato-acuminata: spica subpollicaris: bracteae videntes: flores intense-rosei, punctato-variegati: petala tria exteriora nervis binis atropurpureis notata: labellum planum, puberulum; laciniis lateralibus anguste-linearis-subulatis!, media subaequalibus!, calcar rectum obtusiusculum.

Habitus *O. commutatae, et tenoriana*e; diflert floribus intense-roseis, petalis lateralibus exterioribus apice reflexis, labello profunde-trifido, laciniis la-

teralibus anguste-linari-subulatis!, media subaequalibus.]

Philippe Parlatore Panormitano medendi artis laurea donato, in I. R. Museo Physices ac naturalis historiae urbis florentiae, Botanicæ, ac Physiologiae vegetabilis professori spectatissimo, et Botanici viridarii rectori, qui multa edidit non parvi momenti opera, discipulo meo dilectissimo, hanc plantam dedico, perpetuum amoris monumentum.

22. CAREX SICULA. *TIN.*

C. androgyna, spiculis apice foemincis, alternis, linear-lanceolatis, acutis, inferioribus distantibus, superioribus contiguis, in spica elongata, inferne ramosa, dispositis, bracteis scabris, ex ovata basi attenuatis, spica brevioribus, stigmatibus duobus, fructibus ovatis, plano-convexis, nervosis, glabris, levibus, marginatis, ciliato-serratis, in rostrum longum, bidentatum, serrulato-scabrum, attenuatis, radice caespitosa, repente, fibrosa.

C. leporina $\beta.$ spica ramosa. *Tin.*, *Gus. fl. sic.* syn., t. 2., p. 2., p. 570.

$\beta.$ spica simplici, spiculis 2-4.

In sylvaticis umbrosis, uliginosis, montosis; var. $\alpha.$ bosco dirimpetto Troina, margio del Sambuchello; var. $\beta.$ laghetto del bosco di Sanfratello.

Junio, Julio. 25.

Radix repens, caespitosa, fibrosa: culmi graciles,

1-1- $\frac{1}{2}$.-pedales, triquetri, striati, superne scabri: *folia* linear-i-acuminata, striata, margine aspera, culmo breviora, vel aequantia: *spica* multiflora, spadicea, 1-2-pollicaris, interrupta, a basi ad medium ramosa: in $\beta.$ simplex, pauciflora: *rachis* flexuosa scabra: *spiculae* androgynae, linear-i-lanceolatae, acutae, superiores approximatae; *flores* foeminei numerosiores: *glumae* anguste-lanceolatae, acuminatae, carina albidae, fructum subaequantes: *fructus* ovari, plano-convexi, glabri, nervosi, longe-rostrati, marginati, ciliato-serrati, apice bidentati.

A *C. Leporina* L. *spica* ramosa interrupta, *spiculis* inferioribus remotis, linear-i-lanceolatis, acutis, satis distincta.

23. SALIX PELORITANA. PREST.

S. frutescens, foliis oblongo-ellipticis, serrulatis, apice obtuso breviter acuminatis, supra virentibus, subtus glaucis, junioribus albo-sericeis, demum glabratis, stipulis subcordato-ovatis, obtusis, amentis masculis....., foemineis pedunculatis praecocioribus, capsulis breviter pedicellatis, ova-to-attenuatis, pubescentibus, stylo elongato, stigmatibus bifidis. Prest.

S. villarsiana? Guss. syn. fl: sic., t. 2., p. 2., p. 624.

In humeribus maritimis. *Messina all'ortora* Prest; nei fossi del luogo detto le Mortelle Guss, Nym, Tin.

Februario, Martio. $\ddot{\nu}$.

Frutex 3-8-pedalis, ramosissimus: *ramuli* juniores, uti *petioli* pubescentes, adulti ex brunneo-rubentes, ac glabri, patentes: *folia*, 1/2-1-poll. lata, 4-2-pollicaria, saepe apice latiora, breviter petiolata, subcordacea, serrulata, glabra, supra viridentia, subtus glauca, juniora albo-sericea: *stipulae* (parvae) subcordato-ovatae, obtusae, cito deciduae: *amenta* mascula...., foeminea praecociora, brevi-pedunculata, pollicaria, axillaria, erecta, rachide, et squamis nigricantibus, albo-piloso-lanatis; *capsulae* tenuiter pedicellatae, ovatae, attenuatae, rugulosae, pubescentes, flavae, stylo longo terminatae: *stigmata* crassa, bifida. Prest.

A. S. *villarsiana*, *stigmatibus* pedicellatis, (nec sessilibus), *capsulis* ovato-attenuatis, pubescentibus (nec ovatis, glabris), *foliis* oblongo-ellipticis (nec subrotundis), satis diversa.

Obs. MELCA CUPANI GUSS, ET M. NEBRODENSIS.

Parl. variant, spicis densiusculis, vel laxis; flocibus majoribus, minoribusque; foliis planis, vel involutis, vaginis glabris, aut villosulis; culmis subcaespitosis, vel dense-caespitosis,

Characteres constantes sunt, in *M. Cupani*, valvula corollina exterior undique dense-pilosa, ac ci-jata, scabriuscula, in *M. nebrodensi* dorso nuda: tuberculato-scabra.

24. CALLITRICE STAGNALIS, SCOP. fl. carn. 2.
p. 251. Guss. fl. sic syn. v. 1. p. 8. β. crassi-folia. TIN.

C. foliis crassis, trinerviis, obovato-spatulatis, inferioribus oblongis, petalis falcatis, apice con-niventibus, stylis persistentibus, elongatis, subre-curvis, fructu subsessili, carpidiis alato-carinatis!.

In fossis, et stagnis montosis. *Ficuzza al Gor-go Lungo.*

Majo, Junio. Θ.

Dense-caespitosa: *folia* (parva) punctata, non e-marginata!, omnia trinervia: *carpida rugulosa*, ala-to-carinata.

25. CALLITRICE INTERMEDIA. WILD. sp. pl. 1., p. 1., p. 29.

C. foliis superioribus natantibus, ovalibus, tri-nerviis, inferioribus linearibus, uninerviis, apice bifidis, fructibus subsessilibus, carpidiis obtusis!.

C. autumnalis α. Bertol. fl. it. 1, p. 29., *C. au-tumnalis* L. δ. Hoffmanni Reich. fl. germ: exc. p. 754.

Ic. Reich. t. 1213. ex ipso.

β. minor, humilis.

In aquis lente-fluentibus; *Palermo condotti di Santo Ciro, e mare dolce*

A vere ad autumnum.

Differt praecipue ab omnibus affinibus, carpidiis

obtusis!, nec angulatis, vel alato-carinatis, aut alatis.

26. VERONICA PSEUDO-ARVENSIS. *TIN.*

V. pubescens, foliis inferioribus petiolatis, cordato-ovatis, crenatis, superioribus sessilibus, bracteis ovato-lanceolatis, integris, pedicello longioribus, racemo terminali, floribus pedunculatis!, corolla (intense coerulea, majuscula,) calycibus irregulariter quadripartitis, aequali!, capsula orbiculato-obcordata, compressa, seminibus plano-convexis.

In uliginosis. *Palermo al ponte dello Ammiraglio, luogo di Carnazzo; fra la Bagheria e Misilmeri alla Porcara.*

Februario, Martio. Θ.

Pubescens: *caulis* teres, erectus, vel ascendens, simplex, vel inferne ramosus, diffusus 2.-40-pollicaris: *folia* inferiora opposita, petiolata: *racemus* terminalis elongatus, laxiusculus: *bracteae* ovato-lanceolatae, obtusae, vel lanceolatae, prope basin dentatae, aut integerrimae: *pedicelli* *calyce* aequales!: *calyx* quadripartitus; *lacinias* inaequalibus, ovatis, obtusis: *corolla* intense-coerulea; majuscula! *calyce* aequans!: *capsulae* latae, bilobae, lobis obtusissimis: *stylus* persistens, capitatus, emarginatus, *capsulae* subaequalis.

Habitus omnino *V. arvensis*, a qua praeceipue

differt; corolla majuscula, calyce aequali, intense
coerulea(nec parva, calyce minori, et pallide-coe-
rulea, vel albida,) floribus pedunculatis, pedunculis
calyce aequantibus, (nec subsessilibus).
luteola

27. VERONICA ANAGALLIS. L. γ. RICHARDI. TIN.

V. glabra, gracilis, caule basi decumbente, ra-
moso, fistuloso, radicante, foliis integris, superio-
ribus sessilibus, amplexicaulibus, ellipticis, lanceo-
lativis, inferioribus obovatis, basi, attenuatis, vel
oblongis, racemis lateralibus oppositis, calycibus
quadripartitis corolla brevioribus, capsulis subro-
tundis, leviter emarginatis.

V. Anagallis β. Vahl. enum. 1. p. 69.?

In aquosis elatioribus. *Etna, Milo sorgive, e val-
lone dello Stroppone.*

Junio, Julio. γ. et ♂.
Caules 2-4-pollicares, fistulosi, ramosissimi,
adscendentes, inferne ad nodos radicantes: *folia*
1/2-1-pollicaria, sessilia, amplexicaulia, elliptica,
vel lanceolata, inferiora obovata, in petiolum bre-
vem attenuata, integerrima, vel leviter remote-et
argute-serrata: *racemi* solitarii, oppositi, foliis lon-
giores: *calyx* quadripartitus, laciniis nunc acu-
tis, nunc obtusiusculis: *corollae* coeruleae, venis
pictae: *stylus* longe exertus, declinatus: *capsulae*
turgidiusculae. *Tota planta glabra, vel puberula.*

28. SCIRPUS PHILIPPI. TIN.

S. culmo triquetro, vaginis superioribus 4-2-foliiferis, spicularum fasciculis lateralibus, sessilibus, pedunculatisque, glumis integerrimis!, late-albo-marginatis!, stigmatibus tribus!, nucula sublenticulari, abbreviata, glabra, setis hypogynis 3-4, penicillato-plumosis.

In fluminibus, ac lacubus. *Al fiume dell'arena, tre miglia distante da Mazzara.* Philippi.

Augusto, Septembri. *v.*

Radix repens: culmus triqueter, erectus, gracilis, intus spongiosus, basi vaginis 2-3, suprema in folium 4-1-1/2-pollicare, triquetre-canaliculatum, erectum, attenuata: umbella spuria, simplex, sita infra apicem culmi, brevis, inaequalis: involucrum monophyllum, carinato-triquetrum, umbella aequale, vel duplo longior: spiculae parvae, ovato-lanceolatae, paucae, capitatae in apice radiorum, capitulo sessili intermedio: bracteae acuminatae, nervosae, ad basin radiorum: glumae ovato-subrotundae, concavae, emarginatae, nervo prominulo, glabrae, carina scabriusculae, margine ciliolatae, integerrimae, dorso fusco-rubentes, lateribus membranaceis, late-albo-hyalinis, plicis arcuatibus subinde prope apicem instructae: stylus simplex: stigma 3. nucula minutissima, abbreviata obovato-cuneata, sublenticularis, apiculata, laevis,

matura nitida, nigricans, et cum glumis decidua:
selae hypogynae 3-4, penicillato-plumosae.

Medicinae Doctori R. A. Philippi Berolinensi,
naturalium rerum cultori, doctis coscriptis operi-
bus celeberrimo, amico dilectissimo, qui Siciliam
iterum peragravit, hanc plantam.

29. *SCIRPUS TRIQUETER*. *L.* *mant.* p. 29. *Vahl.*
En. 2. p. 270. *Bertol fl. ital.* v. 4. p. 292.

S. culmo triquetro, vaginis superioribus 1-2-foliiferis, spicularum fasciculis lateralibus sessilibus, pedunculatisque, glumis ciliato-laceris, anguste-marginatis, stigmatibus duobus, nucula lenticulari, glabra, setis hypogynis 4-6, intus retrorsum hispidis.

S. mucronatus. *Host. G. Austr.* 5. p. 44 t. 66.

In lacubus. *Castrogiovanni*, al lago di Pergusa. *Ins.*

Junio, Julio. *ψ.*

Radix repens : *culmus* 1-4-pedalis, intus spon-
giosus, pallide-virens, crassiusculus, plus minus
acute-triquierter, superne nudus, basi cinctus vagina
longa, abiens in folium per breve, pollicare, aut
paulo ultra, lineare, carinatum, acuminatum, supra
canaliculatum : *umbella* spuria simplex, sita infra
apicem culmi, brevis, inaequalis : *involucrum* mo-
nophyllum, carinato-triquetrum, *umbella* subae-
quale : *spiculae* paucae, ovoideae, turgidae, rubro-
fuscae, capitatae in apice radiorum, capitulo ses-
sili intermedio : *glumae* ovatae, concavae, apice ob-

tusae, emarginatae, nervo prominente, margine tenui, hyalino, perangusto, ciliato-lacero, superne *scabrae*: *stylus simplex*: *stigmata 2.*: *nucula minuta* obovata, lenticularis, apiculata, nitide-fusca: *setae hypogynae 4.-6.*, *retrorsum hispidae*.

30. DAUCUS LOPADUSANUS. *TIN.*

D. pusillus, caule primario subnullo!, ramis brevibus!, divaricatis, inferne, petiolisque retrorsum hispidis, foliis imis bipinnatis, foliolis (minutissimis!) ovatis, vel obovato-cuneatis, obtuse-inciso-dentatis, setosis, scabris, ciliolatis, involucri foliolis pinnatifidis, trifidisve (angustissimis!), umbellarum radios subaequantibus, demum reflexis!, involucellis linearibus, mucronatis, integerrimis, vel 2-3-dentatis, aculeis latitudine fructus longioribus, basi dilatatis, apice stellulato-glochidatis.

In aridis maritimis. *Lampedusa*, alla Cala grande. *Calcaria*.

Majo, Junio. Θ.

Radix subsimplex, gracilis, alba: *caulis* primarius semiunguicularis ramosus: *rami* 1/2.-1.1/2.-pollicares, subfiliformes!, striati, hispiduli, inferiores, decumbentes: *folia* radicalia bipinnata, foliolis ovatis obtuse-inciso-dentatis, media pinnata, foliolis pinnatifidis, laciniis obovatis, integris; suprema pinnatifida, laciniis (minutissimis) abbreviatis, cuneato-2-3. dentatis, vel plus, minusve anguste-lanceo-

latis, integerrimis; *foliola* omnia setosa, scabra, ciliolata, pallide-virentia; *petioli* retrorsum hispidi, basi vaginantes, striati, margine longe-ciliati: *pedunculi* 1-2-pollicares, superne scabriusculi: *umbellae* (parvissimae), $\frac{1}{2}$ -1-unguiculares, solitariae, pauci-radiatae, in anthesi patentes, sed minus in fructu: *involucrum* universale sub-5-phyllo, umbella subaequale; *foliolis* pinnatifidis, trifidisve, angustissimis, acuminato-aristatis, demum reflexis: *radii* breves, inaequales, striati, scabriusculi, (non incrassati!): *flosculus* abortivus centralis nullus: *involucella* umbellulam subaequantia; *foliolis* marginē anguste-membranaceis, ciliatis, integerrimis, raro 2-3-dentatis: *corollae* exiguae, (non radiatae), siccae lutescentes: *diachenium* ovoideum, luridum; *aculeis* latitudinem fructus paulo superantibus, argenteis, basi dilatatis, subcoalitis, patentibus, apice glochide stellulata terminatis.

Planta 3-4-pollicaris.

A Dauco siculo, characteribus indicatis dictin-
ctissimus.

34. ALLIUM AESTIVUM. TIN.

A. scapo folioso, foliis semiteretibus, fistulosis, spatha 2-valvi, umbellis secundis!, ovato-subrotundis, breviore, pedunculis interioribus longioribus, sepalis (albo-pallentibus) carinatis, linearī-oblongis, acutiusculis, carina (flava) laevibus, staminibus alterne-trifidis, subinclusis!, pistillo longe-exerto.

In collibus calcareis aridis, mari finitimiſ, et in montosis. Monte Gallo dalla parte del mare di Sferracavallo, presso Caltagirone, Militello Val di Noto, Bronte Insenga.

Augusto, Septembri. ȝ.

Bulbus oblongo-ovatus, parvus, inter tunicas auctus bulbillis 4-6, pedicellatis, triquetris, acutis: *scapus* teres, subgracilis, striatus, erectus 1- $\frac{1}{2}$ -2- $\frac{1}{2}$ -pedalis, inferne ad tertium foliosus: *folia* semi-tereta, fistulosa, tenuia, supra canaliculata, dorso striata, vaginaria, glabra: *spatha* 2-(raro-3-) valvis, ovata, apice breviter subulata, scariosa, marcescens: *umbella* ovato-subrotunda, secunda!, compacta, ad summum semipollucaris, multiflora, vel pauciflora: *radii* umbellae breves, inferiores breviores, (rarissime deflexis): *perigonum* pyramidato-trigonum, albo-pallens: *sepala* oblonga, carina flavescentia, laevia: *stamina* subinclusa!, alterne-trifida, pallida: *stylus* longe-exsertus, albidus: *capsula* ova-to-triquetra, viridula, perigonio brevior.

Ab A. arvense habitu graciliore, umbellis secundis!, staminibus inclusis, vel perigonio aequantibus!, et florendi tempore! praecipue differt.

32. **POTENTILLA DETOMMASII.** TEN. fl. nap. 4, p. 285., et syll. 251. Bertol. fl. it. t. 5., p. 255.

P. caule erecto, vel adscendente, foliis septenatis, quinatisve, foliolis oblongo-obovatis, denta-

tis, utrinque sericeo-villosis, supra virescentibus,
subtus incanis, petalis luteis obcordatis, calyce du-
plo longioribus, receptaculis villosis.

Ie. fl. nap. t. 44.

In montosis apricis. *Palermo nei monti sopra
Renda, a Cacudda.*

Majo, Junio. ♀.

Planta villosissima, villis longis, patentibus: *ra-*
dix lignosa, crassa, obscure-rubens: *caules* a radice
plures, $\frac{1}{2}$ -1- $\frac{1}{2}$ -pedales: *folia* inferiora longe-pe-
tiolata, suprema sessilia; *foliola* per toto margine
dentata, dentibus acutiusculis: *stipulae* bipartitae,
segmentis acuminatis, saepe laciniatis, rarius inte-
gris: *panicula* terminalis, dichotomo-corymbosa,
compacta: *nuculae* obsoletissime rugulis arcuatis
instructae, cristula carinatae.

33. RUBUS DIVERSIFOLIUS. *TIN.*

R. caule angulato, petiolisque aculeatis, villosis!
aculeis validis aduncis, compressis, foliis quinatis,
ternatis, simplicibusque!, foliolis obovatis, et ova-
to-acuminatis, argute irregulariter duplicato-ser-
ratis, supra glabris, subtus pubescentibus, pani-
cula subsimplici, pedunculis, calycibusque lanugi-
noso-tomentosis!, laciñiis calycinis ovatis, longe-
acuminatis!, inermibus, demum reflexis.

In collibus apricis. *Palermo sopra Colluzzio.*

Majo, Junio. ♂.

Caulis fruticosus, suberectus, ramosissimus, inferne glaber, albidus: *folia* alterna, petiolata, quinata, ternata, et simplicia: *foliolis* obovatis, retusis, aut acutiusculis, vel ovato-acuminatis, non raro 2-3-5-lobatis, ciliatis, nervo aculeolato, supra viridentibus, subtus albidulis, lateralibus subsessilibus: *petioli* aculeis aduncis non validis instructi: *stipulae* lincari-acuminatae: *bracteae* linear-lanceolatae, 2-3-fidae; superiores integerrimae, pedunculis breviores: *racemus* terminalis simplex, vel compositus, 2-3-pollicaris: *calycinis foliolis* ovatis, longe-acuminatis: *pe'ala* obovata, patentissima, plana integrata, calyce majora: *aculei* flavescentes, vel subrufentes, in pedunculis tenuiores.

Characteribus adnotatis ab omnibus affinibus satis distinctus.

34. PRUNUS INSITITIA Sp. pl. p. 680. Bertol. fl. ital. t. 5. p. 155.

P. ramis spinescentibus, foliis ovali-lanceolatis, argute-serratis, pedunculis subgeminatis, petalis ellipticis, drupa subglobosa, caeruleo-pruinosa.

P. spinosa β. macrocarpa Guss. fl. sic. syn. t. 4 p. 553. et sup. p. 829.

P. sylvestris quadruplo majori fructu. Cup. h. cath. p. 173.

In sepibus montosis. Etna siepi di Malpasso.

Junio, Augusto. ♂.

Frutex vel *arbuscula* *orgyalis*, et ultra, cortice
gilvo, vel fusco cum nebula cinerea: *rami* nume-
rosi sparsi, patuli, passim instructi *ramulis* bre-
vibus, crassis, validis, spinescentibus: *gemmae* flo-
rum laterales bisflorae, vel uniflorae: *pedunculi* nu-
di, glabri, aut pubescentes, plerumque, nec sem-
per diametro floris breviores: *flores* quam in *P.*
Cocomilia paulo minores, passim evolvuntur eodem
tempore, ac *gemmae* foliiferae superiores:
petalorum lamina elliptica, integra, vel retusa, ungue
brevi: *drupa* globosa, magnitudine cerasi mediocris,
circiter diametri sex-linearum, semper
valde austera, matura purpureo-caeruleascens: *folia*
primordialia obtusa, et densius pubescentia, prae-
sertim subtus, successiva majora, oblonga, acuta,
acuteque serrata, pilosula, basi angustata. Reliqua
ut in *P. Cocomilia*. *Bertol.* l. c., descript. optima.

35. HELIANTHEMUM ALLIONII. *TIN.*

H. suffruticosum, dense-caespitosum, caule pro-
cumbente, ramis floriferis ascendentibus, subco-
rymbosis, foliis exstipulatis, oppositis, petiolatis,
ovatis, obovatis, lanceolatisve, tomentosis, supra
cinereis, subtus, vel utrinque canescentibus, lon-
ge-ciliatis, racemis simplicibus, pedicellisque pilo-
so-glandulosis!, calycibus hirsutis.

Cistus canus All., ped. p. 105. t. 45., f. 3. nec
aliorum. (*Conf. obs. cl. Moris. in fl. Sard.* 1. p. 202.)

In saxosis asperis elatioribus montosis. *Isnello canale delle Niviere sotto la Vetta della Colma grande.*

Junio, Julio. 5.

Radix lignosa, ramosa, rufescens: *caules* plures ex eadem radice, perennantes, dense-caespitosi, decumbentes, ramosissimi, fuscescentes, rugulosi, glabri, 2-3-pollicares; *ramis* floriferis ascendentibus, 4-4 $\frac{1}{2}$ -pollicaribus, subcorymbosis, cinereo-tomentosis: *folia* opposita, petiolata, exstipulata, ovata, obovata, vel lanceolata, acuta, inferiora minora, supra cinerea, vel albidula, stellulato-tomentosa, adspersa pilis longis, fasciculatis, margine plana, eisdem pilis ciliata, subtus canescentia, tomento brevissimo, stipato, stellulato, inque nervo adspersa pilis longis, fasciculatis: *racemi* simplices 2-6-flori, *pedicellique* tomentosi, piloso-glandulosi, *pilis* patentibus, nigricantibus: *flores* (parvi) ascendentes, vel erecti, post anthesin recurvi: *bractae* linearí-acuminatae, ciliatae: *calycis foliola* canescentia, hirsuta, duo exteriora anguste-linearia, breviora, interiora tria, ovata, quinquenervia, corolla crocea, petalis obovatis, calyce longioribus.]

Ab H. cano, alpestre, italicico, marifolio charactibus adnotatis satis distinctum.

36. HELIANTHEMUM SICULUM. TIN.

H. caule suffruticoso, decumbente, ramoso, ramis ascendentibus, lanuginosis, virescentibus, foliis oppositis, petiolatis, margine revolutis, den-

ticulatis!, subundulatis!, ciliatis, supra glabriusculis, saturate-virentibus, subtus incanis, inferioribus elliptico-lanceolatis, mediis oblongo-obovatis, superioribus lineari-lanceolatis, stipulis anguste-linearibus, ciliatis, pedicellis albo-tomentosis, calycibus hirsutis, fructiferis ovalibus.

In asperis calcareis elatioribus montosis. *Isnello timpe di Marfa.*

Junio, Julio. ♂.

Radix lignosa, ramosa, rufescens: *caules* a radice plures, inferne perennantes, subpedales: *folia* opposita, breviter petiolata, inferiora minora, elliptico-lanceolata, media oblongo-obovata, suprema linearis-lanceolata, omnia acutiuscula, supra saturate-viridia, glabra, adspersa pilis rarissimis, longis, solitariis, vel fasciculatis, margine revoluta, subundulata, denticulata, eisdem pilis ciliata, subtus albotomentosa, tomento brevissimo, stipato, stellulato, inque nervo adspersa pilis longis, fasciculatis, basi tuberculatis: *stipulae* petiolo longiores: *bracteae* anguste-lineares: *racemi* pauciflori: *pedicelli* incani, calyci subaequales, fructiferi penduli: *calycis foliola* duo exteriora linearia, subdimidio breviora, interiora tria, ovata, quinquenervia, nervis purpuratis, tibus, hirsutis, pilis fasciculatis, patentibus, basi tuberculatis, inter nervos membranacea, pallentia, tomentosa, pilis stellulatis: *corolla* crocea; *petalis* obovatis, calyce duplo longioribus.

Proximum *H. vulgari*; differt praeccipue, foliis marginæ denticulatis, subundulatis; mediis oblongo-ovatis, basi tuberculatis; pilis longis, fasciculatis; ramis floriferis non elongatis; racemis paucifloris.]

37. THLASPI ROTUNDIFOLIUM. *TIN.*

T. glaucescens, siliculis obovatis!, emarginatis, alatis, sub 8-spermis, stigmate sessili!, incrassato!, foliis integris, radicalibus petiolatis, caulinis sessilibus, amplexicaulibus, cordatis, subrotundo-ovatis!, caule erecto, basi subramoso.

In herbidis montosis, humidiusculis; *Madonia*, ed alla *Colma grande*.

Majo, Junio. Θ.

Glaberrimum; *caules* 2-5-pollicares, simplices, vel basi tantum ramosi; *ramis* erectis, indivisis, centrali elatioribus: *folia* integerrima, vel obsolete-crenata, carnosula, radicalia petiolata, suborbiculata, aut spatulata, caulina multo majora, subrotundo-ovata, obtusissima: *racemi* conferti!, 1-2-pollicares: *pedunculi* demum patentes, siliculis subaequales: *sepala* obtusa, apice concava exstus rubentia: *corolla* alba, (parva); *petalis* oblongo-ellipticis, calyce longioribus: *silicula* obovata, alata, profunde-emarginata, lobulis obtusis!: *stigma* sessile, incrassatum: *semina* ovoidea, glabra, levia, rufescens.

A, *T. arvense*, caule basi tantum ramoso, foliis

caulinis subrotundo=ovatis, siliculis obovatis, alatis, stigmate sessili, incrassato, abunde distinctum.

38. ANTHEMIS GEMMELLARI. *TIN.*

A. cinereo-villosa, caulis ramosissimis, disflisis, gracilibus, foliis inferioribus 2 superioribus 4-pinnatifidis, laciinis integris, abbreviatis, linearilanceolatis, mucronulatis, impunctatis, pedunculis non incrassatis, receptaculi conici paleis adherentibus, lanceolato-acuminatis, dentatis, apice fuscis, disci flosculis longioribus, acheniis (pallidis) subtetraedris, nitidulis, pulchre-punctatis!, apice margine tenui umbilicato coronatis.

In elatioribus montosis, apricis, vulcanicis. *Etna a Nicolosi, e nella vigna di Gemmellaro.*

Junio, Julio. ♂.

Caules 3-6-pollicares, saepe rubentes; *ramis* filiformibus, ascendentibus, vel in caulis humifusis secundis, lateralibus longioribus: *folia* ima subpollicaria, bipinnatifida, media unguicularia, pinnatifida; *laciinis* inferioribus minutis, superioribus latiusculis, integris, vel 2-3-dentatis, extrema saepe anguste-linearia, integerima: *pedunculi* 1/2-4-pollicares, non incrassati: *flores* parvi: *anthodii* foliola oblonga, carginata, margin albo-scarioso, ciliato-lacero, circumdata, carina obscure-virenti, scabra: *corollulae* radii albidæ, abbreviatae, tridentatae, demum deflexae: *achenia* pellucida, pulchre-punctata!

Tota planta cinereo-villosa: variat, radio nullo:

Manibus et memoriae *Marii Gemmellari* geologi, et mineralogi insignis, comitate ac modestia omnibus scientiarum cultoribus carissimi, qui aetnem regionem perscrutatus sapienter descripsit, hanc plantam ad moerentis animi solatium dicavi.

39. **ECHINOPS SPINOSUS.** Lin. *mant.* *Desf. atl.*
2. *p. 310.*

E. foliis 2-pinnatifidis, subtus tomentosis, laciniiis angustissimis, valide spinosis, capitulis adspersis spinis longis.

Carduus sphaerocephalus acutus. Dod. *Pempt.* 722
Ic.

In lapidosis maritimis. *Lampedusa, Punta rupestre. Calcaria.*

Majo, Junio. ♀.

Caulis errectus, firmus, 3.-decimetr., villoso-tomentosus. *Folia* 4.-3.-decimetr. longa, amplexi caulia, superne glabra, subtus tomentosa, pinnatifido-lobata; *laciinis* acutis, inaequalibus, in aculeum longum abeuntibus. *Flores* congesti in capitulum rotundum, magnitudine E. *sphaerocephali* Lin. *Calyx* proprius imbricatus squamis subulatis interioribus in aculeum saepe longissimum, 2-5.-centrimetr. abeuntibus. *Flores* herma phroditi omnes, quinquefidi. *Stamina* 5.; *antheris* connatis. *Stylus* 1. *Stigmata* 2. *Semen* oblongum villosum, margine sericeo coronatum. *Receptaculum* parvum, rotundum. *Desf. l. c. descript. optima.*

UB WIEN



+AM469782506

